





M








PAVLI
AEGINETAE
MEDICI OPERA,

A IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico exercitatisimo
summiq[ue] iudicij conuersa, &
illustrata commentarijs.



*Adiectæ sunt Annotationes Iacobi Goupy
Medici Parisiensis, in aliquot singulo
rum Librorum Capita.*



VENETIIS,
Apud Hieronymum Scotum.


M D LXVII.


12



Cornelio


Francisco







AD HONORATISS.
VIRVM IO. BELLAIVM
CARDINALEM ET EPISCOPVM
PARISIENSEM,



IO. GVINTERII ANDERNACI
Medici in Paulum Aeginetam præfatio.




*V*AM olim Pauli Aeginetæ interpretationem latinam tibi dicaui, uir honorate, & omni dignitate princeps, eam rursus maiore nunc cura, & fide ad uetusta exemplaria, ipsiusq; artis rationem exactam, recognitamq; , ac breuibus quibusdam commentarijs, illustratam offero: non dubitans, quin illam eo sis animo excepturus, quo olim ueluti rudimēta, & prima operum nostrorum exercitia solebas. Hoc autem nomine potissimum offero: ut gregijs tuis in me beneficijs, literata quædam remuneratione, ac debita beneuolentiæ memoria gratiam repōnam. Tu siquidem iuuentutis nostræ studijs ad optimas quasq; artes celebrandas, recolendasq; fauere nunquam destitisti: per te labores nostri, qualescunq; in Græcis medicinæ autoribus suscepti, clarissimo Francorum Regi Francisco innotuerunt. Vnde mihi non uulgaria præmia,

& data sunt, & proposita, siue ad opes, siue ad gratiam.
Ergo quicquid à me unquam exactius eruditiusq; proue-
nerit, id omne iure tibi optimo debere me libenter agno-
scam. Cui enim potius aliquis otij sui fructum acceptum
referre poterit, quàm Mecænati suo, & patrono, eiq; eru-
ditione, prudentia, & pietate excellentissimo? sub cuius
etiã nominis celebritate & patrocinio tutior à male-
uolis, & uiligatoribus esse possit. Nam hodie ita com-
paratum est, ut statim ubi quis ingenij sui fœturas ma-
gno partas sudore in publicum ediderit, nonnulli malefe-
riati homines, acutius atque acrius uitia quàm reſta ui-
deant: auctori potius, quàm codicum deprauationi ascri-
bentes, quanquam nullius hætenus fuerit philosophiæ,
aut medicinæ interpreter, quem non sæpius aberrasse de-
monstrare possem. Nullus autem labor in disciplinis ue-
teribus instaurandis, magis quidem negotij, & mole-
stie plenius, minus autẽ auctori gloriosius suscipi queat,
quam qui in autoribus conuertendis infumitur. Id quod
ego annis iam sat multis experior, dum communibus ho-
minum studijs & publicæ utilitati prodesse cogito. Cum
enim olim Lutetiæ medicinam publicè docerem, non pau-
cos obiter Græcorum libros scholæ nostræ quasi latinita-
te donauimus, ac in hoc præsertim excudendos permisi: pri-
mum ut amicis aliquot gratificarer, deinde ut habere ex
ueteribus medicis, quos studiosis prælegerem. Eos tamen
libros ex tempore sic potius quàm cura translatos, inte-
rim per interualla reuifere, ac recognoscere decreuerã;
maius aliquando otium, & meliorum codicũ exemplaria
naſtus, sine quibus nihil posse quemlibet ingeniosum pu-
to. Inter cæteros Paulum quoq; Aeginetam, excellentẽ
medicinæ scriptorem, annis mille desideratum, primus in
tegrum

tegrum latinū facere sum aggressus, ea sanè causa & ra-
tione, ut post ampla illa Galeni theoremata compendio-
sum aliquē authorem scholæ nostræ haberent, ex quo me
dendi rationē, quam practicē uocant, fideliter condiscer-
rent. Paulus siquidem omnes recentiores à Galeno citra
controuersia compendio, ordine, artificio, perspicuitate,
& doctrina superat. Adde quod multa erudite tractet,
alijs aut intacta, aut etiā incognita. Quid de parte chi-
rurgica dicam? quam ita feliciter & dilucidè persequi-
tur, ut Auicēna ille Arabicæ familiæ princeps non pau-
ca in suum librum mutuare sit dignatus. Porro quod ad
partes meas attinet, in hisce septem Pauli libris pluri-
mum laboris mihi subeundū fuit, tum exemplariū uitio,
quamuis tria contigerint diuersa, tum quòd in chirurgi-
ca uel instrumentorū nomine difficillima, nulli fere Lati-
ni auctores habeantur, quos tutò queas imitari. Quippe
is semper mihi in uertendis Græcorū monumentis fuit
animus, ut præter fidem, purè omnia Latine & planè
quoad eius fieri potuit, exprimerem. Quauquam hodie
multos agrestes hircososq; philosophos, si dijs placet, ui-
dere liceat, quos impolita, & rudia magis delectant. Ex
horū numero nonnulli grauiores disciplinas exponere ag-
gressi, uocabulis sordidis, & à politiore humanitate alie-
nis sœdarunt, contaminaruntq;. Vnde fit, ut qui paulò
humanius educati, institutiq; sint, non reformident illas
adeò sed fugiant, oderint, & despiciant: cum magis refer-
ret egregias mentes, præclaraq; ingenia, sermonis uenu-
state, & elegancia, ad seueriores illas, ut ita dicā, matro-
nas allicere. Quod an nos in hoc opere præstitimus, alio-
rum esto iudicium, certe sedulò conati sumus. Vale uir
clarissime apud Mediomatrices.



INDEX EORVM QVAE HOC OPERE CONTINETVR.



BAPTISMVS	Abscessus rumpentia	290
instrumen	Abscessum generatio	391
tum 435	Notæ	ibid. & 304
Abdominis	Abscessum neruicorum medi-	
interioris	camenta	290
membra-	Absinthium	479
næ uulne-	Acacalis, Acacia, Acalyphe,	
ra quomodo manu curen-	Acantha, Aegyptia uel arabi-	
tur	ca, Acantha leuce, Acan-	
Abdominis suendi ratio 399	thium	470
Abies	Acantobolon	382
Abrasa quomodo curēda 86	Acanthus	470
Abrasa ab inflāmatione quid	Aceratos emplastrū Gal. 619	
tueatur	Acetabulū §10 & 662 & 663	
Abratum	Aceti fæx	549
Abcessibus corporis exteriori-	Acetum	527
bus conuenientia medica	Acetum scillites §75. quibus	
menta	utile	575
In abcessibus qualia corpora	Achores quid 113. unde orian-	
inueniri soleant	tur ibid. quomodo curen-	
Abcessui quomō manu scal-	tur ibid. & 114	
pelloq; sit medendum 385	Achras	479
Abcessum in pus trāgisse quo	Acidorum uires	265
modo deprehendendū 384	Acinos herba	40
Abcessus medicamētorū 332	Acini mali punici	536
Abcessus quid	Aconitum	470
	Aconiti	

INDEX:

Aconiti poti notæ 356	Rementa 310
dia 356	acutus morbus exacte nō exa
Acopa unde dicantur 231 & 637 & 617	cte 713
Acopa calefacientia quibus cōstent, eorum usus, Acopa emollientia quibus conueniant, Acopa quam spissitudinem habere debeant 637	acutus morbus ibidem
Acopon à uarietate præcilon dictum 638	acutus ex decedentia 714
Acopon azanitæ, Acopon barbaricum dia euphorbiu, adcoxendicum dolores, & alia pleraque 640	adarce tantū aerimonix & caloris habet ut extrinsecus cū aliis imposita urat. 468
acopon Basilii, ibidem	adeps animalium . 47 & 143.
acopon bromion 638	suillus ibidē caprillus ibidē
acopō cui nomē est pyxis 636	anserinus ibidem, gallozum
acopon dysodes ex Gal 638.	gallinarum ibid. leoninus
aliud ibidem	ibidem. bubulus ibidem. uersinus, uulpinus ibidem uiperinus ibidem
acopon ex abiete Gal. 640	adeps marinum calidior & fierior quā fœminarū ibid.
acopon ex atramēto librario, cutis ruborem peculiariter inducens, idq; potissimum in iis quibus altera capitis pars dolet, ex commētariis Alexandri 641	adeps uetustate calidior redditur 544
acopon ex nigra populo. 640 & 673	adglutinamenta 602
acopon lysiponium 639	adanthum 471 & 831
acoron 470	adolescencia ætas 671
acorus nostra 312	adolefcens mulier ibid.
acrides 479	ædæon 468
acrium uires 468	ægilops 771
acrochordon 23	ægilops 468
acroteria smos 426	ægilops morbus quid. 149 & 376 curatio ibidem
acrou acraganthus 87	ægirinum oleum 645
acte 470	ægiros 463
aculeos extrahentia medica-	ægyptia artaba 63
	ægyptia, pessus 661
	ægyptia spina sanguinem & alias fluxiones retinet 470
	ægyptia stomatica 599
	ægyptia terra 483
	æma 469
	æquinoctium uernum quid in hominibus efficiat 55

I N D E X.

Aequinoctio uerno quid faciendum	ibidem	Aethale	467	
Aequinoctium uernū dies habet quadraginta sex usque ad uergiliarum ortum ibi.		Aethiopica olea	489	
Aequinoctiū autumnale quid in homine efficiat	56	Aethiopsis	468	
Aequinoctio autumnali quid faciendum, & Ab æquinoctio autumnali dies sunt quadraginta sex ad occasum uergiliarum	ibidem	Aetius Cappadox	272	
Aera lolium	469	aetonycho 468 agallocū	467	
Aeræ aquæ quib. cōferunt	24	Agapeti compositio ad podagram. § 34	Agaricum 457	
Acrem morborū causam esse quomodo cognoscatur.	87	agarici nigri damnum corpori afferentis remedia	362	
Aereolus	661	agarici uires. § 53	Dandi modus & pondus ibidem. Quale deligendū, ageraton	467
Aer intemperatus contrariæ temperiei confert	22	ageratus	517	
Aeris flos mixtus collyrijs palpebrarum & asperitates & ficus exierit. § 52	quomodo coqui debeat	649	agglutinamenta	602 & 601
Aer optimus. 22	Semper prodest, & Aer temperatus corporibus utilis	ibid.	agglutinamēta oculorum qui defluxionib. infestatur	612
Aer uitiosus ibidem. semper nocet ibidem : quomodo emendandus	87	agnus	465	
Aerugo 498	quomodo coquenda	653	agninus sanguis	469
Aes combustū ad cicatricem ulceribus obducendam in sicciore corporibus præstantissimum est. § 52	quomodo coquendum	662	agrestis	467
Aestate quæ uictus ratio conueniat	25	Agnoscordon	540	
Aetatum omnium uictus ratio	6	aima 469	aizoon	456
		alabastrites	517	
		alana terra	486	
		alæ quomodo adurantur	293	
		alauda. § 10	albus cygnus	664
		albugines oculorum quomodo curentur	154	
		album diarodon	609	
		alexæ. 471	alcibiadion	496
		alcibiadios anchusa	467	
		alcyonium	475	
		alexandri cyphoides	582	
		alexandri purgatio ex Rhodomelite confecta	562	
		alexandri acopon ex atramento librario	637	
		alica	43	
		alimenta quæ laudatiss.	40	
		alimentum facultates ibidem	alimon	

INDEX.

alimon	471	alius quomodo emolliēda	54
allium	42 & 540	alui deiectiones quid præsa-	
alme	471	giant 74 unde deiectio.	
aloe	ibidem	aluo astrictæ quomodo me-	
aloe quibus danda	556	dum	213
aloen exhibēdi tempus & mo-		alius quomodo subducenda	
dus	ibidem	sanis	20
aloe quomodo coquenda	654	alui fluxionibus maxime bi-	
aloe sola inter medicamenta		liosius medetur lac coctū in	
purgantia stomacho con-		quod demissi sunt igniti ma-	
ducit	557	rini calculi 49 & intestino-	
alopex	472	rum torminibus	49
alopecia unde dicta	107	alui astrictæ citæ & cruentæ	
alopecie remedia	108	in febribus causæ & cura-	
alopecia & ophialis quomodo		tio	103
differant	107	alypon	472
alos achne	472	alypi seminis uires, quantitas	
alos anthos	ibidem	& dandi modus	559
alphitidon	431	alysson	472
alporum generatio	281	alyssi uires & utendi mo-	
ratio	ibidem	dus	559
alphi a'bi unde ducant origi-		amantium notæ 135. cura-	
nem	ibidem	tio	ibidem
alphi nigri unde generantur		amaracinum oleum	643
ibidem		amaracus	472
als	470	amarantus	472 & 490
alsine	473 & 523	amarorum uires	465
altercum	549	amaurosis oculorum	158
alterci assumpti notæ	354	ammanitæ fungi	43
media	ibidem	amazonum pastillus	589
althæa	471	ambrosia ad febres arcendas	
alumen 543. quomodo co-		apta	638
quendum	646	ambrosia	472
aluminatæ aquæ ad quid con-		ambustorum medicamenta	
ducant	24	284	
alius quomodo subducen-		ambussis quomodo pili rena-	
da	12	scantur	285
alius pueris quomodo cien-		ami	472
da	405	amiantum	ibidem
		amithæonis	

I N D E X

amitationis empl.	619	andrachme	474
ammos	473	andronius pastillus	590
ammoniacum quomodo co-		androsæmon, androsarces	474
quendum	655	anemomæ	ibidem
ammoniacum thymiana, am-		anethine malagma	636
moniacû suffimen, ammo-		anethinum oleum	643
niaci gutta	473	anethum	474
ammoniaci suffiminis, pon-		anethinum olea incoctâ, dolo-	
rus. modus utendi, atque		re lenit & somniferû est	92
uirres	560	aneurisma quid	386. Eius cau-
amomum	474	sæ	287. Notæ ibid. curatio,
amores	131	angina eiusq; species, & cura-	
ampelos melæna, & ampelos		tio	173
leuce	473	anguis senectæ	485
ampelos agria	473	anicetos empl.	619
ampelos hemeros	ibid.	ani inflammationis curatio	233
ampeloprasum	473	ani erysipelata quomodo cure-	
ampelitis terra	485	tur	ibidem
amphisbenæ morsus curatio		ani dolorem mitigantia	234
344		ani excreſcentia quomodo cu-	
amigdalinum oleum	643	randæ	ibidem & 235
amygdalinum metopion ibid.		ani ulcera pascendo serpentia	
amygdala, dulcia, amara	43 &	quomodo sananda	232
475		ani rimas curantia ibid. &	234
amylum	43	ani cōdylomata quomodo cu-	
amylon, & amurca	373	randæ	234
ambrochismus in quibus &		ani cōdylomata, tubercula &	
quomodo fiat.	272	rimæ quomodo manu cu-	
anagallis, & anagyris	475	rentur	424
anarrhinon	475	ani fistularum curatio manu	
ancyloſis quid & quomodo cu-		administrata	420
randæ	326	ani non perforati curatio	423
anaphorici	178	ani ulcera humida quomodo	
anas	46	curanda	232
anatis sanguis	459	ani ulcera citra inflammationē	
anchilops eiusq; curatio	149	oborta quomodo curanda ibid.	
anchusæ quatuor	467	ani procidentis curatio	235
ancyle, & ancyloſis	226	ani ulcera sicca recentia quo-	
ancylion, ancyloglosson	380	modo curanda	232

animi

INDEX.

animi relaxatio ad probā corporis educationem plurimum affert momenti	6	aphechema.	423	aphace	479
animæ defectus causæ & remedia	104 & deinceps	aphrodes papauer	521		
animalia pedestria	47	aphronitrum	479		
animalia fera siccius,quàm domestica, alimentū exhibēt, minusq; excrementiciū	48	aphroiselenes lapis	517		
animalia uolatilia	46	aphroditarium	595		
animalium partes	47	aphrodisiasticon clidon pattilus.	586	aphros	479
animalium pedestrium carnes, & anisum	475	aphias curantia	6. & 171	apios	476
anodynon medicamentum ad abrasa, flagris cæsa, & articulorum contusiones	286	apiastrum.	521	apiū grandæ	498
anodynō colliriū liquidū	145	apium 538			
anonis 475		apium palustre	49		
anorexia	192	apium ictus notæ. 329			
anseris 46		dia, & apium montanū	527		
anserinū adeps	542	apium sylvestre	541		
anseris sanguis	469	apii dimidii quod ad radicem est utendi modus	559		
anserū oua 46,		apiū quas uires possideat	41		
anthemis	555	apochyma	476		
antheron 597,		apochymatis coctio	655		
anthyllis	475	apochynon	476		
antiadas curantia	172	apollinaris herba	551		
antidotum quid	571	apomeli	601		
antidotum dia hæmaton ex sanguinibus	471 & 469	apomeli, ex commētariis philagrii	601		
antidotorum differentia	571	apoplexia quid	125		
antidotum Mitridatis, diastinctu	575	apoplexia cui ætati & tēperamēto potissimū accidat	126		
antidotum philonis	577	apoplexiæ signa, & apoplexiæ causā apoplexia curatio	136		
antidotum, Sotera	578	apofyrmata quomodo curanda	285		
antidotum Satyriacum	587	apotherapia	8. & 10 & 11		
antidotum theodoretum	217	apothrausis	432		
antidotū theriace quomodo pareretur	570. Eius usus	appetentia canina quomodo curanda	99		
antihirrhinon	475	apri iccur	495		
antiochi hiera	567	aqua 149			
antilium	636	nitrosa, bituminosa, ibid pluuiialis, ibidem marina	495		
antitasis 438					
aparinæ	476				

aqua hydropicis quomodo e- mitatur. 396	aqua inter cu- tem. Vide, hydrops, & aqua aluminata ad quid condu- cant 24. nitrosa, & salse ibid. sulfurata ibid. bitumi- nata ibid. ferrea, & aqua in qua ferru extinctu est 538	aqua frigida in febris putri- dis quando tuto exubea- tur, & aqua quæ optima 22 eius notæ 78
aqua frigida qñ assumenda 23	aquam educentia 560. quibus conueniant ibid.	aquæ areæ quibus cōferat 24
aquæ rosatae quam hydrosta- tum dicūt, compositio 601	aquosorum uis 465	aquæ frigida subito cumula- tini potæ remedia 362
aquosum rancidē curatia 228	aqua frigida quando cum fidu- cia propinanda in febrī- bus 83	aqua uiciosa 22. quomodo corrigenda 23
aquam elicentiā quibus exhi- benda 562	aquæ bituminæ quibus conte- rant 24	aquarum sponte prouenien- tiū differentia 24. uires ibi.
aquæ naturalium differen- tiæ, & aquæ sulfuratae qui- bus conferant, & aqua uitio- sa quomodo enedanda 23	aquæ salse & nitrosæ quibus conferant 24	arabica spina 469
aquæ ferreae quibus confe- rant ibidem	aquæ uiciosa notæ 22	arabicus lapis 517
aquæ frigida potu coercendi phrenitici 127	aquam educentia 220	arachne, & araneus 476
aquam uiciosa sumpturus quæ præmittere debeat 23	aquosorum uires 464	araneæ ictus notæ 340 reme- dia, & arbutus 508
aqua marina 496	aquarum naturalium uis 24	aceuthos 475
aquarum naturalium uis 24		archigenis hiera 566
		archigenis medicamentum ad uiperarum morsus 344
		archigenis medicamentum ad erosionem inamillarum cū malignitate 290
		archigenis medicamentū ad carcinode & cacoethe ulce- ra 300
		arction. 466 arena 473
		alghemon. 152 argemone 476
		argæi montis Cappadociæ la- pides 517
		argentum uiuum 549
		argenti spuma 516 quomodo coquenda 652
		argenti uiui assumpti notæ & remedia 361
		argenti recrementum 490
		arida medicamenta eorumq; uariæ differentia. 591 aridū ad xerophthalmiā &c. 609
		aridum

INDEX.

aridum collyrium Gal. quod		dignoscendi causa	64
oculos tuetur	612	arteriæ post aures in quibus	
aridum dia crocu	612	passionibus incidendæ	365
aridorum mensuræ	663	arteriæ quomodo diuidantur	
arietum testiculi	47	ibidem	
ariobarzanon emplastrū	614	arteriæ asperæ tumor q. bron-	
arifarum	475	cho cele dicitur	387. eius
aristolochia	ibidem	differētia duplex ibidem cura-	
aristolochiæ clematidis pon-		tio	388.
duş, modus ex hendi & ui-		arteriam humidiorē quæ red-	
res	558	dant	72
aristophanium empl.	610	arteria aspera quomodo inci-	
armenia	45	di debeat	383
armenia empl.	623	αρθρίανον	175
armenia terra	485	arteriotomia	265
armeniacus lapis	517	arthritis quid 258. signa	ibid.
armeniacum	477	arthritidis causæ	257
armenia mala	45	arthritis à podagra quid diffe-	
arnabo	477	rat	258
arnoglossum	477	arthritidis ex sanguineo hu-	
aron	477	more curatio	261
arquatus	225	arthriticis non sanguineis so-	
arsenicum	477	lum, sed pituitosi etiam &	
artaba ægyptia	663	melancholicis in morbi ini-	
artemisiæ	477	tic sanguis mitti debet ibi.	
arteriace ad abscissum uocis		arthritidis ex bile curatio 259	
sonum & eius claritatem fa-		articularius morbus uide ar-	
ciens	178	thritis.	
arteriace, hypoglossis appel-		articulorum dolor uehemens	
lata, ad abscissionem uo-		quomodo leniendus	ibid.
cis, rauitatem, & ægrè reii-		articuli unde laxentur, articu-	
cientes	ibidem	lorū relaxatorū curatio	377
arteriæ quid	63	articulorum doloribus contra-	
artèriarum usus	ibidem	ctis intenso frigore aut hu-	
arteriarum origo	ibidem	moribus inter ossa articulo-	
arteriæ omnes eodem pulsan-		rum impactis	263
di modo inter se & cum cor		articulorum tophi quomodo	
de conueniunt	ibid.	curandi	264
arteriæ quæ tangendæ pulsus		articulorū tophos quid coale-	
		scere	

INDEX.

scere impediāt	263	after pastillus	585
articulorum intortorū & con-		astragalus	479
tusorum remedia	302	astmatici 179. eorū curō ibid.	
articulorum contractio seu li-		astringentium uires	465
gatio quæ ancyloſis dicitur		astringentiū ante & poſt cibū	
quomodo curanda	326	ſumptorum facultas	45
articulorum cōuſionum me-		atactos compositio ad poda-	
dicamenta	286	gram	584
articolorum morbis quomo-		attegena	46
do & quæ medicamenta		athanasia Oribasii	577
adhibenda	262	athema emplaſtrum	620
articulorū ulcerū curatio	320	athera	469
artos 478 artus ſanguine in-		atheroma quid 306. curatio	
feſtati quomō curētur	264	ibid. & 386	
aſarum. 478 aſbole 478		atracton. 428 atractylis 479	
aſcalabotes, & aſcarides lum-		atractylis uires	41
brici 331. ubi generentur		atra bilis duplici modo gene-	
ibid cauſæ & curatio	342	ratur	560
aſcyrrhon	473	atram bilem uacuantia medi-	
aſcyrrhoides	475	camenta ſimplicia	560
aſclepias	478	atram bilem purgantia medi-	
aſclepion chironium	530	camenta quibus & quando	
aſclepion panaces	ibid.	exhibenda	560
aſclepios ſmegma aridū	594	atramentum indicum	520
aſelli. 459 aſiæ petræ floſ 517		atramentum ſcriptorium 520	
aſini 427 aſininum lac 482		atramentum ſutorium 522. c.	
aſininū iecur. 495 aſpaltus 479		20. 4. quomodo coquen-	
aſpalatus. 478 aſparagus 49		dum	654
aſparagorum differentię & ui-		atriplex	479
res 479 aſphodelus 42		atrophia oculorum	156
aſpera arteria quomodo inci-		attenuantium alimentorum	
di debeat	383	uires	40
aſpidis morſus notæ 346. cu-		auditum grauē corrigentia 14	
tio	347	auditum grauē curātia 161	
aſpidis tria genera	346	auditus grauſ quomodo cu-	
aſpidis exuuium	485	randus	163
aſplenon, aſtaphis, after attri-		auditorii meatus non perfora-	
cus	478	ti cauſa & curatio	377
after magui	610	auellana 45 auena 43	
		auenæ	

INDEX

auenæ decoctio. 43 aues 46
 aures animalium 47
 auricula muris 472
 auriū sordes extrahentia 161
 aurium dolor quas causas ha-
 beat & quomodo curari de-
 beat. 159: & deinde per to-
 tum caput.
 auribus incidentia quomodo
 extrahantur. 163
 auribus incidentia quomodo
 modo extrahantur. 378
 aurium sonitus quomodo cu-
 randus 163
 auriū-uermes quomodo cu-
 randi, aurium cruorem fun-
 dentium remedia, aurium
 ulcera diuturna quæ sa-
 nent 162
 aurium tinnitus quomodo e-
 mendandus 163
 auriū humiditates desiccātia 5
 auris congestæ curatio 422
 aurium pus curantia 161
 aurium caro excrescens quo-
 modo arcenda 162
 aurium ulceribus cum inflam-
 matione quid faciendū ibi.
 aurium curia quomodo sar-
 cienda 379
 aurium confusio quomodo cu-
 randa 163
 auripigmenti assumpti notæ
 361. remedia ibid.
 auripigmentum 479 quomo-
 do coquendum 649
 autumnino quæ uictus ratio con-
 ueniat 25
 auulſorum remedia 203

B

B Accæ prunorum sylue-
 strium 507
 Baccharis 480
 Baion malagma 634
 Balaninon oleum 645
 Balanus myrepſica 480
 Balauſtium, Balenæ 50
 Ballote. 480 Balnea alumi-
 nosa quibus conferant 24
 Balnea area quib. cōferat ibi.
 Balnea bituminata quibus cō-
 ferant ibid.
 Balnea ferrea quibus confe-
 rant ibidem
 Balnea falsa & nitrosa quibus
 conferant 24
 Balnea sulfurata quibus con-
 ferant ibidem
 Balnei aquæ dulcis calidi uti-
 litates ibidem
 Balneorum naturalium disſe-
 rentiæ ibidem
 Balneorum sordes 485
 Balsamum 480
 Barbara, emplastrum 620
 Barbaricum acopon, dia eu-
 phorbiu 639
 Barbe alopeciis efficax reme-
 dium. 151
 Basilisci morsus notæ 347
 Basilicum tetrapharniacū 614
 Basilii acopon 639
 Basti hygra adhypopios 153
 Batina mora 599
 Batrachi Bdelium 480
 Bdellij pondus, & modus uti-
 di 360
 Bdelliū quomō coquendū 651
 Bechicon

INDEX.

Bechicon	178	curetur	458
Bechicon ex styrace ad tussim		Brachii contracti curatio	443
577		Brassicę marinę facultates	41
Bechium 481	Belulcum 428	Brassica marina	476
Befasa. 524	Beta 545	Brassicę facultates	41
Betę uires. 1	Betonica 481	Brathy. 486	Brion 482
Bilis atra duplici modo generatur	272	Britanica Bromiõ acopõ	624
Bilis uomitioni quomodo occurrendum	101	Bromus 482, Bronchion	182
Bilem atram uacuantia medicamenta simplicia	560	Bronchus	175
Bilem atram purgantia medicamenta quibus & quando exhibenda	ibid. & 560	Bronchocele	387
Bilem flauam educetia, quando & quibus exhibenda	560	Bryonia	483
Bilem flauam purgantia medicamenta simplicia 556. & sequentibus		Bryõ rhalaßion, Buboniũ	482
Bilioßis alui fluxionibus medetur lac coctum in quod calculi marini igniti decocti sunt 49 & intestinorum torminibus	ibidem	Bubo quid	96. Curatio ibid.
Birhynus pastillus	591	βουβονοκία	227
Bitumen	48	Bubulum lac	483
Bituminatę aquę quibus conferant	24	Bubula caro	47
Bitumẽ quomõ coquẽdũ	650	Bubulum stercus	262
Blatta quę in pistrinis inuentur	539	Bubulum stercus	508
Blepharoxiston	150	Bubulus talus	518
Blitum. 481	Bliti uires 41	Bubulus adeps	542
Boleti. 43	βομβύλις 124	Bucellatus purgans	561
Botanicum emplastrum	611	Buccina	50 & 505
Botryon. 152	Botrys 583	Buglossum. 482	Bulbus 481
Bouis femora cremata	529	Bulbus agrestis	357
Brachitlis luxatio quomodo		Bulbi	42
		Bulimos quomodo curet	99
		Bunium, Buphtalmon	482
		Buprestis assumptę notę	352
		Curatio, Buprestis	482
		Butyrum	482
		C	
		Acacia	500
		Cachexia quid 218. eius curatio, Cactus arbor	541
		Cacoethe ulcera	315
		Cactos. 302	Cadmia 500. quomodo coquenda
		Cæcitude nocturna quid & quomodo curetur	156
		Cæli	

Cæsi flagris quomodo curan- di 285, & 86	Calidioris temperaturæ no- tæ, Calidi & humidi tempe- ramenti notæ
Calamagrostis 500	Caliginem oculorum prohi- bentia 14
Calamus, & Calaminta 500	Callus quid 419
Calcanei ex longo decubitu attritus quomodo curandi 268	Callos excindenda 318
Calcaneorum & plani pedū scissuræ quomodo curandæ ibi.	Caluarie fracturæ curatio 43
Calciamentorum ueterū co- ria 488	Caluitium unde fiat 107
Calx, & Calcis assumptæ no- tæ 361. remedia 549	Caluitiū curatio 107 & 109
Calculorum in renibus no- tæ 207	Camarosis 432
Calculi ne creentur 208	Cameli cerebrum 489
Calculorum materia 207	Campe. 500 Cancamum 599
Calculi rufsi eiekti 175	Cancanus ibidem
Calculorum causæ 107	Cancer in quib. corporis par- tibus oriri soleat 299 Cau- sæ ibidem. Signa 300. Cura- tio 299
Calculi in uesica notæ 404	Cancer in seminarum mam- mis cur potissimum acci- dat 399
Calculorum in renibus cura- tio 207	Cancer latens 394
Calculi uesicæ quomodo ex- cindendi 404	Cancer unde appelletur 300
Calculus quibus excinditur, qui facile curationem reci- pianc ibidem	Cancer cur planè non confa- nescat, & Cancer quid 272.
Calculos quatuor aut quinque; asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarū trium, aut quatuor expuit quidam 182	Incurabilis, & Cancer quo- modo præcauendus 300
Calculus per anum in tenes- mo excretus 198	Cancer quibus partibus cor- poris accidat 394
Calculi in sanguinis reiectio- ne excreti 175	Cancer quid 394. unde dica- tur, ibidem. Eius curatio ma- nu adhibita ibid.
Calida intemperies quomo- do corrigatur 36	Cancro 50. & 501
Calidi & sicci temperamenti notæ 29	Canus non rabiosi morsus re- media 339
	Canis qui momordit rabio- sus sit an non, qua ratione cognoscas. 337 Canis rabidi morsum symptomata 336

Caninus appetitus quomodo curandus	99	bona, quæ mala	30
Canis rabidi iecur	495	capitis morbos quæ signa præcedant	13
Canis rabidi signa	336	capitis ulcera manantia unde fiant 113. quomodo curentur	ibidem, & 114
canum stercus	508	capitis exanthemata quomodo curentur	114
canes rabiūt plernnq; in æstu uehementiore	336	capitis morborum signis neglectis quæ ægritudines sequantur	54
canis rabiosi morsum remedia. 338	cannabis 509	capitis morborum signa ubi apparuerint quid faciendum	ibidem
canopus. 561	canopon 500	capitis faui unde nascantur & quomodo curentur	113
cātharidis assumptæ signa 352		capitis formatio	30
curatio, cantharides 500		capitis pediculi quomodo abigendi	114
capillus qua ratione aureus reddatur	111	capito piscis	49
capitis dolor ex insolatu contractus quibus notis dignoscatur	115	capnistos pastillus	173
capitis dolor ex insolatu contractus quō curetur, capitis dolorem ex frigida intemperie notantia, & curantia, capitis dolorem ex bilioso humore curantia	116	capnion, & capnos	500
caput cōsortij lege indolefcēs quomodo curetur, capitis dolor ex uino quō cureter	117	capparis	41 & 501
capitis dolor ex ictu quomodo curetur, capitis ptydracia quomodo curetur	112	caprarum sanguis	470
capitis dolorem ex calida intemperie curantia	115	caprarum syluestrium sanguis	ibidem
capicis dolor unde oriatur ibidem		caprillus simus	262
capitis ulcuscula densa, rubraque quomodo curanda	113	caprillum stercus	508
capita 504	Menarū ibid. Smaridis ibid. Muris ibid. Milui ibidem. Lacertæ ibidem	caprillus adeps	542
capitis quantitas & figura quæ		caprilla caro	47
		caprillum lac	482
		caprillum cornu	503
		caprillum iecur	495
		caput adurendi modus	263
		caput quomodo aduratur in lippientibus ægre spirantibus, & elephanticis	363
		caput per os & nares quibus medicamentis euacuandū	21
			carbunculus

I N D E X:

carbuuculus quid. 298	causæ	caseus oxygalastinus	545
ibid. Notæ ibid. curatio ibid.		caseosum lactis	483
carbunculus	287	castamum	502
carbunculus oculorum	155	castia, & castanea	46
carcinoma oculorum	ibidem	castorium	502
cardamine	539	catagmaticæ Oribasii 625. ex	
cardamomum	501	commentariis Heraclei ibid.	
cardamum	501	catalepsis	125
cardiogmos. 127	carduus 541	cataphora quid	72
cari radix. 42	caricæ 44	cataphoræ curatio	93
cari species. 23	caris 501	cataphora quid 53. causæ ibi.	
caries lignorum	537	curatio	ibidem
carnes optimæ. quæ	47	cataplasma quod oras uulne-	
carnes uolatilium quomodo		ris latis in rabidi canis mor-	
differant	46	su seruat	328
carnem generantia medica-		cataplasma ad sacrum ignem,	
menta	309	herpetas, & abscessus, paroti-	
carnis contusæ curatio	302	das, & ambusta	295
caro bubula	47	cataplasmata	590
caro ceruina	ibidem	catapotia ex aloë 562. modus	
caro hircina	ibidem	utendi atque pondus ibidem	
caro humana	ibidem	catapotia ex lapide armenico	
caro leporina	ibidem	arthriticis	565
caro ouilla	ibidem	catapotia ad tussim ueterem	
caro suilla	ibidem	accommodata	177
caro thymi salis	543	catapotia ex xylomacere, dy-	
caros	123	sentericis utilia	585
caros à lethargo quid disse-		catapotia ad destillationem in	
rat	123	fauces & tussim	177
carpesium	502	catapotia Dosithei ad iecur in	
carpesiæ liquoris poti notæ		scripta	583
356. remedia	ibidem	catheter	213
carya	500	catheterismus	402
caryinum oleum	646	catochos	121 & 125
caryophyllon	500	catochi causæ ibid. Signa ibi-	
caseus	49 & 548	dem. curatio	126
caseus laudatior	49	catochi uel catochomeni un-	
caseus acris	ibidem	de dicti, 125 calcalis	503
caseus pessimus	ibidem	cauda equina	493

I N D E X.

Causos febris	81	Ceratoides membrana	150
Cautica. 151	Cecis 504	Ceratum thaidis quo facies	
Cedrea, Cedrus arbor	503	rubescat	198
Cedrus frutex, Ccle, Videra-		Ceratum dia turpænes ad po-	
mex, Cenchros, Cenchri		dagram dolorem leniens mi-	
morsus notæ	346	rabiliter	628
Curatio, Centaurium	503	Cerosus quid 415	quomodo
Centaurii minoris uires	558	sit emendanda	ibid.
Pondus ibid Exhibendi mo-		Cerebrum 490. Leporis ibid.	
dus, & Centunculus	486	Galli ibid, Cameli ibid. Mu-	
Cepa 42. 512	Cepæa 504	stelæ ibid Hirundinum ibi.	
Cephalæam curās apophleg-		Ouillum	ibidem
matismus	120	Cerebri membranæ inflam-	
Cephalæ	504	mationis notæ, causæ & cu-	
Cephalææ curatio	118	ratio	436
Cephalæam curans epithe-		Cerebri uulnerati notæ	431
ma	ibidem	Cerebri membranæ conuul-	
Cephalæam curans unguen-		neratæ signa	ibidem
tum	119	Cerebri mē branæ nigrescens	
Cephalæa	117	quomodo curetur	436
Cephalæam curantia medica-		Cerebri erysipclatis signa &	
menta varia	119	curatio	123
Cephalalgia unde oriæ	115	Cerebri temperatur notæ	30
Cephalicus puluis, capiti con-		Cerebrum animalium	47
ueniens	592	Cerebri inflammationis signa	
Cera	504	& curatio	123
Ceræ cum oleo qui modus		Cerion quid 421. eius cura-	
esse debeat in conficiendis		tio	ibidem
unguentis	656	Cervicis tumorū curatio	388
Ceræ quomodo coquēda	663	Cerui, cornu	503
Ceras 503	Ceramium 660	Cerui masculi pudēdum	463
Ceramium Italicū	ibidem	Ceruina caro	47
Cerasia	45	Cerussæ assumptæ signa	361.
Cerasia 504. dulcia, austera		remedia, & Cerusa 555. quo	
ibid. acida	ibid.	modo coquenda	639
Cerasi arboris gummi	ibid.	Ceryces, & Cheræfolium	505
Cerastis morsus notæ	346	Chalbanæ	554
Curatio. 347	Ceratum 661	Chalaziō & eius curatio	150
Ceratonia arbor	504	Chalcāthon, Chalcitis	554
		Chalcitis	

Chalcitis quomodo coqui de beat 648	constantini sapo 598
Chalcidica lacerta 559	choriō. 4: 8 chrysanthos 40
Chaleos. 554 Chalcus 661	cyryse emplastrum 625
Chalcuanthos 554	chryfocolla 556
Chalazium quid 373. curatio ibidem	chryfocome 556
Chamæ. 50 Chamæacte 471	hryfitus 556
chamædrops 555	chryfos. pessus emolliens 651
chamædryas, chamæleon 554	chus 651
chamælaræ pondus & modus administrandi 558. uires ibi.	cibis in uentre corruptis quid faciendum 15
chamælaræ 556	cibi fastidium prohibentia 1
chamæleuce 554	cibi fastidium eiusque causæ signa & curatio 191. & 192
chamæleonis nigri assumpti notæ 54 curatio ibidem	cibi qui laudatissimi 40
chamæleonis sanguis 469	cibi uarii assumi non debet 40
chamæmelum 555	cibi fastidium in febribus quo modo curandum 98
chamæmelinum oleum 629	cicadæ 546
chamæpityos pondus & uten di modus 561	cicatrix ulceri quomodo indu cenda 313
camæpitys 555	cicatrices oculorum quomo- do curentur 154
chamæraphanon 561	cicatrices nigræ quomodo tol lendæ 316
chamæsyce, chelidones 555	cicatrices quomodo tingan- tur 154
chelidonia aspidis genus 346	cicer. 44 cicer 491
chelidonium. 55 chema 657	cichorium 506 cici 505
chemosis quid, & quomodo curetur 148	cicinum oleum 645
chersæa aspidis genus 346	ciconiarum ltercus 509
chezananze 565	cicuta 513
chia terra 485	cicutæ potæ notæ 355. reme- dia ibid. 485
chiacum collyrion 601	cimex 485
chirurgicæ partes duæ 363	cinara quomodo preparan- da 41
chænix. 657. & 659 cholæ 555	cinerula. 341 cinis 545
cholera quid 195. eius curatio ibidem	cinnabaris, cinnamomū 505
chondrilla 556	cinara uires 41
chondrus 556	* * 3 cinocrambe
chondri coctio 43	

I N D E X:

cinōcrambe	476	cocci gnidii uires, pondus, &	
cirēza	505	sumendi modus	598.
circūcisorum curatio	403	coccos baphicos	507
cirsocele. 409	cissaros 506	coccymelza	ibidem
cistēris	505	cochlea. 510	cochleaz 50
cissos, & cisthos	506	cochleaz terrestres, cœlia	507
cissimum emplastrum	613	cœliacus affectus	197
cittæ causa	1	colchicon unde dicatur	357
citra grauidarum symptoma		colis glans contacta quomo-	
unde nomen acceperit	2	do aperiatur	401
citream malum	46	colicis dolor in Italia uictus	
citrei mali tres partes	ibidem	ratione temeraria curatus à	
citrium	506	quodam medico	205
citrium malagma	633	colla. 507	colon quid 202
claudiacum dia smyrnon	607	colobomata	379
clauus quid 269. curatio	ibid.	colocyntha, colocynthis	507
clauus quid & unde dicatur		colocinthidis effectus.	557
427. curatio	ibidem	pondus ibidem. exhibēdi mo-	
clauiculæ luxatæ curatio	455	duz ibi. quib. exhibenda	ibid.
clauiculæ cōfractæ curō	441	colicorum remedium	217
clēmatis, clematis altera	506	colis glans nuda quomodo cō-	
cleonis collyrium	609	tegenda	401.
cleopatrz mors	348	colicus morbus quid 202. caus-	
clidion aphrodisiasticon, pastil-		sz ibidem signa ibidem, cura-	
lus	586	tio 203 & deinceps	
clidion oribassi ad dysenteri-		colico & renum dolori quid	
cos, & cœliacos	ibidem	commune, quid propriū	207
clinopodium	506	colliquamenta corporis quō	
clystere uesicæ	403	curanda 92. & sequentibus	
clysteribus qui uti debeāt	20.	color urinæ aquosus rufus &	
& qualibus	ibidem	biliosus mediocriter palli-	
cneoron quas uires obtineat		duz quid significet	7
560		color malus corporis quomo-	
cnicus	507	do emendandus	13
cnici seminis pondus & sumen		colpos quid 216. curatio	ibid.
di modus	598	columbarum sanguis	469
coagulum 535. leporinum	ibi-	columbarum pullus	46
dem equinū	ibid. Phoece ibi.	columbarum syluestrium ster-	
coccoz cnidios	507	cus	509
		columella	

columella 381. curatio ibidem	dat	128		
columellæ inflammatio quomodo curanda	172	comitialis morbus trifariam gignitur, & comitiales quomodo coarguendi	129	
collyrium anodynon	146	comuni. § 14	commi § 08	
collyrium malabathrinū	611	compositio Procli, podagræ & coxendicum doloribus ac commodata	§ 86	
colymbades. 45 collyria	603	compositio dia hermodactilu ad podagram	§ 64	
collyrium ex succo fœniculi	608	compositio dia citriu, quod est ex malo medico, stomacho utilis	§ 63	
collyriū ex opobalsamo ibid.		compositio dia coronopodiu	§ 65	
collyrium ex aloë	609	compositio rhodostacti	602	
collyrium ex succo fœnugræci, collyrium cleonis	609	compositio Agapeti ad podagram. § 86	compositio atactos ad podagram ibidem	
collyriū crassius ex uino	611	compositio pæonia	§ 83	
collyrium ex duobus lapidibus ad asperitudinem	611	conchulæ Indicæ	§ 27	
collyrium aridum Gal. quod oculos tueretur ibidem		conchyliæ	§ 07	
collyrium chiacum	614	concoctionis signa nunquam sinistrè apparent	61	
collyrium ex oleæ turionum succo tenerum	606	conditum calculos confringens	§ 84	
collyrium ex decoctis	605	cōdylomata locorū muliebriū	415. quō excidenda ibidem	
collyrium ex cornu Gale. 608		condylomatū ani curatio manu administrata	423	
collirium monohemerum	604	confectio Rhoetis	609	
collyrium dia hydrys repellens	602	confectio masuchæ	649	
collyrium liquidum ex caualide	609	congius	657. & 658. 659	
collyrium dia crocu ibidem		cōuulsiones unde oriantur	140	
collyrium Ilambonis	607	cōuulsionibus puerorum, menditia. §	conuulsiones ex inanitione originem ducant an ex repletionem quomodo cognoscendum	141
collyrium è thure	608			
coma. 121 coma uigilans	121			
comatis uigilantis causæ	125			
signa ibid. curatio ibi. &	126			
comatos	§ 08			
comitialis morbi notæ	128			
comitialis morbi causæ ibid.				
comitialis morbi curatio	129.			
& deinceps, & comitialis morbus cui ferè ætati acci-				

convulsionum curatio	ibid.	do emendādus, corporis col	
conyza, & copros	508	liquamentorū remedia	92
copron ad duritiem stomachi		cortex piceæ	533
& iocinoris malagma	632	corydallus	510
coracon emplastrum	619	corydos, coryza	175
coria calceamentorum ue-		cosolearia	517
rum. 487		costarum rupturæ & confusio	
corallium	509	nis, notæ & curatio	441
corium, coris herba, cordis		coctus	550
affectus quomoda curādi	188	cotis noxiæ detrimentū	517
cor animalium	47	cotyla. 661	cotyleden 510
coriandrum	510	coxarum dolor ab articulari	
cordis palpitatio	189	morbo quid differat	255
coris animal, coriandri assum		coxarum doloris causæ	ibid.
pti notæ 355. curatio	509	Notæ ibid. curatio	ibid.
corianum	509	coxarum fracturæ, differentiz	
cordis temperaturæ notæ	33	notæ, & curatio	442
cornu. 504		coxæ luxatæ curatio	464
caprillum, Hirci-		coxendices quō adurātur	419
nium ibid. cerui ibid		crania. 510	crambe 511
Tauri-		crapulam quid discutiāt	51
num, & cornea membrana		cratægonos	511
oculi	152	cremasteres	406
coronopos	510	creta sutoria	520
corpus hominis in quatuor		cretica terra	485
partes diducitur	53	crethmon	511
corpus ut bene oleat quomo-		crinaton suffimen	649
do efficiendum, corporis li-		crimnon, & crinon	511
uores prohibentia	31	crines. 549	crisi instans quo
corpus crassum quomodo ex-		modo agnoscenda	61
tenuandum	27	crisis futura quomodo præno-	
corporis habitus quomodo		scenda, & crisis optima pera-	
recalfaciendus	13	cta quomodo agnoscēda	63
corpus tenue quomodo im-		crisis qualis futura sit, quomo-	
pleatur	28	do dignoscendum	61. & se-
corporum intemperatorum		quentibus.	
notæ	29	chrite quid eiusq; curō	350
corporis temperatissimi no-		critonis smegma	597
tæ	28	crocium dia rhodon	610
corpus pletoricum	62		
corpus quō erugandum	13		
corporis malus color quomo			

Crocinum oleum	648	curei malagma	631
crocides pessus	651	cutis alstrictio 10. Eius causse	
crocides pastillus	589	ibid. Notæ ibid. curatio 11	
crocodili terrestris sanguis	469	cuti senili teneræque conue-	
crocodilorum terrestriū ster-		uientia medicamenta 289	
cus	509	cyamos, & cyanos	512
crocodili morsus remedia	540	ciathus. 6 cyclaminus	512
crocodilus terrestris	541	cyclamini radices pondus &	
croco dilon, & crocus	512	modus utendi	62
crocomagmatis cōfectura	648	cyclifli	435
crocomagma quō pareē	588	cydonaton contusum frag-	
cromnion 512. crotones	561	mentis saluis	435
crudis humoribus abundantes		cygnarium, cygnus albus	605
quam curandi rationem de-		cygnus rubens, cyminum	512
derent	89	cynanche, cynosbatos	513
cruenti sputi causse signa	181	cyphi 645. Eius materia ibid.	
cruentū sputū quō cureē	182	usus ibidem	
crus quō reponi debeat	448	cyphi magnum quod uocant	
crusta generantia medica-		solare ex rebus triginta sex	
menta	322	confectum	648
crystalloides humor oculi	157	cyphi, quod rebus uigintiocto	
cubiti fractura quō curāda	7	cōstat, lunare appellatū	649
cubiti luxatio quot modis		cyparissius, & cyperus	513
fiat & quomodo cureē	456	cyphoides Alexandri	582
cucumer. 44 cucumis	539	cyphoides medicamentum ad	
cucumis syluestris	ibid.	recorosos & pectoris uitia	
cucumeris syluestris radices		582	
torticu pondus	560	cypros. 513 cytinus	537
cucurbitulas ad mouendi mo-		cyprinum oleum ex commen-	
du. 391. & deinceps		tariis Posidonii	643
cucurbita syluestris	507	cyprinum aliud, cytisus	513
cucurbita. 44 cucurbita	507	D	
cucurbitularum usus	391	Damascena	46
cucurbitula leuis quid effi-		Damascena	507
ciat	391	Damascena, Damasoniū	487
cucurbitula cum scarificatio-		Daphne, & Daphne herba ibi.	
ne ad quid præstet	392	Daphnoides. 506 Darti	406
cuminum. 513 cupressus	512	Daucus 487 Dauci radix	42
cura quid	135	Decretoria signa in morborū	
		principio	

principio praua sunt 61.	Sed	Destillationis curat. Destilla
ubi morbus inclinauerit, bō		tionis acris tenuisque cura-
na sunt	ibidem	tio. 177 Deuterion. 426
Decamyron malagma	629	Dia aloës medicamētum 595
Deiectio quæ optima	74	Dia anacardion 582
Deiectio cruda	ibidem	Dia alicacabu pastillus 592
Deiectio merè ruffa	ibidem	Drabrosis 181
Deiectio uiridis	ibidem	Dia bacanu medicamētum he
Deiectio nigra	ibidem	pati accommodatum 582
Deiectio liuida	ibidem	Diabates quid 12. eius signa
Deiectio oleosa, pinguisque		ibid. curatio ibidem
ibidem		Dia calaminthes 581
Deiectio uiscosa	ibidem	Diacodion, ex papaueris capi-
Deiectio nimis foetida	ibid.	tibus & melle 577
Deiectio omnium deterrima		Dia coralliu pastillus 588
& pestifera 71		Diacodion compositum 178
Deiectiones qd præfagiāt 56		Dia citriū medicamētū, tardē
Delphini 50		concoquentibus efficax 581
Dēres quomodo eximant 380		Diacodion, ex papaueris capi-
Dētes exesi quomodo exi-		tibus & sapa 177
thendi ibidem		Dia chartiu pastillus 591
Dentes superflui quomodo		Dia citriū compositio stoma-
tollendi ibidem		cho utilis 583
Dens confractus quomodo cu-		Dia chartu 596
rāndus ibidem		Dia coronopēdiu compō 555
Dentes ab interitu uindican-		Diacodyon 121
tia 14		Dia xgylops, acopon 636
Dentium dolora sedētia 169		Dia xron emplast. 620
Dentes quo tempore oriātur		Dia cadmias empla. 615
pueris 4		Dia dictamnu empl. 617
Dentes attritos curantia 170		Dia erigerontos emplast. 624
Dentiū candorē facientia ibi.		Dia euphorbitu, acopon 631
Dentiū stuporē tollentia ibid.		Dia coralliu medicamentum,
Dentium inflammationē cu-		podagricis idoneum 586
rantia, & Dentes mobiles sta-		Dia electru pastillus 590
bilientia. 169 Dētifriciū 170		Diarrhæa 196
Dentiētib. pueris superiātia 5		Dia hematon antidotum 575
Dentium smegma 170		Dia hermodactilu compō ad
Derma. 487 Destillatio 175		podagrā 564 dialibanu 595
		Dia

Dia cœnelzu pastillus	592	dia pirano emplastrum	613
Dia ostreon	595	dia hydrias collyrium	503
Dia oxynyrhines	596	dia zomaton collyrium	605
Dia phellon pastillus	591	dia crocu aridon	612
Dia physalidon	590	dia rhodon Nili	610
Dia rhodon pastillus	188	dia pternes emplastrum	626
Dia stole pulsus. 63. dia scincu.		dia turpænes ceratum	627
575 Dia spermatō pastillus.		dia halon emplastr.	626
588 Diasphecles, hoc est ex		dia samplicu malagma	635
fæce uini cōbusta, Manetho-		diachromon emplastrum	629
nis. 595 Dia cinnabareos em		dictamnū	587
pla. 628 Dia iteon empl	622	dies decretorii	59
Dia meliloron malagma	629	dies speculatorij	60
Dia spermaton malagma	635	digerentia medicamenta	122
Dia strutiū empl. 612 dia rho-		digiti in manu ubi adnascan-	
don, quæ septuaginta duas		tur, digitorum adnatorū dif-	
uncias pendunt	609	ferentia,, digiti adnati quo-	
dia talias collyrium	608	modo præcidendi	393
dia talias, ruffum, dia smyrnō,		digitornū luxatio quomodo	
claudiacum, diamoron sim-		curetur	450
plex, diamoron cōpositū	599	digitorū pterygia putrida quo	
diamoron ex moris batinis,		modo curanda. 270 digitorū	
quæ rubi fructibus sunt	599	pedis luxatorū curatio	463
dia caryō simplex, dia caryon		digitos puerorū, dentibus uul-	
cōpositū, dia gyreos emp	611	neratos quod sanat	5
diagleucous, dia besafa	600	digitorū cōtusionis & confra-	
dia rhodon album	609	ctionis curatio. 447 dioclis	
dia smyrnon ad & rhyadas &		epistola Antigono regi scri-	
ægylopas. 606 dia gigurton,		pta ad ualeitudinē tuendā	53
malagma 6.5 dia chilon em		dionysias. 489 diospolites	581
pla 615 dia sphodelu empla		diphryges quomodo coqui de	
strum. 615 dia ceratos colly-		beat	648
rium Galennis	605	diphryges, dipfacos	485
dia elcysimatos. 616 dia meli-		dipfas unde dictus. 345 dipfa-	
tos empl.	614	dis morsus notæ ibi. curō ibi.	
dia aloes collyrium	609	διτιχιασις qd 367. Eius caus-	
dia libanū collyrium	608	sa ibi. curatio ibi. dolichō	44
dia scoridū emplastrum	615	doloris species & causæ	91
dia rhodon Crocinum	610	remedia	ibidem
			doloris

Doloris capitis in febribus cu	Ebulus. 471	Ebur 490
ratio 94	Eccope. 433	Echini 50
Dorias. 493	Echinis herba, Echinus 493	
Dorycinon 488	Echinon, Ecchimona quid	
Dorycnii poti notæ 358. re-	302. curatio, Echidna 493	
media, Dosithei catapotia	Eclegma ex marrubio compo	
ad iecur inscripta 583	situm 576	
Dothiene emplastrum 615	Eclegma ad tussim 177	
Drachma 662	Eclegma ex marrubio. sim-	
Dracunculus 488	plex 576	
Dracunculi 332. ubi generen	Ecpiesmus oculi 158	
tur ibid. curatio ibidem	Ecpiesma 433	
Dracunculi curatio 425	Estropion, eiusq; curatio 149	
Draconis marini ictus cura	Estropium 371. Eius caulæ	
347	ibidem. curatio, Educentia	
Dracuntium 488	spicula, aculeos, arundines,	
Dropax Gallus Oribasii 639	spinas & consimilia 320	
Dropacis duplex præparatio	E'sonyca 433	
636. usus druppæ oliuæ 45	Elate, Elatine 490	
Drys 488	Elaterii noxæ quomodo re-	
Dryni morsuum signa 344. re-	mouendæ 362	
media 345	Elaterii effectus 558. quale de	
Drynus pessimus serpens 344	ligendum, ibid. Exhibendi	
Dryopteris 488	modus & pondus ibidem	
Dulcis radícula 486	Elaphoboscus, Elaterium 490	
Dulcium uires 465	Elæa, Elæon 489	
Duracina 45	Elæa, æthiopica ibidem	
Dysenteria quid 199 species	Elæomeli ibidem	
ibid. causæ ibid. signa ibi. Cu	Elephantia quid 272	
ratio ibid. & sequentibus	Elephantia incurabilis quare	
Dysenteria cruenta ibid. Ieco-	ibidem	
raria, Dysentericis utilia ca-	Elephantia duplex ibid. Quæ	
tapotia ex xylomacere 583	minus malignior, Elephan-	
Dysodes acopon ex Gal. 635	tia minus malignæ cura-	
aliud ibid.	tio ibidem	
Dysodes malagma 635	Elephantia laborantium spi-	
E	randi difficultas quomodo	
Ebenus 488	curanda 276	
Ebrietatē præcauentia 51	Elephantia causæ 272.	
Ebrietatis curatio 15	Elephantia	

Elephantiz uictus ratio con-	ueniens	274	Empla. ex achate, discutiens	
Elleborine		491	emolliensq; Empl. ex plum	
Eleoselinon		490	bagine ad cal. das affectio-	
Eleliphacus, Electrum		496	nes, Empl coracon ex oxy	
Elos. i 53	Elymus	491	melite, ad naturalium & no-	
Empetron		491	mas accommodatum, Empla-	
Emphysema quid		148	strum Icesios ad strumas, ab-	
Emphysematis cura	ibidem		scensus, lienē, articulos, & co	
Empiema 184 causæ 185 si-			xendicum dolores	620
gna ibid. curatio	ibidem		Empla Neronis, ad ictus om-	
Emplastrum smilion ad ab-			nemq; particularum carnosarum	
scensus		612	dolorem	622
Emplastrum diascorodon ad			Empl. ex cerusa uel oui	615
rumpendum, Emplastrum			Emplastrum parygron Oriba	
dia apyranu ad discutiend-			si, & Emplastrum ariobarza	
dum, Emplastrum dia stru-			nion, Emplastrum ex dra-	
thiu, strumas discutiens, ibid.			cunculo	617
Emplastrum pelarion ex sco-			Emplastrū ex dracunculo ibi.	
ria argenti		616	Emplast: um Aristophanium	
Emplastrum è fermento ab-			emolliens	619
scensus rumpens		615	Emplastrum ex althæa, poda-	
Emplastrum dothiene	ibid.		gricis aliisq; duriciis accom-	
Emplastrum ex succo lini se-			modatum	616
minis discutiens detergens-			Emplastrum cissonum ad ner-	
que		614	uorum uulnera, punctus, &	
Emplastrum ex melle ibidem			maximè diuturna	ibidem
Empl. barbara quod cruentis			Emplastrum botanicum	614
protinus, uulneribus iniici-			Emplastrum ex polline farina	
tur, & fracturarum callos fir-			ceo	611
mant		620	Emplastrorum materia, præ-	
Empl. ex salicibus, glutinans			paratio & differentia	612
cruenta excreantibus, & pu-			Emplastrum pyrine, ad duri-	
lulentis efficax, thoraci im-			tias scirrhus	616
positum		621	Emplastrum tetrapharmacū	
Empl. Galeni aceratos, glutin-				614
at, concoquit. ulcera ad sup-			Emplastrum dia chylon	614
purationem perducit		619	Empl. dia asphodelu	ibidem
Empl. ex oxelæo		619	Empl. oxera multiplicis usus	

Emplast.

- Empl. ex oehra, inflammatio
nem arcet tum sponte, tum
in iudicio, tortis idoneū 721
- Empl. ex cedria, glutinat di-
scutit, abstergitq; ibid. Aliud
emolliens, Empl. ex pumi-
ce ad cicatricē ducendū 625
- emplastrum paula, strumis &
bubonibus efficax ibidem
- emplastrum palmulatum 617
- emplastrū ex metallicis 622
- emplastrum armenia fractu-
ris accommodata ibidem
- emplastrum ex anchusa, am-
bustis efficax 618
- empl. ex pampholige ibidem
- emplastrum leæna, noxia edu-
cit in superficiem, humores-
que euacuat 621
- emplastrū Macedonicum ibi.
- emplastrum chryse, cruentis
vulneribus accommodatū 628
- emplastrum anicetos glutinat
discutit, squamas separar, &
ad articulos recenti cicatri-
ce contractos nalet 622
- empl. Serapionis Melæne ibi.
- emplastrum ex lolio 629
- emplastrum lsis, cruentis ac-
commodata, ad glutinandū,
carnē inducendū, & purgan-
dum 619
- empl. ex urina mu-
li, podagricis utile 627
- emplastrum ex lapidis asii flo-
re, philagii ad scyrrhos ibi-
dem ex eodē Galeni ibidem
- emplastrum ex salis flore, ar-
ticulariis in declinatione ac-
commodatur 627
- emplastrum quod nutriendæ
ulcerum carni est ibidem
- emplastrum Italicum ad pur-
gandum sordida, inducen-
dumque carnem 628
- emplastrū entaticon ibidem
- emplastrum ex cinnabari ad
trophos aliosq; omnigenos
tumores induratos, dicitur
pamphletes 623
- emplastrū uiride simplex. 622
- aliud uiride, ad humida uitia
& carnis excrescētiās ibidem
- emplastrum peganera ad pleu-
riticos ibidem
- emplastrum athena, ad ulcera
sordida, impacta, neruorum
uulnera 620
- emplastrū diā dictamnus, gluti-
nans ad canū morsus, & om-
nigena ulcera ibidem
- emplastrū è nitro ad abscessus
scyrrhos, ad tumores 626
- emplastrū conglutinandū ad ul-
cera quę serpendo depascūt,
& sanguinis spiritum 623
- empl. ex cinere aspidū, discutit
strumas & podagras ibidem
- emplastrū leæna, siccat discu-
titque, emplastrum ex nitro
ad carbunculos 624
- emplastrū ex anemone ibid.
- empl. uiride Macherionis, ad
coxendicum cruciatus, arti-
culos infractos, & abscessus
ibidem
- emplastrū ingrediētia medica-
mēta quō coqui debeāt 652
- emplastrum philocatiche, do-
lorem

lorem leniens, ad sedem utilis	615	epicaunia ulcus oculi	152
emplastrū Amithaonis, ad artculos recenti cicatrice contractos, condulososq; ad extrahendum etiā efficac	619	epilepsia trifariā gignitur	128
emplastrum ex perna tophos soluit	626	epilepsia curō. 129 & sequēt.	
emplastrū ex lixiuio, coxendi cum doloribus, articulariis & tumoribus oedema referentibus utile	625	epialtes unde cōstituat	134
empl. ex auellanis, ad articulorum tophos probatū	628	epilepsia caussa, & epilepsia cui ferē ætati accidat	128
emp. Sphærien ad ardores	641	epilepsia no:æ	ibidem
emplastrum Nicolai ad recentia uulnera, & sinus glutinados aptum.	621	epileptici quō coarguēdi	129
emplastrum ex liquore sycamino.	629	epimedium	493
emplastrum dichromon	ibid.	emictides quid 283. signa, curatio ibidem & 284	
emplastrum dia cadmias, cicatricem inducens	618	epimelis. 491	
empl. Moasæi discutiens	612	epiphora oculorum quōmodo curet	147
emplastrum melancolorū	616	epiploenteroceles	411
emplastrū ex seuctione	617	epipactis. 491	
emplastrum psitacium	ibidem	epiplocele	411
emprosthotos	142	epistola Dioclis Antigono regiscripta ad ualitudinem tuendam	53
encanthis qd eiusq; cura	161	epithymi uires, pondus, & utendi modus	561
encephalos	438	epithymbri uires	ibidem
engisoma	432	epithymum	491
entaticon empl.	628	epomphalum medicamentū quod umbilico illinitur ad alium subducendam	568
enteroceles	410	epithematū dria & usus	626
enthenstici	132	epuli 380	
epheleidem curantia	167	Eius curatio, epulis quid & quō curetur	170
ephemeron, ephemeris assumpti notæ. 457.	remedia	493	
epialtes unde dicatur	134	equarum sanguis	471
epialtes quō cognoscat	ibid.	crasistrati panchrestos hygra 612	
epialtes quō curādas	ibidem	erethrias terra	485
		ena, & erice	492
		erigerum	495
		erinaceus	493
		erimon	492
		eruum. 528	
		eruca	492
		erucæ picearum	533
		erucæ facultates	41
		erucæ pinorum assumptæ signa 353.	
		Curatio ibidem	
		erucæ	

Eruca olerum	501
Eryngium	495
Erysipelas inflammatoriū	99
Erysipelas quid	287
Erysipelata capitis periculosa,	
Eorum curatio	96
Erysipelas quid ibid	Curatio
ibidem.	
Erysipelatis cerebri signa & cu-	
ratio. 123	Erytrodanon 492
erythroides, tunica	406
erithrum. 639	eupatoriū 492
euphorbium	499
euphorbii pondus, uires; & mo-	
dus utendi	562
eunuchi quomodo fiant	414
eunuchismus, euodes, à grato	
odore dictum, malagma	630
euzomon	492
exanthemata puero oborta	
quomodo curanda	4
exanthemata ficsa capitis &	
menti quō curanda	114
exanthematum capitis præsid.	
113	
exarthroma	451
exercitationum genera	7
exercitatio ualida seu uio-	
lenta	7
exercitatio celeris	8
exercitatio quid	ibidem
exercitationis commoda	7
exercitationis tempus ido-	
neum, urinarum color indi-	
cat	ibidem
exercitatio uocis qualis esse	
debeat & quæ eius sint com-	
moda	9
exemplalon	397

F

Faba. 512	Fabæ 44
Faba Aegyptia	ibidem
Facies ut rubescat quomodo	
efficiendum	168
Faciem à rugis asserentia	167
Faciei pilos tollentia	168
Faciei nigritias tollentia	ibid.
Faciei uaros tollentia	ibidem
Faciei aspretudinem tollenti-	
tia, Faciei uicia quomodo	
curentur	167
Facultates alimentorum	40
Fames grandis, in febribus	
quomodo curetur	99
Farinaceus pollen	486
Fastidium cibi	192
Fastidium cibi in febribus quō	
modo curandum	98
Fastidium cibi prohibentia	1
Fatuitatis causa	126
Fauitini pastillus	589
Fauus quid 221. curatio	ibid.
Fauus quid 307. quomodo cu-	
retur	ibidem
Fauis capitis unde nascantur,	
& quomodo curentur	113
Febrium continuarum origo	
notæ & curatio. 83	Fex 549
Febriū putridarū agnitio	77
Febriū tertianarū agnitio	78
Febris tertiana	79
Febris tertiana exacta	ibid.
Febris tertiana extensa	ibid.
Febriū putridarū curatio	78
Febris tertianæ uictus	79
Febris tertianæ curatio	ibid.
Febris tertianæ nothæ cura-	
tio	80
Febrium	

Febrium quartanarum agnitiono	ibidem	perquirere debeat	57	
Febrium quartanarum differentia	ibidem	Fel. 555. Suillum 556. Ouillu		
Febrium quartanarum curatio, & Febrium quotidianarum agnitio	81	ibidem, Caprillum, Vrsoru,		
Febrium quotidianarum curatio, Febris quartana quo ferre anni tempore incipiat	80	Boum, Taurinu ibide Hyæ-		
Febris hepialis signa, causæ & curatio	82	næ, Callionymi piscis ibid.		
Febris hepialis unde dicatur ibidem		Scorpionis ibidem maxime,		
Febrium ardentiu agnitio	84	Hirundinis, Capræ sylvestris		
Febriu ardentiu curatio ibid.		ibidem Gallorum, Perdicum		
Febrium quibus ex affectu erysipelaceo origo est notæ ibidem eorundem curatio ibidem		Accipitrum, Aquilarum ibid.		
Febriu hecticaru agnitio	85	Fel uolucrum acius & siccan-		
Febrium hecticarum duæ species, Febrium hecticarum curatio	ibidem	do uehementius, quàm quadrupedum	ibidem	
Febrium diariarum causæ	76	Felis morsus notæ 342 curatio	ibidem	
Febri diaria qua ratione dignoscatur	ibidem	Femora bbuis cremata	529	
Febri diariæ qui oportuni ibi.		Femoru intertrigines curantia. 5	Femoris fracturæ quomodo curentur	447
Febri diariæ curandi ratio ibid.		Foeniculum grande	497	
Febri diaria laborantium uictus, Febrium putridatum notæ	77	Fermentum	494	
Febrium putridaru curat.	78	Ferrez aquæ quibus conferant	24	
Febris semitertianæ notæ, eiusque generatio duplex	86	Ferrum. 539	Ferula	525
Febris semitertianæ curatio ibidem		Ficus. 44	Ficus	546
Febres continentes	83	Flcus arbor	546	
Febris continens quid ibidem		Ficus humilis	555	
Febres curaturus quod & quæ		Ficus capitis morbus quomodo curandus	114	
		Ficosa capitis & menti exanthemata quomodo curanda, & Felicula	488	
		Felicula. 533	Filix	535
		Fistula quid	420	
		Fistula quid 318. curatio ibid.		
		Fistulæ insanabiles	422	
		Fistulæ egrè conanescentes ibidem		
		Fistularum ani curatio quæ manu peragitur	ibidem	
		***	Fistularum	

Fistularum differentia	420	frictionum genera	80
Fistulæ quomodo manu curanda	ibidem	frictionum nouæ coniugationes.	9
Fistularum ani latentium notæ	421	frictio mollis, Frictio medio-	81
Fistularum ani manifestarum notæ	421	cris, Frictio multa & dura.	
Flagris cæli quomodo curandi	285 & 286	frictio modica & mollis	ibid.
Flatus uentriculi unde generentur	195. quomodo curentur	frictio apothepentica	ibid.
	ibidem	frictio præparatoria	71
Flauum medicamentum	596	frigida lauatio quibus conueniat.	23
Fluxionibus alui biliosis maxime medetur lac coctum in quod calculi marini igniti demissi sunt	49 & intestinorum torminibus	frigida intemperies quomodo corrigatur	37
	ibidem	frigus cui nocuit, quid facere debeat	18
Fœniculū.	519	frigidi & sicci temperamenti notæ.	30
Fœnugræcum	547	frigidi & humidī temperamenti notæ	29
Fœtum educientia	238	frigidi temperamēti notæ	29
foltum	553	frons quomodo incidatur & quibus	366
fracturis idoneū medicamentum	Oribasii 624. Ex commentarijs Heracleti	fructus temporarii	44
	ibidem	fructus arborum	ibidem
Fractura ossis quid	433	frumentaceorum uires	43
fractura in capite quid	ibidem	fucus.	553
fracturarum differentia	ibid.	Fuligo.	516
fracturarum capitis differentia, Fracturæ capitis species quomodo dapehēdēda	433	fuligo.	469
fracturæ capitis curatio	434	Fumaria	501
fracturæ cum nuulnere curat.	449	Fungorum assumptorum remedia	359
fracturæ callo nō firmatæ quomodo curandæ	452	furunculus quid	297. curatio.
fracturæ immodico callo obductæ quō curentur	450		ibidem
Fraxinus	520	fuga purgans & stomacho grata	564

G

Gagates	512	Gala	483
Galaçtites	516		
Galbanum quomodo coquendum	654		
Galenī collyriū ex cornu	608		
Galenium malagma	633		
Galenī picra	581		
Galerita.	510	Gallion	484
		Galliopsis	

Galliopsis, & Galla. 504	Galli	glutinum	507
cerebrum. 489	Gallina 46	glutinum bubulnm	509
Gallarum sterus	509	glycea quomodo curenē	166
Gallarum uentris interior		glycyrrhiza, gnaphalium	487
membrana	507	gone pessus. 648	gōgylis 487
Gallus dropax, Oribasii	639	gordilion, gamma oboli	662
Gallarum chortalium san-		gramen	481
guis	471	gramen arundinaceum	501
Gallopsis. 487	Gammari 50	grandines tussiedo eieci	175
ganglion quid 388. Eius no-		granum gnidium	507
te, ibidem, Curatio ibidem		granum tinctorium	ibidem
Gangliū qd 187. curatio ibi.		crassum corpus quomodo ex-	
gāgrēna qd 291. curatio 292		tenuandum. 27	grauedo 175
gangrēnarum remedia	292	grauedinis curatio	ibidem
garum. 487	Ge, Genista 542	grauedinis puerorū curatio	4
genitali exulcerato conue-		gravidarum Symptomata, eo-	
niens medicamentum	267	rumque remedia	1
gentiana	484	grossi. 525	grues 46
genu articulus luxatus quo-		gummi	508
modo reponatur	464	gummi cerosi arboris	504
geranium. 484	Geras 485	gurgulio. 381	gutturis aspredi-
ges enetera, gigarta	ibidem	nem curantia	177
gingidion. 41	gingidium 485	spinæ quō eximantur	382
gingiuas corrosas curatia	171	gipsum. 488	gypli poti uotæ
gladiolus. 526	glandes 46	& remedia	360
glans unguentaria	480	gyrgathon. 131	gyris 488
glans penis contacta quomo-			
do aperiri possit	401		
glandes ad quid conueniāt	20		
glandes unde conficiātur	ibid.		
glans colis nuda quomodo cō-			
tegenda	401		
glandulæ animalium	47		
glastum. 499	glans 486		
glaucium	ibidem		
glaucoma quid eius remedia			
157			
glechon, & glocos	487		
gluten piscium	500		

H

HAbitus corporis quomo-
do recalcificandus 131
Hæmatites. 516 hæmorrhoi-
des eççç curatu difficiles exi-
stunt 234. quō aperiēdæ ibi.
hæmorrhoidum fluxus super-
fluous quō sistendus, hæmor-
rhoides qd, & cur sic dicatū,
hæmorrhoides muliebriū lo-
corum quō excidendæ 414.
hæmorrhoides ani quomodo
manu curandæ 429

*** 2 Halatia

I N D E X.

Halatia, quasi dicas ex sale cō		Herpyllum	492
fecta, purgatio	562	Hidos. 494	Hieracitis 517
Halmi uires	41	Hiera Antiochi	567
Hammaton	617	Hiera Archigenis	568
Hastula regia	479	Hiera Galeni	565
Hedera	506	Hiera Iusti, Hiera Rufi	568
Hedera terrestris	551	Hippocampus	497
Hedycroi confectio	571	Hippolapathum	ibidem
Hediosmus, Hedyfarum	494	Hippomarathron	ibidem
Helcysma, Helleborus	492	Hippopotami	447
Helechryson, Helenium, He-		Hippopotamus	480
liocæs medicamentum	596	Hipposelinon	ibidem
Helxine	491	Hipposelinon	542
Hemerocalles	495	Hipposelini uires	41
Hemicrania	117	Hippuris	480
Hemicranie curatio	118	Hircina caro	47
Hemina	661	Hircinum iecur	495
Hemionitis	495	Hircinu cornu	504
Hemiplagia quid	135	Hirundines	555
Hepar 496. Vide Iecur		Hirundinum cerebrum	489
Hepar quomodo uratur	395	Hirundinaria herba	555
Hepatis téperaturæ notæ	34	Hirundinum deuoratarū digno-	
Hepialis febris	82	tio 354. curatio	ibideur
Hepiali curatio	ibidem	Hyssopi liquidi medicamenti	
Hepestma. 493		præparatio	625
Heraclicion	517	Hœdi sanguis	470
Heraclius lapis	ibidem	Hominis temperatiss. notæ	28
Herba lactaria	547	Hominis morl ⁹ remedia	348
Herba apollinaris	551	Hordeum	511
Herbæ quæ coquendæ	652	Humanæ caro	47
Hermaphroditi unde appel-		Humerus summus quid	454
lati	414	Humeri luxati curatio	454
Eorum quatuor differentiæ,		Humiditates aurium defici-	
in uiris tres, in mulieribus		cantia	5
una ibidem curatio	ibidem	Humidi téperamēti notæ	29
Hermodactylus stomacho no-		Hyalos. 550	Hyacinthus 550
cet	261	Hydatis quid 372. notæ ibi-	
Herpes quid	187	dem curatio, Hydnon	550
Herpes exedens	293	Hydor, & Hydrargyros ibid.	
Herpes miliaris	ibidem	hydros	

hydros. 346	hydrocele 228	cinoris notæ ibi. curatio 225
hydrocephalon quid 364.	Eius causæ ibidem notæ ibidem curatio ibidem	icteri ex calida intemperie folliculorum partium generatio 224. notæ 225. curatio ibid.
hydromalum uinosum 500	hypofarcidos, uel anasarca, eiusque signa & causæ 219. eiusdem curatio ibidem & 220. & 221	ictericis quæ uena secunda ibid.
hydrops leucophlegmatias, hypofarcidos, uel anasarca, eiusque signa & causæ 219. eiusdem curatio ibidem & 220. & 221	hydropeperi 550	Idæa radix 497
hydropicis aqua quomodo emittatur 396	hydrophobia 336	iecur 496. Canis rabidi ibid.
hyemi quæ uictus ratio conueniat 24	hygra ex caualide 609	caprillum ibidem, hircinum ibidem, lacetæ ibidem, Lupinum ibidem, Asininum, Apium ibidem, Mergi ibidem
hygidion Ammonii 604	hyoscyamus, hypericum 550	iecur animalium 47
hypericon. 509	hyperico 551	iecur suillum ibidem
hypocistis, hypoglosson ibid	hypoglottides medicamē. 176	iecur quomodo uratur 394
hypopoyi. 374	hypopii 153	ilambonis collyrium 603
hypophæston 551	hyposphatismus 366	ileos quid. 206
hyposphadion 401	hyposphagma quid eiusque curatio 148	ilex 535
hyrcorum sanguis 470	hyssopum 550	incrassantium alimentorum differentia & uires 40
		incubo uel incubus unde dicitur. 134
		indicus lapis 517
		infans recens natus quomodo nutriendus 3
		infantium uictus ratio 6
		inflamatio proprie quid 287
		curatio 288
		inflamatio erysipelacea 96
		inguinalis herba 294
		inguinibus conueniens medicamentum 290
		inodora 464
		insanæ curatio 147
		intemperies frigida quomodo corrigatur 37
		intemperatum corporum notæ 29
		intertrigines femorum curatio. 5
		intertrigines curatio. 286
		intestina terræ 485
		Intestini procidentia quomodo

do curan.	399	κακοχυμία quid	25
intestina animalium	48	καρωτικά medicamenta	123
intybus syluestris	506	L	
intybi facultates	41	Aboriosam uitam agen-	
iocinoris affectus	214	tium uictus ratio	25
iocinorosi qui	ibidem	Labrorū curta quomodo sar-	
iocinoris tēperaturæ notæ	34	cienda	371
iocinoris imbecillitas	214	Labrum ueneris	488
iocinoris frigida intemperiei		Lac recens multum	48
notæ ibidem curatio	216	Lac bubulum	484
iocinoris caua pars per aluū		ibid. Caprillū, Asininū, Ouil-	
gibba per urinas expurga-		lum, Vaccinum	ibidem
tur	218	Lac coctum	48
iocinoris sicca intemperiei		Lac nutricis uiciatum quomo-	
notæ	215	do corrigatur	3
iocinoris inflammationis si-		Lac ouillum	48
gna ibid. eiusq; curatio	217	Lac scissilæ	49
iocinoris inflammatio à pleu-		lac humidius, Lac caprillū	48
ritide quō discernenda	215	lactis probatio	3
iocinoris inflammationum in		lac crassius	48
gibba eius parte, notæ	ibid.	lac coquendi modus	ibidem
iocinoris uenarum obstructio		lac statim à partu redditū	49
nis notæ ibid. curat.	216	lac nutricis quot modis uicie-	
ion.	497	tur. 3 lactaria herba	545
ios, & iris	498	lacerta.	538
isatis	498	ibid. lacerta	536
isis emplastr.	619	lacertæ iecur	495
isopyron	498	lactuca	496
isotheon collyrium	608	lactucae facultates	41
itea	498	ladanon.	514
iudicium futurum quomodo		lagopus	513
prænosendum	61	lanæ	492
iudicium instans quomodo		lanæ pinguitudo	526
agnoscendum.	61	lapathum.	514
iuglās	45	lapides	516
iuguli confracti curatio	440	lapides quō coquendi	649
iunctus angulosus	513	lapides argæi montis cappado-	
iunci odorati & rotundi flos		ciz.	517
546		lapis specularis	543
iuncus palustris	ibidem	apsana.	514
iuniperus.	477	larinx	173
ixos	497	larix.	537
ixiæ signa	357	laserpitium	540
remedia	ibid.	lassitudinem ob exercitatio-	
		nem quatuor species earum	
		que	

que remedia	9 & 10	lien quomodo aduratur	395
Lateralis dolor quid	186. nota	lien's obstructionis nota	222
ta ibi. causæ ibi. curatio	187	lien's expultricis facultatis	
lathyrus	514	imbecillitas quomodo co-	
laurus arbor	487	gnosenda	ibidem
lauri foliorum uiridium pon-		lien's intemperies quomodo	
dus	159	curetur	ibidem
Laurus Alexandrina	487	lienteria quid, eius species,	
laurinum oleum	641	causæ, notæ, & curatio	197
leæna empla.	623 & 624	lignys	516
legumina. 44 lemeæ quid	121	lignorum caries	538
lamonium	514	ligysticum	516
lemina terra. 484 lentes	550	lilium	511
lenticula	44	liliaceum oleum	640
lenticula palestris	552	linguæ animalium	47
lenticula curantia	169	linguæ morbus	171
lentiscus	546	linguæ scabrities quomodo	
lentiscinum oleum	642	curanda	101
leontopetalon	514	lini semen, linospermon	517
lepidion, Lepidoile ossa	364	linozostis, liosporon	517
lepis. 515 leporina caro	47	lipasmata	138
leporis cerebrum	488	Lippitudinis causa	145. cu-
lepra quid 276. causæ ibid. si-		ratio	ibidem
gna ibid. curatio	277	liquidorum mensuræ	662
lethargi causæ 123. signa ibi-		liquidum collyrium ex cau-	
dem curatio	124	calide	612
lethargus à caro quid diffe-		liquor 527. Cyrenaicus, medi-	
rat	123	cus, Syriacus	ibidem
leucacanthum	515	lirinum suffimeu	649
leucas, leuce, leuce quid	280	lyspionium acopon	638
causæ ibidem curatio	ibid.	lirhargyros, & lithi	516
leucas pastillus	592	lirhospermon	517
leuiraze	550	litrum	518
libanius pessus	651	liuores corporis prohibetia	13
libanotides, & libanotos	515	locustæ, & loligines	50
libanum. 608 libella	50	lolium. 470 loychitis	518
libra. 662 lichen herba	514	lorichitidis feminis pondus &	
lichenes equorum	ibidem	modus utendi. 562 lothus	
lien animalium	48	herba. 518 lotus arbor	519
		*** 4 lumbricorum	

lumbricorum origo	327	Malacia grauidarum Sympto	
lumbrici rotundi infantibus		ma. 1 Malache	519
peculiares	328	Mala costrata	50
lunare cyphi	649	malagma ad capitis dolorem	
lupinum. 496	lupinum 44	117	
lupinum iecur	495	malagma anethine	635
luporum stercus	508	malagma ex baccis lauri	634
lupus, piscis	49	malagma ex seminibus	ibid.
luxatio quid	452	malagma erythrium	633
luxationis duæ species ibidem		malagma mendesium	630
luxatio cum fractura quomo-		malagma marciatum	631
do curetur	465	malagma pentamyron	632
luxatio cum ulcere quomodo		malagma euodes	633
curetur	464	malagma ex sertula campa-	
lycaonis signa 134. curatio		na	629
ibidem		malagma citrinum	634
lychnis	518	malagmatum, differentia &	
lychnidis seminis pondus &		usus	629
modus utendi	561	Malagma dia sampsychu	635
lycium. 518 lycoctinon	471	malagma ex ninaceis	ibidem
lycopsis	518	malagma decamyron	632
lycopsis, lygis	468	malagma ex oenanthe	635
lynceus ad claritatem oculo-		malagma polyarchion ex Ga	
rum	607	leno 627. aliter	ibidem
lypyriæ febres	83	malua. 519 maluz uires	41
lysimachium	518	malicorium	537
M.		malus armeniaca	522
M Acherionis emplastrum		malum citreum	46
uiride	625	malum medicum	506
Macedonicum emplastr.	624	malus persica, malum punicū	
Madarosis quid & eius cura-		cum 536. Eius acini	522
tio. 150 Magnes	517	malum terræ	477
Magni aster. 609 Mala	521	mamillarum affectus curan-	
Mala dulcia ibidem austera,		tia	189
acida, assa, elixa	ibidem	mamiras	519
Mala punica	45	mammarum inflammationes	
Malabathrinum collyriū	611	quomodo curandæ	300
Malabathron	519	mammis medicamentum con-	
Malacia piscis	50	ueniens	290

mandragora

mandragora	519	flauam purgantia	557
manethonis dia sphedes	595	medicamentum dia besafa ex	
manus summæ cōtusionis cura-		ruta syluestri	600
ratio	448	medicamentum ex syluestris	
manna thuris	519	maluæ seminæ	585
manna thuris quomodo co-		medicamenti hyssopi liquidi	
quenda	651	præparatio	625
marathon	519	medicamentum philoxeni, pu-	
marasmōs	85	rulentis & longa defluxione	
marcellius thronus pastillus		infestatis idoneum	579
691		medicamentum è musto	598
marciatum malagma	628	medicamentum dodechateon	
marina aqua	496	578	
marrubium	534	medicamentū dia citriu, tarde	
marrubium nigrum	481	concoquentibus efficax	581
masuaphion confectio	626	medicamentum massalioti	597
massalioti medicamentū	597	medicamentum quod umbi-	
mastiche	526	lico illinitur epomphalium	
maxillæ cōfractæ curatio	439	dictū, ad aluū subducēdā	568
maxillarum luxatio quomo-		medicamentum ex myrto syl-	
do curanda	452	uestri	597
maza. 45		medicamentum dia coralliu	
mecon	521	podagricis idoneum	586
medicamentum ex thure	595	medic. dia calaminthes	581
medicamentum uomitum ci-		medicamentum dia bacanu,	
tantia	567	hepati accommodatum	582
medicamentum ex ostreis	595	medicamentū zopyrios ibid.	
medicamentum ex duplici pi-		medicamentum Galeni è stil-	
pere	575	la comitialibus potissimum	
medicamentum ex charta, ad		efficax. 574	
nomas oris potissimū & na-		medicamentum	
turalium ulcera	593	trion piperon	578
medicamenta purgantia com-		medicamentum ex succo ma-	
posita	562	li punici. 599	
medicamentum heliocæ, adu-		medicamentū	
rens,	593	ex succis malorū ad appeten-	
medicamenta atram bilē pur-		tiam abolicam & ægram con-	
gantia quibus & quādo exhi-		coctionem probatum	580
benda	560	medicamentum fracturis ido-	
medicamenta simplicia bilem		neum Oribasii 628. Ex com-	
		mentariis Heraclei ibidem	
		medica-	

Medicamentum ex sanguine	melanchloron emplastr.	616
hiricino	melanchlorus pastillus	593
medicamentum nephriticum	melanteria.	520
excicadis	melaplacon	580
medicamentum ex eruis	tium quomodo paretur	580
medicamentum ex malorum	melenæ serapionis empl.	619
cotoneorum carnibus	melea	522
medicamenta liquida quæ illi	melitera Oribasii	595
nuntur ad oris uicia, ac gut-	meliceris quid	386.
tur accommodata	eius notæ	
medicamenta purgantia sto-	ibidem curatio, & meliceris	
macho aduersantur, excepta	quid	306
aloe	curatio	ibidem
medicamentum à murino co-	melilotus.	520
lore pſaron dictum	meline	491
medicamentum emplastra in	melinum oleum	643
gredientium differentia eo-	melitites.	516
rumque coctio	melon.	153
medicamentum ex lupino ie-	melopepon	44
core præstantissimum	memæcylos	521
medicamentum xanthon	membrum distortum callo fir-	
medicum malum	matū quomodo curetur	451
medimnus	membrorum attenuatorum	
medimnus atticus	curatio	28
medulla animalium	mēbrana cerebri si nigruerit	
melan.	quomodo curanda	437
mel	memoriæ noxæ quomodo ac-	
mel coctum	cidat	126.
mel non coctum	quomodo cogno-	
mel sachar.	ſcatur ibid. quō curetur	127
quanto ponderosius	menſes cientia medicamen-	
mel oleo quanto grauius	ta.	237
mela	menſes mouentia	21
melancholia quid	mēſium immoderatus fluxus	
melancholiæ cauſæ	quas cauſas habeat	238.
melancholiæ ſigna	quomodo curandus.	
melancholiæ curatio	Menſium	
melancholia hypocondriaca	ſuppreſſis cōplures affectus	
131	& lōgos procreare ſolet	236
melanthion, & meli	menſium ſuppreſſio ob intera-	
520	nearum partium aliquā pri-	
	mario affectū quomodo cu-	
	rari debeant, Menſium ſup-	
	preſſionis cauſæ quibus no-	
	tis deprehendantur	ibidem
	menſium ſuppreſſorum cauſæ	
	ibidem curatio	ibidem
	menſes	

616	menfes uulneribus quādo flue	morbus comitialis trifariam
593	re incipiunt 235. quando de-	gignitur 128
acon	finant 236	morbi publicè graſſantes 86
580	menſium tempus, menſes mo-	morbi publicè graſſantes un-
619	ratos prouocantia ibidem	de oriantur, morbi ex aeris
522	menſuræ 657	ſtatu futuri quomodo præſa-
595	menſurarum, notæ ibidem	giendi & prohibendi 87
notæ	menſura aridorum ibi. & 663	morbi letalis notæ 58
eris	meſuræ liquidorū 657. & 662	morbi non letalis ſigna ibid.
dem	menta 494 meon 522	morolis unde fiat 126
491	mercurialis herba 517	moroxus. 516 morus 522
643	mergi uenter 507	motus mediocris ualitudini
53	mergi iecur 495	tuendæ ſummum affert præ-
44	merulæ. 46 meſpila 521	ſidium. 40 muliebres lac 483
521	meſpila. 45 metopion 645	mulier ægrè pariens ſuperſtes
ſir	milax. 522 millefolium 524	ne futura ſit an minus quo-
551	milium. 503 milium 43	modo cognoscendum 416
um	milphoſis quid & eius cura-	muliebris fluor 239 eius ſpe-
28	tio 150	cies cauſæ ibid. notæ ibid. cu-
erit	mina, & mina ægyptia 662	ratio, & muliebres loci, uide
437	mina attrita ibidem	uulua & utetus 127
oac	mina Romana minium quo-	muliebrum locorum clauſu-
no-	modo coquendum 652	ræ cauſæ 415. incō moda ibi.
27	minium rubricum 484	curatio ibidem
en-	miſy 522	muliebrum locorum thymi
21	miſy quomodo coquatur 652	condilomata & hæmorrhō-
us	mithridatis antidotū dia ſcin-	des quō excindantur ibidem
uo	cu. 573 Mnæſæi emplaſtrum	mullus. 547 [mullus piſcis 49
m	diſcutiens 917	muſſa 51
us	modius 662	muſſæ præparatio ibidem
6	modius ægyptius 663	multipedæ 528 muria 472
2	modus Italicus, mota qd	murenæ morſus curatio 347
i-	notæ ibid. curatio 247	muris arane iſtus notæ 348
u-	molæ & aquæ inter cutē diſſe-	curatio ibidem
o-	rentia. 546 moly 524	muris auricula 523
o-	molybdos, & molybdæna 522	murium, ſtercus 509
n	anonohemerum collyriū 604	muſæ paſtillus 590
e	mora. 45 morza 522	muſtela 484
n	morbi principium quod 57	muſtelæ uenter 507
s		muſtelæ

mustelæ cerebrum	489	nares fractæ & contusæ quor-	
muscus, muscus marinus	483	modo curentur	438
myaces, myagros	523	narium uitia 165. & deinde	
myaron, mycete, ibidem		per totum caput	
mydriasis oculorum	156	narium sanguinis fluxus quo-	
myelos	523	modo sistendus	166
myocephalon	153	narium ulcera quomodo cu-	
myopiæ qui, myopias	153	rentur	166
myosote, myrica	523	narium fœdus odor quomo-	
myriophyllon	524	do curetur	ibidem
myrmecia	233	narium uitia quomodo emen-	
myrmecia quid 427 unde sic		dentur. 165 nartex	525
uocetur 428 curatio ibidem		nascâthon, nascaphthon	524
myrrha. 542 myrrha	524	nasturtium	501
myrrha quomodo coquenda		nasturtij uires	41
652		natricis morsus notæ	346
myrrhis, & myrrhine	524	curatio	ibidem
myrsinatum emplastrum	618	naturalia. Vide pudenda	
myrsine	524	naturalium inflammationes	
myrsinoides. 506 myrtus	524	quomodo curandæ	300
myrtites quomodo fiat	561	naturaliū ulcera citra inflam-	
mystrum	658	mationem oborta quomo-	
mystrum magnum	ibidem	do curanda	232
mystrum paruum	663	naturalium particularum con-	
mytuli	523	seruatio	226
myurus unde dicatur	66	naturalium aquarum uis	24
myxa	523	naturalium aquarū dñæ ibid.	
N		naturalium balneorum diffe-	
Napus. 42 Napy	524	rentiæ	ibidem
Narce, & Narcissus	525	naturalium thymi	403
Narcoticorū largior usus quæ		naugantium uictus	26
incommoda aſſerat	260	nausea quomodo curada	101
nardinum	607	naxiæ coris detrimētum	517
nardostachys	524	nephriticis	207
nardus cizicine iniectio pri-		nephriticum medicamentum	
ma 629 altera iniectio ibi-		ex bellariis uesicæ & renum	
dem tertia iniectio	ibidem	exulcerationi idoneum	584
nardus gallica	524	nephriticum medicamentum	
nardus montana	ibidem	ex cicadis	482
		nepira	

nepita. 598	nerion 525	nymphodoti pastillus 592
nerui testium 406		O
neruus præcisus quomodo curandus 326		O Bolus 662
neruis uulneratis aut punctis quæ accidunt 323		O Oboli grammæ 662
neruorum uulneratorum curatio ibidem		Ochra. 485 Ochron 44
neruorum contusorum curatio 326		Ocimum, & Ocimoides 557
neruicorum abscessum medicamenta 290		oculorum caliginem prohibentia 14
neuras 525		oculorum expressionis curatio. 158
nigellæ incommoda quomodo amolienda 362		oculorum medicamentorum differentia atque usus 603
nili dia rhodon 610		Oculorum suffusio 375. unde fiat ibid. notæ ibi. curatio 376
nili malagma ad lienem omnemq; duritiem 633		Oculorum qui defluxionibus infestantur agglutinamenta 612
nitrum 518		Oculorum carcinomati quid fieri debeat 155
nitrum quomodo coqui debeat 652		Oculi procidentia quomodo curanda 153
nitri spuma 480		Oculi humor crystalloides 157
nitrosæ & salis aquæ quibus conferant 24		Oculorum obscuritas 158
nocturæ sanguis 470		Oculorum suppurationem curantia 155
nucis. 502	nucis 45	Oculi procidentia 153
nucis uirides, aridæ ibidem		Oculorum habetudo 158
nuclei acinorum uiridis 487		Oculorum confusio quomodo curanda 159
nutrix qualis esset debeat 2		Oculi purulenti quomodo curandi. 153
nutrici quæ sint uitanda ibid.		Oculorum suffusio quid, eiusque curatio 157
nutricis lac laudatissimū ibid.		Oculi si cute non obtegatur, curatio. 370
nutricis lac quod modis uicietur 3		Oculi purulenti quomodo curandi 374
nutricis lac uiciatum quomodo corrigatur ibidem		Oculi dolorum causæ 145
nyctalops quid & quomodo curetur. 156	nymphæa 525	Oculorum epiphora, id est, defluxionis impetus quomodo curetur 147
nymphæ quid 415.	Quomodo excindenda ibidem	Oculorum

Oculorum unguis 374. cura- tio	ibidem	Olea digerentia	89.
Oculorum phthisis eiusq; cu- ratio	156	Oleum	489
Oculorum atrophia eiusque curatio	156	Oleum amaracinum	646
Oculorum hebetudinem cu- rantia	155	Oleum amygdalinum	544
Oculorum albugines quomo- do curentur	154	Olea Aethiopica	489.
Oculorum unguis qui ptery- gion græcis dicitur, quid, eiusque curatio	ibidem	Oleum ægirinum	644
Oculorum ulcera eamque cu- ratio. 152	Oculorum inflā- mationis curatio	Oleum anethinum	642.
	145	Oleum balaninum	644
Oculorum cicatritrices quo- modo curentur	154	Oleum caryinum	ibidem.
Oculi membrana cornea 152		Oleum chamæmelinum	642
Oculorum carbunculo quid faciendum	155	Oleum cicinum	644.
Oculi tunica <i>εξωτερική</i> 153		Oleū cyprinū posidonii	646
Oculi dolorum curatio 145		Aliud	ibidem.
Oculorum mydriasis 156		Olei cum cera qui modus esse debeat in cōficiēdis unguen- tis &c.	656.
Ocimum. 41	Odora 466	Oleum crocinum	647.
Oe. 526	Oedema quid 25	Oleum dulce 490	omotribes
Odema quid 301. causæ ibid.		ibid elotum ibid.	Vetus ibi- dem. Tenue ibidem. Sabinū.
curatio	ibidem	ibid Ex agrestis olea ibid.	Ri- cininum ibid. Sesaminum.
Oedema aliorum morborum		Raphaninum	ibidem.
accidens nonnunquam 301.		Oleum iriunm	646
quomodo curandum ibidem		Oleum laurinum	645.
Oedemata pedum discutien- tia. 2	Oenanthe. 526	Oleum liliaceum	643
Oenantheria	647	Oleum lentiscinum	646
Opanthinī confectio ibidem		Oleum mastichinum	642. ma- gis uarium
Alia 649	Oenos, cæsyphus 526	Oleum sycioniū simplex	642
Olypos. 495	Olea. 489	compolitum ibidem aliud ef- ficacius, Oleū melinū	643
radicis corticis pondus & u- tendi modus	561	Oleum picinum	532
		Oleum raphaninum	644
		Oleum ricininum	ibidem
		Olei rosacei confectio	642
		Oleum sesaminum	643
		Oleum susinum	ibidem
		Oleum uiolaceum	644
		Oleum	

Oleum melle quanto leuius 662	opos 527. Cythæicus, medi- cus, syriac ⁹ , orchis herba 528
Oleum uino quāto leuius ibi.	ordeum 43 oreoselinum 527
Oleum quō coquendum 653	Oribasii clidion 589
Olei diuerso genera quomo- do conficiantur 640	oribasii dropax Gallus 636
Oleoſorum uires 470	oribasii melitera 595 oribasi parygrum emplastrum 615
Olearia cos 527	origanū. 527 orioſenes paſtil lus. 593 oris aflectus 168
Olera ſylueſtria uitioſos hu- mores gignunt 41	oris uentriculi inflammatio- nes quomodo, curentur 191
Olerum facultates ibidem	oryza. 43 orminum 528
Olera cruda peiores ſuccos procreant quā cocta 42	orobanche, & orobos 528
Olera cōdita muria uel oxal- me quas facultates habeant ibidem	orthopnœa. 179 oryza 528
olfactus uitia 165. & deinde per totum caput	oſſa. 528 oſta, & oſtheon. 406
ὀλγοφρόν uinum 122	oſtraca. 529 oſtracoderma 49
oliuz. 45 oloſtium 526	oſtracites. 517 oſtrea 50
olympus ſeu olympiacū 607	oſtrea. 529 oſyris 528
olynti 526	othoma 526
omenti procidentia quō cu- randa. 401 ἀμυλῆς 174	otium ſummum ualitudini maxime obest 40
omphaciū. 602 omphacome- lis præparatio 602	oua puncta 45. Friſta 47
onagra. 526 onobrychis 527	ouilla caro 47
onochelos, & onoclea 468	ouillum cerebrum 488
onoma, & ononis 526	ouium ſtercus 509
ononis. 476 ononis 526	ouillum lac 484
onothera, onothuris ibidem	quina pellis. 87 ouron 529
onyches. 527 oon 557	ouum, & oui candidum 557
ophialis unde dicta 107	oui luteum ibidem
ophites 517	ouum aceto incoctum uetis fluxiones deſiccat ibidem
ophthalmia unde fiat 145	oxera emplastr. 622 oxos 526
opisthocranion 363	oxyacanthos, oxybaphus 662
opisthorionos. 142 opisthoto- nicis potio accommoda 143	oxymeli ſimplex 576 oxymeli Iuliani 560. Pandya 563
opopanax quō coqui deat 645	Vires
	oxymeli ſplenicum 588
	oxymeli ſiliniua 576
	oxanas curacua 566
	Flamma

P		
Paeonia	486	particularum principalium uul-
Paeonia compositio	583	neratarum agnitio 431
Paguri. 50	Paliuron 529	partium attenuatarum curatio 28
Palma	551	partium extremarum praecisio
Palpebrarum pili oculum irri-		quomodo administranda 426
tantes quomodo curandi 152		parthenium. 491 parthenii ui-
Palpebrarum uisionem ex uen-		res, & utendi modus 559
te medicamento facta uete-		parthus difficilis causae 253
res omnes damnarunt 269		curatio 254
palpebrae superioris sutura		partus ex utero qua ratione
quomodo administranda 368		exautiatur excindaturq; 417
palpebrarum pediculi quomo-		deinde per torum caput
do arcendi 150		parulis 379. Eius curatio ibid.
palpiratio cordis 189		parulis quid & quomodo cu-
palumbus 46		retur 170
palumbi sanguis 470		parygrum empl. Oribasii 618
palumbi uenter 507		passer troglodytes 550
panaces Herculeum 529		passeres exigui 46
pancratium 529		pastillus Oribasii elidion 580
panicum. 491	panis 478	pastillus dia spermaton 588
panis syncomistos 43		pastillus purgans 562
papauer 521		pastillus ex spina Aegyptia
papaueris liquoris epoti no-		589
tae 355	Curatio ibid.	pastillus dia castorei, colicis
papyrus 530		efficax 592
paracynanche 173		pastilli scillini quomodo prae-
paralysis quid 135		parentur 571
pararthrema 452		pastillus dia rhodon 588
parastatae 406		pastillus faustini 591
pardalianches 471		pastillus cui nomen est thro-
parens curatio 137		nus Marcellus. 591
parietaria 491		past. ex erica, lieni dicatus 590
paronychia 530		pastillus neræ ex Heræ com-
paronychia 270		mentariis 590
parotis quid 164		pastillus trigonus 588
partes animalium 47		pastillus nymphetoti 593
particularum naturalium con-		pastillus capnistos ad tussim
seruatio 226		continuum 178
		pastillus Criogenes 593
		pastillus

pastillus musæ	590	periphymosis	402
pastillus ad capitis dolorem ex		peripneumonia quid	180
intemperie calida	115	periscyphismus	367
pastilli 584. eorum differentia		peritonæi vulnere quomodo	
ibidem. Vfus	ibidem	manu curanda	398
pastillus aster dictus	588	perniones quid 267. eorum	
pastillus dia coralliu	588	curatio, & persæa	531
pastinaca	543	perturbationis oculi causa	
pastinaca marina	549		145
pastinaca radix	42	pesti. 645	
pastinacæ. 50		pestus quid	237
patella 448		pefforum differentia	649
patellæ fractæ curatio	ibidem	peffus titianus	651
panicum. 43		pefforum aperientium mate-	
pectoris rupturæ, impressionis	pauo 45	ria 650. Vfus	ibidem
confractiois notæ & cura-		peffus Aegyptia	651
tio	442	pestilētia quō præcauenda	88
pediculi capitis quomodo abi-		pestilentia notæ	87
gendi 114		pestilentiam arcuentia	87
pedis ossa fracta		petasites. 531	
quomodo curentur	450	peuce 531	
pedis digitorum luxatorum		peucedanum	ibidem
curatio	464	phaci, & phacos	552
pedū rimæ quō curandæ	268	phæo ad oculos sanguine suf-	
pedum œdemata discutiētia 2		fusos, & magnos affectus	605
peganera emplastrum	625	phagedænæ remedia	311
paganum	531	phalangites	552
pelagii pisces	49	phalangiorum morsus notæ,	
pelarion ad ulcera	605	& curatio. 339	
pelarion ex scorïa argēti	613	phalaris. 552	
pelecinos. 494		pharici poti signa 358. reme-	
pelles calcea-		dia, & Pharynx	173
mentorum ueterum	487	phaselum	44
penis glans nuda quomodo		phasganion	525
contegatur	401	phasianus	46
pentamyron malagma	632	phasolum	488
pentaphyllon	530	phellos	551
peperi, peplion, peplon her-		philagrianum malagma.	
ba, & pepon	44	philocotythe emplastr.	618
peponatum sinagma	597	philonis antidotum	577
perdix. 46		philyras	552
perdicium	490	phlegmone quid	287
periclymenon	530		

* * * *

phlomitis

Phlomit. 526	phlomos 552	pisces cetacei 56
phlyctæna 153		pisces omnium deterrimi 49
phlyctenæ quō curandæ 284		pisces molles cute 50
phœnicine emplastrum 615		pisces pelagij 49
phœnix herba 552		pisium ius 493
φώνημα 125		pissa. 531 piselæon 532
phormion. 552	phrenes 121	pistacia. 46 pisum 44
phrenitis quid 120		pituita in uentriculo redun-
phrenitidos causæ ibidem &		dans, quomodo uacuâda 18
signa ibid. Curatio 121		pityides, & pityocampæ 532
phrygius 517	phrynion 534	pityos phlæos, pityriasis 112
phthysis oculorum 155		pityriaseos curatio ibidem
phthysis quō curetur 186		pityusa. 532 pix 531
phu 552		plantæ sordida ulcera quomodo
phusca, ad conterendum cal-		do curâda. 267
culos 583		platanus 533
phycos. 552	phygethlon 296	plethoricum corpus 62
phylites 553	phyllon 552	πλαῖμα quid 25
phyma quid 296. curatio ibi.		plumbago 522
piceæ cortex, & picis flos 532		plumbago quō coquenda 651
picinum olenm ibidem		plumbum 522
picra Galeni 581		plumbi scobis potæ signa 361
pilos augmentia 109		remed. & pneumon 532
pilos extenuantia 110		pnigalion 134
pili palpebrarum oculum irri-		podagra quid 257 signa 258
antes quomodo curâdi 151		podagræ causæ 256
pilos nutrientia 109		podagrica remedia 586
pinaster 531		podagra ad arthride quid
pingitis terra 485		differat 256
pinguedo animalium 47		podagra quomodo præcaue-
pinguia quomodo coquenda		rit possit 267
653		pœcilon acopon 634
pinj resina 536		pollen farinaceus 486
pini nucleus 45		polycnemon, polygalon 532
pinus. 531	piper 530	polygonon polygonides 506
piper aquaticum 549		polyidæ sphragis 590
pappi quid 362 eorum reme-		polypi 50
dia. 361	pitum agreste 480	polypus quid 373 unde dica-
pirus. 476	pisces 49	tur ibid. curatio ibidem
		polypodas curantia 165
		polypodion

I N D E X.

polypodion	533	psimmythion	557
polypodii radice uires & mo-		psitacium emplastrum	617
7-dus exhibendi	560	psora quid 276 causæ ibidem	
pomorū omniū facultates	44	signa ibidem curatio ibidem	
pompholyx	533	psoricō. 557 psorophthalmia	
pompholigeron emplastr.	618	quid eiusq; curatio	148
pondera, ponderum notæ	661	psydracia capitis	113
populus nigra	569	psyllium	555
portigo capitis	112	psylli assumpti notæ 355 re-	
porphyre. 533		media	ibidem
porrum agreste	474	ptarmicæ	534
portulaca	475	ptelea, pteris, pterygion quid	
poramogeton	533	374 curatio, pterygion ocu-	
poterion 534		lorū quid eiusq; curatio	154
prasoides. 491		ptyas aspidis genus	346
præster unde dictus	345	pudendum masculi cerui	469
priapismus quid 231 causæ		pudendorum ulcera quomo-	
ibidem curatio	ibidem	do curanda	267. & 270
principium morbi quod	57	pudendorū rimas curatiā	232
prinos	534	puerorum stercus	508
proficiscentium uictus	26	puerorum aphthæ quomodo	
prucolis	534	curentur	5
propolis quomodo coqui de-		pueris quomodo cienda aliis	
beat	654	4. & 5	
propomata	602	puerorum tussis quomodo cu-	
prosechii staticum	607	randa	4
prospheysis	406	puerorum morbi & sympto-	
protelus ad claritatem oculo-		mata, & pueri quo tempore	
rum, cicatricesque extenuat		dentiant, & pulegium	486
610		pulegii uires, pondus & sumentum	
prunus, & prunus, pruni fru-		di modus	561
ctus, pruna damascena	507	pulicaris herba	557
pruritus causæ 269 signa ibi.		pullus columbinus	46
pruritum gingivarum puero-		pulmo 332. agninus, suillus,	
rum curatiō	45	uulpinus	ibidem
psaron medicamentum	596	pulmo animalium	48
pseudodictamnion	557	pulmonis tēperaturæ notæ 32	
psilothrum	598	puls ad purgandum	563
psilothra medicamentā q̄	226	pulsus quid	63
		**** 2	pulsus

I N D E X:

Rapa, & Raphanis	42	ricininum oleum	644
Raphanidon	433	ricini pondus, utendi modus,	
Raphanus. 536	Raphano quā	& uires	561
do & quomodo utēdum	42	ricinorum sanguis	470
Raphaninum oleum	644	rigioris in febrib ⁹ curatio	95
Ravum. 488	Ratiocinationis	rimæ ani quomodo manu cū	
offensa quomodo contingat		randæ	224
dignoscatur & curetur	126	rimæ digitorum totorumque	
Raucitas	175	pedū quomodo curandæ	268
Racrementum	542	rhododaphne. 525	rolæ 537
Refractio. 432	Remedia	435	rosacei confectio
Renēs animalium	47	rosmarinus	515
Renum affectus quomodo di-		rostra animalium	47
gnosceretur & curandi	207	rubia, & rubra tinctorum	492
Repletionis curatio	15	rubus. 481	rubus caninus 513
Resinæ	536	rubens cygnus	605
Resolutionis curatio	137	rufi potio contra pestem	88
Resolutionis ob colicum do-		rumex	514
lorem cōtractæ curatio	278	rumex grandis	498
Rha, & Rhacos	536	ruptorum remedia	303
Rhagadæ ani & pudendorum		ruptis à quibus abstinēdū	228
quomodo sanandæ	232	ruta. 531	ruta sylvestris 524
Rhamnus. 536	Rheon	536	rutæ sylvestris nocentur re-
Rhetinæ. 536	Rhinariū	608	media. 224
Rhoda	537	ruta ueneris ardō	
Rhodia radix	537	rem obtundit	16
Rhodia ad supprimendum san-			
guinem ulcera depascentia,			
& excreſcentias	595		
Rhodomalum	602		
Rhœ, & Rhœa	537		
Rhœlis confectio	603		
Rhogme. 432	Rhu		
Rhyas quid eiusq; curat.	151		
Rhypos	537		
Rhythmus quid	65		
Rhythmī differentiæ	ibidem		
rhythmus in pulſu quid	ibid.		
ricinum	505		

S

Sabina. 482	Sachar	520
Sagapenum		537
Sagapenū quomodo coquen-		
dum. 651	Sal. 471	Sal quō
coqui debeat		652
Salis flos. 473	Salamādra	537
Salamandræ assumptæ signa		
358. curatio		ibidem
Sales theriaci. 574	Salix	498
ſalſamentum thymī		546
Salſæ & nitroſæ aquæ	quibus	
conferant		24
Salſorum uires		467

* * * * *

3 Saluia

I N D E X.

Salvia. 490	Sambucus 471	satyriasis quid eiusque causæ
Sambuci coricis radice pon-	230	quæ symptomata eam
du, uires, & mod ^o utedi 581		consequantur ibidem
Samia terra 484		satyriacum antidotum 583
Sandaracha 534		satyrium. 538
Sandaracha quomodo coque		saura 534
da 647		saxifraga, & saxiphages ibid.
Sandix. 534	Sanguis 570	scammonia 531
Sanguinè e naribus profuen-		scandix 41 & 541
tem in febribus quomodo		scapularum compressionis, ru-
sistere oporteat 103		ptoræ, refractionis notæ &
Sanguinis e naribus profluuiū		curatio 442
sedantia 166		schidacidon 432
sanguinem cōmouentia 236		schinos. 546
Sanguis bubulus 48. lepori-		schistos 516
nus ibidem, porci iuuenis ibi-		scillini pastilli quomodo præ-
dem, caprillus ibidem		parentur 592
Sanguis ex uena, arteria uel		scingos 541
naribus profluens quomodo		scirrhus quid 303
sistendus 320		eius differe-
sanguinem uenane an arte-		ntiæ ibidem, qui sit insana
ria profundat quomodo di-		bilis ibidè, causæ ibidem, cu-
gnoscat 321		ratio ibidem & 304
sanguinis renum profluui cu-		sclerophthalmia quid eiusq;
ratio 211		curatio 198
sanguinis profluuium curans		scolopendra marina 541
medicamentum 212		scolopendræ morsus notæ 341
sanguinis ex ore profluuium		curatio ibidem
quomodo sistendum 173		scolopomachætion 366
sanguis animalium 48		scolymon 541
sanguinaria 534		scolymos quas uires habeat 41
saporum species 462		scordion. 541
sapphyrus. 517	sapotes 537	scordon 572
sarcocolla ibidem		scordoprason 542
sarcomata curantia 165		scorpoides 542
sardonian herba 358		scorpius. 406
sardonian herbar potæ signa		scrotum 407
ibidem		scroci inflammationis notæ
satureia 497		228
		scrupulus. 662
		scylla 541
		scytales morsus cura 344
		secundæ relicte quomodo ma-
		nu educendæ 419
		sedes, Vide anus
		sed

sedillita quæ purgent	568	signa concoctionis nunquam	
sedis tuberosa ulcera quomo-		linistre apparent	ibidem
do curanda. 300	felache 50	signa decretoria ubi morbus	
selemusia terra	485	inclinauerit, bona sunt ibid.	
selinon	538	siliqua. 662	siliquæ 46
semen redundans quomodo		silphe, & silphium	540
imminuendum	17	silurus, silibon sinapi	524
semina quò coeuenda	656	sinapifini usus	636
feminis redundantis noxa	17	sinciput quibus secetur 367 &	
feminaria uasa	35	quomodo	ibidem
semperuiuum	469	singultus causæ	102
senescio herba	495	sinus quid 216	eius cura ibid.
senecta anguis	479	sion	340
senum habitus quomodo ri-		sion quas habeat uires	41
calfaciendus	13	siræon. 493	siricum 538
seuum uictus ratio 12. & se-		sifarum, & siser	540
quentibus.		sifymbrium, & sison	ibidem
sepiz	50	sitis in febribus curatio	100
sepiz testa, & seps	539	smegmata	594
serapionis melæne emp.	616	sinagma dentium	170
serapias. 528	seris 539	sinagma pepouatum	597
seriphum, serpillum	492	smilax	543
sertula campana	520	smilacis potè signa 357	reme
serum lactis quomodo à ca-		da	358
seo discernatur	49	smilion ad abscessus	612
sesamoides	539	smiris. 517	smyrna 543
sesaminum olenm	643	smyrnion	ibidem
sextarius 658. & deinceps		smyrni uires	41
sicci temperamenti notæ	29	stæchas	544
sicyos	540	sol si quem exusserit, quid fa-	
sicyos agrios	ibidem	ciendum	18
sicyonium oleū simplex	642	solani furiosi poti signa 358	re
compositum ibidem, aliud ef-		media, & solanum	544
ficacius	ibidem	solare cyphi	645
sideratio quid 291	uide sphaci	solstitium æstiuum quid effi-	
los, & sideritis	539	ciat in hominibus	56
sideros, & sidion	538	solstitium hyemale quid in	
signa decretoria in morborū		corporibus humanis effi-	
princ pio praua sunt	61	ciat.	55

Somnus quid	52	utendi	561
Somni uehementis causæ.	53	squatinæ	50
curatio, & Sonchus	542	squillæ, & stachys	543
Soporis uehementis causæ ibi		stacticum proscelii	608
dem curatio	ibidem	staphiloma	153
soporis noxiæ curatio	93	staphyloma quid 374. curatio	
forba. 45	fordes 537	ibidem	
fordes balneorum	486	staphylinus. 543	steara 542.
fori	546	steatoma quid	306
forera, antidotum	486	stegnosis	10
sparganium	542	stellio transmarinus	342
spartos, & speculium	543	stellionis transmarini morsus	
specularis lapis	ibidem	remedia	ibidem
sphacelos quid	291	stercus 508. Canum ibid. Pue	
Curatio	292	rorum ibid. Lupinorum ibid.	
sphærio empl. ad ardores	621	Caprillum ibid. Bubulū ibid.	
sphincter. 203 Σφίγκτης	332	stercus caprillum	262
sphongion malagma	631	sterilitatis remouendæ ratio	
sphragis polyidæ	590	250. & deinceps.	
spica nardi 542 Indica. Syria-		sternutamēta quæ citent	166
ca, & spina alba	471	sternutamēta in febribus quo	
spina Aegyptia uel Arabica		modo curentur	98
ibidem		stigmata quō curanda	282
spinæ gutturi quomodo exi-		stimmi, & stœbæ	544
mantur	382	stomachus quomodo adura-	
spirandi difficultas	179	tur	396
spodium. 543 spondylium 545		stomachus atra bile uitiosus	
spondyli	50	quomodo curandus	192
spongia, & spongos	543	stomachi exundationē impe-	
spongiarum lapides	517	dientia. 1 stomacho in febrī	
spontanearum lassitudinum		bus quæ cura adhibenda	94
tres species, earum curatio		stomachi dolores conuulsorii	
11. & deinceps.		quomodo curandi	195
spuma nitri	480	stomachi affectus curātia	191
spumæ argēti potæ signa	361	stomachi rostonē emēdātia	2
remedia, sputi noræ	76	stomatia Aegyptia	600
sputum cruentū curantia	177	stomatia medicamenta	598
squama	515	strabismus quid, & quomodo	
squamæ Cypriæ pōdus & mo-		curetur	158
		strangulatorum	

I N D E X.

strangulorum curatio 173
 stratiotes 544
 strobilina resina 538
 strobilus 45
 struma quid 385. Vnde dicatur ibidem. ubi oriantur ibidem curatio ibidem,
 strumæ quomodo curādx 299
 strutiocameli 46
 strychnon 544
 stultitia unde fiat 126
 sturnorum sterces 509
 stypteria, & styrax 544
 styracis albi pondus, & utendi modus 560 suber 552
 succidanea inuicem medicamenta 612 & deinde per totum cap.
 succinum. 495 sudor 497
 sudorem elicentia 22
 sudori in febribus quid adhibendum 96 suffimenta 648
 suffimen rosatum ibidem
 suffocatorum curatio 173
 suffusio 375
 suigillata quō curetur 163
 suilla caro 47
 suillus talus 528
 sulfur quō coqui debeat 649
 sulfuratæ aquæ quibus conferantur 24 sulphur 498
 suppurationem oculorum curantia 155
 surditatis remedia 163
 susinum compositum 643
 susinum oleum ibidem
 suspiriosi qui 179. Eorum curatio, & syca 545
 sycamina. 45 syce 545

sycomoræ. 46 sycomorus 545
 sycofis quid eiusq; curatio 150
 lymphitum petraeum 545
 symptomata & morbi puerorum dentientium 4 eorum curatio ibid. & sequentibus.
 synanche 173
 syncopes in febrib. causæ. 89
 remedia ibidem & 90
 syntexis. 48 syntexes quomodo curari debeant 91
 syriasis quid 6
 syriasi succurrentia, syrica 46
 syrmaismi. 54 systole pulsus 63

T

TAbes quō curetur 186
 Tali articulus luxatus quō reponendus 563
 Talus bubulus 528
 Tamarix 523 Tarichos 546
 Taurocolla ibidem
 Taurinum cornu 504
 Taurorum sanguis 470
 Tauri recens occili sanguinis poti notæ. 359 remedia 360
 Taxus 441. & 457
 Tecolithos. 517 Tedæ 483
 Tela e corpore quomodo extrahēda. 429 Telephion 147
 Telis, & tellinæ 546
 temperamentorum ordines & interualla 467
 temperamēti optimi notæ 28
 tenesinus quid unde oriatur, & quomodo curetur 198
 tenue, corpus quō impleat 28
 tephra. 547 terra 484
 terra quomodo coquēda 654
 terræ intestina 482
 terræ

I N D E X.

Terræ tuber	550	thermarum differentia & uires 24. & deinceps	
terebinthus quid, eius causa, nota & curatio	297	thermos	498
terebinthina resina	537	thlasis	432 & 433
terebinthina ad aluum subducendam quantitas & exhibitionis tempus	20	thlasis aurium	163
terminthos. 546	testa 529	thlasi	498
testes aphthæ ulceræ pressi quomodo curandi	229	thoracis morbos quæ signa præcedant. 54	thridax 498
testiculorum caro excrescens quomodo amouenda ibidem		thronus Marcellini pastilli. 588	
testiculi inflammationis nota 229 curatio	230	thus	515
testiculus quid	406	thuris lachryma quomodo coquenda	654
testiculi animalium	47	thuris manna	519
testiculorum inflammationis quomodo curanda	300	thylacitis 524	thymbra 497
testiculorum temperaturæ nota. 35 testium conseruatio	225	thymus 498	thymus 233
testudinis marinis sanguis quomodo præparetur 348	Eius usus ibidem	thymus locorum muliebrium 415	quomodo excindendus ibid.
tetrapharmacum empla. 614	rettiges. 546	thymi naturalium quid 403. eorum differentia ibi curatio ibi.	
teutlion	ibidem	Thynni prægrandes	50
thalassion hydor	496	tibiae fracturæ quomodo curanda	449
Thalasseros	610	tilia. 552	tiphodes febres 83
thaliotrum	495	titanus	548
thapsia	498	tithymalus 546. Eius septem species	ibidem
thapsia quomodo coquenda	654	titianus pessus	652
thapsia quæ pericula nonnunquam afferat 362. eorundem remedia, & theion	498	tonsillæ 380. Eius causa ibidem, Curatio	381
thelypteron	ibidem	tonsillarum inflammationi resistentia	171
theodothion minus	607	tophos in artubus quid coalescere impediatur	263
theriace antidotum quomodo præparetur 570. Eius usus	572	tophi articularum quomodo curandi	164 & 266
theriaci pastilli quomodo fiant	570	tophorum commune	266
		tormina quomodo curentur	199
		torpedines	50
		torpedo	

torpedo marina	525	tylosis	150
toxicum unde dictum	359	V	
toxici poti notæ ibidem	Re-	V Accinum lac	483
media	ibidem	Valetudini tuendæ sum-	
trachoma quid, eius curatio		mū otium maximè obest	40
150		Varices	409
tragacantha	548	varicosus uarix	ibidem
tragium, & tragoriganū ibid.		uari quid & quō curan.	168
tragosfitodes	ibidem	uasa quomodo diuidantur &	
tragus frumentaceus	ibidem	quibus	565
terebinthus	546	uasorum adustio quomodo ad	
tremoris origo	144	ministranda	366
triblium. 662	tribolos	uenæ sectio quomodo admi-	
tribulus, & triches	549	nistranda 391 & deinceps	
τριχίασις quæ curent	151	uenena	347
trichismus	423	uenenorum simplicium enu-	
trifolium. 538	trigle	meratio	351
trigonus pastillus	586	uenter 507 Mergi ibidē, Gal-	
triorchis. 528	triphyllon	linarū uentris interior mem-	
tripolium	549	brana ibidem, Palumbi ibidi-	
tritium	43 & 535	dem, Mustelæ	ibidem
trixago palustris	541	uentriculi affectus curātia	191
trogodytes passor	549	uentris morborum signis ap-	
tryglion	658	parentibus quid faciendū	54
trygon, & tryx	549	uenter quō emolliendus	56
tuberum facultates	43	uentriculus animalium	46
tubercula ani quomodo ma-		uētriculi tēperaturæ notæ	32
nu curanda	423	uentriculi flatus unde gene-	
turdis, & turtur	46	rentur, & quō curentur	195
turturis sanguis	470	uentriculi intemperies quo-	
tussis	175	modo corrigantur	37
tussim continuam pastillus cu-		ueneris ardorem obtundit ru-	
rans	178	ta, Veneris commoda	16
tussi in febribus quomodo oc-		ueneris impotentia 231 caus-	
currendum	97	sæ ibidem, Curatio	ibidem
tussi grādines & calculi ex pe-		ueratrum	415
ctore educti	175	ueratri albi assumpti noxæ	
tussilago	481	quomodo curandæ	362
tussiculæ puerorum curatio	4	ueratrū quibus cōueniat	558
		ueratrum	

Veratrū qūo exhibeatur	568	sumpti remedia	362
uerbascū. 552	uerbenaca	532	uini moderatē sumpti cōmo-
uergiliarum exortus quid effi-			da. 51 uini immoderati sum-
ciat in hominibus	56	pri incommoda	ibidem
ueri q̄ uict ⁹ ratio cōueniat	24	uinum omne nutrit	50
uermes terreni	486	uini potio in febribus quando	
uertebrarum contusionis, &		conueniat	78
fracturæ notæ, & curatio	443	uinū purgās in hydropicis	503
uertiginis curatio	128	uinum rubens & crassum	50
uerruca quid	428. unde sic no-	uini uires, uiola	497
minetur ibid.	Curatio ibid.	uiola alba	513
uerruca penfiliis	233	violaceum oleum	643
uesicæ affectus. quomodo di-		uipera	499
gnoscerendi, & curandi	207	uiperæ tum maris tum fœmi-	
uesicæ calculi signa	404	næ morsus notæ	343
uesicæ clystere	403	uires quæ dissoluant	72
uesicæ exulceratæ signa	210	uiride empl. Macherionis	625
uesicæ morbos quæ signa præ-		uirulentorū p̄cautiones	334
cedant. 55 uesicæ morborum		uisum. 499 uitis nigra	475
signi, neglectis quæ ægritudi-		uitrum. 550 uituli marini	50
nes sequantur	ibidem	ulcus simplex quid	307
uesicæ resolutio	213	ulcus cauū qūo implendū	309
uesicæ resolutionem comitan-		ulcera sordida quomodo pur-	
tia, Vespertilionū sāguis	470	ganda. 310 ulceri cicatrix	
uestis attritæ fragmentū	536	quomodo inducenda	313
uictus nauigantioni	26	ulcera carcinode quomodo	
uictus ratio omnium ætatū. 6		curentur. 300 ulcera chyro-	
& deinceps.		nia quomodo curanda	299
uictus ratio infantū, uictus rō		ulcera capitis manantia unde	
in laboribus uitam agentū	25	fiant 113. qūo curentur	114
uictus rō senū 12. & sequētib.		ulcera uermes qūo arcēdi	310
uictus ratio quolibet anni tē-		ulcera oculorū eorumq; cura-	
pore quæ seruanda	24	tio. 152 ulcera cacoethe	315
uigiliæ quomodo arceātur	52	ulcera chironia, telepha	ibid.
uigiliarum uariæ causæ ibid.		ulcera uetera qūo cur.	299
uigiliis in febribus qūo resistē-		ulcera articularum quomodo	
dum 92. & sequentibus.		curentur	320
uinū albū 51 uinum dulce	50	ulcerū diruporum curatio	319
uinum meracioris copiosi as-		ulcus circa os sacrū unde pro-	
		ueniat	

ueniat. 106	ulophonos 357	urtica, uteri abscessus notæ 242
umbilico illita q̄ purgent 567		uteri affectus 235
umbilici p̄minētis causæ 397		uteri callus q̄uo curands 253
umbilici p̄minētis curat. 226		uteri cancerorum species 244
uncia. 652	unedon. 491	uteri clausuræ, quam phinon appellant causæ 250
unguenta q̄uo coquan. 652		uteri duricies q̄uo curāda. 245
unguentum zosimi ad tremu- los celebratū. 639	ungues 50	uteri hæmorrhoides quomo- do deprehendendæ 253
ungues qui laborauerint, ut ab- scedant. 271	unguis oculorū, quid eiusque curatio 154	uteri inflāmationis causæ 240
unguium peteygiū quid 426		uteri à naturali sede declinan- tis curat. 241
ungues cruēti q̄uo curan. 217		uteri ulcera pascendo serpen- tia quomodo curanda 243
ungues contusi quomodo cu- rādi, unguiū rediuiæ qd 270		uua. 381 uua. 44 uua inflā- matio quomodo curāda 172
uocis exercitatio qualis esse debeat & quæ eius sint cōmo- da. 9	uolatilia. 46	uua passa. 479
uolanti quid obseruandum 19		uulpes 573
uomitibus q̄uo prouocādus 54		uulæ abscessus quomodo ma- nu curandus 416
uomitibus qui uti debeant, & quomodo. 527	sequentibus.	uulua animalium 48
uomitibus quæ comod p̄stet 19		uulæ fluor 239
uomitibus bilis quomodo oc- cutendum. 102	uranium 609	uulæ ostij phymus quomo- do curetur 416
ureteres. 210	urina 529	
urinam cientia. 55	urinarū co- lor aquosus, rufus, & bilio- sus mediocriter pallidus qd significet. 7	
urinæ difficultas quomodo curatio. 213		
urinæ difficultatem indicā- tia, & urinæ incontinentia unde oriatur 214		
urinā quæ mouent. 19	urinam mouentia. 220	
urinæ retentionis causæ. 403	urforū sanguis 470	

X


X Anthion. 525	Xanthon medicamentum 595
Xerophthalmia quid eiusque curatio. 148	xestes 658
xiphion, xyris. 525	xyraphiū medic. aduersus capitis & mē- ti ficosa exanthemata 114
xyris. 525	xyfter. 608

Z

Z Armala. 524	Zea 493
Zingiber, & Zomos 495	
Zopyrios medicamentum 580	
Zosimi unguentum 639	
Zynie, & Zythus 495	



PAULI AEGINETAE
PERIODE VTI IN SVVM
DE RE MEDICA OPVS,



P R A E F A T I O.

*Pauli laborem nosce me, qui plurimas
Inuisit orbis terras, Aegina satus.*



ON EQV IDEM opus hoc quasi ue-
teres aliqua arti necessaria prætermise-
rint, componere sum aggressus, sed to-
tam ut disciplinam in compendium re-
digerē. E contrario enim illi rectē qui-
dem omnia & integrē e laborauerunt:
recentiores autem præterquam quod
illos ne legere quidem curant, etiam
loquacitatis adhuc coarguunt. Qua ra-
tione impulsus uolumen istud elucubraui, quod illis sanē qui
ipsum, ut uerisimile est habere uelint, eorum quæ legerunt cō-
mentarius, mihi uerō exercitii loco erit. Absurdum nanq; fue-
rit rhetoras quidem compendiosis uti libellis iudicialibus, &
ad circumferendum accommodis, in quibus legum capita con-
tinentur, ut dum usus postulat, in promptu habeant, nos uerō,
nullam eorum habere rationem. quum illis non paucō tantū,
sed iam longo etiam tempore, legibus inspiciendis immora-
ri, ac differre iudicium liceat, nobis neutiquam, aut certe rarō
ea facultas concedatur. Etenim necessitas in quibusdam mor-
bis frequenter nullam ferens dilationem, subitam concretatio-
nem opemq; postulat. ob quod rectē Hippocrates occasionem
dixit

dixit præcipitem . Illos præterea in solis ferè urbibus rerum utilitas incitar, & ubi libri nequaquam desiderantur : medicis autem non tantum in urbibus, aut agris, aut etiam locis desertis, uerum iam quoq; per mare frequenter in ipsis nauibus subita morborum necessitas ingruit, in quibus dilatio mortem, aut omnino extremum adfert discrimen. Quoniam igitur uni uersas medendi rationes, aut particularem omnem materiam memoria tenere uel difficillimè, uel nequaquam aliquis possit, compendium hoc ex ueteribus collegi. Nulla enim de meo inserui, nisi paucula quædam in artis operibus mihi & uisa & comperta. Nam in pluribus egregiis authoribus, magisque in Oribasio uersatus, qui & ipse librum totum, quo uniuersam de tuenda ualitudine rationem comprehendit, aliunde collegit utpote Galeno posterior, adeoq; recentior adhuc, optima quæque ex ipsis se legi, nullum quatenus licuit, ex morbis prætergressus. Etenim Oribasii ipsius uolumen, à septuaginta libris quos continet Hebdomæ contabiblon appellatum, quod tota in se artis materiam complectitur, non omnes, quod grandius sit comparare sibi possunt. In huius autem Epitome ad Eustatium scripta, præterquam quod pleriq; morbi non attingantur, etiam imperfectam reliquorum præceptionem uideas, partim causarum, partim signorum, nonnunquam & curatio integra desideratur, ceu alia in memoriam uenerint.

Præfens autem commentarius notas, causas, & curationem omnium morborum continet, simularium, instrumentorum, & eorum quæ ad unitatis diuortium pertinent: idque non summatim, sed quatenus licet amplè & diffuse. Ante hæc autem omnem uictus rationem quæ sanitati tuendæ facit, exposuimus. Postremum autem librum de simplicibus compositisque medicamentis conscripsimus.

Quid singuli septem totius operis libri, nam totidem habentur, contineant.

Primus omnem sanitatis tuendæ rationem tradit, item quomodo morbi peculiare ætatibus, anni temporibus, temperaturis, aliisque nonnullis, caueantur, emendenturq;. Præterea ciborum omnium uires & usus habet, ut in capitibus comprehensum est.

Secundus febris uniuerſas enumerat, ita ut præponantur iſſis, quæ eò conferunt, exempli gratia, notæ ex recrementis, diebus decretorijs, & id genus aliæ. Subiunguntur autem caſus qui febribus ſuperueniunt.

Tertius affectus declarat, qui ſingulis corporis partibus obueniunt ſicut à ſummo capite ad imos pedes, adeoque ungues deſcendat.

Quartus agit de exterioribus, & ueluti in aperto contractis uitijſ, quorum non certæ ſedes aſſignari poſſunt, ſed plureis particulas infeſtât. In quo & de tineis & dracunculis trãctatur.

Quintus de animalibus icu, morſuue uenenum relinquentibus diſſerit, ubi & de rabioſi canis morſu, & metu aquæ adhæc de non rabidi canis morſu hominiſque agitur. Inibi de uenis eorumque remediis diſputatur.

Sextus chirurgicam omnem exponit, tum quæ carniſ uicia curat, ubi & teli extrahendi ratio comprehenditur, tum quæ oſſium fracturas, luxationeſque artuum complectitur.

Septimus omniũ medicamentorũ uireis continet, primum quidem ſimplicium, deinde & compoſitorum, eorumque potius quæ in ſex aliorum librorum diſcurſu commemini, præfertim maiorum & nominatarum compoſitionum. Scio enim illic non omneis diſſuſè explicari, ne diſciplina, tædium afferat: tum, ut quærens aliquiſ unam, aut etiam plureiſ nobileiſ conſecturas, facile inueniat. In fine adduntur nonnulla ad medicamentorum compoſitioneſ utilia. Item de alternantibuſ inuicem remediis agitur, ut totuſ liber in diſciplinã de ponderibuſ & menſuriſ deſinat. Incipiemuſ itaque primum uolumen.


Primuſ totiuſ operiſ hic liber eſt, in quo omnia ſanitatiſ tuendæ præcepta tradidimuſ, quemadmodum iam in præfatione dictuſ eſt. dicenturque iterum capita, ubi tantuſ hoc prælibauerimuſ, quòd in primo, & ſecundo uolumine plurima ex Oribaſio mutuati ſumuſ. Non enim peculiarem uolumuſ conſtituere opinioneſ, ſed ex omniibuſ utilitateſ indipiſci. In reliquiſ quinque libriſ pauciſſima tantuſ ex illuſ commentariis huc tranſtuli.

PAVLI AEGINETAE

I IBER PRIMVS,

IO ANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.



Quę grauidis superueniant, & quę uictus ratio eis conducat. Cap. I.



VANDOQVIDEM inter ea quę grauidis superueniunt, hæc potissimū infestare solent, stomachi exundatio, continuę uomitiones, sputa crebra, oris uentriculi rosio, & cibi fastidium: non alienum fuit remedia quibus ab eis uindicentur, præscribere. Pro sunt itaque ob ambulationes, cibi nō nimium dulces, uina fulua, odora, maxime quinquennia, & moderata potio. Hęc. n. omnia ne mulier stomachi exundationem experiatur uomatq; impediunt. At medicamēti nomine, uincit polygoniū herbam aqua elixam bibere. item anethum & ponticam radicem, quę indigeti uocabulo rha nuncupatur, hæc tum ante, tum post cibum licet assumere. Extrinsecus præcordia adiuuari debent cataplasmate ex cenanthe balauftio, † cytisi smyrinijq; coma, & sceniculi semine, siue per se, siue quomodocunq; uoles miscere, cum palmulis & uino ueteri. Aduersus stomachi rosiones confert, calidam aquam bibere, quiete in ambulare. præcordia contegere lana molli. At eas quę cibum fastidiunt, uarijs & ad uoluptatem quæsitis cibis amyloq; sicco sollicitabis. magis autem hoc

PAVLI AEGIN.

a

obtuleris

obtuleris ijs quæ terram edere concupiscunt, ut in malacia, quod uicium Græcis Citta dicitur, accidere consuevit. id tertio à conceptu mense potissimum contrahitur. Nam tunc id quod in utero est, quicquid ratione alimenti ad ipsum fertur, tanquā imbecillius, nequit cōsumere, unde fit, ut quū uaria ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundēt, uaria & naturæ aliena appetat, exempli gratia, carbones extinctos, cretam Cimoliā, aliāq; complura. Hanc. n. ob causam appellationē huiusmodi affectus accepit, uel à picæ auis uarietate, uel q̃ eadē subinde hoc malo corripiatur. Iam labor, & longior peregrinatio etiam stomachum ad cibos excitat Quæ uerò mulier citra labores agere consuevit, ea si uterū gerat, haud cōmode repentinas subibit motiones. Verūm acria quandoq; gustare, præsertimq; sinapi cibū fastidienti non fuerit alienum. Cæterū eximios pedū tumores quos œdemata Græci dicūt, anthyllis quæ in aceto maduerit, foliaq; brassicæ in latū super deligata discutunt. Item Cimolia creta ex aceto illita, similiter alumen cū aceto proficit. Rectē etiā pedes malorū medicorū, quæ Citria alias dicuntur, in aqua decoctorum iure lauantur.

† Hic locus sic legitur in ueteribus libris manuscriptis, ἔξωθεν δὲ οἰνάνθη, καὶ βαλαντίω, καὶ κυτίνω, καὶ σμυρνίῳ κόμῃ, καὶ μαράθῳ σπέρματι, κωή τε καὶ ὡς ἀνμίσην ἐβελῆς μετὰ φοινίκων καὶ οἷν παλαιῷ καταπλάσσει, &c. Quæ lectio magis probatur quod cytinus accommodatior sit huic medicamento, q̃ cytissus.

De Nutrire.

Cap. II.

DELIGI nutrix debet, nulli morbo obnoxia, ætate nec uetula nimium, nec adolescens, ita ut iunior quinque & uiginti annos compleuerit, grandior quinque & triginta non excedat: pectore sit amplo, mammis magnis, papillis neque conuenientibus neque auersis: reliquo corpore nec admodum obeso, nec nimium gracili Præterea magnū est infanti commodū, si nutrix non multo antè pepererit, maiusq; si masculum Vitanda ei sunt, admodum siccantia, falsa, acria, acerbata, acida, amara, & ualidè calefacientia. Item odores tum fœdi, tum suauis præter modum, condimenta, aliāq; acria nocent. Ad hæc uenere nutrix abstineat, manus, humerosq; molendo texendoq; exerceat: puerum ulnis gestet, treis iam menses quatuor uel natum.

LAVDATISSIMUM lac est, moderatū spissitudine, copia, colore, odore, & gustu. Cōmendatur & quod in linguem pollicis instillatum, eo inclinato ad lucem, neque subito neque tarde uidetur desuere. Iam uerò in hunc modum probari potest: infusio lacti in uas uitreum coaguli exiguum admiscetur, digitisq; agitur. in quo postquam concreuerit, inspicietur, num casei portio minor quàm seruū fuerit. hoc enim lac inutile est, contrarium huic, concoctu conumax: probatissimum quod utraque habet mediocritia.

Quomodo lac uitiatum corrigatur. Cap. IIII.

LAc uitiatum hoc modo corrigi debet, si crassius fuerit, pituita uomitu elicietur, qui optime oxymelite epoto citatur: laboribus etiam cibum præcedentibus eadem ex tenuabitur. Tunc nimirum in cibo conducunt, origanum hyssopum, satureia, scandix & thymus, item raphani momentum, uetusq; salsamentū cum oxymelite. At si acrius tenuiusq; lac euaserit, multis quidem tunc laboribus nutricem leuare, sorbitionibus autem & carnibus suillis, sapæq; & uini dulcis potu, reficere conuenit. Si lac fuerit imminutum, sorbitionibus & pleniori modo sustentanda est, uinum dulce potui dabitur: pectus & mamillas perfricare oportet. Iisdem cucurbitula quoque defixa abundè præstitit. Medicamenta uerò etsi lacti gerando proficere quidem aliquid sciam, non tamen frequenter ipsis uti præceperim, ut quæ uiolentius consumant. est autem sceniculi radix, & semen, ptisanæ incocta: item cytisi folia ex uino nigro aut ptisana: melanthium in passo & anethum, pastinacæ radix atq; semen, quæ calida prius irroratis admouenda sunt. Omni uerò lacte uitioso, siue crassum, siue acre fuerit & foetidum, prius emulso, puer mamillis admouendus est. Lac autè acre nunquam ieiuno adhiberi debet, foetorem eius uinū odoratum & cibi dulces emendare possunt. Porro de caseato lacte tertio uolumine in capite de mamillis tractabimus.

Educatio pueri.

Cap. V.

PRimum infans recens natus melle nutriri debet: mox lacte, idq; bis die, aut plurimum ter, cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est cum posse quod obla-

rum est concoquere, tunc iā & cibis solidior rectè datur qui nō ipsum repleat. At si fortè imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior aut statim & torpidus magis euadat, uenter intumescat, inflaturq; , & urinæ aquosiores reddantur, quæ repletionis notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abundè autem fuerit, duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi.

De pustulis puero obortis quæ Exanthemata dicuntur. Cap. VI.

Pustulis quæ ex puero per cutē ueluti efflorescunt, Græci ἐξάνθηματα nominant, primū sanè nullū facessere negotium oportet, ubi uerò probè ad summa eruperint, tunc iam curare tentabimus, balneis, quibus iniiciatur myrtum aut lentiscum, aut rosa. deinde rosaceo aut lentiscino utendum: ceratoq; cum cerussa, ad hæc nitro abstergere lenius expedit nam ualentiora non sustinebit. Optimum uerò est nutricem dulciori uictu uti. Laudatur autem maximè si puer etiam ipse neq; plenior, neque nimis tenui cibo alatur. At si uenter ipsius nō respondeat, tunc mel cibo infusum simul coquerere oportet: si ne sic quidem descenderit, terebinthinæ instar ciceris iniicies. Humectata aluo, milium potissimum offerre conducit.

De tussi & grauedine pueri. Cap. VII.

Quod si quandoq; tussicula aut grauedo puerū affligat, melicisimi dicti adhiberi debent. Conuenit igitur puero liberaliore aqua calida loto caput ipsius melle copioso calido illinere, deinde digito linguam leniter premere: multum enim hoc pacto pituitæ uomitu egeret.

De gingiuarum pruritu. Cap. VIII.

Purioribus gingiuis fomētū utēdū est, & liberali unctio-
ne ex oleo discottor in quo ceræ momentū eliquarū sit.

† In margine alterius exemplaris manuscripti hæc uerba leguntur, ὁ δ' ἀξίος μὲν ἐστὶ περὶ ἀσσητὶς σὰν ἔχει τοῖς οὐλοῖς ἐπὶ φρυγμένη σικία ὁ δ' ἄστι. Id est, Odaxesmus est superuacanea quædam caro adnata gingiuis similis dentibus.

De dentium ortu. Cap. IX.

Dentiunt septimo quidem mense pueri experiuntur autem tunc inflammationes gingiuarum, maxillarum, & tendinum, aliquando etiam conuulsiones Tunc igitur

tur puero nihil dudū, quod mādi postulet. digito aut in lauacro gingiuarū continenter contrectari, & gallinaceo adipe uel leporis cerebello emolliri debent. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxillæ delicatis lanis puris conteguntur, oleoque dulci & calido fouebuntur. idemq; meatibus auditorijs instillabitur. Cæterum plenius infantem tunc alere, & calida lauare oportet: & si alui profluuium experiatur, tentabimus eam epithematis quæ præcipuè sistunt, contrahere, inspergen do lanæ cuminum, aut anethum, aut apium.

Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summatim † calidè desiccare. At si uenter nihil reddit, melle in glandis figuram coacto inferius leniter irritabitur, aut nepita detritā cum melle illinetur. Porro conuulsionibus pueroꝝ optimè uidetur auxiliari heliotropium in aqua elixum, si puer in hac lauatur. confert & irino aut cyprino, & sycionio perungere, & uniuersum calefacere. Cum autē exortis dentibus digitos mordet uulneratq; bene faciet radicem iridis deraſam, nec admodum siccam, ore continere. Hoc remedium ulceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum nielle illitum adiuuat. Gingiuarū autem pruritus, ueteris salsamenti caro lenit.

† In ueteri codice hoc loco duplex est scriptura: prior enim καὶ ὁλως θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν Posterior καὶ θερμῶς ξηραίνειν, calido desiccare.

De oris ulceribus quæ Aphthæ dicuntur. Cap. X.

Oboritur puero etiam ulcus quod aphtha uocatur, nūc subalbidum, nunc subrubrum, alias crustæ modo nigresces, quod omnium periculosissimū & lethale est. Remedio erit, iris cum melle, & sicca inspirata Item rosarum folia contusa, earumq; flos, crocum, myrt hæ exiguum, galla, lachryma thuris & cortex eiusdē, & simul & priuatim: singula melle tincta: adhæc mulsæ, & mali punici dulcis succus ꝑficir.

Ad femorum intertrigines. Cap. XI.

Femorum intertrigines myrtus arida iuncus angulosus, & rosæ inspersæ iuant.

Ad aures humentes. Cap. XII.

Aurium humiditates lana ex alumine imposita, aut mulsū, aut uinum uetus instillatum, aut crocum ex uino detritum, desiccant.

SYriasis, est inflammatio partium circa cerebrū eiusq; mē-
branas: concauum in ea sit sinciput, concaui itidem cum
pallore oculi, accedit & corporis totius siccitas Succurrit
huic malo uitellus oui sincipiti cum rosaceo, romenti modo
impositus: sic tamen, ut continuē renouetur.

Aliud ad Syriasim.

† Oportet eidem loco imponere folia herbæ quam Græci
heliotropion, latini solarem nuncupant, cucurbitæ ramenta,
cucumeris, quem peponem dicunt, cutem carni adiacentem,
aut hortensis solani succum cum rosaceo

† In ueteri codice hic locus sic legitur, κατὰ τὴν βερέγματος
ἐπιτιθέναι χεῖρὶ ἡλιοτροπίῃ καὶ ῥέκαλυμένῃ sed legendum si-
spicamur ut est apud Aetiū ἡλιοτροπίῃ σκωρπιούρε καλυμένῃ,
Id est, heliotropij quod scorpiuron uel scorpionides dicitur,

*Ratio uitæ infantium, atq; reliquarum deinceps
ætatum, ad usq; declinantes. Cap. XIII.*

POSTEAQUAM lacte nutriri infantes desierint, liberiore eis
modo & suo ingenio hilariter uiuere permittemus: exer-
citia autem & alimenta leuiora. Ab anno sexto & septi-
mo, tum pueri, tum puellæ, literatoribus blandis humanisque
tradentur, tales enim cum animi remissione & gratia docent.
Animi autem relaxatio ad probam corporis educationē plu-
rimum adfert momenti. Duodecimum annū egressi, ad gram-
maticos iam & geometras mittendi sunt, corpusq; eorū exer-
cere oportet. A quartodecimo usq; ad primum & uigesimalum,
mathematicis disciplinis & sapientiæ studio incumbunt: exer-
citijs pluribus propter corporis robur credentur, ut & animo
& corpore laborantes, a libidinis impetu coerceantur: his etiā
uinum circuncidendum est. Aetate florentibus educatio abso-
luta tum animi, tum corporis congruit, eoq; exercitijs omni-
bus, præsertim quibus quisq; assueuit, utendum cibo pleniore
& ualenti Declinantibus autem remissa competit & animi &
corporis educatio Exercitia enim qualiacūq; fuerint pro ho-
rum ratione imminuere oportet: alimento detrahendum, ut
quorum habitus iam frigescere incipiat.

*De frictione præparatoria, quæ parascœuasticè
dicitur. Cap. XV.*

ANte exercitationē corpus mediocriter calefacere oportet frictione linteis adhibita, deinde nudis manib⁹ oleo intinctis perfricare, usq; dum bene incalescat emolliturq; colore uiuido rubescat, & in tumorem attollatur.

De exercitatione. Cap. XVI.

EXercitatio motus est uehemens: uehementiæ autem finis est, respiratio crebra. Id uerò cōmodi præstat, quoddam partis instrumentarias morbis non opportunas efficit, & functionibus obeundis ualidas: præterea ut alimenta fortius attrahant, promptius immutent, & liberalius reficiantur, caloris beneficio quem illa excitauit. adde q̃ meatus expurget, recrementa, propter ualidam spiritus motionē, expellat. Quoniam igitur alimentorum per corpus membratim digestionem adiuuat, † non debet crudi incoctiq; siue cibi, siue humoris copia, in uentre, aut uasis cōtineri. periculum enim est, ne priusquam probè fuerint concocti, in uniuersas animantis particulas distrahantur. Vnde manifestò liquet exercitationē cibum præcedere oportere. Notæ autem quæ opportunitatem laboris subeundi ostendant, ex urinarum colore petuntur: erenim aquosa nondum coctum humorem qui ex uentre distributus est, significat: rufa autem & biliosa, iam pridē elaboratum esse notat: mediocriter pallida, concoctionem modo factā indicat. Tunc igitur ad exercitia ueniendum est de positis prius recrementis: tū quæ in uesica, tū quæ in aluo cōtinentur.

† Veterum librorum alter habet hanc scripturam δὲ μήτε πλῆθος αἰμῶν καὶ ἀπέπτων, μήτε οἷων, μήτε περιττωμάτων, μήτε χυμῶν, &c. Id est non debet crudorum & incoctorum neque ciborum, neq; excrementorum, neq; humorum copia, &c. Quam lectionem meliorem esse faciliè quiuis ex secundo libro περὶ ὑγιεινῶν intelligere potest.

De exercitationem generibus. Cap. XVII.

OMnis exercitationis commune est, q̃ animali ex ipso caloris augmentum excitat. Singulæ autem exercitationes proprium habēt officium, ualida sanè, hoc est, uiolenta musculis & neruis robur præstaret, cuius generis est

quum quis fodit, & maximo onere sublato; aut eodem loco manet, aut paululum procedit: item accliuus ambulatio huius quoque generis existit: praeterea per funem manibus apprehensum scandere, aliaque plurima consimilia. Celeris autem exercitatio citra robur uolentiamque peragitur: id genus sunt, cursus umbratilis, armorum meditatio, aut quum duo summis manibus concertant, tum quae per corycum & paruam pilam fit exercitatio. Composita autem ex ualida & celeri, quando quas ualidas diximus ijs omnibus ut uehementibus uti licet, motus modo celeritatem adijcias. Praeterea per alias exercitationes lumbi magis quam brachia cruraue laborant: per alias spina tota, aut thorax tantum, aut pulmo. Exerceri uero oportet quousque corpus in tumorem attollatur & rubescat, motus prompete aequabiliter & continue aetat. Inter haec autem sudorem cum calido uapore mixtum cernes. Pausandum uero ab exercitatione tunc primum est, quum aliquod horum fuerit immutatum, nempe si contactior corporis moles uidebitur, ilico desistendum est: similiter quum coloris gratia deperit, cessare oportet. Quinetiam quum motus remittere quippiam cernitur, protinus desinere conueniet. Itidem si in sudore ulla qualitatis eius, aut quantitatatis mutatio accidat: quum enim is aut minor, aut frigidior factus intelligitur, tunc desistendum scias. oleo mox corpori superfuso, apothera pia uti deinceps oportebit, inde frictione apotheraeutica adhibere, ut pedotribus facitare solent.

De generibus frictionum.

Cap. XVIII.

INter frictiones, dura ligare corpus potest: mollis, soluere: quapropter quae supra modum resoluta sunt, duriter perfri care oportet: quae autem astricta, molliter. At si mediocri quis corpore praeditus sit, neque molliter, neque duriter fricandum id esse constat, sed quatenus licet uterque excessus uitari debet. Siquidem multa & dura frictio, corporis molem deprimit: modica uero & mollis, e contrario implet. Porro tres quantitatis frictionum differentias, si tribus quae a qualitate ducuntur, iunxeris, nouem coniugationes effeceris, ut subiectum est. Etenim una iuxta quantitatem, nempe multa, si tribus quae a qualitate sumuntur, durae dico, molli, & mediocri, adiungatur, treis secundum duritiem differentias efficit: modica rursus si eisdem tribus ad-

datur,

datur,treis alias procreat . At mediocris qualitate eisdē tribus iuncta,alias treis progignit,ut in formula subiecta uidere licet.

Q V A N T I T A S

Multa }

Multa }

Multa }

Pauca }

Pauca }

Pauca }

Mediocris }

Mediocris }

Mediocris }

&

&

&

Q V A L I T A S

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

{ Dura

{ Mollis

{ Mediocris

De uocis exercitatione. Cap. XIX.

INter uocis exercitationes suavis lenisq; modulatio nihil ad sanitatē tuendā proficit : grauioris autē uocis sonus utilis habetur, eoq; exercere eum oportet. Ita enim aer copiosissimus inspiratu in corpus attractus, thoracē, uentrē, & meatus totius corporis diducit, dilatat, aperitq; . Quapropter ipsa lectione humiditates quæ redundant, excernit . fortius igitur legentibus, magis & per sudores : lenius autem, per latentem totius corporis perspiratum . Accidit enim propter extenuationē multa recrementa, nempe sputa, mucos & pituitam, per sereatum excerni cōsumiq; . Ijs uerò qui propter frigiditatem excalescere desiderant, quodnā aliud præsentiū remedium esse potuerit, quàm functio quæ respiratione peragitur ? Consiliū igitur est, hos frequēter legere, ut toto corpore relaxato, fusaque carne, arteriā & alios spiritus trāsitus studiosè rarefacientes, per grauiiores uocis actiones modulētur . Vti autē oportet uocis officio neq; temere, neq; inconsideratè : sed quū nec uitiolis corruptisq; humoribus repleti sunt, neq; magnæ & euidentes stomachi cruditates apparēt, ad uocis exercitationē accedēdū est, ne corrupti uapores per corpus largius distribuant.

De lassitudinibus ob exercitationem. Cap. XX.

VLcerosa lassitudo ab excrementorum tenuium simul & acrium copia contrahitur . Tensoria nullum quidem excrementū, cuius ratio aliqua sit habenda, in corpore cōtineri indicat, sed in musculis neruis quæ affectus quāquo

quò tendi uidentur, residet. Ea uerò quæ inflammationis speciem præ se fert, in qua nimirum ceu contusas, aut inflammatione obfessas partes sentimus, tunc solet incidere, quum musculi impendio excalfacti, aliquid ex circumfusis sibi recrementis attraxerunt. Est & alia quædam præter has quarta affectio, quæ oritur, quum musculi supra quàm par est, siccantur, ita ut uestibus exutis squalens corpus contractumq; appareat, atq; ad motus pigrum, Remedium ulcerosæ lassitudinis est, si quæ redundât, euapores frictione multa molliq; cum oleo copiosiore, quod omnis astrictio sit expers. Altera lassitudo in qua tensus sentitur, hoc pro curatione desiderat, ut relaxetur. sanè relaxatur quod distentum est, pauca & molli frictione, eaq; ex oleo dulciatq; egelido: item intermissione omnino, quiete, balneis teporatis atq; in calida, mora longiori: adeò si bis tæue ipsum laues, plus profeceris. Tertiæ lassitudinis inflammatoriae curationis consilium, ad tria dirigitur, nempe superuacanei euacuationem, extenti remissionem & inflammationis refrigerium: itaq; & oleum copiosum tepidumq;, & frictiones molliissimæ, & lenta in temperatis aquis mora, eiusmodi lassitudines persanant. pari modo & multa quies, unctiones assiduæ. Quarta affectio nihil sanè à priori consuetudine immutari potest, nisi calidiorem aquam quæ sensim contrahat: altero die, apothepiæ exercitationem. protinus autem in lauacra frigidi solij exiliant, & omnes autem qui lassitudinibus laborant, cibo boni succi refici debent.

† Vetus codex hanc scripturam habet, *ἐνθὺς δ' ἐκβάτες οἱ μεκοπωμένοι δέονται τροφῆς*. Id est simul atq; balneo excesserint oleo indigent. Quam lectionem Copus sequitur, sed scriptura quæ Orosius restituit *ἐνχύμῳ δ' ἀπαντες διμεκοπωμένοι δέονται τροφῆς*, melior est.

De cute astricta.

Cap. XXI.

ASTRICTIO, quam Græci stegnosin uocant, accidit, aut obstructis, aut densatis meatibus. obstructio quidem ex copiosis crassisq; humoris crudis concoctionemq; non expertis, oritur: densatio autem, ab ijs quæ refrigerant, aut astringunt, aut desiccant. Acprehenditur sanè iam dictus affectus, statim ubi se exuerint, ex colore albo, & cutis tum duritie, tum densitate: tumq; in ipsa exercitatione

citatione uix incallescant. Succurrit huic affectioni calefactio, quæ ualentiore exercitio, balneisq; , calidioribus petenda est. Mora uerò in frigido solio diuturna non sit. imò nec ipsa aqua nimium sit frigida. Vbi uesteis sunt induturi, ungentur aliquo quod mediocriter calfaciat oleo, dulci ac tenui. Cutis autem densitatem abundè etiam sanat oleum anethinum, præsertim si uiride fuerit anethum, oleumq; ex populo nigra confectum.

De spontaneis lassitudinibus. Cap. XXII.

QUONIAM ulcerosa lassitudo ex acrium recrementorum uitio contrahitur, siquidem paucus omnino uitiosus humor fuerit, apothepix exercitatio suffecerit: si copiosior, & altius in corpore redundarit, eiusmodi malo obnoxius, nec exercitationem, nec ullum omnino motum iniungemus, sed quiete, somnoq; recreatos abstinere cibo totū diē cogemus, deinde uesperis pinguius unctis, temperatoq; balneo lauaris, cibū boni succi & sordilem modicum dabimus, non tamen à uino eos arcentes. hoc enim semicrudos humores, si aliquid aliud, cōcoquit. Si ergo his peractis symptoma conquieuerit, ad consueta munia paulatim reducendi sunt: sin in posterum etiā diem remaneat, de ualentiore iam remedio considerandū est. Si enim uires consent, duorum alrerum, aut sanguis mittendus est, aut purgatio exhibenda, sed ita ut discernamus, utrum magis expediat. Quod si uires inualidæ sint, sanguinem dimittere haud quaquam oportet, sed deiectionem mediocrem tentare. At si crudi humores omnino fuerint, neq; sanguinis detractio, neq; purgatio, neq; exercitium ex usu est, imò ne mouere quidem in totum, aut lauare expedit. Tales igitur in quiete omni seruandi sunt, cibis, potionibusq;, & medicamentis, quæ extenuent, incidantq; sine manifesto calore, reficiendi. Pro cibo igitur oxymel, modicum ptisanæ, nonnunquam, & mulsæ exhibebitur. Quoniam uerò præcordia eiusmodi omnibus turgida, inflataq; sunt, ac facile quicquid assumpserint in flatum conuertitur, satius fuerit cum cibo piperis aliquid offerre. Utilius autem erit, & medicamento quod diospolites dicitur, uti: item diatrion pepereon, simplici: utilissimumq; ipsis est oxymel. Potui sumēt apomel, præsertim ubi coacuit, uinaq; leuiter acescentia. cibi erūt qui siue calore attenuent, cuiusmodi est capparitis si ex oxymelite.

aut

aut oxelæo assumatur. Porro tensionis lassitudo quæ sine exorcitijs oboritur, copiam innuit solidas corporis parteis distendentem. Constat autem omnibus, optimum esse præsidium quum sanguinis copia subest, aut uenam incidere, aut malleolos scarificatu sauciare. Quæ uerò inflammationem repræsentat lassitudo spontanea, ea ne paucis quidem horis, nedum duobus, tribusue diebus eodem renore consistit, sed protinus febrē accendit uehementissimam, nisi sanguinis detractioe malo prius occureris. Præstiterit autem, si fieri queat, bis eodem die sanguinem detrahère: ac primum quidem ita mittere conuenit, ne animi defectu homo periclitetur: secundo autem, ne defectio quidem ipsa formidari debet. At qui sic affecti sanguinem non dimiserint, hi ut periculum euadant seruenturque, bonæ fortunæ beneficio opus habent.

Viçtus senum ratio.

Cap. XXIII.

Senectus quum sicca, frigidaque existat, per calefacientia, humectantiaque corrigi debet. Frictio itaque adhibenda est, citra lassitudinem: imbecilliores ter die cibo refici debent: ad tertiam quidem horam, panis exiguo cum melle attico: septima uerò, hora ubi frictionum, exercitationesque ipsis congruas, & balneum fuerint experti, primum sanè quæ aluum emolliunt, assument, deinde pisces, aut auiculas, hinc in cœna ea quæ optimi succi sunt, & ægrè corrumpuntur. Non prohibeo item uinis ex melle præparatis uti præcipuè quibus de calculo in renibus creato, aut etiam podagra suspitio est, quando petroselinū uino rectè inijcitur. At si quando pituita in uentriculo contracta, necessitas est aliqua quæ eam incidant, diligere, protinus ad humectantem uictus rationem, digrediendū est: ac fieri maturæ ante alium cibum ipsis exhibetur: per hyemem uerò caricæ, si nullum in dextra præcordiorū parte symptoma accidere sentiant. At quia serosa pituitosaque in senili corpore excrementa colliguntur, urinam quotidie promouere consilium est, & aluum subducere, præsertim oleo quod ante cibum absorbeant. Clarum uerò est, omnia olera ante cibū ex oleo, garioque sumi oportere: item oliuas muria seruatas, quas halmadas dicunt, & damascena. Quod si uenter magis astrictus nihil deiecerit, & mercurialis herba, & cnicū abundè sunt. benefacit etiam resina terebinthina, interim unius auellanae

nz,interim duarum triūve magnitudine sumptā. Iam oleū quibus aluus contracta est, per clysterē utilissimē infunditur.

E De rugoso corpore. Cap. XXIII.

Rugat corpus erui farina,uiti albæ mista.

Aliud sinegma quo continue corpus abstergitur.

Fic pingues simul cum bryonia contusæ, farina erui, combusta sepiæ testa cum mellis momento affuso.

Quomodo corpus suauiter oleat. Cap. XXV.

VT corpus bene oleat, eidem unctioni cupressi comam aridam contusam admisceto, aut piceæ cortice. Meminisse uerò debes, ut manē postquam corpus uestimentis menierint, paxillum casie aut fabinæ herbæ degustent.

Quomodo habitus recalescat. Cap. XXVI.

VVandoquidē uerò habitui senū succurrere oportet, utatur dū lauat, puluere calefacienti, aquæ indito qui constat, ne pita, sampſūcho, hyssopo, baccis lauri, rore marino, lapide pyrite, sale, sæce combusta, nitro, pumice, pro cuiusq; ratione: item sinapis, herbæ pediculariæ, & cocci gnidij momento. à balneo, acopo quod calefaciat utatur, uinū fuluū uetus potet, sumatq; propoma ex mulso pipere, ruta, & consimilibus

Quomodo color malus emendetur. Cap. XXVII.

COrpus declaratū pallidūve uita læta & cibus gratus emendat, miscetur autē huic radícula, porrum, & uiridē cicer. Iam mali punici dulcis succus sorbitionis modo sumptus, bonū colorē efficit. Proficit ēt oleū cui bryoniæ radix diutius sit incocta. idē & corporis cutem intendit, erugatq;. Ijs autem, qui corpori nitorem conciliant miscere cōuenit pastillos, qui sunt ex cuiusdā abstergentis farina, bulbo, narcisso, & bryoniæ radice. bene colorant, si copia datur, tū radix, tum semen amaræ amygdalæ in aqua elixa, qua pro lauacro utitur.

Ad liuores.

Cap. XXVIII.

Luescere senum corpora prohibemus, si cutē ipsorū crassam, & iniurijs haud faciliē opportunam, habitumq; calidiorem reddiderimus. Ut autem celerius id assequamur, sale in balneis, super partem quæ nigruerit uti conueniet eandemq; fomentis per spongas decocto raphani aut absinthij immersas, adiuuare.

Quomodo

Quomodo dentes ab iniuria asserantur. Cap. XXIX.

Dentes ab interitu uindicabis, si primum caueas ne cibi quos ingesseris corruptionem experiantur, adhuc ne continuè uomas, deinde escas dentibus incommodas, nempe ficus aridas, mel coctum quòd durum nimis sit, palmas uix fragiles, adhuc omnia glutinosa, quæq; adeò frangi contumacia sunt, ut dentibus commoueant. insuper uitare oportet, quæ dentibus stupefaciunt, perfrigida cuncta & putrida Conducit itidem secundum cibum dentibus purgare.

Quomodo grauis auditus corrigatur. Cap. XXX.

Ad grauem auditum corrigendum, uincit primum meatus per quos audiendi facultas est, sordibus expurgare: per interualla autem linteum dropaci intinctum ipsis demittere, atq; prius expressum retrahere. summe enim meatus purgat, & simul auditum auribus reddit. Deinde aliquo erui instar inserto, meatum ad diem obturbabis: postea ipso exempto quotidie oleo amygdalino, aut nardino, aut chamæmelino, aut pingui anserino, cum exiguo fellis bubuli perunges. Rursus diebus aliquot interpositis, sinapi, & ficis contritis factum penicillum ad horas duas imponis, inde hoc exempto infundis oleum, quod in asphodeli radice excauata efferbuerit.

De oculorum caligine. Cap. XXXI.

Ne caligine oculi corripiantur, quum in aquam frigidam temergis, illos diu in eadem apertos esse cōueniet. hinc enim robur uisui adijcitur, Lēctione uerò nō te fatigabis, uino crasso & dulci abstinebis. similiter cibus qui in superiore uētre diu remorantur, cōcoctu difficiles, & qui humores lentos, crassosq; generant: itē cauebis erucā, porrū, & omnia quorum acrimonia sursum effertur. Vitare etiā oportet supinum incubitum diuturnū, frigus uentos cōtra oculos flantes, fumū, & puluerem. Iam uerò aquā oculis instillare quotidie ad mensem totum, iuuat. quæ in hunc modū præparatur, sceniculum uiride fictili uasi extrinsecus picato, cum aqua cœlesti demittitur, deinde exempto sceniculo quod reliquum est repones.

De repletionē. Cap. XXXII.

Purimum noxæ ciborum repletio conciliat, quamuis. n. probè quippiam uenterculus concoquat, uenæ tamen nimium repletæ, laborant, distenduntur, rumpuntur, obstruuntur,

struuntur, flatu implentur, & ualde grauantur deterrimum autem habetur in morbis, uenas esse repletas. at uentris repletio si urget, interim uomitu quod redundat, interim per aluum ex cernitur, in totum inualidior hæc, ea est quæ uenis accidit, non tamen & ipsa admitti debet, sed si quis impendio plura assumpserit, statim eum uomere oportet. periculum etenim est, ne obita concoctione uenæ repleantur: magisque si intemperantius cibus continuè assumptis, nullam deinde uacuationem experiatur, uomitu, igitur sollicitari debet prius quàm cibi corrumpantur. At si aliquid eum impediat, aluus soluta frequenter succurrit. si minus illa fluxerit, certè diutius dormire & potui aquam calidam frequenter sumere, consiliū est. Vbi iam abundè concoxerit, præsertim aluo largiter fusa, lauacris fomenti sique adiuuare, fassamenti parum ac potionem dilutam exhibere oportet. At si neq; descenderit aluus, neq; celeriter obita est concoctio, sed corpus uniuersum graue, ad motus pigrū, & sommolentum fuerit, mens præter rationem quodāmodo torpescat, uenarum repletionem esse cognoscas. Qui uerò præter hæc lassitudine premuntur, eos conuiuiscere dum uenotriculus ingesta concoquat, deinde laboribus inanire expedit.

De ebrietate.

Cap. XXXIII.

Ebrietatem uomitus repentinè obortus discutit: item aqua & mulsa liberalius superbibere uincit, atque sic uomere, usque dum plurima reiecerint, ac stomachi uellicatus obtundatur. à uomitu solium ingressi copiosè unguentur, reliquo tempore conuiuiscunt, & accuratè & cooperti diutissime dormient, quousque temulentia discutiatur.

Quibus cibi corrumpuntur.

Cap. XXXIII.

Cibus in uentre uiciatis, si quæ corrupta sunt deijciuntur: maximum ad sanitatem est compendium: si minus, ijs quæ leniter subducunt aluus irritanda est. Huiusmodi autem malo affectis uomitus ante cibum, uini dulcis potu excitatus, conducit. Nullum prætereà cibum uel nidorosum, uel graueolentem, uel in totum corruptioni opportunum assumere ipsos consuluerim, sed ea quæ boni succi sunt deligere. Iam per interualla temporis mediocria alium subducere, ex ijs quæ mediocriter purgant, ita affectis confert.

De

*De Venere.**Cap. XXXV.*

Veneris hæc sunt commoda, repletos inanit, corpus agile præstat, in augmentum promouet, & uirile magis efficit. Quantum uerò ad animum spectat, impeditam intelligentiæ uini dissoluit, iratos mitigat, eoque melancholicis coitus, si quid aliud, remedium est accommodatissimum: item alio modo insanientibus integritatem sensuum restituit. Tam ex pituita morbis uenus est utilissima: cæterum alij etiâ cibum respuentes, eius cupiditatem hinc recuperarunt: alij, continuis per somnum ueneris imaginibus liberati sunt. Porro natura ueneri idonea est calida, & humida, ut quæ reliquis salacior sit. Minimè uerò coitum excitat uetus qui siccatur refrigeratque, ætas senilis, tempus autumnale. Quapropter uictus ratio humida calidaque adhiberi debet, mediocritas, & laborum, & ciborum. Quemadmodum uerò moderati labores, ita etiâ concubitus ipse mediocris conuenit. Nam & ad opus incitat, & facilitatem quandam consuetudini præbet. Requirit autem libido, si quid aliud, alimenti exuberantiam, eoque cibi potissimum ualentis materiæ utiles sunt: ex piscibus autem polypodes. ut qui alioquin etiam ad uenerem incitare credantur. his adduntur, molli cute præditi: ex oleribus autem, orminum, erysimum, eruca, & rapum, quæ in medicamentorum uicem dantur: ex leguminibus profunt, faba, cicer, ochri, & dolichis, & pisæ, quæ præterquam quòd largiter corpus alunt, flatibus etiâ replent. Ruta igitur quia flatus discutit aboletque, ideo etiam ueneris ardorem obrundit. magnificè autem probouas, ut quæ humectent, † & spiritu sanguinem repleant, qui in uenerem proritat. Quum igitur concubiturus es, nimiam satietatem, cruditatem, lassitudinem, cauebis: item ne uomitus, aut purgatio præcesserit. similiter repentinum alui profluuium: inueteratum enim fluorem uenus desiccatur. At uementis coeundi cupiditates non laudo, sed potius resistere eis consulo, præsertim ij quos morbus aliquis infestat. Saluberrimum igitur post exercitationem, balneum, moderatumque cibum, uenerem exercere ita enim uiribus conducit, & frigus obortum minus efficitur. Tempus autem concumbendi opportunum est, secundum cibum, ut suprâ dixi, antequàm somnus inuadat, lassitudo siquidem ex coitu contracta, obdormienti statim remittitur. Id uerò tempus etiam liberis procre-

procreandis accommodum est, tum alijs de causis, tum quod mulier consopita, genituram facilius retinet,

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus, καὶ πινύματος ἐμπιπλάσσι τὸ σῶμα, δὲ ἢ ἐφορμᾷ πρὸς ἀφροδίσια. Id est, corpus statu implent, qui ad libidinem excitat. Qui sensus simplicior est.

Ad eos qui uenerē exercere nequeunt. Cap. XXXVI.

Naturalia cōtinuē pingui ungentur, cui adiectum sit narcissi radiciis momentum, aut cocci gnidij, aut pyrethri, aut herbæ pediculariæ, aut seminis urticæ, aut uiticis. Præbiberè autem ante uenerē oportet piper, aut satyriion aut erucam, aut cnicum, aut simul omnia. esse confert ante cibum bulbos tostos, rubentes ac exiguos, cum sale & oleo, aut scillæ marcidæ modicum: item compositis aduersus hoc uitiū inscriptis remedijs utendū est: item subinde lasciua legere competit.

De ijs qui immodice coierint. Cap. XXXVII.

Quoniam ex immoderata uenere corpus rarius, frigidius, siccus, & imbecillius euadit, ratio est admouere nimirū quæ desent, calefaciant, humectēt, cōfirment-que. Qui igitur immodico cōcubitu exhausti sunt, uestimētis calidis operi cōquiescēt, sōnoq; satis indulgebūt, donec corporis cōtentio substat, & illi ab imbecillitate sese recollerint.

Si semen genitale redundet. Cap. XXXVIII.

Nonnulli semine copioso & calido collecto, in uenerem prouunt: quod cū in coitu egresserint, corpus inualidum & stomachum resolutum obtinent, extenuantur siccanturq; ob quā causam si rursus à cōcubitu abstinerint, capite grauantur, & anxij sunt, deinde statim ueneris insomnia experti eodē modo afficiunt. Nihil igitur his quod semini augendo efficax est, sed potius & cibi & medicamēta quæ id corrumpāt, offerri debēt, & balneo lūbos oleo rosaceo, melino, & omphacino perungere oportet. Satiū autē est oleū cera addita, ne defluat, crassius efficere, miscereq; succū aliquē refrigerantē, nempe semperuini, solani, cotyledonis & psillij: ac horū quidem per estatē, reliquis autē anni tēporibus, tum aliorum, tum lactucæ succū: item lini semē quod aqua fuerit incoctum. nam hoc quoque refrigerantem succum exhibet. Ad hæc la-

mina plumbea lumbis subiecta, ueneris insomnia cohibet. Iam herbae refrigerante ui praeditae si cum ruta substernantur, & teneris uiticis surculis, idem praestant. Praeterea semen uiticis & rutae in cibo sumptum. Cauendum uero est, ne lumbis uehementer refrigeratis, tenes offendantur.

Si perfrictio nocuit.

Cap. XXXIX.

QVI frigori nimio patuerunt, locis calidioribus decumbent: cyprino aut irino peruncti. postea ubi modice incaluerint, piper, myrrha cum uino dulci odorato & ueteri assumet, aut liquor cyreniacum cum uino uel aceto, aut pyrethrum castoriumue ex aceto: cibo aut calidioris recreandi sunt.

Si insolatus adussit.

Cap. XL.

SI qui uero exusti in sole sunt, his locis aeri expositis decumbendum est, perfundendaque frigida, facies, manus, & crura: si siti conficiuntur, frigidam aquam qui assuerunt, bibent. atque haec paulatim, & non una uice ac subito facere expedit. cibum assument modicum, qui facile in membra distribuatur, humidiores potius quam solidiores.

† Vetus scriptura hoc loco habet, σκληροτέρων, id est, duriorum, ἀντιτὸ παχυτέρων καὶ σκληροτέρων, quibus nominibus medici cibum solidiorem significant. uix unquam inuenitur σκληροτέρων in hac significatione.

De pituita in superiore uentriculo redunda. Ca. XLI.

† **Q**UOD si in aliquem interdum incidas fastidientem, qui quidem cibos ualentis materiae auersetur, & si assumere compellas nausea afficiatur, sola uero acris appetat, & ijs quide oblectetur, sed uentris inflationem experietur, nauseatque ac paululum ructibus solis leuetur, interim uero & ipsi cibi quos assumpsit, praesertim in acorem conuersi, uitientur, omnino intelligendum tibi uenit summam curationis existere, ut pituitam a uentriculo abstergas. Ego quandoque ita affectum noui, qui raphanis ex oxymelite sumptis, incredibili cassioris pituitae copia uomitu egesta, integre statim sanitati restitutus sit.

† Hic locus sic descriptus est in ueteribus libris. εἰ τινα περιστέλλῃ καὶ ποτὲ τὰς μὲν τῆς τροφίμων σιτίων προσφορὰς ἀποπερφομένῳ, ἀποσίτω αὐτὸν μένοντι. Id est, Quod si aliquem incideris, qui cibos ualentis materiae auersetur, atque non alatur, ἀπόσιτος enim uidetur positum ἀντὶ τῆ ἀτροπῆς.

Quomodo

Quomodo facile quis uomat. Cap. XLII.

Quoniam ualidè uomentibus multa solent absurda su-
peruenire, cōmodum fuerit quomodo quis facilè uo-
mat, exponere. Etenim uomitus pituitam inanit, ca-
put leuat, & ne qui auidius nonnunquā cibū ingesserint cru-
ditate laborent, item ne qui uinum liberalius sumperint, of-
fendantur, prohibet. At quæ offerentur, neq; acerba, neq; sic-
ca erunt, sed partim dulciora humidioraq; partim acriora. Cō-
mendatur ad hæc raphanus, eruca, fassanientum uetus, origa-
num uiride, cepæ momentum & porri. Promouet uomitus
etiam ex leguminibus prifana cui mellis aliquid additum sit,
ferculum ex fabis frefis confectum, magisq; carnes ipsarum. ue-
rū non solum cremores ipsarum, sed ipsas quoque integras
deglutire oportet, eoq; uomiturus non diu mandendis ipsis
immorabitur, omnia uerò per coctionē mollia flaccidaq; erūt.
Iam constat, uina dulciora deligi oportere, ut quæ in stoma-
cho magis supernatent, atq; eam potionem tepidiorem assu-
mi. Cōfert etiā amygdalas melli intinctas comedere, ac placen-
tas gustare: item peponis & cucumeris semen maceratū detri-
tumq; cum melle assumere, radicemq; cucumeris contritā ex
melle. At qui ualentioribus uti uolunt, narcissi bulbo aquæ in-
cocto, uinū temperant. Mouet autem uomitiones iritium quo-
que unguentum, si digitis eo perunctis, irrites. Porro uomen-
tis interest, ne cesset uel intermitrat, usque dum omnia eiece-
rit: à uomitu os colluat, faciemq; posca aut aqua abstergat,
id nanque dentibus conducit, & caput releuat.

Quæ sanis aluum subducant, & quæ urinam moueant. Cap. XLIII.

Veterum nonnullis satis esse ad secundam ualetudinem
tuendam uisum est, si aluus quotidie & urina pro inges-
torum tum cibi, tum potus copia, sine uitio & abunde
responderet. ac quum uacuatio iuxta assumptorum propor-
tionem accidebat, commendabant: sin minus, promoue-
bant, urinam quidem scandice, apio, asparago, petroseli-
no, aniso, nepita, origano, absinthio, graminis carduique
radice, cytiso, adiantho, ononibus in aqua elixis, quorum
b 2 decoctum

decoctum cum uino potui exhibebant. hæc enim per urinam sanguinem repurgant, unde non parum utilitatis percipitur. Alium adiuuabant terebinthina: ex qua oliuæ magnitudinē dormituri deglutiendā offerebant. At quum magis subducere eam cogitamus, rheu momentū admiscebimus. Accommodata deiectioni sunt, oua sorbilia: ex oleribus, beta, malua, itē cochlearū ius, atq; hæc fortē abundē erunt. Efficacior est herba mercurialis, in aqua cum sale elixa comestaque, eiusq; decoctū potuit datum similiter folia sanibuci. idem præstat polypodij radix duarū drachmarum pondere, salsamēto inspersa, aut etiā in ptisana sorpta, adhæc serum lactis cum sale aut melle, ad treis heminas quatuorve assumptum: ueteris quoq; gallinacei ius, tum per se, tum cum cnici drachmis duabus. nonnunquam & aloë trium cicerum instar secundū cœnam rectē assumitur. Præstantissimum uerò est epithymū in uino post mediocrem cœnam potum: qui uehementius uacuare desideret, manē epithymi drachmam ex oxymelite, uerno tempore ebibat.

De clysteribus.

Cap. XLIIII.

IN quibus uenter ægrè descendit, & stomachus imbecillis medicamenta ad subducendum efficacia non sustinet, clysteribus utendum est, quum pituita quidem in intestino residet, ijs quæ sunt decocto caricarum, betæ, nitri, syluestris cucumeris radices, melle, oleo chamæmelino, aut anethino: quum siccitas magis urget, ijs quæ constant, althæa, foenu græco, chamæmelis, oleo, mellis exiguo interim etiam oleum per se dimidiæ heminæ mensura iniectum, abunde proficit. non tamen continuè id faciendum est, ne natura his irritata, spontaneæ excretionis obliuiscatur.

De glandibus.

Cap. XLV.

VTimur etiam glandibus subinde stercoris excernendi gratia, & in quibus id quod per clysterem inditum est, non egeritur. Finguntur autem glandes ex sale tosto, melle, & nitro: item thymus discocto melli additur. Fiunt etiam ex resina terebinthina, & nitro: interdum & cocco gni-dio modico. Sed quia uellicatus mouet, parteis ipsas oleo delinere conuenit præterea pyrethrum aut piper admiscetur, conuenitque resolutionem expertis, & ijs qui ex perfrictione inflationes contraxerunt. Insuper centaurium pici & ce-

rz commiscetur, ac naturalium relaxationibus aptum est præsidium. Infantibus autem etiam salis grumus ano imponitur. Fit quoq; glans ex ficu cum nitro.

De ijs quæ per os & nares caput euacuant quæq; eisdem partibus delinuntur. Cap. XLVI.

HVMORES in capite residentes per sputa uacuamus, quod si modicè facere uoluerimus, piper cum mastiche temperabimus: si largius uacuare libet, pyrethrum aut herbam pediculariam mandî præcipiemus. item anemonæ omnis radix mansa pituitam prouocat, capparisiq; radicis cortex. Itaq; huiusmodi remedia serosum excrementum uacuât, crassam uerò lentamq; pituitam, sinapi cum oxymelite gargarizatum, aut sapa in qua origanum, aut hyslopum sit incoctum. Ego autem sapam cum sinapi, & oxymelite misceo. At si cerebrum muco purgari desiderat, acris remedij, quorum nonnulla etiam sternutamenta mouent, euocabimus. Itaque anagallidis utriusq; & anemonæ cuiusuis, & betæ, succus per nareis purgat: item cucumeris syluestris foliorum succus naribus ipse & per se & cum betarum decocto succoue infunditur. sternutamentum uerò crudis humoribus qui in thorace, pulmone, & capite continentur, non expedit. Quod autem orillinetur tale est: sapo cum betæ succo palati regionibus & columellæ delitus bene facit, idem etiam per nareis purgat, melanthio uerò quod faciliè paratur, ad narium illitionem subinde usus sum, interim aceto acri pridie macerans, deinde postridie cum aceto rursus læuigans infundensq; naribus. Nonnunquam oleo ueteri idem melanthium derritum, similiter illeui. Sic igitur & Archigenes eo in narium obstructione usus est. prior autem, ex aceto, Crito in morbo regio uti solebat.

Quæ mensis ducunt. Cap. XLVII.

QUÆCUNQ; urinæ ciendæ sunt, eadem omnia mensis ducunt, nempe brassicæ radicis decoctum potum, persicæ radix, ruta, chrysanthemion, dictamnû, & erucæ semen: item quæ ori uulvæ subiiciuntur, mensis commouent, ut ruta cum melle trita, aut porri succus, aut allium tritum subiectum, aut myrrha cum uino læuigata, aut leporis coagulû.

Quæ sudorem mouent. Cap. XLIII.

Sudorem eliciunt chamæmelum aridum tritumq; oleo inspersum, si summæ cui ualidè infricetur: seseli, pyrethræ, cachry, anysum, similiter oleo inspersa. item nitrum tostum non nimis tenue, cum oleo efficax est: adhæc salis flos oleo temperatus, & liquor cyrenaicus aqua dilutus corpori infricatus epotusq; ciceris magnitudine: Pari modo nepita & pota cum mulla, & extrinsecus cum oleo infricata proficit.

De aere. Cap. XLIX.

Laudatissimus aer est, qui exactè purus: is autem nimis erit qui non ex stagnorum, aut paludum uapore turbidus exurgit, neq; ex profundo quodam specu pensilentem aurâ exhalante prouenit: ita qui ex cloaca quadam magnâ ciuitatè expurgante turbidus exit, uitiosus est. Quinetiam nebulosus similiter sanitati nō facit, quemadmodū item qui in cauo loco altis undiq; mōtibus inclusus, nullā aurâ recipit. Hoc igitur modo uitiosus aer omni ex æquo ætati nocet, omniq; temperaturæ: sicut optimus prodest. At qualitate uarians aer colore dico, frigiditate, siccitate, & humiditate, nū similiter uniuersos afficit. Etenim temperatis corporibus aer temperatus utilis: intemperatis, qui contrariam temperiem habuerit confert.

De aquis. Cap. L.

A quarum præterea & uirtutes & uitia cognita habere expedit, ut quæ ex multiplici ipsarum usu magis ferè quàm omnia alia ad quamlibet uictus rationem requirantur. Ea igitur optima aqua censenda est, quæ nullā aut gustu, aut odore qualitatem repræsentat, sed protinus bibēdi suauis est, & uisū pura simpidaq;, quum uerò etiam à præcordiis statim descendit, melior alia quærenda non est. Nam quæ in præcordiis residet diutius, uentilē ferit, inflat, grauâtq;, uitiosa censēbitur, huiusmodi aqua neq; citò calefit, neq; refrigerat, sed quæ in ipsa relixantur, tardissimè peiusq; decoquuntur. Præstat itaq; talem aquam experimento discernere. Qui uerò notis quoq; eam uolet agnoscere, iis quæ dicentur attendat, quæ enim ad septentrionem spectat: à sole auersa, tardè permeat, agræ concoctionis lentè calefcit & refrigeratur: quæ autem ad orientem erumpit, ac per meatum quendam, aut terrâ colatur

latur puram, eademq; citissimè calefit, iterumq; refrigeratur protinus, hanc optimā esse existimandū est. Probatūr itē quæ æstate frigidior, hyeme calidior est. Nōnulli & pondere aquā examinant, leuē præstare credentes, hoc igitur si aliis à me cō memoratis accedit, commendatur, uerū sola hæc bonæ aquę nota non sufficit. At imbrium aqua auctore Hippocrate leuissima est dulcissima, limpidissima, tenuissimaq; eò q̃ sol leuissimum & tenuissimū attrahat, ac id nō ex alia aqua solum, uerū ex mari quoq; & corporibus: quapropter etiam omniū prōptissimè cōputrescit, ut quæ diuersis ex qualitatibus sit cōflata. Nemo autem aquā putrefactioni opportunā deterrimā esse existimet, nā mutationis facilitas uirtuti potius, quam uitio tribuitur. Quæ igitur aqua optimæ notas habet, si prōptè etiam putrescat, ea cēsebitur saluberrima, & si quū mutari incipit, occasione rucedinis, tussiculæ, & grauitatis uocis iis quī biberunt præbeat. Ac inter imbriū aquas. æstiuæ quę tonitru decidit, præstantior est, quā quæ nimbis demissa est. Ex glacie & niuib. aqua, insaluberrima est. Nam ea congelascente, tota pars tenuior exprimitur. Porro palustrem fœdiq; odoris & absurdas recipientem qualitates, rectè decoques, atq; ita meliorem redditam potui dabis uino temperatam: si adstringit, dulciori: aliam uerò acerbiori. Nonnullas percolare expedit, nempe limosas salas, & bitumen referentes. At frigidæ nimīū à cibo assumi debent, non tamen subito, a cuna uice. Non desunt qui cibos & potiones aduersus aquarum uitia inuenerint: ac alii cicerum decoctiones præbunt, uel eadem quoq; edūt: alii caualidem similiter cum pisciculo quodam elixam, item fœniculum reliqui betam & cucurbitam sale conspersam cū uino dilutiore præsumunt.

De lauacris.

Cap. LI.

F Rigidam lauacionem ita quidem laudo, ut non iis qui nullo uictus delectu agunt, ex usu esse dicam, uerū solis illis qui accurate uiuunt, & laboribus, & cibis sicut expedit, utentes. Porro multis qui amplius interdum refrigerari desiderant, abundè est natare per æstatem, si iuuenes sint, carnosī & frictionibus autē excelsi. Sint autem qui aquam ingredientur, neque uenere, neque alio quodammodo lassi, neque cruditatem sentiant, neque uomeu,

aut aluo inaniti, neq; uigilijs defetigati. Periculosum enim si quis ita affectus frigidae lauacro utatur. Calidum uero balneum & optimum & tutissimum est: lassitudinem soluit, humorum repletionem per halitum digerit: item excalfacit, mitigat, emollit, flatus ubicunq; decubuerint diffundit, somnum conciliat, carne replet. Est autem aptissimum omnibus, & uiro & mulieri, & puero & seni, & priuato.

De balineis naturalibus. Cap. LII.

Naturalium balneorum alia nitrum, alia salem, alia alumen, alia sulfur, alia bitumen, alia æs, alia ferrum repræsentant: nonnulla composita ex his omnibus reperiuntur. Itaq; aquarum naturalium uis est quæ deficiet & calefaciat ampliter, ac humidis frigidisq; affectibus maximè conducit. Iam uero quæ nitrum, & salem obtinent, capiti, thoraci fluxione tentato, stomacho humentior, aquæ inter cutem, tumoribus laxis, œdemata Græci uocant, qui ex morbis proueniunt, & pituitosis sunt accommodatæ. Aluminatæ sanguinis reiectioni, stomacho uomitioni opportuno, immoderatis mulierum purgationibus, continuisq; aboribus, utiles existunt.

Sulfuratæ neruos emolliunt, calefaciuntq; & dolores mitigant, stomachum uero eneruant euertuntq;. Bituminatæ caput replent. instrumenta sensibus distribuendis dicata, offendunt: calefaciunt autem continuè, & temporis processu emolliunt. Quæ æris naturam occupant, ori, tonsillis, uux, & oculis præcipuè conferunt. Ferri uirtutem sortitæ, stomacho & lieni sunt utiles. Oportet autem in aquam sine tumultu, & lentè descendere, quo uirtus corpori relaxato accedens immèrgatur.

Quæ uictus ratio quolibet anni tempore sit utilis. Cap. LIII.

Non alienum est, pro singulis quoq; anni temporibus uictum instituere. Ac hyeme quidem pluribus uti laboribus, plus esse conuenit præsertim diebus aquiloniis. Nam austrinis laborare quidem similiter, sed minus cibi & potus assumere oportet. Summatim humido tēpore corpus omnino siccum reddere, quemadmodum in frigido, calidius: carnes calidas comedere & olera, plus uini bibere oportet. Verè autem ineunte, alius uomitu, alius per aluum euacuari debet,

alius

alius sanguinis demissione, prout cuiusq; consuetudo & uoluntas fuerit. Per æstatem à laboribus conuiescendum, ciboq; demendum est, qui rectè frigidioris erit naturæ: portione largiore utendum, ac omnia fieri debent, quæ ad refrigerationem humiditatemq; conferunt. At in autumno, quoniam prorsus inæqualis inordinatusq; est, & omnigenos morbos inuehit, magna uictus habenda sollicitudo est: frigus uitare, concubitu & frigida potu prorsus abstinere expedit. itè frigidus auroræ aer, meridianusq; ardor rectè cauebitur, poma æstatim assumere noxium est, ut quæ non copia tantum obfint, uerum etiam uiciosos procreent humores, & inflationes. Etenim præstantissima ipsorum, nempe ficus & uux, flatus pariunt corrumpuntq; cibos, nisi ante alios præsumantur: ita uerò neq; inflant, neque corrumpunt. Vbi aer frigidior euadit, corpus pro frigoris ratione calefacere, omniaq; peragere oportet, ceu hyeme aduente. Nihil mali autem fuerit post æquinoctium uacuatione ex commemoratorum aliquo tentare, ne aliquid superfluum in corpore retentum, hyeme facessat negotium.

*Vitæ eorum qui in laboribus uitam
agunt. Cap. LIIII.*

SI quis in laboribus uitam transigit, cōsiderandū est, priusne is exerceri consueuerit, an nullo exercitio se credens, mediocriter t̄ eiusmodi consuetudinem ferat, ita ut non morbo implicetur, continuè, facili præditus perspiratu meatuum, eiusmodi enim corporis naturam ad aliā consuetudinē traducere non oportet, imò nec eos qui ex longiore temporis interuallo ægrotant. At si assiduè quis morbo consiliari uidetur, in humorum quidē redundantia *πλεωρίαν* græci appellant, eò per totam salubrem uictus rationem, consiliū diriges, ut humorū mediocris sit t̄ copia: in eorū uerò prauitate *κακοχymία* græcis dicitur, ut optimos efficias. Qui igitur humorum redundantia laborant, in balneum deduci, deinde frictionem adhibere, & paululum dimoueri prius debent. Qui uerò eiusmodi facere antea sunt aggressi, ijs hæc eadem paululum augere, cibo autem detrahere, eumq; imbecillis materiæ ingerere consulemus. At qui prauos humores colligūt, non uno consilio tractantur, quoniam neque una uicioli humoris species

cies est. Nonnulli si quidem frigidiorē magisq; pituitosam colligunt alij calidiorē biliosiorēq; quemadmodum alij melancholicam magis accumulānt. Quapropter singuli, cibo potuq; abstinebunt, quā collectam ipsis humorum colluuiem solent generare. In omnibus autem his commune est praesidium, alui subductio.

† Vetus scriptura est *ῥαδίως*, id est, facile: non *μετρίως*.

† Ante hoc uerbum in manu scripto est uox *ἀέ*, id est, semper, quā omīssa uidetur à librarijs.

Proficiscientium uictus ratio. Cap. LV.

Facillimè quis profectiōem inibit, si inunctus sit, & nō fortiter incedat. Præterea ad proficiscendi facilitatem conducit per ætatem fascia mollis digitos sex, aut septē lata, quinq; autem cubitos nō minus oblonga, lumbos ad ilia usq; cōplexa. Item baculus ad iter utilis habetur. Etenim per decliuiā præmissus, corpus quod præceps ruit ceu cōto cuidam innixū retinet, quum ascendendū est, ipsi innitentes facilius in accliuiā corpus promouemus. Porro cum in itinere cessamus, unctio & paxillum cibi cuiusdā æstiuī, potioq; modica eo tēpore conuenit: à prandio antè quā iter arripiamus, conquiescendū est. Si uerò necessitas abeundi fuerit & sitis urgeat, tenuis polenta ex aqua cū salis momēto bibetur: æstus ardorq; solis caueri debet, cui nec corpus nudū exponere sed cōtectū esse oportet, ne ex itinere siccescant indurescat. Hac. n. ratione & minus lassatur, & nullū ex prædictis affectibus similiter percipit. Hyeme quū frigus urit, antequā itineri te accingas uentre subducto, & unctiōe adhibita hyemaleis cibos copiosè assumes, potionē modicā. Cæterū fascia longiore nō solū lumbos, sed spinā quoq; & pectus rectè inuolues. Requiescenti autem, si interea uehementis frigus urat, neq; ungi, neq; cibum potumue assūmere præstat, neq; alio quodā modo refici debes, si inibi mansurus es. At si secundum longas profectiōes, aliosq; ualidos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, non aliter quā lassī curabit. minus enim sic periculis erit opportunus.

Nauigantium uictus. Cap. LVI.

Vomitibus quibus nauigantes premuntur, primum oborientibus nec faciliè, nec utiliter succurrimus: ut quæ omnino magna ex parte praesidio esse soleāt. A uomitu
autem

autem cibi non copiosi, nec quilibet offerri debent, sed aut lenticula uti sicca, decoctaq; cui pulegij modicum sit adiectū, aut panem ex uino aquoso, & odoro maceratum ingerere oportet: portione uti modica, eaq; uel ex uino prorsus aquoso, uel aceto mulso. Lenticulam incoqui dum emollefeat, conueniet: mox in tenuem puluerem redigere, inde siccare, postea in uas fictile condere. At si diutius crebriusq; uomitus urgeat, cibo magis subtrahendum est, eademq; portione modica utendum, uel aceto mulso cum aqua, in quo thymum aut pulegium cōmaduerit: item aqua cum polentæ polline aut uino odorato, eoq; aquoso cum illius polline similiter, recreatio tentabitur. Ad graueis autem nauium odores, aut mala cotonea naribus admouentur, aut thymus, aut pulegiū. Mare nequaquam aspicendum est, usq; dū in nauibus uersari assuescas. Aquis porro cura adhibenda est, ne turbidæ, fædi odoris, ac salæ existant.

Quomodo extenuetur corpus. Cap. LVII.

QUum immodicè corpus plenum est, extenuare ad atque imminuere oportet. Quia ergo calidior tēperatura & siccior gracile corpus reddere demonstrata est, crassis eam, si mediocres reddere uouerimus inducemus Didicisti autē citas exercitationes, uictū extenuantem, similiaq; medicamenta, & animi curas, temperamētum siccius & calidius, eoq; corpus gracilius efficere. Quæ igitur uictus ratio extenuet, nulli nō cognita est: medicamēta uerò uehemētiora hæc sunt, rutæ semen, præsertim syluestris, cum ipsis corymbis, aristolochia rotūda, tenue centauriū, gentiana, polium, quæque ad urinam ciendam ualentiora sunt, uti petroselinum: singula nāq; hæc, & per se, & cum aliis omnia, humores abundè extenuant, inaniuntq; corpus. Quinetiam sales ex crematis uiperis largiter extenuare solent: ipsaq; adeò theriace. digerit autem, extenuatq; oleum cui radix syluatici cucumeris, hibiſci, gentianæ, panacis, & aristolochiæ sit incocta, si illinatur: sic polium & centaurium. At cibis non statim à balneo dari debet, sed prius somnus est indicendus. Præstaret etiam aquam balnei ex iis esse quæ digerant, si quidem sponte sua scaturienrem habeamus, qualis est Mitylenæ: sin minus, salis florem aquæ marinæ commiscebimus. Vino utemur

mur tenui & albo. Cæterum frictio sicca linteis crassioribus durisq; adhibita, idem abundè efficit. Adhæc oportet cibi minus quàm pro exercitiorum ratione ipsos assumere: iuuat etiam obæsos insolatus, præbibere autem non debent, sed epulas semel tantum die sumere, magis expedit. item corpus nitro & sale asperiore infricare. In balneis copiosum nitrum extenuat, modicum uerò probam corporis nutritionem excitat. Postremò extenuat & medicamentum, quod recipit piperis & petroselini duas portiones, assari & anisi dimidiam. Hoc & urinae & aluo promouendæ efficax est.

Quomodo tenues impleantur. Cap. LVIII.

QUum extenuatos implere uolumus, uinum quidem crassum, cibis autem crassi succi, exercitatio modica, frictio mediocris, & ut summatim dicam omnia prædictis contraria expediunt. Commodum est iisdem & pice diebus tribus quatuorue interpositis, oblini. Si ieiunus aliquis lauetur, ante balneum linteis corpus donec rubescat, infricare debet, deinde frictione dura nõ tamè multa cutè cogere, quod densa duraq; euadat. Expedit igitur ijs qui pallido sunt colore præditi, nec alimentum sentiunt, iram animiq; motus excitare.

De partium attenuatarum curatione. Cap. LIX.

EXtenuantur plerunq; partes nonnullæ, uel diuturna ipsarum quiete, uel deligaturæ modo quo contracta fasciatur. Itaq; uirtus partis extenuatæ firmari, sanguisque ad eâ elici debet copiosus, frictione moderata, aptoq; motu, & calētis aquæ mediocri superfusione. Hæc sanè tantisper faciēda sunt, dū rubescēs corpus attollatur, cessandū uerò prius quàm collabāt. Iam & picationē prædictis membris, adhibere cōgruit. Quū autem frigidiorem partē senseris, linteis ipsam confricare, ac calefacienti quodā medicamine oportet. Vsum aliquādo & thapsia, nūc cum melle, nūc cū cerato illinēs.

Optimi temperamenti notæ. Cap. LX.

TEMperatissimus homo est, cuius corporis cōpositio omnium extremorū exactè mediū occupat, nepe gracilitatis, crassitie, mollitudinis, duritiæ, caloris, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, in uniuersum naturæ ac animi functiones hēt inculpatas: medius quoq; est glabri & hirsuti, nigri & albi: pilos in pueritia rufos magis q̃ nigros hēt: in uigore, è priore.

Interpe-

Intemperatorum corporum notæ. Cap. LXI.

Corpora moderato calidiora citius dentient, increscēt-
 que similiter: tangentibus autem calidiora, munusque
 pingua apparent: colore sunt rubido, pilis nigris, me-
 diocriter hispidis, & latis uenis. At si quis simul & pinguis, &
 crassus latiores uenas habeat, is ob consuetudinem, non na-
 tura pinguis euasit. Frigidioris temperaturæ nota est, si ad ta-
 ctum frigidius apparet corpus, glabrumque sit & pingue, color
 unà cum capillis rufus, si multa inest frigiditas, liuens quodam-
 modo & plumbes, uenæ angustiores: si gracilis est eo tempera-
 mento præditus, neque necessario talis, sed ex consuetudine
 factus est. Sicca autem temperies durior est, graciliorque tem-
 perata, atque hirsuta, durities igitur à sicca temperie omnino
 separari nequit, gracilitas autem non modo naturaleis tempe-
 raturas, sed etiam ex longa consuetudine acquisitas comita-
 tur. Indicium siccitatis est, si corpus ægrè mouetur, siccum, &
 squalidum à siccantibus euadat. Humida temperies, cætera
 quidem temperatæ similis est, sed mollior, corpulentiorque; ac
 ab hac separari nequit, mollities, quemadmodum, & crassitudo
 non insitum modo temperamentum, comitatur, sed etiam ex
 longa quadam consuetudine constituitur. peculiare uerò hu-
 miditatis signum est, corpus maximè hirsutum, facilis pilorum
 capitis prouentus, ijque nigri sunt, & per iuuentutem copiosi:
 processu temporis caluitium sequitur, uenæ latæ sunt, sicuti &
 arteriæ grandes, simulque uehementissimè pulsant. præterea
 totum corpus ualidum, articulaturn, masculosum, pinguedi-
 nis expers apparet, cutis dura, & nigrior. Frigidum humidam-
 que temperaturam testatur thorax angustus, sicut etiam to-
 tum corpus glabrum, cutis tenera & alba, capilli, subrui, præ-
 sertim in iuuentute, hac præditi in senio non caluescunt, ue-
 rum statim timidi, pusillanimes, pigri, uenis latentibus, crassi
 pinguesque & femoribus, & musculis indistincti, inarticulati,
 blesi que sunt. At si humiditas frigiditasque magis fuerit ad-
 aucta, color unà cum pilis rufas uidetur: si plurimum increue-
 rit, liuescit. Porro calidum ac humidum temperamentum
 mollius carnosiusque, optima temperie existit: auctum am-
 plissimè, putridis affectibus opportunum est. Quum autem
 paulo quidem humidius, multo autè calidius fuerit, eo donati
 mollio

molliores paulò, corpulentioresque temperatis existunt, non paulò uerò hispidiores, imò etiam ad tactum calidiores apparent, nigri ipsis pili existunt, & caro pinguitudinis experts. Quod si paulò quidem fuerit calidius, multo autem humidius, mollis his caro, multaque existit, & color ex rubro, & albo commistus, tangentibusque paulò calidiores apparent. At si frigiditas pariter cum siccitate ex æquo augetur, corpus erit durum gracile, album, non musculosum nec articulatum, pilisque uacuum, tangentibus frigidum deprehenditur: pinguedo tamen, graciles licet eiusmodi existant, per carnem dispersa est, color autem & capilli frigiditati proportionem respondent. Quod ad animi mores pertinet, pusillanimes, timidos & tristes eiusmodi temperamentum efficit. Ac, ut semel expedit, in coniugatis temperaturis semper euincens qualitatibus notæ superare solent.

De capitis formatione.

Cap. LXII.

EXiguum sanè caput prauum cerebri structuram propriè notat: magnum uerò non necessariò bonam testatur. Si nanque tale insit uirtutis, materiam probam, multamque efformantis robore factum est, bonum est indicium: si ex solius materię copia, non item. Verum distinguere ea conuenit figura, & ijs quæ ex illo processerint. Figura quidem, si concinna, aptaque fuerit, hæc enim semper bona est constructio, ijs autem quæ ex illo procedunt, si optimè sit disposita, & si neruosum genus ipsi integrum, bene habitum, ualens, sique oculi acriter cernant. In acutum fastigiata capita, deficientem in fronte, uel occipite habent eminentiam, aut magis quam decens est, auctam. Plerunque igitur, ut magnam, ita has quoque deprauatas comperiemus sit tamen, sed raro ut nonnullæ ex his bonæ proueniant, cum formas scilicet uis, non inualida fuerit.

Temperatura cerebri notæ.

Cap. LXIII.

Cerebrum temperatum moderatas habet, & animi functiones, & excrementa, minimeque ab omnibus exteris offenditur. Talium pili capitis in infantia subrui, pueritia subflauo apparent: ubi ad adoleuerint flauescunt, medijs quodammodo inter crispas exactæ ac simplices nec tamen faciliè caluescunt. Si uerò calidius temperato extiterit, omnia quæ circa caput existunt, & calidiora, & rubicundiora apparent, oculorum uenæ sensibiliter apparent, capilli his in lucem

cem æditis protinus in capite oriuntur . Ijs autem qui multò sunt calidiores, nigri, ualidi, & crispi: qui non multò, ijs flauī primum, deinde nigri proueniunt, procedente ætate caluescunt, interim his recrementa sunt exigua, & inculcata fruuntur ualitudine : capite uerò à calefacientibus cibis, potu, odoribus, & foris accedentibus implentur grauanturque, modicus somnus in huiusmodi temperaturis sufficit, neque is profundus ad modum. Frigidius autem quàm conuenit cerebrum fatentur, excrementa copiosiora per meatus ei peculiareis manantia, capilli recti, rufi, firmi, & faciliè à frigidioribus causis læduntur, destillationibus, & grauèdinibus continuè infestantur, oculorum uenæ latent, somno maximè premuntur. Siccioris cerebri nota est, si nihil excrementi emanat, sensuum acrimonia, uigiliæ, capilli sunt robustissimi, statim ab ortu, ac ijs crispī magis, uerum ex facili caluent. Humidioris autem, capilli simplices planique, & nequaquam caluitium experiuntur, sensus turbulenti, excrementorum copia, somnus multus & profundus. Calido, & sicco cerebro præditi, recrementis carent, exactos sensus obtinent, uigilantissimi sunt, faciliè caluent, primum uerò capilli celerrimè ipsis proueniunt, & optime habiti, plenissimi que, nigri, calidi ad tactum capitis, rubrique usque ad uigorem apparent. At si calori humiditas accesserit, ita ut utraque paululum excedant mediocritatem, colorati calidique sunt, uenæ oculorum grandes, excrementa pleniora, mediocriter concocta, capilli recti, subflauī, caluitium haud faciliè experiuntur, uerum capita ipsorum calefacientibus, humectantibusque implentur, grauanturque. Vbi uerò humiditas, caliditasque accreuerit, caput morbidum euadit, facileque ex calidis & humectantibus noxam contrahit. eiusmodi temperamento præditi, uigilare diu nequeunt, dormientes autem imaginibus, per insomnia torquentur, oculi carigant, non exactos sensus obtinent. Frigida uerò simul & sicca temperamenta cerebri, frigidum decolorque caput efficiunt, oculorum uenæ non extant, à frigidis causis promptè offenduntur eoque inæquali ualitudine fruuntur, sensibus per adolescentiam exactis inculpatisque, processu temporis subito contabescunt; summatim circa omnes capitis partes cito consenscunt, capilli à natali die uix erumpunt, exorti non aluntur, rufescuntque humidum frigidumque temperamentum cerebri, reddit

reddit soporosos, somnolentos, sensibus uitiosos excrementitios, frigori opportunos, capita habentes quæ faciliè repleantur, destillationi, grauedini obnoxios, non tamen hi caluitum experiuntur.

Ventriculi temperatura notæ. Cap. LXIII.

Ventriculi natura siccioris indicium est, si confestim eo donati sitiant, & modico sint contenti potu, largiore grauentur, fluctationes experiantur, uel id quod redundat in uentriculo supernatet, cibusque delectentur siccioribus. Humidiorem notant, si nulla sitis urget, & largior humor non molestat, cibusque placent humidiores. Calidior natura uentriculi melius sanè concoquit, quæ appetat, & dura potius, quæque difficulter possint immutari, calidis cibus, & potionibus oblectatur, neque à frigidis quicquā incommodi percipit, si modicè utatur. Frigidior, appetendo quidè ualet, concoquendo minus, præsertim si contumacia frigidaque alimenta assumpserit, quæ faciliè in eo acescunt, frigidis quidè gaudet, sed immoderatus assumptis promptè offenditur. At intemperies ex morbo contracta, hac ratione ab insitis differunt, quòd contraria sibi, non similia appetant. Si igitur uenter probè concoctionem obit, temperatus: si non concoquit, intemperatus est. Item si nidrosos ædæ ructus, immodicum etiam feruorè igneum fatetur: si acidus, contrarium. Rursus si rebelles concoctioni cibos propè concoquat, immodicum: si pices concoquat, illos minus imbecillem. quod num ex humore quodam aliunde influente accidat, considerare oportet. Etenim pituitosi, acidum: biliosi nidrosum, graueolens, aliasque extraneas qualitates ructant. Communiter autem utrisque nausea superuenit. uerum si uitiosi humores in concauo uentriculi spatio supernatent, uomitu reiiciuntur. qui autem corpore uentriculi contenti, tunicis eius adhærescunt, frustra eum ob inanem ad uomitum nauseam conturbant.

Pulmonis notæ.

Cap. LXV.

Non modo uentriculus sitim uel adfert, uel arcet, ac frigida calidæque potionis appetentiam facit, sed etiā quæ in thorace continentur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Verum qui ob horum caliditatem sitiunt, largius inspirant, expirantque longius, item sentiunt in thorace ardorem: non sicuti qui in uentriculo subter præcordia illum experiuntur.

† Quia

† Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, ac frigida potio magis quàm calida admodum sitim ipsorum restinguit: frigidus autem aer inspitatus refocillat, quum nihil uentriculi uitio sitibundos soletur. Hac ratione qui è contrario affecti sunt, à frigido inspiratu sensibilem molestiã percipiunt, quòd maximum pulmonum frigiditatis indicium est, adeoq; pituita secreta & cū tussi reijciunt. Sicci autem pulmones excrementis carent, & pituita, quemadmodum humidi excrementicij sunt, & obscuram raucaq; uocem efficiunt: accrementa ipsis interueniunt, ubi aut uehementius, aut acutius loqui studuerint.

† Hæc uerba ita leguntur in uetusto codice. καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες, ἔκ, αὐτίκα πάνονται, καὶ τὸ ψυχρὸν ὀλίγον ποτὸν ἵστανται αὐτῶν μᾶλλον τὸ δίψας, ἢ περὶ τὸ πολὺ θερμὸν. Id est. Quinetiam si bibant non statim sitire desinunt, ac frigida pauca potio magis quàm multæ calidæ sitim ipsorum restinguit. Quisensus huic loco magis conuenire uidetur.

Cordis notæ.

Cap. LXVI.

C Ordinis calidioris notæ sunt, respiratio magna, pulsus ne-
lox & creber, itidem audacia, insanaq; ferocitas: tho-
rax ipsis hirsutus, præsertim pectora existunt, ac præcor-
diorum regio his uicina: magna uerò ex parte totum quoque
corpus calidum, nisi iecur ualide renitatur. Quinetiam thora-
cis latitudo calorem notat, nisi & hic cerebrum ualde resistat.
Porro cor frigidius, pulsus habet mediocribus minores, ac qui
tale habent, † timidi natura sunt & pusillanimes, negligentes
pectore glabro. Cor siccus pulsus edit duos, iram excitat nō
procliuem, sed feram & quæ non facile queat placari, magna
uerò ex parte, uniuersum corpus reddit aridius, nisi iecur repu-
gnet. Humidius cor testantur, pulsus molles, mores ad irē pro-
ni, sed quæ facile pacari possit, ac totū corpus humidius, nisi ie-
cur resistat. Calidum & siccū cor ostendunt pulsus duri, magni
ueloces, & crebri, item respiratio magna citata & frequens, hoc
donati corde, maximè hirsutum pectus, nec non præcordia ob-
tinent, impigri tractandis negotiis, furibundi, temerarii, mori-
bus tyrannicis: etenim ad iram procliues, quæ non facilè con-
quiescat. Si autem humiditas cum calore superauerit, ta-
les minus hirsuti sunt, quàm commemorati, prompti autem
functionibus obeundis, neque tamen fero animo, sed ad iram
PAULI AEGIN. c piono

prono duntaxat existunt, pulsus in eis magni, molles, citati & crebri. Humidioris frigidiorisq; pulsus quidem molles, mores autem pusillanimes, timidi, & pigri: talium pectora pilis uacant, ac nequaquam iram retinent diu, quemadmodum neq; ad eandem procluesunt. Frigidum & siccum cor pulsus duriores & exiguos efficit. huiusmodi corde donati minimè omnium iræ sunt obnoxij, sed ubi semel eam conceperint, diu retinent: pectora ipsorum omnium maxime pilis uacant.

† Auctor earum annotationum in Paul. Aeginetam quas Cratander formis expressit anno 1543. & Orosius locum hunc peruerterunt. Ita enim legendum putant, ἀτολμοὶ καὶ ἀμεληταὶ cum ex fide exemplaris uetustissimi artis paruo Galeni (ex qua totus hic locus desumptus est) quod Aldus sequutus est, legendum sit μελληταὶ. μελλητής. n. significat ὑπερθετικόν, id est, cunctatorem. Et μέλλωσις uel μελλωσμός, id est cunctatio propria eorum est, qui cor frigidum habent ut scribit Gal. lib. 2. περὶ κρῶτον. Quod autem Orosius ex Oribasio legendum putat καὶ ἀτολμοὶ εἰσι καὶ λιθαργοὶ καὶ ἀμεληταὶ, æque magnum uitium in ea scriptura. Nam pro λιθαργοὶ omnino legendum est αἰργοὶ, id est, pigri (Nam λιθεῖν γὰρ affectus est cerebri potius quam signum, quo cognoscas cordis frigidam intemperiem) pro ἀμεληταὶ uerò legendum est μελληταὶ, ut iam ostendimus. Fere. n. fit ut curiosi hi διορῶνται, παρὰ διορῶνται inueniantur.

Iocinoris temperatura notæ. Cap. LXVII.

IEcoris calidi notæ, uenarum latitudo, flauæ bilis copia, per ætatis autem uigorem, etiam atræ, sanguis calidior, eoque totum etiã corpus existit, nisi cor obstiterit, præcordia & uenter pilis obfita sunt. Frigidioris indicium, uenæ angustæ, pituita copiosior, sanguis, torusq; corporis habitus frigidior, nisi à corde incalescat: præcordia & uenter pilis uacant. Siccus iecur testatur, sanguis crassior minusq; redundans, uenæ duriores, ac uniuersa corporis habitudo aridior. Humidioris notæ sunt, sanguis copiosus & humidus, uenæ molliores: sic etiam totum corpus, nisi cor restiterit. Calidi simul & sicci indicia sunt, præcordia maxime hirsuta, sanguis crassior simul & paucior, amara bilis copiosissima, ac in ætatis uigore, atræ, uenarum latitudo duritiesque: pari modo & totum corpus calidum siccumque.

Siquidem

Siquidem calor à corde procedens, frigiditatem à iocinore
 prouenientem potest euincere, quemadmodum & frigiditas ca-
 liditatem, siccitatem uerò non potest cor humidius ad contra-
 rium perducere. Constat autem quòd si in idè utriusq; princi-
 pij temperamenta concurrerint, totum omnino corpus, illo-
 rum ratione affici. At humidum simul & calidum iecur, minus
 q̃ calidam & siccum præcordia efficit hirsuta, plurimum uerò
 sanguinis, uenas grandes, habitum humidum & calidum, nisi
 cor obfistat. Quod si utraque qualitas longius à naturæ modo
 recesserit, morbis qui ex putredine uitioq; humorum habent
 originem, corripuntur: idq; magis, si plurimum humiditas, pa-
 rum calor increuerit, ac humoribus uitiosi fiunt. Cæterum hu-
 midius frigidusq; glabra habet præcordia, sanguinem magis pi-
 tuitosum, nec non uenas angustas, totumq; corpus similiter af-
 ficat, nisi cor ad contrarium deducat. Frigidum simul & siccum
 iecur corpus efficit, modico sanguine, uenisque angustis, & fri-
 gidius, præcordia glabra, nisi & hic cor superauerit.

Testiculorum temperatura notæ. Cap. LXVIII.

Calida testiculorū temperatura, ad libidinem procliu-
 est, fecunda, & masculos procreat, parteis genitales ce-
 leriter hispidas efficit, ac uicinas etiam attingit. Frigi-
 da contrà. Humida, copioso ac humecto semine abundat. Sicca
 pauci & crassi seminis efficax est. Calida & sicca temperies me-
 diocriter crassum semen progignit, estq; fecundissima, ac ce-
 lerrimè ad libidinem iam inde ab initio animal incitat. Tales
 itaq; testiculi hispida statim genitalia, eorumq; uicinam effi-
 ciunt, sursum, usque ad umbilici regionē: infra, usq; ad media fe-
 mora. ac eiusmodi temperamentū abundè uenerē commouet,
 sed celerrimè satiatur, & si cōpellas, offenditur. Porro si humi-
 ditas calori fuerit coniuncta, hispidos quidem minus tales red-
 dit. copioso autem semine magis abundant, nō tamè magis q̃
 alij appetunt, minus autè frequentiori concubitu læduntur: si
 autè utraq; & humidū & calidum impense creuerint, non sine
 noxa à uenere abstinēt. At humidi frigidiq; temperamen-
 to testiculi, uicinas parteis glabras reddunt, ac tarde concum-
 bere incipiunt. neque ad actionem excitantur, † aquosum,
 tenue, & inualidum semen, ac scēmine efficax proijciunt.

Siccum frigidumq; temperamentum, alia quidem similia prædicto, crassius autem semen & planè exiguum progignit.

† Scriptura uetus huius loci est, ὁ δα τῶδες δὲ καὶ λεπτὸν αὐτοῖς τὸ σπέρμα καὶ ἄγονον ἐστὶ καὶ θυλόγονον, Semen ipsorum est aquosum, tenueq; ac infæcundum. quem locum ita legendum esse faciliè ex arte parua Gal. atq; adeò ex re ipsa intelligi potest. Sed id erratum Orosius prius emendauit.

Quæ prætermissa sunt.

Cap. LXIX.

Singulæ corporis nostri partes peculiarem quãdam & temperaturam & uim fortitæ sunt: omnium uerò notas hoc loco exponere necessarium nō esse duco, quum infinitæ promodum sint. & nos compendium scribere proposuerimus. Porro de iis egimus, quæ potissimum totum corpus consortii quadam lege afficiunt, de reliquis eadem ratione & uia considerare præcipimus, temperamenta ipsorum tū ab excrementis, tum ex reliquis functionibus, tum iis quæ superueniunt dignoscetes. Tempestiuum igitur est, ut oratione conuersa, doceamus quomodo totius corporis intemperies corrigi debeat.

Quomodo calida intemperies corrigatur. Cap. LXX.

Quam itaq; incalida intemperie bilis superet, si per inferiora descēdit, notū est omnibus, nullū oportere negotium facessere: si ad superiorē uentriculum tendit, uomitu euacuare, qui post exercitationem ante cibum factam aquæ potu cietur. Vtilius autē exercitiū ipsi est, quod non uelox ac ualidum est, sed remissius tenusq;. Nonnulli uehementer calidi nequaquam exercitationem requirūt, uerū obambulatio balneumq; ipsis sufficit, iisdem lauacris quoq; secundū cibum oblectantur. Quibus adiuncta est siccitas, hi ratione uictus humectante indigent, ex cibis humectis, balneis, & exercitiōrū ualentium & multorum abstinentia. Quare per æstatem citius lauantur, & à cibo rursus debent frigida hos potius iuuare. Venus autem siccis temperamentis maximè est inimica: cauēda ipsis lassitudo, insolatus, sollicitudo, & uigiliæ. Humidæ & calidæ natura intemperies in pueritia morbis patent rheumaticis, pletoricisq;, & præterea ijs qui putredini feruntur accepti. Itaque pluribus egent exercitiis, exacta in uentre concoctione

coctione excretioneq; per urinas. Quapropter si etiā ante cibum bis tēue lauent, ut anturq; aquis natura calidis, magnum sentiunt præsidium. Porro defluxionibus prospiciendum est, lauacris, multa exercitatione etiam ante cibum, urinę, aluiq; excretionibus. Nihil autem prohibet, etiam apophlegmatismis nonnunquam uti, & purgationibus, cibis boni succi, & uino quod urinam moueat,

Quomodo frigida intemperies emendatur. Cap. LXXI.

Inter frigidas intēperies, tres numerantur differentię, ex quibus sicca est deterrima quod enim processu tēporis senescentibus obuenit, id statim ab initio hos affligit. Itaq; humectare eos & calefacere oportet, quod cōmodē fiet exercitijs mediocribus, cibo humido & calido, uini calidioris potu, somno pleniore, cura tamē adhibita, ut quę in corpore recrementa quotidie procreantur, oīa euacuentur. Cæterū uenus oēs sicciore, & præsertim qui præterea frigidi sunt, offendit: solis autē calidis humidisq; tuta. Porro uitiōsa quoq; frigida tēpera mēta sunt quę humiditatē habēt cōiunctā, & hæc potissimū rheumaticis corripuntur morbis, prodest ipsis balneo abstineret, largius exerceri, uictus tenuior, unctiōnes mediocriter calidę. Qui autē frigidiores natura sunt mediocriter uerō siccī humidiq; tēperamento, horū calor suscitari firmariq; debet, ac in humiditatis siccitatisq; totius uict⁹ specie, media deligi debet.

Quomodo sicca intemperies in uentriculo, ueluti exemplo, deinde & alię corrigantur.

Cap. LXXII.

Intemperies sicca, alia est, ubi solida similariū partiū substātia reddita est sicciore, quę nihil in medicina spei habet, alia cū substātia, quę ex humore cōcreto cōstat, est colliquata: tertia præter has cū propria humiditas undē partes nutriūtur omnino est absumpta: quę cōtinetur in oībus animalis partibus, roris modo eis inspersa, hanc igitur particulis sine nutrimento inserere, nulla ratione queas, ideoq; difficillima est omnīū eiusmodi affectuū curatio. At quę in exilibus arterijs uenisq; cōsistit siccitas, curationē recipit, si singulas similarium partiū, propria humiditate, humectantis alimentī auxilio re-

pleas. Balneum igitur temperatum conuenit, in quo diutius uersari hominem expedit: inde statim lac exhibere asinum, quod recens mulctum fuerit, & paucillum mellis tepidi adiectum habeat: postea conuiescere ad secundam usque lauationem permittes, tum modicè fricabis simul & pinguiter, utique si lac quod sumplit, iam omnino confecit, id quod tum ex ructu tum uentris mole licet coniungere. modicum uerò temporis inter primam & secundam lauationem, interuallum erit, ut quatuor, aut quinque; æquinoctialium horarum spatium intersit, scilicet si tertio adhuc lauare paras: sin aliter, plurium. Quinetiam post unamquamque lauationem, hominem, priusquam se uestiat, oleo perungenius: ac si quidem lactè oblectatur, post secundam quoque lauationem id exhibebis: sin aliter, ptisanam diligenter incoctam, aut chondrum ptisanæ modo præparatum. hinc ubi rursus conquierit, ad tertiam reducendus est lauationem, aut ilico ad cœnam. Sit autem panis præparatus illi purus, & qui curiosè in furno sit coctus obsonium quoque ex saxatilibus piscibus, aut ex albo iure asellus, & ut paucis alimenti summam complectar, concoctu sit facilè, nutriens, minimeque glutinosum & excrementitium. potus, uinum aquosum & album, purum, & quod minimam, si diluitur, aquæ mixturem sustinet, oligophoron Græci nominant, modicæ astrictionis particeps: atque hæc maximæ siccitatis curatio est. Modica uerò non tam exacto uictu indiget, & plenioribus cibum admittit. Proponatur autem & nunc siccitas priori similis, copuleturque ei frigiditas mediocris: in qua ad calefacientium materiam transeundum est: ac commemoratis modo adijciemus: in lactis quidem usu, mel copiosius: uinum autem minus aquosum priore dabimus. Quinetiam esculenta omnia calidiora, idque non naturalibus modo ipsorum temperamentis, uerum recentibus etiam qualitatibus, exhiberi debent. Nardino præterea unguento ungendus assidue uenter est, aut mastichino. At uerò si cum siccitatis intemperie multa sit frigiditas, primum ipsam difficillimam & uix emendabilem celsator: eisdem uerò utere, & melle per se discocto despumatoque, uinum autem eliges antiquius. Optimum sanè medicamentum talibus est, quo picatores assidue utuntur. & illinere eo uentrem conueniet, ac post auellere etiamnum calidum. Cæterum iuuat eos probè carnosus puellus una sic accubans, ut semper abdomen

men contingat. Iam uerò multæ siccitati moderata caliditas iuncta esto. In eiusmodi sanè intemperie primum curationis modum seruabimus, ita ut mel prorsus nō degustetur, uinum uerò exhibeatur quod minimè sit uetustum. Porro cibos tepidos, lactis modo offeremus, & uentriculū oleo tum crudo tum melino perungemus. Verūm hos uehementer admodū refrigerare periculosum est, quandoquidē hæc affectio, febris quodammodo naturam, ubi calor superarit, imitatur. Fingamus itaq; rursus calidam intemperiem præpollere, huic autem adiunctam esse humiditatem talem, frigidæ aquæ potu curabimus, huc optimè facit usus ciborum altringentium, sed qui citra calorem sint austeri. Quum humida sola intemperies est, siccantes cibi, ita ut non calefaciant, aut refrigerent ualidè, auxiliantur adhæc consuetæ porionis penuria. Si cum frigiditate humida urget intemperies, optima remedia sunt, oīa acia. misceri autem his debent etiam quæ sine manifesto frigore astringunt. optima simul his est exigua portio, eaq; uini ualidè calfacientis. Hoc igitur modo intemperies qualitatū curatur. Quoniam uerò sæpe in ipso uentriculi sinu contentus humor, interim autem in ipsas uentriculi tunicas absorptus, intemperiem procreat, non alienum est de his differere. Prior itaque affectio si semel radices egerit, purgatione per uomitum facile conquiescit, si autem rursus ex alia quapiam alijsue particulis confluerit, exactam requirit dignotionem, curatio uerò statim subsequetur. Etenim uniuersam eam parti affectæ oportet accommodare, cura adhibita, ijs quæ recipiunt, ne facilè quæ confluunt, admittant. Fiet autem hoc astringentibus & ijs quæ totum corpus ad bonam habitudinem perducunt: At uitiosos in uentriculi tunica humores mediocriter purgantibus educemus, cuiusmodi est aloë & ex ea confectum medicamentum amatum quod hiera picra dicitur. Verūm quibus lenta simul pituita uentriculo impacta est, ijs prius exhibenda sunt quæcunque hanc dissecant. deinde purgatio tentanda. Quoddad uomitum sunt idonei, ex sumpta radicularia uomant. Sin nec lentus humor sit nec crassius, utiq; abundè est à ptisanæ ciemote uomuisse, item à mulsâ. proficit & absynthii succū in mulsâ bibere, reliquarum uerò partium intemperies haud absimiliter curare oportet, ita ut humoribus idoneos effluxus inuenias. Nam si particula sensibilem, efflu-

xum non habeat, redundantem in ea uel saniem uel humores, quemadmodum si id quod continetur, spiritus sit flatulentus, euaporatu discutere ac uacuare conuenit.

De alimentorum facultatibus. Cap. LXXIII.

QUum de alimentorū facultatibus sermo, pars sit operis quod de sanitate tuenda præcipit, proximum est ut iam dictis eum subnectamus, ubi prius quàm particulatim ipsa persequamur, paucula quædā prælibauerimus. Quippe alimentorū uireis, si quid aliud, perceptas habere conuenit. Quæ igitur attenuandi uirtutem obtinent, meatus aperiant, uiscosa adhærescentia abstergunt, crassā incidunt extenuantq; . Quod si diutius ea in cibo adhibeas, serosa biliosaq; contrahes recrementa, ac si uberius ingeras, sanguis atra bile uitiosus redditur. Quare cōtinuus ipforū usus præsertim biliosis temperamento uitari debet, conueniunt enim solis ijs, qui piritam, humoremq; crudū, lentum, & crassum collegerunt. Porro quæ in crassādi uiribus cōstant, ualent is admodū materiæ sunt, & si in uentriculo ac iocinore decenter fuerint concocta, boni succi sanguinem producant, sed lienem & iecur obstruunt. Ex his alia sunt crassi duntaxat succi, ut lenticula: alia uiscosa, sicuti malux quibusdam utraq; contingunt, nēpe ut & crassi sint succi, & glutinosa, ut testaceo tegmine prædita. Itaq; uictus extenuans ad sanitatē tuendam tutior quam qui in crassat, existit. Quū uerò imbecillis sit materia nō robur nec uireis corporibus suppeditat, ac oportet nonnūquam ualentis materiæ cibum, quū inedia quædā pressit, mediocriter exhibere. præsertim uerò citra periculū assumunt, qui se exercent, & quantūlibet dormiunt, omnes autē quibus ante cibū exercitari nō licet, crassi succi alimēta euitabunt. Imò neq; in otio degentes eiusmodi cibos assument. Porro quemadmodū summum utiū maximè ualeitudini tuendæ obest, ita mediocris motus summū adfert præsidū. Cæterū cibi inter eos qui in crassant & attenuāt, mediū omnīū sunt laudatissimi, ut qui mediocrē substantia sanguinē procreant. Talis itaq; quibus corporibus nostris cōgruit: qui autē uitiosos humores gignit, noxius est, eoq; semper caueri debet. Iam & uaria ciborū genera assumere, cautio est, præsertim si ex diuersis consistant facultatibus.

ingesta

esta enim concoctionem non, ut par est, sortiuntur.

De oleribus. Cap. LXXIII.

Actuca manifesto & refrigerat & humectat, eoq; somnū accerit. ut autem inter olera ualenter nutrit, ita boni succi sanguinis efficax est. Intibum frigidi humidiq; tementi, sed minus quàm lactuca existit. Malua refrigerat dē, sed non euidenter, magis autē humectat: unde etiam um subducit, idq; propter genuinam eius uiscositatē. Beta absterforia uentrē subducit, eoq; stomachū largius comestit, iecoris lienisq; meatus aperit. Brassica bis cocta si eda-
luū cohibet: semel autem nō tamen uehementer cocta, oleo & garo, uel sale comesta, magis subducit, quemadmodum succus ipsius etiā lenticulæ efficacius purgat. Hac magis huc marina brassica aluū emollit: manifesto salsa, & subama: idē præstat halimon, amphoris autē salsæ qualitatis particips, aluum subducit, magis quàm brassica stomacho conducit, ceu astringentis modicæ compos: lac & semen producit. Citum & atriplex humida quidem & uentrem soluunt, sed parum alimenti præstant. Omnia spinosa ut scolymos, attractiuique generis alia stomacho præter cinaram conducunt, quæ cum dura euaserit, improbū succū procreat, quapropter primum est, incoctam cum oleo, garo, & coriandro assumere: hippofelinum, sion, & smyrnium, omnia urinæ ciendū sunt, sed smyrnium aromaticum spirat, magis acre, urinæ du-
endæ proficit, & mulieribus mensis comouet: apia suauiora sunt, ideoq; stomacho magis amica. Eruca calida est, & seminis efficax, ob quod libidinem & capitis dolorem, quā cephalæam icunt, excitat. Nasturcium, ocimum, & sinapi, calida quidem & acria, sed maximè nasturciū: concocta uerò difficilia, stomacho inimica, & uitiosi succi. Vrtica extenuat, uentrem subducit, modicè alit. Gingidion simile est scandici, astringentis & non parum amaræ qualitatis particips. præterea stomacho congruit, ut etiam cibum fastidientibus cū aceto assumptum, proficiat: parum uerò alimenti corpori ministrat. Porro syluestria dicta olera maximè uitiosos gignunt humores. Capparis cibi cupiditatem proritat, iecocis lienisq; meatus aperit, pituitam subducit. Utendum uerò ea est ante cibum alium, ex oxymelite aut oxelæo.

De

De asparagis. Cap. LXXV.

BLiti, lactucae, atriplicis, maluae & betae, planta quidē humida est, asparagus autem siccus. Contra, raporum, sinapis, radiculæ, nastorcii, pyrethri, brassicæ omniumque aliorum quæ calida sunt planta quidem sicca, asparagus autē humidus est. At à spinosis stirpibus palustris & hortensis, asparagi, item qui à bryonia decerpuntur, stomacho quidem utiles sunt, & urinam citant, sed inualidē alunt. At si probè coquantur, magis quàm ij qui ex oleribus sumuntur nutriunt. Consimili modo & chamædaphnes asparagus agit.

De ijs quæ radices esculentas habent.

Cap. LXXVI.

Napus & rapa si bis coquātur, nihilo minus quàm reliquæ stirpes alūt, cōtinuē aut assumpta, crassum succum procreant. Bulbi astringunt, abstergūt, cibi cupiditatē mouēt, stomachū cōfirmant, & uiscosos peccore humores eliciunt: bis incocti ualētius quidē nutriunt, sed nihil emolliunt, amara ipsorū qualitate sic abolita, præterea semē genitale augent, libidinemque excitāt, si largius utare. itē inflationes & tormina, pariūt. Quod si ex aceto cū garo & oleo edātur, suauissimī sunt, flatūs nō generāt, ualēter alunt, cōcoctu faciles Pastinacæ uerò, dauci & cari radices quidē minus quàm rapa nutriunt, calidæ autē aromaticæque manifestè sunt, & urinā cient: Si uerò inmoderatus utatur aliquis uitiosos humores gignunt & ægrè cōcoquuntur cōi radicū ratione. Nonnulli syluestre pastinacā daucū nomināt, efficaciorē ad urinā ciendā uirtute præditū. Radicula quæ græcis raphanis dī extenuādī calefaciēdiq; uireis obtinet. sumitur rectè ante cibū ex aceto & garo, alui ducendæ gratia: secundū cibum, nequaquam Cepa, alliū, porrum, & ampeloprasum acri uirtute donata, corpus calefaciūt, extenuāt, & crassos in eo humores incidunt, bis cocta, parum alunt: cruda, oīno nihil. At qui alliū magis meatūs reserat, humoresque discutit. Sunt aut porris sicciora ampeloprasa, utpote syluestria. In totum oīa cruda olera, si edātur, peiores quàm cocta succos procreant, ac plus humoris excrementitij continent. Verū quæ cōdita, uel muria uel oxalme reponuntur, stomacho profunt & appetētiā excitāt, crudos humores incidunt, sed ægrè cōcoquuntur: & si abutare, uitiosos succos gignunt.

De

De tuberibus & fungis. Cap. LXXVII.

Tuber humorem de se reddit qualitatis expertē, sed frigidiorem & crassi succi. Fungi uerò frigidi pituitosi & mali succi sunt: in his ipsis minus nocētes boleti sunt, qualitatis expertes, si probē coquantur. Qui uero ammanitæ dicuntur, secundū ab his ordinē obtinēt: aliis fungis abstinendum, pleriq; siquidē ipsorum lethales: Ac ipsi boleti nisi exactius decocti edātur, periculi occasionem frequenter præbent.

De frumentaceis. Cap. LXXVIII.

Ex iis quæ frumentacea nominantur, chondrus egregie nutrit, & glutinosos parit humores, uerū elotus, prauus habetur, quoniā promptē crassescēs, cōcoctionis expers permanet. probatur magis cremor chondri, si totus robe prisanz modo fuerit decoctus. Alica in cæteris chōdro quidem respōdet: sed aluū magis astringit. Triticū, elixum facit, cōcoctū difficile est, & inflationes creat: ubi uerò concoctionem expertum est, alimentum præbet ualentissimū. In panem autem coactum minus inflat, minusq; ægrē concoquitur, pote fermēti & salis particeps. Inter panes firmissimus est ligineus, deinde ex simila, tertius à quo cribro nihil excussum est, Græci syncomiston quasi dicas cōfusaneū appellāt. Sordidus panis minus quidem nutrit, sed magis per aluū deiicitur. Mylum parū alimenti præstat, quemadmodū & panis elotus, Ordeū frigidæ facultatis est & absterforiæ prisanz modo incotum, humectat; torrefactū, quemadmodū in polentis fit, decoctat. Polenta per æstatem ante balneum cum aqua pota, sitit edetur. Panis ordeaceus fragilior est, & parum nutrit. Maza facilius concoquitur statusq; magis quàm panis ordeaceus ignit: melle autē adiecto aluū citat. Avena & calida est, & in cællis materiz. Milium & panicum refrigerant, siccant, paululum nutriunt, & aluū cohibēt. Omnino aut milium panicum præstantius. Oryza uix concoquitur, parū nutrit, & uentrē tinet. Porro prisana in hunc modū coquitur: uni eius partibus quindecim & olei momentum adiciuntur, ubi ebullierit acetum quoq; adde. quum iam exactē cocta fuerit, sal tepidius superiniicitur, in quibuslā porrum & anethum ei miscēt. ceterum auena chondrusq; in prisanz modum decoquuntur.

De

De leguminibus. Cap. LXXIX.

EX leguminibus lenticula uitiosum succum, & melâcha-
licum perducit, imò etiam, præsertim bis cocta, aluû co-
hibet. decoctû uerò ipsius cum oleo & garo potum aluû
proritat. at quia inflationes mouet, satureia, uel pulegiû admi-
scendum est. Fabæ leues sunt, inflant & abstergunt. Aegyptia
autē faba humidior nostra est, & excrementicia. Pisum laxum
quidē, non tamen adeò flatuosum est. Cicer inflat, abstergit, ge-
nitale semen auget, libidinē incitat, & calculos confringit: fri-
ctum, minus quidem inflat, sed ægrè concoquitur. Lupinû con-
coctioni rebelle, haud faciliè per aluû trāsmittitur, crudi humo-
ris efficax. Fœnugræcum si ante cibû sumatur, calefacit, & aluû
mouet. Ochron & phaselû macerata donec etiam radices suc-
creuerint, ex garo ante cibû sumpta, aluum subducunt, ac plus
quàm fœnugræcû alimēti exhibēt. At phaselû & dolichon in-
tegra cû siliquis uiridia comesta, excremēticia magis reddūtur.

De temporarijs fructibus. Cap. LXXX.

Cucurbita refrigerat humectatq;, & uentrem subducit,
sed parum alit. Pepon totus uitiosi succi est, frigidus, hu-
midus, & uomitioni dicatus: non coctus, bilem gene-
rat. semen eius urinam citat & calculos in renibus confringit,
ac in totum, abstergit uehementer. Melo pepon omnia quæ de
pepone dicta sunt, inualidius efficit. Cucumer minus pepone
frigidus, humidusq; est, sed acrius cit urinam, difficilis cōcoctu
& uitiosi succi, etiam si concoctus fuerit. Summatim omnia po-
ma refrigerant humectantq;, imbecilliter alunt, & uitiosum
humorem progignunt.

De arborum fructibus. Cap. LXXXI.

Ficus & uuæ inter omnia poma principatum obtinent,
ut quæ minus uitiosos humores generent, & magis nu-
trians. Inter hæc ipsa ficus probioris succi sunt, ualen-
tiorisq; materiæ aluo, & urinae ducendæ, renibus purgandis, ido-
neæ, præsertim admodû maturæ. Idem præstant caricæ, quan-
quam inflationes & sanguinem non probam pariant: eoquæ
frequentius usurpatæ, pediculus procreant. Vuæ, si non de-
scendant, non quidem concoquuntur, uerùm etiam crudum
humorem generant: sin autem deiciantur, moderatores
sunt. Vuæ passæ alijs calidiores sunt, stomacho gratiores,
ualent

alentius alunt, sed minus subducunt aluum. Mora quæ aliàs
 vcamina Græcè appellantur, impensè humectant, mediocri-
 ter refrigerant, ac ante alios cibos præsumpta, ventrē soluunt,
 non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti. Ex cera-
 is, dulciora quidem aluum subducunt, uerū stomacho ini-
 mica: quibus inest astrictio minus quidem stomachum lædūt,
 sed non ventrem citant. Atque hæc ratio tum in uitis & mo-
 ris, tum in aliis compluribus seruatur: In uniuersum, astringen-
 tia si prius ante alium cibum aut eduntur, aut bibuntur,
 aluum comprimunt. quibus autem ob imbecillitatem uenter
 non respondet, ij molliendi uirtute prædita, nempe olera aut
 isces, aut id genus aliud præsumunt: deinde astringentia, quæ
 um ipsum firmant, deorsum propellunt, & ad excretionem in-
 citant. Pini nucleus, qui & strobilus dicitur, boni quidem suc-
 ci est crassique, & ad nutriendum ualens, non tamen ex facili
 concoquitur. Persica prauī succi, acidiq̃ue sunt, & faciliè cor-
 rumpuntur. eoq̃ue primum exuberi debent, quod protinus
 eiiciantur, nullamq̃ue in uentriculo diutius immorata, corru-
 tionem sentiant, præcocia, duracina & armenia, persicis præ-
 rant, neque enim acescunt, neque similiter corrumpuntur, ac-
 tant etiam gustu gratiora. Malorum, dulcia sanè aliis calidio-
 ra sunt, & faciliè in corpus distribuuntur, præcipuè uel assa, uel
 alia: acida, magis refrigerant, & humores uentriculo im-
 pactos incidunt: austera stomachum firmant, & ventrem re-
 comprimunt, atque his magis cotonea. Idem præstant pira gran-
 dia maturaq̃ue, præterea etiam ualentius nutriunt. Mala pu-
 blica frigefaciunt, & parum alimenti præbent. Mespila sorba-
 que uehementius astringunt, eoq̃ue aluo fusæ accommodan-
 tur. Palmulæ, nisi admodum sint pingues, stomacho profunt,
 ventrem retinent, crassos, glutinososq̃ humores gignunt, capi-
 ti faciunt dolores. Ex oliuis, druppæ stomacho aduersantur,
 crassi humoris efficaces: muria conditæ, & colymbades, si an-
 te cibum sumantur, appetentiam faciunt, & aluum subducunt,
 ac magis quæ ex aceto & oxymelite præparantur. Inter nuc-
 ces, iuglans, auellana minus nutrit, stomacho gratior. Nux
 uiridis humidior est, & ventrem citat: arida, si ubi in aqua
 commaduerit membrana ipsius interior adimatur, consimi-
 lem uiridi potestatem obtinent. Amygdala incidendi extenuan-
 diq̃ue uiribus pollent, ideoq̃ uiscera & thoracem expurgant,
 idq̃ue

idque efficacius amara. Similiter & pistacia, uerum iecur efficacius obstructione liberant. Damascena ante cibum sumpta & cruda, & in mulsa elixa uentre soluunt. Syrica ægre coquitur, stomacho noxia, modicique alimenti. Siliquæ ægre conficiuntur, aluum cohibent, & humores creant uitiosos. Sycomora manifestò & frigefaciunt & humectant. Citrei mali pars exterior acris & concoctioni rebellis est: caro ualenter alit, & ipsa ad concoquendum contumax: interior pars siue acida, siue aquosa fuerit, abundè refrigerat. Glandes non minus quàm frumentacea alunt, sed concoctu difficiles, crassi succi, & tardè permeant. Castaneæ omni ex parte his præcellunt.

De animalibus, & primo de uolatilibus.

Cap.

LXXXII.

ANimalia quæ uolatu nituntur, minus quidem quàm quæ pedibus fidunt, & præcipuè quàm sues, alunt, sed promptius concoquuntur, magisque; perdix, attagena, pullus columbinus, gallina & phasianus. At turdi, merulæ, & exigui passerès, inter quos sunt etiam à turribus ubi nidificant pyrgitæ appellati, durius alimentum præstant, atque his magis adhuc, turtur, palumbus, & anas: sed multo durius, concoctu difficilior, magisque fibrosum pauo exhibet. Anserum uerò & struthiocameli caro excrementicia, ægrius quàm omnia commemorata concoquitur, si alæ excipiantur, quæ non minus quàm aliarum auium probi succi existunt. Porro gruorum caro fibrosum durumque; præbet alimentum. In totum iuniora ueteribus humidiora sunt, promptius concoctioni parent, ualentiorum cibum præstant, atque per aluum faciliè descendunt. Similiter elixa ab assis, & in sartagine frixis differunt. Iam quæ in siccis locis & montosis proueniunt, citius concoquuntur, minusque excrementicia sunt, quàm quæ in paludibus nutriuntur.

De ouis.

Cap. LXXXIII.

OVa gallinarum, phasianorumque; omnibus præstant. Anserum & struthiocamelorum praua habentur. Ex omnibus autè recentia ueteribus multo sunt præstantiora, ac tremula plus alimenti habent: sorbilia magis descendunt, ac faucium asperitates læuigant. Reliqua omnia ad concoquendum, rebellia, tardè transeunt, & succum gignunt crassiorem, præter ea quæ pincta dicuntur, hæc autè huius si cruda immergantur

in

aquam calidam cum garo, uino, & oleo, & in uase mediocriter coagulentur. Huiusmodi enim coqui facilia & boni succi fiunt. Omnia uero quæ saragine friguntur deteriora sunt.

De pedibus animalibus. Cap. LXXXIII.

Inter animalium quæ pedibus fidunt, carnes, suilla maius quam alij cibi alimentum præbet, eò quòd gustu & odore familiaritatem cum humanis corporibus sortita est, ut non illi qui imprudenter humanas carnes gustarunt, cognouerint. Alimentum uero quod ex illis contrahitur, uiscosum est, non facile in memoria potest distrahi. Ouilla excrementitia prauique succi est. Caprilla acris est malumque succum efficit. Deterrima hircina, siue succi bonitatem, siue concoctionem respicias. Bubula melancholicum humorem facit. Leporina assa succi est, sed minus quam ouilla & bubula. Ceruina durior est, & concoctioni rebellis. In totum, iuniora uetustis humiora, mollioraque, & ad concoctionem facilia sunt. Hoc modo iam castrata non castratis, bene habita macris præstant.

De partibus animalium & sanguine. Cap. LXXXV.

Summa corporis particulae nervosae sunt, citra pinguedinem, & excarnes, coque glutinosae, exigui alimenti, ac ad aluum mouendam efficaces, si excipias quæ uolatu nituntur, ob nimiam siccitatem. Rostra & aures cartilaginosa, & ad concoctionem sunt pertinaces. Lingua, est fungosa laxa uel exanilis: parum alimenti habet. Glandulae suauis sunt, & friabiles, sed mammae, praecipue scropharum, quum lacte scatent, dulciores habentur, haec autem non minus quam carnes alunt. Renes & testiculi gustu insuauis & concoqui difficiles. At saginatorum gallinaceorum testiculi & suauis sunt, & probum corpori alimentum præstant: quemadmodum taurorum, hircorum, & arietum concoctioni resistunt, & uitiosos creant humores. Cerebrum uiscosum, crassum, uitiosumque succi, lente transit, concoctioni aduersatur, stomachum lædit, & nauseam excitat: si autem probe coquatur, plurimum exhibet alimenti. Medulla pinguis, & cerebro suauior est, in cæteris ei respondet. Pinguedo & adipsa uici alimenti sunt, & stomacho nocent. Cor & iecur crassum succi, ægre concoquuntur, & lente transeunt. At suillum iecur

alij

215

le

sfle

aliis præstat. Lien tum uitiōsi succi est, tum melancholicum humorem efficit. Pulmo facilius quidē, utpote fungosus, concoquitur, sed leuiorē cibum præbet, pituitæ generandæ efficax: Ventriculus, uulua, intestinaq; dura, concoctioni aduersantur, pituitæ efficacia. Summatim fera animalia sicciora, q̃ domestica alimentū exhibent, minusq; excrementiciū. Sanguis quilibet, uix concoquitur, præsertim crassus, & melancholicus, qualis nimirū est bubulus. Leporinus utpote suauissimus cōmendatur. Ac multi ipsum cum iecore solent incoquere, quidam uero, & cum aliis uisceribus. nonnulli & iuuenis porci sanguinē edūt. Caprillū uerò nonnullos comedisse, etiam Homerus testatur.

De lacte.

Cap. LXXXVI.

L Ac coctum probè nutrit, gingiuis autem & dentibus nocet, quapropter ubi assumptum est, primum mulsa, deinde uino astringenti os colluere oportet. Item caput tentat, præcordia, uentremq; inflat, calculos in renibus gignit. Ac humidius, minus quidem alimenti præbet, sed magis aluum proritat: crassius autem ē contrario, magis alit minus descendit. At caprillum lac, mediocre consistentia est, sicut ouillum, crassius: & quod statim à partu redditur tenuius est, procedente tempore crassius, deteriusq; efficitur.

De lactis potione.

Cap. LXXXVII.

Q Vi lac potare uoluerit, ab aliis abstinere cibis debet, donec concoctū fuerit, & inferius descenderit. Satius itaq; est manē recens mulctū bibere, ac post id nihil assumere, nec non labores nimios deuitare, ut quod laborantibus necessario acefcat, sed lentè obambulare satius est, & interea uigiles conuiescere: hoc. n. pacto quamprimum per aluum descendit. Vbi deiectum fuerit, aliud bibendū est: ac si hoc quoque descendat, aliud. Initio itaq; purgat utiliter, non quidem copiosum ex reliqua corporis mole, sed quæ in uentre cōtinetur: mox, uenas ingreditur, ac optimè nutrit, atq; non amplius deiicitur. Porro in biliosis fluxionibus, & quum syntexes, hoc est colliquamenta corporis ad uentrē concurrunt, coctum lac exhiberi debet. Coquetur autē primum lentè paulatimq; ut pars descendat, pars consumatur, deinde magis, ac magis incoquetur, cura adhibita, ne aduratur, aut in caseum coalescat. quod optimè fiet, si leniter ipsum coquamus, & agitando id
quod

od recesserit undiq; abradamus. Agitabitur autem ferula le
& tenui: & si quid oris ollæ inferueſcat, hoc quoque ſpongia
umere oportet, id. n. ſubinde etiā reliquū lac corrumpit. Eo
itur modo quo dixi, lac coquēdum eſt, uſq; dum æquabiliter
aſſius dulciusq; crudo eualeſcit. Quod in eo tenue eſt & ſero
na; calculis marinis ignitis in id demiſſis, ebibi cōſumiturq;
tq; hoc alui fluxionibus, præſertim bilioſis eſt accōmodatum.

De lacte ſciſſili.

Cap. LXXXVIII.

Seroſa lactis portio à caſeo diſcernitur, ſi uehementius ad
ignem largiorem citra ſumum excoquatur, deinde colo,
aut panniculo exactē trāiciatur. Porro miſcetur ſero mel
s momentum, aut oxymēlitis, aliorūve, daturq; ſubducen-
uentris gratia, ætate quidem florentibus ad duos ſextarios:
nioribus, non minus ſextarios. Quod uerò marinis calculis
nitis aut ferro candenti demiſſo lac incrāſſatum eſt, in teſti-
orum torminibus & alui profluuijs recte exhibetur.

De caſeo.

Cap. LXXXIX.

Omnis caſus acris eſt, ſitim facit, ægre concoquitur, uitio-
ſos ſuccos, calculosq; generat. Laudatior eſt recens,
laxus, mollis, ſuauiſ, & modici ſalis particeps: qui ſecus
abet, peſſimus eſt.

De piſcibus.

Cap. XC.

Omnes piſces frigidiſ, humidioriſque temperamenti
eſſe, nulli non conſtat. Omnium uerò optimi ſunt. ſa-
xatiles, ad concoquendum prompti, bonique ſucci, mo-
ice humectant, ubi non duram carnem occupauerint. Verū
x non ſaxatilibus, pelagij, multum ab ij uariant, qui in limo
autriuntur, uel in fluui oſtio, ſed omnium deterrimi qui uel in
tagnis uel mari ſtagnante uiuunt. Particulatim uerò capito, ſi
pelagiſ fuerit, mediocriter ſuauiſ eſt, minus concoctioni re-
pellis, & boni ſucci, ſanguinem uerò gignit tenuiorem imbecil-
loremq;. ſimilia & lupus præſtat. Mullus qui & ipſe pelagiſ
eſt, alijs piſcibus durior eſt, fragiliſ, concoctu facilis, ualidæ ad
alendum materiæ, ſuauiſ & pinguedinis expers.

De teſtaceis.

Cap. XCI.

Generatim piſces qui teſta conteguntur, Græci uocant
oſtracoderma, ſalſum crudumque humorem producant.

Ex his ostrea mollissimam carnem obtinent & facilius descendent Chamæ uerò, purpure, ungues, spōdyli, buccina, cochleg, atque huiusmodi alia dura. Ac quæ molli testa integuntur, malacostrata græcis nominantur, nempe gammari, paguri, cancri, locustæ, & squillæ, concoctioni repugnant, sed alimentum præbent & uentrem comprimunt, si in aqua dulci sæpius decoquantur. Omnibus uerò crustatis inest succus, aluo subducendæ utilis, eoque etiam terrestribus cochleis. Ac quum hæc duram carnem, concoctu difficilem, ualentis materiæ & succis uitiōsam sortiantur, nonnulli ius ipsorum cum oleo & garo conditum, ad aluum subducendam adhibent. Echini modice frige faciunt; exigui alimenti, & urinæ ciendæ efficaces.

De mollibus, quæ malatia dicuntur. Cap. XCII.

Molles cute pisces, utpote polypi, & sepia, loligines, dura carne & concoqui difficiles sunt, præcipue polypi, salsum humorem modicum obtinent: concocti autem non parum alimenti corpori exhibent.

De cartilagineis.

Cap. XCIII.

Cartilagineorum, quæ selache Græci dicunt, torpedines, pastinacæ, mollem suauemque carnem occupant, quæ celeriter descendit, facile cōcoquitur, & probe alit. Raiz, leuiraz, squatinæ, atque eius generis reliqua, duriora sunt, concoctioni renituntur, & ualētius nutriūt. In summa, quibus durat caro est, & ægre concoquuntur, & plenius alunt: ubi uerò concocta fuerint, copiosum solidumque alimentum præbent.

De cetaceis.

Cap. XCIII.

Cetacea, utpote balneæ, uituli marini, libellæ, delphini, & prætrādes thynni, durā, cōcoctu difficile & crassi succi carnē habent. Sale cōdita eiusmodi moderatiora efficiuntur, iā qui ex alijs piscibus humidiores habentur & magis excrementicij, ad conditurā magis sunt accommodi. Talis autē in condituris est differentia, qualis & piscium, unde conficiuntur.

De uini uiribus.

Cap. XCV.

Qui sanitatis tuendæ curā susceperit, eū quoque uini facultates cognitās, habere expedit. In uniuersum itaque uinum omne nutrit, uerum rubens & crassum, magis boni

ni autem succi non est efficax. Item dulce & ipsum quidem apense nutrit, sed stomacho nocet. Austerū stomacho quidē rucum est, uerū ægrè in corpus distribuitur, leuiusq; alit: hoc tē minus, album. Præstantissimū est colore fuluum. Porro tustius nouo magis & calefacit & desiccatur. hę igitur uini sunt cultates ueluti summatim expositæ. Cæterum uinum calom genuinum refocillat, unde concoctio melior, & sanguis obus euadit, cibum per omnia corporis membra, ut quod facile penetret, deducit. Quamobrem ex morbo emaciatos reit, corpusq; ipsorum auget. Etenim cibi cupiditatem facit, uitam extenuat, bile per urinam educit, & bonū colorē coniat, animo læticiam, uoluptatemq; parit, & robur adijcit. Ham itaq; commoditatū moderata uini potio, immoderata ue contrariorū occasionem præbet, eoq; temulenti, animo turntur desipiunt, & graui somno quæ cataphora dicitur preuntur qua de causâ immodica uini potio diligenter uitantest, quanquā longiore tēporis spacio interposito liberaliter bibere conducatur. ita namq; urina largius & sudores promontur. Vincit autem mox uomere, assumpta prius mulsâ. quod palulum quidem ab eo noxæ percipiatur Qui igitur potantur indulgebit, alio cibo non admodum repleti debet, sed inr potandum brassicam elixâ esse, & bellaria, præsertim amyglâ assumerē, ut quæ capitis dolores leuent, & uomentibus nil adferant molestiæ. Præstaret autem absinthij dilutum antipotionem bibere, ut quod omnium maximè crapulæ discundæ sit efficax. At si quis rosionem à uino sentiat, frigidam bet: insequenti die, absinthij rursus dilutum, obambulationem, frictionibus, balneo, & exiguo cibo reficietur.

De melle & mulsâ.

Cap. XCVI.

MEL coctum ualentius nutrit, quā subducatur aluum: non coctum, ē contrarium, ac frigidis humidisq; temperaturis conducit: calidis, in bilem uertitur. Mulsâ uenon admodum biliosis utilis est, ut quæ in bilem degeneret. itaq; in eiusmodi naturis dilutior mulsâ recte dabitur: ijs quī scera habent affectibus opportuna, incōmoda est. Cæterum hoc modo præparari mulsâ debet. Octupla aquæ portio mellimiscetur, incoquiturq; donec spumare desinat. spumam rō continenter ab ea tollere, simul atque orta est oportet.

*De somno.**Cap. XCVII.*

Postea quàm omnia quæ ad uictus rationem spectant, sumus executi, superest ut de somno, eo quòd omnium postremus magna ex parte inititur, disseramus. Itaq, somnus uirium animalium (ut ita dicam) requies est, utili humiditate cerebrum madefaciente proueniens. Qui si recte ineatur, multa præstat commoda, cibum elaborat, humores excoquit, dolorem lenit, lassitudinem solatur, intenta laxat, animi uerò ægritudines obliterat, rationem uitiatam corrigit. Porro tempus somni optimum est à cibo. sed diurnus haud omnibus est idoneus. Tempus enim quo obdormiscunt ad absolutam ciborum concoctionem non sufficit. interrupta enim ante horam suam concoctione, à meridie resurgentes, subinde acidos ructus ædunt, & flatibus replentur. Nonnulli uerò fluctuatione uentris infestantur, nisi uel ex consuetudine, uel sufficienti somno usi, eiusmodi mala effugiant. Cæterum optimus somnus est nocturnus, quoniam nox naturali humiditate, silentioque animum in somnum deducens, absolutam molitur concoctionem. Item post somnum nocturnum plurima parte ad excretionem recrementorū instigamur. Terminus autem somni esse debet perfecta ciborum concoctio, quæ tum ructibus, tum uentris contractione deprehenditur, secundum quam uigilia non inutilis, ut quæ recrementorum ex concoctione deiectionem molitur.

*De uigilijs.**Cap. XCVIII.*

Vigilias quæ laborantes iam affligunt, ex dolore, aut febris, aut acutiore quodam casu oboriētes, secundo libro de febribus persequemur. quæ autē sanos infestant, hoc loco nobis exponendæ sunt. Si igitur aliquis ob mœrorē, aut curā, aut quandā animi ægritudinem uigilauerit, primū id quòd molestat, quatenus licet protinus amputabimus, deinde suauium sonorum auditu mens à sollicitudinibus abducēda est, id quòd nonnulli leni aquæ murmure machinantur. qui. n. sic permulcentur somno facilè capiuntur. Præterea balneis præsertimq; uespertinis quum bene concoxerint utentur, ciboque humectanti utpote lactuca & id genus alijs. nonnunquam nigri papaueris folia uiridia obsonijs admiscebunt. Piscibus ad concoctionē promptis, uino largiore tenui & nō uetusto recreari debent.

t. Dormituri rosaceo caput perungent, aut oleo in quo pæris capita, aut mandragora sint incocta. item anethinum uetus somnū accersit. Noui autem qui post lassitudinem ere subito succedente, somno caperetur. Adhæc uenus mota id ipsum præstat. Alii caput aut pedes refrigerantes, a somno corpiuntur. At si ex cibi copia uitioe stomacho nato uigilauerint (nam hoc etiam accidere nouimus) quæmodum rursus alii præter consuetudinem inedia preissi, aut dico cibo sumpto, uigiliis sunt infestari, cōsiderare id, ac cauere succidere, oportet.

De sopore uehementi quæ cataphora græcis appellatur. Cap. XCIX.

AT si è contrario alti uehementesq; somni, quæ cataphora dicitur, urgeant, ab assiduis lauacris & refrigerate uctione abstinēbimus, medicamentis pituitam per os elutibus utemur, atq; in totum ad calidiorem uictus rationē, cōtinentiorem imbecillioresq; ipsos traducemus, quandoquidem huiusmodi affectio à frigidiore, ut plurimum & humidiora maia cerebrum imbuente, accidit.

Dioclis Epistola ad ualitudinem tuendam conscripta. Cap. C.

DIOCLES ANTIGONO REGI.

Quoniam tibi omnium regū literatissimo esse contigit, & multum iam ætate prouecto, oīs philosophiæ disciplinarumq; mathematicarū peritia excellere, iustitiam eā philosophiæ partē quæ ualitudinis tuendæ præcepta tradit, haud alienā à regia maiestate fore: eoq; tibi perripisi, unde morbi hominibus oriatur, & quibus signis præsentibus, quomodoq; ipsis succurrere cōueniat. Quæadmodū nim in cælo nunquam tempestas ingruit, quam non indicia uadā præcedant, quibus nautæ cæteri; probe periti homines certiores reddantur, ita humanā naturā nullus inuadit morbus, quem nō signū aliquod denuntiarit. Tu itaq; si ijs quæ à nobis dicentur, animum attendas, exactā illorū cognitionem adipisceris. Hominis corpus in quatuor parteis diducimus, caput scilicet, thoracē, uentrē & uelicam. Igitur ubi caput morbo cōflictaturū est, hæc plurimi notæ solent præcedere, uertigo

capitis dolor, superciliorum grauitas: aures sonant, tempora saluunt, oculi mane illachrymāt, caligantq̃; nares oppletæ odorē nō sentiunt, dentiū gingiuarū attolluntur. Quū ergo ex his aliquod accidit, caput purgari oportet, nullo quidē medicamēto, sed uel hyssopi uel origani summitatibus tritis, quæ in olla cum musto, aut supæ hemina dimidio deferbuerint, atq; hoc absorbens ieiunus os colluet, & gargarizando humores ex alto deducet, eaq; capitis affectuum curatione, nulla leuior est alia. Optime facit etiam si sinapi, mulla calida dilutū, ieiunus absorbens gargarizet, pituitamq; ex capite eliciat. Cæterum caput operimentis prius calefacere oportet, quo pituita liquefacta, prōptē effluxioni pareat. Siquis hæc signa neglexerit, huiusmodi ægitudines solet experiri, lippitudinem, glaucomata, aurium uomicas ac eruptiones, in ceruice strumas, cerebri cariem quem σφακελὼν græci uocant, grauedinem, anginam nyctilopa, teredines, uuam, capillorum defluxus, capitis ulcera, & dentium dolorem. Quum autem à thorace morbus nascetur, totū corpus incipit sudare, thoraxq; , lingua fit crassior, sputum salsum, aut amarum, aut biliosum existit, dolor costas, aut scapulas sine occasione inuadit, oscitatio frequēs, uigiliæ, suffocatio, sitis ex somno, animus tristior: pectus frigidum, brachia & manus tremiscunt. Succurrendum est prudenter hoc modo, uomitus quàm optime fieri potest, post cœnam sine repletionē, sineq; medicamento citari debet: utiles sunt & uomitiones ante cibum, quas Græci syrmaismos appellāt. Oportet autem eum qui sic uomet, radículas tenuis præsumere, nasturtium, erucam, sinapi, & portulacā, mox aqua tepida superbibita, uomere. At si huiusmodi indicia contemnantur, hi morbi solent obuenire, pleuritis, peripneumonia, melancholia, febres acutæ, phrenitis, lethargus, febris ardens cum singultu: Quod si à uentre morbus orietur, hæc erunt signa, uenter prius cruciatur, turbaturq; , cibus & potio amara uidentur, genua grauantur: lumbi nequeūt: flecti, totumq; corpus etiam sine occasione laborat, crura torpent, febriculæ exiguæ affligunt. His itaq; cognitis, uentrem prius emollire oportet, non medicamentis, sed uictu. Tutius enim est uti ijs quibus nullus error committi potest, utpote betis mullæ incoctis, allijs elixis, maluis, lapatho, mercuriali herba, & ex melle confectiōibus. Omnia siquidem aluo subducendæ sunt. Si quod è signis intendatur,

tur, cnicī succum omnibus decoctis admiscere oportet, ut quæ suauiora & sine periculo sint. Iam & læuis brassica in aqua largiore cocta, eiusq; succus ad heminas quatuor potus cum melle & sale, utilis est: uel ciceris, aut erui decocti aquam eodem modo ieiunus utiliter bibet. Qui nullam eiusmodi signorum rationem habent, ij his morbis tentari solent, alui profluuium, intestinorum tormēbus, eorumq; læuitate, ilio, coxendice, febre tertiana, podagra, apoplexia, hæmorrhoidibus, morbo articulari. A uescica qui nascuntur morbi, hæc dabunt signa: pleni ex cibo modico esse uidentur, inflationes uentris urgent, ructus, pallor totius corporis, somni graues, urina liuida & uix erumpens, naturalia tument. Quum itaq; huiusmodi notæ apparuerint, odoratis urinam cientibus rursus occurrere malo oportet. Itaque fœniculi apiiq; radices, uino albo odorato madefacito, atq; huius diluti cyathos duos, mane ieiuno singulis diebus propinabis cum aqua dauci, smyrnii, helenij, quodcunq; horum habuerit, nam omnia proficiunt: adhæc aqua ciceris macerati cum uino idem efficit. Qui hæc signa negligunt, hos morbos expectent, aquam intercutem, lienem magnum, iecoris dolores, calculos, renum cruciatus urinæ stillicidium & uentris tumorem. In omnibus huiusmodi indiciis infantes sanè leuiori, adultos, acriore curatione tractabimus. Cæterum anni solstitia in quibus hæc solent ingruere silentio prætermittenda non sunt, sed quæ in singulis alimenta conueniant, paucis exequemur, auspiciati ab hyemali.

Solstitium hyemale.

Solstitium itaq; hyemale usq; ad uernum æquinoctium auget in hominibus destillationes humiditatesq; ac, propterea calidioribus uti cibis, parciori potu, sed metaciore, atq; ex origano bibere oportet, necnon ueneri indulgere. Numerantur dies ad æquinoctium, nonaginta.

Æquinoctium uernum.

Hoc tempore pituita in hominibus crescit, & dulcis sanies sanguinis, usq; ad uergiliarum ortum, eoq; tunc maximè succosa acriaq; assumi debent, corpus exerceri, & uenus. Sunt autem ad usq; uergiliarum ortum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum exortus.

HOc tempore bilis amara augetur, amaraq; sanies, usq; ad æstium solstitium, dulcia omnia tunc quæ aluū moueāt, conueniunt, uenus quā parcissimè exercenda, hinc ad solstitium æstium dies quinq; & quadraginta existunt.

Solstitium æstium.

HOc anni tempus atram bilem ad usq; æquinoctium autumnale promouet, quapropter aqua frigida atq; odoratis omnibus utendum est: uenus perniciosa: aut innocentius saltem quæ de ea præscripsimus adhibeto. Porro sunt ad æquinoctiū autumnale, dies tres & nonaginta.

Aequinoctium autumnale.

HAec anni pars pituitæ copiam generat, tenuesq; defluxiones, donec uergiliæ occidant. Conuenit igitur tunc humores ex capite elicere, atq; acerrima, maximeq; succosa assumere, uomitum rarissimè citare, exerceri, atq; concubitū uitare. Numerantur ad uergiliarum occasum dies sex & quadraginta.

Vergiliarum occasus.

HOc tempore pituita ad usq; solstitium hyemale in hominibus redundat, quam ob rem acerbissima quæq;, unum suauissimum, assumere oportet, pinguibusq; uti & exercitari. Sūt autem ad solstitium hyemale dies quinq; & quadraginta.

FINIS LIBRI PRIMI IOANNE.

GVINTERIO ANDERNACO


INTERPRETE.





PAVLI AEGINETAE
I IBER SECVNDVS,
DE FEBRIBVS.

IOANNE GVINTERIO
Andernaco Medico Interprete.



C A P V T I.



BSOLVTIS de uale tudine tuenda
præceptis, ex qui aggrediemur, quo-
modo eos, qui morbis iam cõsistatur,
restituamus, à similaribus utpote sim-
plicioribus morbis exorſi, quales nimi-
rum sunt, quos febriles appellant. Rur-
sus igitur nos Oribasij cõpendio, qđ
ex Galeni sanè potissimũ, & aliorum
præterea complurium cõmentariis est

excerptũ, utentes paucula quoq; ab illis omiſſa adiungemus.

*Quot & quæ principalia in morbis potissimum fe-
brilibus perquirenda.* Cap. II.

PRimũ quidẽ perquirere cõuenit, morbus salutẽmne p-
mittat, an mortẽ mineẽ & si polliceat̃ salutẽ, utrũ acutus
sit, an lógus. Hæc sanè ī aliis quoq; magnis affectibus cõ-
modẽ quærunť. Tertiũ quoq; nũquid una uice crisim expertu-
rus, qđ febrib⁹ potissimũ peculiare est, an particulatim soluet̃.

*Ex Galeni commentarijs, quale morbi princi-
pium dicamus.* Cap. III.

NEq; enim capitis dolores & febris idẽ existunt, quẽ ad-
modum neq; uigilia, & cibi fastidiũ totiusq; corporis
grauitas, aut sensus lassitudinis: uerũ unũquodq; ha-
rum

rum licet à febris sit diuersum, ipsam tamen denuntiat. porro febris inuadens, præsertim acuta, neq; nos porest, neq; imperi-
tum aliquem latere. Sed finge, si placet, etiam latere, miracu-
lum tamen iudicauerim, si hora amplius ægrum subter fugerit.
Quamobrem illud tempus morbi esse principiū dicimus, quo
manifestò febricitare incipientes decumbant.

*Vnde cognoscendum, morbusne sit sanabilis, an
perniciōsus. Cap. IIII.*

Lethales notæ sunt, facies cadauerosa, nares acutæ, ocu-
li cōcaui, reliquæq; ab Hippocrate cōmemorata: si hæc
neq; ex uigilia, neq; euacuatione, neq; inedia accide-
rint. Itē in p̄pinq̄uo mors est, si ægri lumē refugiūt & illachry-
mant, nō ex quadā à foris accidēte causa, neq; tñ oculis pecu-
liari uitio obnoxii. Adhæc si alter ex his minor appareat: quæ-
que in ijs alba esse debēt, rubescāt, aut liueāt, aut nigricēt. Aut
si pituita ipsis inhærescat, perq; somnū alba oculorū appareāt
palpebris extorsum nō cōmissis, nisi ea larga uacuatio expres-
serit, aut ex cōsuetudine ipsis hoc acciderit. Iā illa mortis sunt
indicia, dētibz stridere, aut dēsipere, aut in ueste floccos lege-
re, aut festucas carpere. Attendēdumq; , est ad in cubitū: nā si
eger supinus cubat, & ueluti resolutus, uel si etiā deorsum à lē-
cto ad pedes delabā, extremā imbecillitatē fatetur. Multo ad-
huc peius est, frigidū spiritum ex naribus, & ore elidere: itē pul-
sus languidus creberq; & deficiēs: item si æger ad animi deli-
quium sudore digeratur, perniciem præfagit. Si igitur omnia,
quæ retulimus indicia, aut plura ex his appareant, aut etiā pau-
ciora, sed ualida, nullumq; salutis argumentū affuisset, pericu-
lum moris inuitabile signat. Cōtra spirandi facilitas, pulsus
uegetior, mēs, sibi cōstās, bene erga cibū oblatum affici, adhæc
facies iacentisq; habitus, sani similis, bona indicia sunt, & salu-
taria. In uniuersum quæ a naturali habitu maximē abhorret,
pestifera sunt. quæ uerò ipsi respondent, salutaria. Cæterū præ-
sagia ex urinis, deiectione, & sputo, paulo post exequemur.

† De signis longæ ualitudinis. Cap. V.

Quatuor notis morbi dignoscūtur: ipsorū motu, ægro-
tantis habitu, pulsū, febrīū specie. Motu quidē in eum
modum: si quatuor particularis accessionis tempora,
oculus & breuissimo spatio inuaserint, peracutus erit affectus,
cuius

cuius extremus terminus est. Septimana, magna uerò ex parte quarto die crîsim experitur. At si lôgius quidẽ quã hic affligerit, sed duodecim horarũ spaciũ nõ excedat, acutus prædicîẽ qui intra quartũdecimũ diem potissimũ iudicat, si uerò in plures horas prorogetur, ut initiũ dũtaxat, & incremẽtũ longiore tũ diei, tũ noctis tẽpore absoluat, talis morbus longus existit. at si particulares accessiones morbus nõ habeat, sed inde ab initio ad usq; sinẽ cõtinuet, tanquã una sit accessio, ueluti in continuis, etiã hunc nimirũ acutis adscribes. Aegrotantis habitus hoc pacto deprehẽdũtur. Si quidẽ facies, & totũ corpus reliquũ collabatur, acutũ morbũ prælagire est. Si prorsus nihil emacrescit, lôgus erit. quippe copia materiæ lôgiore spatio cõcoquendæ signat. Ex arteriarũ motu ita diuineris. Magnus pulsus, uehemẽs, citatus, creber, acutũ morbũ indicabit, prius, longum. A febrîũ specie hunc in modũ, quatenus calidæ & urẽtes, acutum signant morbũ, mitiores autẽ & ueluti delitescentes, diuturnũ.

† Hic titulus sic legitur in uetusto Cod. πῶς ἐξαγγινόςκωμεν δὲ καὶ χροῖον ἰδοῦμα, id est, de signis acuti & lôgi morbi. Quĩ quidem titulus huic capiti maximẽ conuenit.

Quomodo præscimus, an morbus iudicium subiturnus soluendus sit. Cap. VI.

Hoc quoq; præscire licet ex ijs quæ modo sunt nobis dicta, nempe ex febrîum specie, & tempore. Forsan autem totum ex febrîum specie. Siquidem calidæ, & perurentes, breui finiuntur, & excretionibus solui solẽt. Mitiores, leuioresq; prorogantur diutius, & in abscessus magna ex parte erumpũt. Hinc liquido constat, non solum quãdo morbus soluetur, sed etiam quo pacto, acuti enim potius per excreta iudicantur: quemadmodum rursus longiores, per abscessus.

De diebus decretorijs. Cap. VII.

Dierum decretoriorum alii de ægris frequenter, cum fide, salubriter, perfectẽ, manifesto, & insigniter iudicant, alii contrario his modo. Tertius decimus medium quendam inter utrunque dierum genus ordinem habere monstratus est. Ac sunt ex ipsis, qui uel exiguum naturæ imperum nactim de morbo possunt decernere: quemadmodum septimus, & quartus decimus: pleriq; uerò, nisi in uehementibus naturæ motibus, morbos neutiquã possunt per crîsim soluere.

Verũ

Verum nec uniuersi boni, simili inter se modo boni sunt: nec oēs mali, pari rōne sunt mali. item nec certo ordine bonitatē malignitatēue obtinent. Qui igitur primi sunt ordinis, nēpe bonorū numero cōprehensi, hunc in modū se habent. Præstantissimi oīum sunt, septimus, & quartusdecimus: mox nonus, undecimus, & uigesimus: deinde decimusseptimus, & quintus. hos sequitur quartus, post hūc tertius, & decimusoctauus. His cōtrarij, ad secundū ordinem referūtur: pessimus, quiq; cū periculo, nec clarē de morbis iudicat, ac ueluti ex aduerso septimo diei opponitur, sextus est. Huic cōsimiles, octauus, & decimus: secundū quos duodecimus, sextusdecimus, & decimus nonus habētur. Medius horum est, & tertiusdecimus, nec ita repudiandus, sicut ordini secundo ascripti: nec tā feliciter morbum potest soluere, quā qui ad primā classē pertinet. Atq; hoc dignitatis ordine Galenus est usus. Numerorū uerō ordine boni sunt, tertius, quartus, quintus, undecimus, quartusdecimus, decimusoctauus, uigesimus: mali autem sextus, octauus, decimus, duodecimus, sextusdecimus, decimus nonus. inter hos medius consistit, tertiusdecimus. Porro ex his decretoriis nōnulli quoq; aliorum sunt indices, quos Hippocrates appellauit speculatorios, eō q̄ iudicia alto die decretorio futura prænunciēt contemplandāq; exhibeant: exempli gratia, quartus, iudicium septimo die futurū præmonstrat: dum uidelicet sudores quosdam, aut madores, aut eiusmodi particulares uacuationes molitur, aut significationes prius nō factas, aut concoctionis notas repræsentat. Iam uerō Galenus etiam sexti, licet nō boni, quartum esse iudicem asserit. Vndecimus quartidecimi index est, septimusdecimus autem, uigesimi. Itaq; ad quartūdecimū usq; diem ualentissima de morbis sunt iudicia proximē succedunt, qui usque ad uigesimum habentur. Qui post hunc ad usque quadragesimum porriguntur, paulatim uehementiā remittunt. Primæ dignitatis sunt, uigesimusseptimus, trigessimusquartus, & quadragesimus. Hos sequuntur, uigesimusquartus, trigessimusprimus, trigessimusseptimus. Qui uerō dies reliqui à uigesimo ad usque quadragesimum intercedunt, omnes iudicii sunt expertes. Sicut qui post quadragesimum habentur, omnes prorsus elanguescunt, concoctione potius & abscessu, quā crisi morbū fnientes. Atque alios quidē à quadragesimo die Hippocrates omnino negligere uidet, sexagesimi uerō,

uerò, octuagesimi, centesimi, & centesimi uigefimi rationem habet. Ab his deinde alios morbos septem mēſibus, alios septem annis, alios, ut uerifimile eſt, duobus & tribus annorum ſeptenarijs iudicari tradit.

Decretoria indicia in morborum principio eſſe praua. Cap. VIII.

Concoctionis ſigna nunquam ſiniſtrè apparent. quippe omnis concoctio, naturæ uincētis opus eſt, eoq; ſemper ſecuritatem pollicetur. Decretoria uerò ſigna aliquando incommodè apparent, propterea quòd criſis ipſa ambigat, nunc bona, nunc mala contingens, uti prius in capite de iudicatorijs diebus eſt comprehenſum. Neque igitur per initia, neq; in augmento ipſa commodè apparent, ſed ubi morbus inclinauerit, quo tempore natura morbo ualentior eſt.

Quemadmodum futurum iudicium prænoſcendum ſit. Cap. IX.

Si acceſſiones urgeant, præueniantq; tempus conſuetū, & multo ſiant uehementiores, ac tertio quoq; die ſignificationem ſui præbeant, tum cōcoctionis ſigna in urinis, aut deiectionibus, aut ſputis cernantur, ſine mora plane morbus iudicabitur. Sin acceſſiones lentè moueantur, eademq; hora inuadant, ac quotidie affligant, longiore tēporis ſpatio interpoſito morbi ſolutione expectabis. Itē ijs qui ob rigores uehementer febricitāt, fieri nō pōt, ut morbus ante ſoluat, q̄ illi fuerint leniti. ſi. n. rigor nihil remittat, haud quaquam morbus ad ſtatum peruenerit, multoq; minus inclinatio ipſius ſperanda eſt.

Quomodo inſtans morborum iudicium agnoſcatur. Cap. X.

An te quamlibet iudicationem ægrotus grauiter excrucietur. Atque ſi inter diu illa continget, noctu affligitur: ſi per noctem futura eſt, inter diu exagitur. Ac ſuperueniunt ſymptomata, utpote capitis dolor, quē prius non ſenſit, præterea collum ſimul dolet, præcordia ſuſum conuelluntur, ſpirandi quædam difficultas repentina oritur, aliaq; graua accidentia, quæ ſuperiori tempore non percipiebantur, apparent. Atque his obuientibus, ſi pulſus non concidant, ſed ſublimius a tollātur, uehementioresq; ſiant, adhæc ſi dies decretorius

decretorius indicetur, isq; potissimum ex illorum ordine, qui probe decernunt, non iudicium modo futurum, uerum salutiferum quoq; expectato. Neq; de terrene in his re debet, si ægrū delirantem, exilientē me conspicias. Etenim & hæ succorum ad superiora tendentium notæ sunt: sicut è diuerso inferiora petentium, aliz, puta imi uentris rosio, circa umbilicum tormina lumborum dolor, uentris murmuratio. Est cum alia quoque in dicia consimilia deprehenduntur. Adhæc si per hæmorrhoidas uacuari laborans consuevit, etiam huius uacuationis circuitus unā incidit, repetitq;. Pari modo in menstruuis, si mulier est quæ laborat, † non absurdum fuerit per talem uacuationem morbi fieri iudiciū. Iam sudores tum ex corporis madore qui præcessit, ut uerissimile est, & præsertim in die contēplatorio erumpentes, tum ex meatuum adapertione prænoscenti sunt. Ac quæ per superna uacuationes futuræ sint, ex his maximè intelligas licet. Nam præter ea quæ iam nobis sunt exposita, etiam ægrotantis facies intuenda est. Item si qua partium ipsius palpitet, aut uenæ in temporibus pulsant, aut gena, aut nasus, aut oculus rubicundior appareat, maior spes uacuationis per superiora futuræ subest. Quod si etiam sine uoluntate illachymen, aut splendores oculis obduci imaginentur, ac naribus ueluti scabendi studio manus admoueant: tunc quidem non amplius morari, sed iam adesse fluore sanguinis uidebis. Vbi enim semel ac iterum scaberint, erumpit. Rosio uero stomachi, & labri inferioris tremor, trisim per uomitiones futuram subinde nuntiarunt. Atque de his abundè est. Accedit ipsis, ægrotantis ætas & natura, quæ spem nostram confirmet. præterea anni tempus, & præsens aeris status. Nam si æger adolescens est, aut alioquin naturæ calidæ, aut sanguinis copiosi compos, multo magis sperandum est. Quod si etiam antea, uel æger, uel sanus, ut supra dictum est, uacuationem sanguinis expertus fuerit, hoc uel solum ad profundendi sanguinis spem exhibendam satis est. Iam uerò si anni tempus æstas est, aut si non æstas, certe calidus aeris status, ac sæpè illo tempore per sanguinis profluuium crism sustinuerunt, corpusque sanguine redundet, quod *πληθυστικὸν* nominant, & consuetarum excretionum sit retentio, hæc quoque spem tibi auxerint. Similis porro, & in reliquis uacuationibus ratio habenda est. At si horum nihil apparuerit, sed æger in aliquo decretoriorum, qui post uigesi-

num

num maximè sunt, dierum grauius morbum ferat, idque cum consistit, ac dolores quidam in articulos aliquos decumbant, aut iuxta aures, alias ve particulas hereant, aut dolores quidem minimè infestent, uerum sudores, particulares continuè ex particula quadam erumpant, per abscissum crifim excipere oportet. Ac in illa potissimum particula abscissus se prominet, quam cunque uel sudores, uel dolores, uel tumores exerceant.

† Hæc ita leguntur οὐδ' ἐν ἀτόπῳ διὰ τῆς τοιαύτης κενώσεως προσδοκῶν γίνεσθαι τὴν κρίσιν. i. non absurdū fuerit per talem uacuationem expectare morbi solutionem: sed hæc leuia sunt.

Quemadmodum optimum iudicium peractum agnoscamus. Cap. XI.

SI uacuatio competens post concoctionem accidat, & febris crifim experunti soluat, ægerque alijs liberetur accidentibus, & coloratior euaserit pro uacuationis ratione, pulsusque uegetiorem acceperit, ac tum insurgendo, tum sese erigendo fortior sit redditus, quodque omnium securissimum est, si ad morbum ferendum facilitas subsecuta sit, ea sanè laudatissima iudicatio habetur. Quod si horum aliquo deficit, tantum ab optima abest, quantum id ualeat, quo deficit.

De pulsibus ex Galeni commentarijs. Cap. XII.

PULSUS motus est, quo cor & arteriæ attolluntur, submitunturque. Pulsus ipsius duplex est. Et enim eleuatione Græci διαστολὴν appellant, qua arteria ueluti explicatur quodammodo, ac patescit, frigidus aer ingreditur, uitale robur euentilans recreansque ex quo etiam animalis spiritus habet originem. Submissione, συστολὴ Græcis uocatur, qua arteriæ extrema ad medium sui confidunt, conuicentque, fuliginosa recrementa expelluntur. Cæterum hæc arteriæ, oblonga sunt uasa, uenarum modo concaua, sed duplici tunica muniuntur, tum prædicti motus gratia, tum quod sanguinē, spiritumque continent. Originem trahunt ex corde, sed per totum corpus membratim distribuuntur. Omnes igitur, & eodem pulsandi modo inter se, & cum corde conueniunt. Quamobrem ex una ipsarum, omnium rationem queas colligere, nō item omnium ex æquo motum percipere. Sed earum quæ ex carnes corporis partes

partes perreptant, promptios. quæ carnofis subfunt, obfcurius. Porro ijs quæ per brachiale excurrunt omiffis, nullam, aut congruentius, aut ufu commodius attigeris. Primum pulfum genus ex motus tēpore fumitur, ut quod eleuatione arteriarū, atq; fubmiffione examinetur. Differentiæ ipfius funt, citatus pulfus, tardus, & mediocris: quoniam omne quod motui eft accommodatum, aut celeriter, aut lentè, aut mediocriter pro temporis ratione mouetur. Citatus eft, qui exiguo tempore multum fpatij motu emetitur. Tardus, qui longo tēpore, paruum interuallum perficit. Mediocris, qui medium quendam motum inter citatum & tardum, peragit. Alterum genus diaftoles quantitate conftat. Quoniam enim quodlibet corpus tria fortitur interualla, longum, latū, profundum, arteria autē corpus etiam eft: ipfam quoq; tribus conftare interuallis, neceffum eft. Verū in naturali animantis habitu, mediocriter ipfam unde quaque eleuari reperiēs. Contrā, cum animal præter naturam habuerit, nonnunquam in aliqua horum diftantia deficit, aliquando excedit. In quo ftatu, meminiffe conuenit, qualis pulfus naturalis fuerit: fi latitudine maior inueniatur, latum uocabis. fi longitudine, longum, fi profunditate, fublimem. Liquet autem contrarios quoque ipfis, & naturali minores, ad eum eſſe modum appellandos, arcum, breuem, & humilem. at inter eos qui omni diftantia æqualiter in ftatum naturæ contrarium uertuntur, quicumque hac ratione immittus eft, paruus: quicumque auctus, magnus nominatur. Tertium genus pulfum, ad uirtutis robur exigitur. Differentiæ ipfius tres funt, uehemens, languidus, & mediocris. Vehemens quidem eft, qui tangentis manum ualide percutit. Languidus, qui inualide, & imbecilliter. Mediocris, horum medio confiftit, quem nonnulli naturalem eſſe putauerunt. Nam ira & exercitijs uehementiorem fieri pulfum aſſerunt, qui à naturæ habitu recedit, quorum dictis Galenus uenit obuiam, non conftantem inquiens, fed promptè mutari eum pulfum, qui ex cauſis non naturalibus uehementior euadit. Pulſus igitur uehementior, qui non expedite mutatur, is nimirum naturalis, & moderatus fuerit. Quartum genus, inſtrumenti conſtitutione conftat. dico autem arteriæ corporis ftatu. differentiæ huius quoque tres funt. Vel enim inſtrumentum durius eft, quē natura exigit, ac pulſus uocatur durus. Vel mollius,

lius, ac nominatur mollis. Vel mediocriter habet, ac moderatus inde nuncupatur. Quintum genus, ex quantitate humoris infusi arteriæ pendet. Hæc habet discrimina. Plenus est, uacuum, & mediocris: quoniam totum uas, aut plenum est, aut uacuum, aut mediocriter repletum. Plenus itaque est pulsus, ut Archigenes definit, qui arteriam pleniorē repræsentat, & occursum eius humiditate plenum, uacuum qui aeris modo arteriam excitat, ut digitorum impressione loci inanitas occurrat. Hæc igitur quinque pulsuum genera, uno arteriæ motu constant. quoniam uerò caloris, qui in corde habetur qualitas, ex arteria quodammodo magis euidenter apparet, dignati sunt quidam etiam hoc pulsuum genus Sextum commemoratis an numerare. Ad reliqua uerò genera, tum quæ ex uno, tum quæ ex multis pulsibus sumuntur, pertinet quod quietis tempore constat, & quod rhythmo & quod æqualitate, & inæqualitate, insuper quod ordine & inordinatione constituitur. Quod itaque quietis tempus spectat, Septimum à primo numeratum diuiditur in frequentem, & rarum, & moderatum. Nam cum arteria duplici agitetur motu, qui ex contrarijs constat particulis, necesse est ut duplex quies cum ipso coincidat. Altera quæ post eleuationem, ante submissionem est: altera quæ secū dum submissionē, eleuationem præcedit, quæ etiam quies plerisque imperceptibilis esse uidetur, ut inter duos motus quies aliqua media existat. Cui itaq; longum quietis tempus est, is rarus dicitur: cui breue, creber: cui mediū, moderatus. Octauum genus pulsū ad rhythmū pertinet. Est autē rhythmus summum quidem dispositio, aut temporis ad tempus proportio. In pulsū autem, secundum nonnullorum sententiam sanè, temporis motus, ad quietis tempus, ut eleuationis, & submissionis, ad aliquam quietem interpositam. Secundum aliorū uerò opinionem in temporis motus, & quietis, ad motus quietisque tempus, aut motus ad motū, nempe eleuationis ad submissionem, aut quietis ad quietem, puta interioris ad exteriorē proportio. Differentiæ rhythmī principes sunt duæ, pulsus boni rhythmī, & nullius rhythmī. Porro uocatur pulsus nullius rhythmī, num qui nullum rhythmum obtinet, id. n. fieri non potest, sed malo rhythmō præditus, quemadmodum nullam habere uocem nullam ceruicem, eum dicimus qui malam ceruicem malamque uocem sortitus est. Cæterum pulsus cui nullus rhyth-

mus adest, triplex differentia existit. Alius siquidem est pararhythmus, mediocrem boni rhythmī peruersionem obtinens. Alius heterorhythmus, id est, alterius rhythmī, qui longius à bono recessit. Alius ecrhythmus, qui omnino bonitatem rhythmī corrumpit. Veluti cum puer significatur, peculiaris quidē puerili ætati secundum rhythmū pulsus eurhythmus appellatur: qui ad uigentē ætatem pertinet, heterorhythmus: qui nihil huius seruat, ecrhythmus dicitur. Nonum pulsum genus est, quod in omnibus prædictis inuenitur æqualitate & inæqualitate cōstans, quod uel in uno pulsu spectatur, uel in pluribus id quod à collectione plurium, systematicum quoque uocant, de quo prius tanquā manifestiore dicendum erit. Aequalis itaque pulsus est, qui consequentia par est siue magnitudine, siue robore, aut uelocitate, aut reliquorum aliquo, aut etiam omnibus. Inæqualis, qui consequentia impar est. Si enim subsequentes uniuersi pares magnitudine qualicunque inciderint eiusmodi pulsus æqualis uocatur. At si primus, secundus, & tertius pares fuerint, quartus autem impar: talis nimirum magnitudine inæqualis dicitur. Huius generis sunt, & deficiens, & coincidens. Non solum enim post unū aut etiam plures magnos unus minor apparet, sed nonnunquā totus quoque motus omnino aboleretur, & pulsus deficiēs appellatur, sicut alter huic contrarius coindicens, cum expectata quiete in medio tanquā superuacaneus aliquis pulsus inciderit. Sin autem secundus primo paulo minor factus sit, tertius secundo, & quartus tertio pari modo, idque deinceps longius, illiusmodi pulsus. myurizontas & myuros nuncupant, nomē à figuris, quæ in mucronem desinunt transferentes. Qui quidem perpetuo, ex ipsis imminuuntur, ac nunquam decrescere cessant, in absolutam motus defectionem finiunt, ac uocamus ipsos myuros deficientes. Qui uerò cessant, duplici continentur differentia. Nonnulli siquidem ipsorum in qua primum defierant paruitate, hanc perpetuò conseruant. Quidam uerò augescunt rursus, uel in parem priori magnitudinem redeunt, uel ad minorem, uel ad maiorem, ij myuri recurrentes dicuntur. Iā uerò & in unius pulsus inæqualitate myuri pulsus sunt, de quibus suo loco paulo post tractabitur. Huiusmodi sanè quedā est pulsum inæqualitas, quæ systematica appellatur. Atque uno in pulsu depræhenditur, uel in una arteriæ particula, uel in diuersis accidit. quem
admodum

admodum in motu, exempli gratia, in una quidem particula arteriæ inæqualitas dicitur, cum aliter inceperit, ac aliter desierit moueri circa unum digitum arteria, incipiens quidem citior, desinens autem tardior, uel è contrario. Atq; hoc triplici modo accidit, uel motus continue manet, uel intercidit, uel repetit, & ueluti bis percutit. Si igitur manens continuus & non intercisus, à celeritate ad tarditatem transierit, aut è contratio, impar citatus græcè *ἡμιστάχυς* eiusmodi pulsus, & est, & dicitur. Quòd si quiescat, & quiete interpollata postmodum uelocior appareat, Caprizans appellatur, ex capra animâte sumpta translatione, quæ saliendo sublimis in aere consistit, & secundū quendam motū inopinatum priore citatione molitur. Porro si ab eleuatione recurrerit, & ante submissionem absolutam, secundo manum tangētis ferierit, dicrotus huiusmodi pulsus appellatur simile quippiam in incudibus fieri cernas licet, quippe mallei, simulatq; semel manu in ipsas incusseris, reciprocatur, incudum renixu, & secundū rursus, uel etiam tertiu feriunt. At qui non solū inæqualitas quæ uno ictu in eademq; arteriæ particula accidit in motus tēpore, potest fieri, uerū & illa quæ uirtutis robore cōstat: nō autē ea, quæ distantiarū quantitate comprehenditur. Nullo n modo idem pulsus eadē in particula magnus & paruus queat effici: neq; in alio genere, sed in diuersis particulis. porro in uarijs arteriæ particulis unoq; in pulsū duplex fit inæqualitas nunc quidē cum motus manet continuus, & arteria iuxta quosdam digitos citius mouetur, iuxta quosdā uerò tardius nunc autē cū motus quoq; interciditur, ut nonnulli quidem digiti motū apprehēdant, nonnulli uerò nō. Ac iuxta eleuationis quantitatē in pluribus quidem particulis inæqualitas manifesta est. Ex quo genere sunt myuri uno in ictu inclinantes, quos Græci uocant *ἐπικλινεύκτας*, & *περικλινεύκτας*. Si nanq; interna digiti parte magnus occurrit pulsus: & curuatus inde iuxta rationē minuitur, ut in exteriorē quæ ad ægrotātis pollicē spectat arteriæ parte, minimus idem appareat, myurus uocatur ad muris caudę similitudinē, uel meiurus q̃ caudę modo imminuatur. At si iuxta medios digitos magnus occurrat, curuatusq; utrobq; minuat, minor apparens, hūc Archigenes *μενεύκτα* quasi dicas latinē inclinātē, & *περικλινεύκτα* appellauit, manifeste significare uolēs eleuationis breuitatē, cū extremorū utrorūq; ueluti inclinatione. Nō. n. ut absicis uniuersim

ac subito, utrinque partibus, sed ueluti inflexis in arcum contractus est, utpote myurus, hoc est imminutus magnitudine utrifque in partibus. Ac cum secundum magnitudinem inæqualitas, id quod maturius est, aut tardius, assumpserit, tum undosus, tum uermiculantes, pulsus oriuntur. quod si id quod in situ est, acceperint, conuulsorij & turbulenti, ut uocant, constituuntur. exordiendum igitur est ab undosis, in quibus non simul apparet in tali inæqualitate arteria omnis eleuari, sed pars illius alia primū, mox alia, dein alia, postremo quarta, ut motus continuus maneat in modum undarum sese eleuantium. ac nonnulli undam in rectum tendentem obtinent. quidam in latus inclinantem, & alij in breui longitudinis distantia, altitudinem magnam habent, alij contra, aliquid latitudinem, aliqui angustiam. Similiter etiam celeritate & robore inæquales sunt. Undosus totus in paruitatem cessans, uermiculans appellatur, uermis gressui assimilatus. Quemadmodū uerō undosum pulsum minorem factū uermiculans excipit, ita uermiculantē formicans ubi motibus multis abolitis in unum eundemque per quam exituum deserit. Vocatus hic quoque est à formicæ animantis similitudine, tum ob paruitatem, tum ob motus speciem. Est. n. formicans admodum exiguus, ut quo minor alius non extat. Pari modo languidissimus omnium creberrimus non tamen citatus, ut Archigenes existimauit. Huic confinis est Hecticus. quemadmodum enim febris, sic etiam pulsus Hecticus est, qui nullam magnam mutationem subit, sed perpetuo consimilis manet, trahitque, ut ab initio inceptit, & nunquam soluitur, toto habitu in morbum cōuerso. Porro conuulsorij pulsus utrinque ab extremis sursum retrahi, tendi, & conuelli uidentur, ceu chordæ cuiusdā tensæ sensum præbeant: at in turbulenti nihil tale reperitur. Sed maior in his eleuatio est, ut arteriæ particulæ quædam sursum ferantur, uno eodemque tempore, ac motum ipsarum spiculis rectissime assimulaueris: quæ ualidius emissæ, celeriter feruntur uibrata. Serratus pulsus est cum alia pars arteriæ elata, alia minus, ob duritiem nimirum ipsius esse uidetur. Cæterum pulsus hic est turbulenti quippiam possidet, ac citatus quidem est, creberque, non semper autem magnus. Decimū genus pulsuum ex inæqualitate profectū cōmemoratis succedit, quod ordine, & in ordinatione cōstat. Nam ordinatus & inordinatus inæquali in circuitum paritate: & prorsus imparitatem diuiso, ex utraque

sectione

tionē originē trahunt. Ex circuituū paritate ordinatus: ex soluta uerò imparitate inordinatus. etenim pulsus æqualis minino est etiā ordinatus, siquidē subsequētia parem ipsum cebamus: inæqualis autē non oīno inordinatus est. Si nanq; paritatē corrūpat, circuitū uerò seruet aliquē, ut in eleuatiōis quātitate, uerbi gratia, si duo magni, & unus paruus sit: deinde rursus duo magni, & unus paruus, atq; sic deinceps, uocatur inæqualis quidē, sed ordinatus. At si præterquā quod paritatem corrūpat, ne ordinē quidē aliquē inæqualitatis cōseruet, cū inæqualis tū inordinatus talis est: similiter in aliis quoque generibus se habet. Inordinatorū quidē, alii sunt ex toto inordinati, ne uel exiguū quendam circuitū cōseruantes, alii uerò secūdu circuitus ordinati. Quatenus. n. cōtinuam ordinatiōnē nō habēt, inordinati uocabūtur: quatenus aut diu circuitum quendā tuentur, secūdu circuitus, ordinati uocari queāt. Exempli gratia, si contingat duos magnos fieri, duos item paruos, deinde tres magnos, & tres exiguos: quatuor magnos, & pares exiguos, & rursus tanquam reflectentes duos magnos, & duos exiguos: tres magnos & totidem exiguos: & deinceps similiter. scire uerò conuenit, inter alios quidē contrarios singulos, quēdam esse medium. Aequalis autē & inæqualis mediū nullum, neq; ordinati, neq; inordinati: nisi uoles secūdu circuitus ordinatum medium dicere ordinati & inordinati. Cæterum aliorum omnium mediū, secundum naturam sunt, præterquam uehementis & languidi, ut à nobis ostensum est. Inter hos autem æqualis solus secūdu naturā est, reliqui præter naturam, inæqualis ordinatus & inordinatus. Hæc pulsum genera uniuersa sunt, & generales ipsorum differentiar. Nonnulli uerò his etiā alia duo annumerarunt. Primum à situ arteriæ sumitur, quatenus sursum, deorsum, dextrorsum, sinistrossum deducta esse uideatur. Alterū quo maturius, aut tardius: ex quorum numero undosos turbulētosq; pulsus esse diximus, ac nos compendii gratia simplices solum differentias prodidimus, ex dictis autem si coniungamus has. faciliē erit etiā cōpositas inuenire. † Porro opportunum erit deinceps, causas quoq; pulsibus convenientes exponere, quas comitatur etiam prælagiū ab ipsis desumptum, ac initium à magnitudine capiemus, quoniam hæc aliis est manifestior. Magnus igitur pulsus redditur, uel propter usum urgētē, qui calor est in corde exuperās, externæ

appetens refrigerationis, & ueluti euentilationis, aut propter corporis gracilitatem, ut posterius ostendetur. Porro augefcit calor, ut ex caufis naturalibus, utpote ætate florida, aut puerili, aut fimpliciter calida, anni tempore, regione, & temperamento calidiore. Aut caufis non naturalibus, ueluti aëre qui nos ambit calidiore, balneis calidis, exercitiis, cibus uino, medicamentis calfacientibus. Aut caufis naturæ contrariis, puta intemperie calida, aut humorū putredine, aut ira, aut fimilibus. Discernes uniuscuiusq; pulfum hoc discrimine, q̃ caufæ naturales magnitudinem ipsius faciunt stabilem, & quæ difficulter mutari queat. Reliquæ uerò, ex facili mutabilem, ut etiam manu adhuc admota frequenter, aut certè paulopost fubfidat. Iā uerò pulfibus, qui fane ob balineas calentes magni funt, mollities quoq; accedit, quemadmodum iis, qui ob calidam & præsertim cum ficcitate intemperiem magni exiftunt, durities. Exercitatis uerò mediocriter, aut perfrictis, nec duri, nec molles funt, medio ftatu præditi. Pectoris autem regio, multo calidior eft, quod iam & iratis accidit. Ex cibo autem magnis, aut uini ufu, aut ita, præter magnitudinem etiam uehementia ineft. Qui uerò occultare iram ftudent, aut aliud quid præter medici permissionem factum, uerbi gratia medicamen calidum fumptum, eundem medicum fimulatq; manum attingat, interrogantem celare uolentes, iis præter magnitudinem manifesta quoq; oboritur inæqualitas. Ad hæc ægrotantis mores & confuetudo non mediocriter ad pulfus dignotionem faciunt. Confuetudo quidem, fi medicaminum appetens fit fi & rudis mores, fi opinionis eximendæ peritus & calidus fit. Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem adhuc fubmiffionē magis citatam habet. Verum ad magnum pulfum efficiendū, non folum ufus abundē eft, fed etiam uirtutis minifterium defideratur, inftrumentiq; commodatio inter ficcitatē & mollitiē. Aucto igitur cordis calore propter quālibet caufam ex cōmemoratis, primum quidē magnus pulfus efficitur: ubi uerò magnitudo ufui nō fuffecerit, ftatim etiā celeritas ipfi accidit. At fi ne fic quidem fatis fuerit, mox frequētiam affumit, parui, autem, tardi & rari pulfus, itidem à contrariis fiunt. Sed quādoq; à magno citato & crebro ad contrarios fit mutatio, ufu nimirū poftulante, non amplius id quod in pulfu primum factum eft, id etiā primum ceffat, uerū quod poftea acquifiuit, id primum

primum abijcit, statim quidem rarus euadēs, deinde tardus, postea quoque; exiguus. Sin autem tarditas prauitasque; accreuerint, ē contrario raritas in crebritudinem trāsmutatur, ut per eam utcumque; usui fiat abundē. Hæ igitur magnitudinis, celeritatis, frequentię, & contrariorum ipsis pulsum causę habentur. Ac iungetur ipsis eā quoque; pulsus immutatio, quę una solum distantia constat. Itaque; latitudo sola augetur, dum humiditas potissimum, uel secundum naturam, uel etiā ab exterioribus causis redundat, quemadmodum sublimitatis pulsus ob instrumenti mollietatem uirtute ad hoc opitulante, longitudo à siccitate, & carniū circumpositarum emaciata palam efficitur, reliquis distantijs collapsis. Non enim arteria longior, quā postulat natura fieri potest, ac propriē magis pulsum huiusmodi gracilem appellaueris, quemadmodum ipsi contrarium secundum latitudinem solam, & profunditatem adauctum, amplū. Contrariis autem horum affectibus pulsus nonnunquam incidit, & in aliquā, aut aliquibus distantijs prohibetur, humilis, aut arctus, aut breuis apparens, cū talis non sit, sed ob pinguedinis cuiusdam, aut carniū, aut mēbranarum oppositarum crassitiem apparens. interim, etiā totus paruus uidetur, cum re uera paruus non sit, & languidus similiter. Quid opus est uerbis: sæpe absoluta pulsus defectio quibusdā esse putatur in omnibus arterijs, cum uerē non sit, & maximē ijs qui negligentius ipsum tangunt, sed cum motus ob carniū copiam delitescit, re uera obscurus existens, non enim extrema pulsus defectio homini potest accidere, quoad uita fruatur, quemadmodum igitur rursus in locis ex carniibus, etiam parui pulsas, magni esse uidentur. Corpore itaque uehementer emaciato, arteria spinam perreptans, sæpe tangentibus abdomen, motum repræsentat, ac nonnulli etiam ex his, quę prius in artubus nō erāt, conspicuę. Quamobrem omnibus causis diligenter attendendum censeo, ne dignorio ipsorum nos lateat. Pulsus autem uehemens uirtutis robore efficitur, si nulla ex causis reliquis renitatur, utpote usus dissolutus, aut instrumenti durities. Languidus autem pulsus, imbecillę uirtutis & solius soboles est, aliud licet nullum adfuerit. Si quidem uehemens omnibus causis ad sui generationem indiget, languidum etiam sola imbecillitas efficit. Qui igitur per initia uehemens est, ætates anni tēpora, regiones, & tēperamenta moderata comitatur,

languidus immoderata. Porro qui à languore in uehementiâ incidit, uirtute uindicta ab imbecillitate prius occupante efficitur. Vindicatur uero, aut ex his quæ in ipso corpore continetur, ueluti humorum concoctione, uel excretionem uel ira: aut ad exterioribus, nempe uino, cibo, exercitijs, ac alijs quæ intemperiem corrigunt. Vires dissoluunt, inedia, uigiliæ, uacuationes immodicæ, tristitia, curæ & dolores, maxime animæ defectiōnem inferentes, ac omnia quæ intemperiem faciunt. Quidam uero ex rudibus ac in exercitatis, durum pulsum uehementem esse putauerunt, quod discrimen exercitatum, tum ratione, tum tactu, nunquam latuerit. Nam uehemens magna ex parte cum magnitudine in sublimitatem attollitur, tactum ualidè percipiens: durus magnitudinem non recipit propter arteriæ contumaciam: fit igitur durus, ob instrumenti duritiem, quâ refrigeratio immodica, aut siccitas, aut tensio ab inflammatione profecta, aut conuulsio generat. Statim uero duritiem etiam paruitas, & celeritas nonnunquam, & frequentia magnitudinis loco propter usum sequitur. Mollis pulsus, arteriæ humiditatis comes est, quam humidiores reddunt ex iis quæ secundum naturam sunt, humectiores cibi, balnea frequentia, somnus multus, uictus copiosior & animi oblectatio, ex his quæ præter naturam sunt, sopores, lethargi, aquæ subter cutem, & reliqua pituitæ uitia. Plenus pulsus, aut humorum copiâ, aut ciborum, aut uini potitionis abundantiam indicat, quemadmodum uacuus cōtrariis, aut enim inediam, aut uacuationem. Vbi calidius arteriæ corpus occurrit, multam in corde caliditatem, reliquo corpore refrigerante, aut conuulsoriam quampiam arteriarum uiolento motu incalescentium, dispositionem facitur. Archigenes uero tradit arteriæ locum propriè in catochis calidiorem deprehendi, quemadmodum in iis, qui conuulsionem cum graui animi in somnum delatione quam cataphoram appellant. At rhythmus, de quo disputatum est, si par sit motu & quiete, probam totius corporis temperiem præ se fert, quantum ad se pertinet, uel non magnam à bona declinationem, sicut in ætate puerili, & corporibus alioquin temperatis. Ac si longius quietis tempus fuerit eo quo motus peragitur, calorem præpollere notat, quemadmodum in ætate florētibus. & his proximis, ueluti igitur in corporibus senilibus æqualiter frigidis, diuturnius motionis tempus est quam quietis.

Notare

Notare autem oportet rhythmum inæqualitatem mensuræ esse
 eius quæ celeritate & frequentia consistit. hanc autem ueluti
 materię rationem ad rhythmum obtinere. Iam uerò deficien-
 tes, coincidentēsq; pulsus sunt, uiribus oppressis, & ueluti ag-
 grauatis, sed coincidentes minorem offensam, deficientes ma-
 iorem significant, ac in uniuersum uirtus oppressa grauataque
 pulsus mutat ad inæqualitatem inordinationemq; tum aliam
 quamlibet, tum eam quæ uehementia & magnitudine cõstat.
 Ac ex myuris pulsibus genere duplicibus demonstratis (uel
 enim in systematica, ut uocāt, inæqualitate, uel in ea quæ uno
 fit ictu, deprehenduntur) deficientes quidem extremam uirtu-
 tis internitionem notant, repentes autem recurrentesq; , &
 ipsi quidem imbecillem, sed repugnantem adhuc resistentem
 que, & renuentem indicant, in uno autem ictu myuri & incli-
 nantes, quos *πνευσκώτας* uel *περιπνευσκώτας* appellamus, ma-
 ximè ijs fiunt, qui paulatim contabuerunt, inflammationibus
 non solutis, præterea plurimis quomocunq; tabescentibus,
 dum partes quæ circa arterias habentur, emarcescunt. Porro
 inæqualiter citati & caprizantes, febriles potissimum calores
 comitantur: uerum si pulsus eleuationis principia dissoluens,
 extremum ipsius acceleret, & submissionis initium, putredinē
 exuperantem notat, natura fuliginosis recementis excernen-
 dis incubente. Sin autem è contrario submissionis initium dis-
 soluerit, ac eleuationem uero magis instet, calorem præpol-
 lere scias, qui refrigerationē desideret. Comitatur hæc in fe-
 bri etiam crebritudo plurima ex parte, interdum magnitudo
 quoq; , nisi uirtutem instrumenti duritia impediat. Cum autē
 hæc in arteria intenditur, & uirtus nō sit inualida, pulsus sit qui
 à his feriendo dicrotus appellatur. Porro undosus humidio-
 res potissimū affectus sequitur, atq; his magis aquæ subtercu-
 tem genus, quod Anasarca uocant, itē lethargos, & peripneu-
 moniam. At cum uirtus dissolui inceperit, sed paululum adhuc
 resistat, undosus in uermiculantem decidit, ubi extremè col-
 lapsa fuerit, etiam hunc formicans excipit. Hecticus autē pro-
 priè contabescens & alioqui emarcescens sequitur. Cõul-
 sorius fit, quā neruorū origo inflammatoria quadam affectio-
 ne cõsistatur, sicut in phreneticis, & acuta epilepsia correptis,
 quando etiā moriuntur, adhuc calētes, qui hoc uitio sunt occu-
 pati, cōtrario his modo quos syncope inuadit, illi nanq; uehe-
 menter

menter etiam frigidi, adhuc uiuunt. Turbulentus autem pulsus efficitur, cum usus magnam eleuationem requirit, ac uitale robur eam potest creare, solum uero arteriae corpus praeduritie, in magnam attolli distolen, ut in magnis inflammationibus, obstructionibusque diuturnis, impotens refragatur. Pulsus serratus in totum index est inflammationis, & praesertim partium quarundam neruosaarum: quinetiam pleuritidi peculiaris est: remittens quidem, leni & ex facili concoquendae: intensus autem difficili, & concoctu peruicaci: quaecum imbecilla quidam uirtute, subito in periculum praecipitat: cum ualida autem longo tempore concoquetur. Vel enim in uomicam transijt subinde, uel marcida tabes ipsam exceptit. Iam uero sciendum uenit, inordinationem comitari inaequalitates. raro siquidem inuenire est inaequalem pulsum, ordinatum. Minores offensa, inaequales pulsus & ordinatos: maiores, inaequales & inordinatos procreant. Hae igitur simplices pulsum causae sunt & praesagia. Ex his etiam compositas, ut in sermone de differentiis ipsorum dicebamus, haud negotiosum est inuenire.

† Rectior est haec scriptura quae in uetusto codice est. ἔστι δ' αὖ ἐν λέγειν καὶ τὰ αἰτία τὰ τρέποντα τὴν σφυγμὴν. Porro opportunum erit deinceps causas pulsum immutantes exponere facile enim fuit librario scribere πρέποντα pro τρέποντα.

De deiectionibus.

Cap. XIII.

Aluus optima est: mollis, cohaerens, & eodem tempore quo in secunda uoletudine assueuit, reddita. Talis nimirum est quae leuiter ruffa est, simul & conuenienter spissata, non nimis foetida: quae talis non est, mala censetur. Quae igitur colore similis cibo ingesto cernitur, & tenuis, & non exucata & celeriter descendens, cruda est. At mere ruffa, initio quidem biliosioris morbum indicabit. sin autem in declinatione talis excernatur, corpus probe expurgari denuntiat, uiridis æruginosae bilis nota est, nigra, uel atræ bilis, uel sanguinis cuiusdam indidē adusti, liuida, refrigerescere quodammodo, & emori non parum interiora significat oleosa pinguisque, corporis pinguitudinem consumi innuit: quemadmodum rursus uiscosa, pingui cum sit deterior, animantis particularum consumptionem praese fert. Nimis foetida haud exiguum fatetur putrefactionem. Porro in omnibus hisce, si alius qualitate cibo assum

pro non

pto non respondeat eodem iam modo affectio quoq; considerabitur. Omnium deterrima & pestifera, erit nigra, liuida, oleosa, celeriter transiens.

De urinarum notis.

Cap. XIII.

Quemadmodum in deiectionibus, ita in urinis quoq; regula sanorum usi, de ægrotis indicia sumemus. Urina igitur præstantissima est, quæ sanis simillima. Talis nimirum est subrufa simul & subflava. nimirum uero hæc & crassitiem moderatam habet. At cum triplex turbidarum urinarum sit differentia, (uel enim redditæ tales, paulopost subsidunt, uel consimiles perpetuo manent: uel puræ excernuntur deinde uero turbantur) praua quidem exiit tertio ordine dicta, moderata benigna; prima: medio utriusq; consistit secunda: summè cruda est, exactè aquosa, ueluti desperatæ concoctionis uenosi generis accidens. Quando autem celeriter descenderit, diabetes, ut Græci appellant, efficitur. Verum hæc sanè inter urinas crudas deterrima est, succedit autè ipsi, tenuis admodum & aquæ modo exalbida. Huic uicina est alia urina, quæ multis in morbis apparet, tenuis admodum, & albæ propinqua. Subpallida uerò hæc sequitur: quæ pallida quidè modo erit, & subrufa, concoquitur autem tam quantum ad colorem ipsius attinet. Tantum uerò crassitiem ipsam ab aquosa recessisse oportet, si probè concoqui debeat, quantum etià colore, sin aut hæc secundum naturam admissim seruato, subsidens album, leue, æquale, & copiosum reddit, exactæ nimirum concoctionis nota fuerit: largius autem crudum, humorem, expurgari signat. Iam uerò si urina crassa modicè fuerit, habeatq; subsidens aliquod, non cruda, iam ex toto erit. Si. n. subsidentia parti farinæ crassiori, aut laminis similia, aut fursuri, aut nigra, aut liuida, aut viridia, aut foedi odoris, habeat, præterquam quod quæuis huiusmodi in cruditate est, etiam mortis periculum aliàs ostendit. Porro boni coloris urina quæq; simul, uel subsidentia alba, leuia, & equalia representent, uel nebulas quasdam similes, uel suspensa, omnium urinarum sunt laudatissimæ, & præcipuæ, quarum subsidens, tale extiterit. Deinde commendatur urina cuius suspensa huiusmodi cernuntur. Tertium bonitatis locum habet, cuius nebulae tales apparent. Ac, ut uno uerbo expediam, quæ urinis probè innatant, quanto inferius subsiderunt, tanto magis laudantur.

De sputi notis. Cap. XV.

Sputum subflauum, subrufum, leuiter spumans, & tenue, solum cruditate, malum uero nullum insignius denuntiat. At syncere flauum, rufum, spumosum, uiride, glutinosum, rotundum, atq; his adhuc magis nigrum, prauum est. Etenim praeter sanguinem, quisquis alius humor syncerus est, prauam ostendit affectionem, caloris flammei sobolem. Cruenta igitur sputa mediocria sunt: flaua, aut nigra bilis, difficilia. Ceterum quomodo ipsa aedantur, inspicere simul expedit. Nam si prompte excreentur, liquido constat talia quidem esse salubria. contraria uero periculum testari absolutam itaq; concoctionem facitur sputum leue, album, aequale: & substantia neq; liquidum, neque ualde crassum. Summae uero cruditatis nota est, si nihil prorsus expuitur. At si expuatur quidem, sed tenne, languidae concoctionis argumentum est, Sin autem Syncere rufum, prodierit, aut flauum, nihil boni pollicetur. Si liuidum, aut aëuginosum, aut atrum, summam perniciem portendit.

De febribus diarijs dignoscendis curandisque. Cap. XVI.

Diaris febres, urinarum in primo die concoctio, calorq; suauitas seu propriae ipsarum & inseparabiles notae testatur. Verum a prima febris solutione, certiore habiturus es earum cognitione. Quippe arteriarum in hac morbus ei qui in secunda uoletudine fuit, ex toto respondet, cum nulla ex aliis febribus in naturalem statum reuertatur. iam uero quod facile morbum fert aeger, maximam & id indicium est. Opportuni sunt id genus febribus, in quorum corpore quod defluit, halituosum non est, sed mordax & acre, sumi instar. Hi autem sunt calidi & sicci temperamento: breuiter, biliosi, quos *πικροχολαίς* Graeci uocant, qui igitur ob lassitudinem febricitarunt, pinguiter simul ac molliter fricandi sunt, in balneumque ducendi. Quibus siccitas febrem intulit, fricandi hi quidem minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curae mœores, uigiliae & ira exercuerunt: lauare quidem non subinde oportet, uerum oleo copiosiore tepido, cui minimè astringens uis insit, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare conuenit. Ab insolatu usque, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriorem lauationem minimè, uerò aut oleum largum, aut crebram frictionem. Sint autem quae refrigerent & rosaceum & omphacinum

amphacinum sine sale confecta: eadem uero fincipiti uehementer refrigerata super fundere oportet, & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Si quis ex frigoris iniuria febrim concepit, etiam is in remissione lauandus est. At si cum rauedine, & destillatione febrat, priusquam hæ concoquantur, lauationi non committetur. Porro qui ex æstu Solis febriant, iij, etiam cum hæc adsunt, lauandi sunt: qui autē ex frigore, iij, quoque caput mediocriter calefacientibus perfundendū, cuiusmodi irinum est, & nardinum unguentum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, uictusque bonis procreandis succis idoneus. At cui propter inedia, febris contracta fuerit, ei opus est statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducī, & repente oleo largissime perfundi, tum molli manu perfricari, utissime in calidi solij aqua immorari. Simulatque exierit, ac se recollegerit, denuò balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox prisanæ cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum quæ molli sunt carne, ex albo iuuari. Omnium uerò communis esto uictus species, quæ & boni succi, & concoctu facilis, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & aspectu, & uiribus aquo- rum. Oportet autem in primæ febrium accessionis insultu nonnunquam aliquos horum nutrire, in quibus corporis imperies ad calidius, siccusque transiens, febres accendit. Quibus bubonem hoc est inguinum inflammationem febrem con- ceperunt, ne medicum quidem interrogant quid sit facien- dam, sed ulceri, quod bubonis occasio fuit, prospiciētes lauant, ubi accessio declinauerit. Cæterum à uino ipsi sunt arcedi, donec inflammationes inguinum fuerint, solutæ, & tenuiore uiu- u enutriendi.

De putridarum febrium agnitione. Cap. XVII.

Putridæ febres dignoscuntur eo quod nulla ipsas exte-rior causa præcedat: item quod à rigore incipiant, neque in solatu, neque uehementi frigore prægresso. id quoque peculiare est febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominant sic, cum incipiente accessione per exi- uos quidem ipsos & inæquales obtinent: hoc enim singula- ter huiusmodi febrium est proprium. maxima autem pu- trida

tridarum febrium nota est etiam qualitas caloris, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Similiter ad ipsas proprie spectat etiam urinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnū uerō & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres repræsentant.

Curatio febrium putridarum. Cap. XVIII.

Si uires sint ualidae ei qui ex putredine febricitat, sanguinē dimittes protinus, modo cruditas in uentre non existat. Ac si uires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes: cuius uacuatione, putrida per urinas, aluum, & sudores expurgare conuenit. Sin autem sponte sua nonnunquam impetum ad os uentriculi capessant, etiam per uomitum: alioquin non oportet ea præter naturam irritare: cæterum deligi materiæ debent, quæ sine calefaciendo siccandoq; ualenter, prædictas uacuationes moliri possunt, ueluti ptisanæ cremor, aqua mulsa, oxymeli, & apomeli, apijq; radix in aqua potabili concocta. Cum aluus nihil deijcit, ex aqua mulsa cum oleo clystere ducenda est. uerum totum corpus rarefacere prius non expedit quàm uacuatum fuerit: ubi uacuaueris, rarefacias utiq; licet, medicamento tepido calore prædito, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore uinum aquosum potui datum, uniuersas promouet uacuationes: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aquæ lauacrū. Quod si uerō febris magnitudine obstiterit, neq; uino utendum, neq; lauacro, neq; unctionibus rarefaciendi uirtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commodè bibitur, nisi quid & hanc prohibeat. Ergo si quidem & uires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa planè euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit æger, tum status cæli calidus ac siccus, etiam si in frigidam nationem hunc dimittas, haud quaquam lædetur: sin autē mediocris existat febris, & uires inualidæ sed cum notis concoctionis, ijs qui ita habent balneum prodest, & uini potio. Tum uerō ex unctionibus eæ quæ rarefaciunt.

De tertianarum agnitione. Cap. XIX.

Tertianæ febris cum sit lauæ bilis cōmotæ soboles, protinus ab initio rigorem, haud exiguum infert. hoc discrimine à quartanæ rigore uariat, quod pungere uideatur, & cutem

cutem conuulnere. In quartanis autem, accessionis insultus uehementem perfrictionem habet. Quotidianas uerò nequaquam rigor præcedit: sed solùm perfrigescunt. Cæterum tertiana etiam exactum pulsum ordinem obtinet. si uerò uehementi in statu affligit, & hominẽ perurit, ac paulò post consistit, calorque æquabiliter per omnes corporis partes diffunditur. Et si manum iniicis, primo quidem contactu, calor copiosus & acris occurrit, ueluti cum uapore quodam erumpens, sed paulò post à manu remanente uincitur. Vbi potione æger fuerit recreatus, statim copia uaporis calidi per cutem emergit, sudorum nuntia. Bilis uomitio superuenit, aut aluus soluitur, perque urinam biliosa redduntur. Præterea ad integritatem tertiana desinit, ubi accessionis tempus, horarum non plura duodecim expedierit. Febrem igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ uerò diuturniorem accessionem habuerit, illam simplici uocabulo tertianam nuncupamus. quæcunque autem longissimè productam accessionem seruauerit, exiguum uero interualum, hanc rursus extensam tertianam dicimus.

Curatio tertianæ.

Cap. XX.

EXquisitam tertianam, ut quam flauabilis procreet, humectare oportet ac refrigerare. & sanè quod in uentriculum confluit, uomitionibus, & inferius elicere. Itẽ per nasas, & sudores deducere id ipsum conuenit. Aluus itaq; molli clysteriis euocatur. urina potionibus, in quibus apium, & ethũ maduerunt, & si concoctionis signa deprehenderis, maia iam confidẽtia etiã absynthiũ dabis. Balnea uero ex aqua frigida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neq; sal, neque sinapi adiici, sed ægrum oleo quam maximè calido perfundendum in solium descendere oportet. At qui balneis admodum aduocant, eos etiã si bis die laueris, haud peccabis. Vbi uerò concoctionis notas perceperis, tũc, uel si sæpius laueris, nihil offensa. Porro uinũ priusquam morbus concoquatur, ex toto circuecidendũ est. simul atq; uero cõcoqui inceperit, tenue, aquosum, modicum, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refrigerantesq; utiliter assumuntur. A melle abstinendum, sinapi, acris & acris omnibus uinis autẽ admodum uutustis, & natura calidis. Cæterum nihil miri est, si in hominibus primi exercitii, in ediamque, expertis, nunc autem ordine conuerso otiosis

sis ciboq; usis plenior, bilis maxima ex parte mixta pituita reperitur. Cuius rei gratia complures tertianæ, aut citra rigorem sunt: aut perexiguus ipsis oboritur, unde etiam animaduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neq; cibibus aliquis liberalior tertianis spuris ante concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem micæ, oua, & consimilia.

Curatio tertianæ notæ.

Cap. XXI.

LAuare in tertianis spuris per initia salubre non est, sed quando iam concoctionis notæ apparent, neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abunde est. Quies autem, & præcordiorum fons ipsis conducit, tum sorbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atq; si sanguinem detrahare opus est, neque hoc omittere oportet. Tota uero uictus ratio erit, non quæ refrigeret in totum, humectetq; uerum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maximè uero conduxerit ipsis pituitianæ cremor pipere injecto. uel hyssopum quoq; nonnunquam uel origanum, uel spica nardi, aquæ mulæ admixta, incoctaq; potui exhiberi, & alia quæ urinæ ciendæ sunt, præterquam ea, quæ nehementer calefaciunt, exiceantq; Potissimum uero ab synthium, post septimum diem porrigi debet. Iam & oxymel epotum, multis fuit auxilio. ad hæc nonnulla ex his quæ moliter uentrem subducunt. Porro uomitus secundum cibum, is quibus hæc febris in uetustatem incidit, utilissimus est.

Quartanarum cognitio.

Cap. XXII.

Quartana inuadit multa cum perfrictione, ut quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem uero seruioremque febrilem tertianæ modo non obtinet, imò nec bilis uomitus eam comitatur. Adhæc si urinæ tenues, albæ, & aquosæ fuerint, quartana erit febris. Eximia uero ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus, Cæterum in autumnopotissimum incipit, erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimum subsistit quæ quarto die reuertitur aliquando etiam plurium dierum intervallo, iuxta quosdam circuitus accessionem habet.

Curatio quartanarum. Cap. XXIII.

Quartana laborans leniter tractandi sunt, neque medicamenro ullo forti sollicitandi, neque uacuatione, nisi

nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, cum uenisse discere conuenit. Victus eis offertur optimus, qui non let, & uenter his quibus uti consuevit, emolliri debet. Quòd nec nihil proficiant, clysteribus per initia quidem mollibus, inde uerò acribus utendum est. A suilla carne prohibeantur, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, qui refrigerant corpus, siccantq;. Vinum utile est tenue, & modice calidum. Item salsa & sinapi ex usu sunt, tum dies aliquot assumptum medicamentum diatrion pipereon, est, quod triplici constat pipere, uel quod diospoliticon appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quotidie sumitur. In ubi statu uictus ægro tenuissimus præcipietur, statim uerò ut diu conquiescat, iniungendū est, tum uisceribus prociendum per ea quæ emolliunt, relaxantq;. In secutis diebus licamenta conferunt, quæ urinam cient. atq; si concoctio notæ apparuerint, cum fiducia tunc quoq; ijs uti expedit, ut utrosque humores uacuant, idq; non semel duntaxat, uerum sæpius. Porro secundum ualidam purgationem, & mementum quod uiperis constat, exhibetur, & alia quæ ad modi febres commendantur, inter quæ est & nobis fami- omniū probatissimū, quod succum cyreniacum recipit.

Quotidiana agnitio.

Cap. XXIII.

Quotidiana haud quaquam cū rigore primo statim die inuadi sed procedēte tempore perfrictio magis quam rigor oritur. Aegre uerò incalescit, & diurnum hanc incrementum: imò neq; adurit ægros, neq; multū, & crebro re compellit, neq; efflare, uel frigidam bibere. pituitosi aut uomitus hic accidunt, & quæ per aluum uacuantur, frigida, crudiora, aquosiora cernuntur: totum corpus crudis humbus redundat: sudores minimè primis diebus erumpunt, ad integritatem uenitur, cutis ægrotantibus albicat, urines tenues sunt & exalbidæ, uel crassæ, turbidæ & rubræ.

Curatio quotidiana.

Cap. XXV.

Quotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum ijs quæ urinā probe eliciunt, ac uniuersa uictus species incisoria esto, circa statum uerò uentri habēda est rō, præsertim ipsius orificij, deinde ægris iubēdū est ut radícula & cibis assumptis uomāt. Idē utantur ijs quæ

pituitam subducunt, idque tamdiu quam febris cessauerit.

*De hepialo febris & rigore qui ægrè potest excale-
feri. Cap. XXVI.*

SI uitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, non-
dum putrefacta toto in corpore exundauerit, rigorem qui
ægrè excaleferi potest, sine febris excitat. In febribus enim
quæ humoris uitio accenduntur, putrefactio maximè febrilem
calorem suscitatur. At si tota hæc pituita putruerit, quod tamen
rarò fit, ob immensam frigiditatem quotidianæ febris causa
redditur. Quando uerò non tota æqualiter, sed ex dimidio ip-
sius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes, nonnullæ uerò non
putruerint. Hepialum febrē hanc facit: in qua simul & rigent;
& febricitant. Particulæ quidem humoris eius necdum putre-
dinem expertæ, omnibus uenis, uel etiam reliquo corpori com-
municate & sparsæ, rigorem creant: putrefactæ uerò febrem ac-
cendunt. † Dicta est autem Hepialos per translationem à sa-
le: dico autem mari, quod tranquillum quidem apparet, in prin-
cipio autem difficile turbulentumque erat. Vel ab Hepios,
quod est molliter & alacrin, quod signat calefacere, quasi di-
cas, quoniam blande & leniter calefacit. Atque hæc febris cum
ex quotidianarum genere existat, utpote ex pituita nascens, il-
larum curationi subiicitur speciali, nisi quòd tanto commemo-
rata quotidiana calidioribus magisque incidentibus præsidij in-
diget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uerò
rigor multo magis calefacientia requirit. Itaque medicamen-
tum ex triplici confectum pipere, ex calaminthe præterea, &
quod liquore cyrenaico constat, his sunt accommodata. Item
ex castoreo, similibusque præparata remedia conueniunt. La-
tius autem diffusiusque explicatam curationem horum repe-
ries in capite quadragesimo quinto de rigore & perfrictione.
Insuper Lypyrizæ & Tiphodes, quæque præter commemoratas
febres dicuntur cum sint ex relatarum numero, etiam curatio-
nes, tum in illis expositas, tum exponendas postulant.

† Locus hic multò rectius in libris manuscriptis quàm im-
pressis, quos interpretes sequuntur, exaratus est. Sic enim legi-
tur in antiquis cod. λέγεται δὲ ἡπιάλος ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῆς
ἀλδός, λέγω δὲ θαλάσσης, ἡπίας μὲν φαινομένης, χαλεπῆς δὲ κατὰ
τὰς ταραχὰς αὐτῆς ὑπαρχούσης, non κατὰ τὰς ἀρχὰς. quibus
uerbis

rbis significatur mare esse molestum & difficile cum turbatum est & agitur.

De febribus continentibus. Cap. XXVII.

Continentes finitimæ sunt singulis intermittentibus: tertianæ quidem exacte ardens, quæ causos dicitur: quotidiana, ea quæ singulis diebus accessionem habet, non rem ad integritatem desinit. Sic etiã quartanæ, ea quæ quatuor die accedit. Exactus nanque causos: cum omnes alias exquirat tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine uariat, quod non in rigore inuadat, neque ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessionem obtinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præse fert. quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratio: & quæ quarto quoque die accessionem habet, uerum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Continens itaque non desinit, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex soluta. Quum autem ne declinatio quidem accipiat, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acumine ab ipsis uariat.

Agnitio febrium continuarum: quas synochos græci uocant, & curatio. Cap. XXVIII.

Continuarum febrium, synochos græci appellant, origo ex sanguine est, nunc efferuescente, nunc putrefacto propter obstructionem. Qua propter accessio ipsis ad finem una est. Indicia uero sunt, pulsus maximi uehementes, citati, crebri, æquabiles, non mordaces. Urinæ non tantum adeo à sanis recedunt. Curatio est, sanguinis quousque remouendi, animæ dimissio. Qui si non fuerit detractus, febricitantes in summum ueniunt discrimen. At si quid per uenæ sectionem uacuare prohibuerit, alijs uti remedijs oportet, quæ sanguinem recludunt, copiam materiæ uacuant, & febrium feruorem leniunt. Cum autem euidentes humorum concoctionis signa in ipsis uideris, neque in principe particula inflammata, aut tumor cedematis speciem repræsentans, aut si fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut in hanc procumbat, cum fiducia frigidam propinato: maximè si eius potioni allueuerit.

Ardentium agnitio.

Cap. XXXIX.

Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua, aspera & nigra, uentris roſio, deiectiones pallidæ, ſitis uehemēs, uigiliæ nonnunquam etiam delirium.

Ardentium curatio.

Cap. XXXX.

Horum alterutrum fieri neceſſarium eſt. ſi perfectè morbus ſolui debet: aut bilioſos excerni humores, aut eoſdem extingui. Excernuntur itaq; per ſudores, uomitiones, & imum uentrem. Extinguuntur aut; per frigidæ potui: quo nos urentes febres, cauſos appellāt, ex toto curamus. Suſtinere eos qui his cruciantur, non aqua ſola conuenit: neq; mulſa duntaxat, uerum aquoſa mulſa exhibita. Nā qui huiuſmodi morbis conſiſtantur, ſola portione ſuſtentandi ſunt. Porro balneum illis ſolum uſui eſt, qui citra tumorem inſlāmatorium, aut eryſipelatium, ardenti febre laborant. Quod ſi uerò concoctionis noctæ percipiantur, multo magis ipsis conduceret. Qui ex falſo humore, febrim ardentem conceperunt, his eſt inutile. Verum iſſdem priſanæ etiam cremorem cibi loco offerre conuenit.

Februm quibus ex affectu eryſipelaceo origo eſt, curatio & agnitio. Cap. XXXXI.

Febres quæ ex Eryſipelaceo uiſcerū affectu procreantur, his notis agnoſces. interna ſeruēt immodice, dolor urget uehemens, præterea ſitis excruciat, & ardor immoderatus. Sūmatim ex indiſijs accerrimæ bilis cum pauco ſanguine putreſcentis deprehēdes. Hunc in modū curabitur. A balneo in totū abſtinere decet. Aqua frigida per morbi ſtatū uehementi, hoc eſt frigidiffima utendū eſt: per initia nō itē. Extrinſecus uero refrigerantia imponētur: & ſi nihil hæc promouerint, etiā intro eadē ſumere ægri cogentur. Maximè ipsis conueniunt lactucæ, & quæ partē his facultatē obtinent à foris & ipſe lactucæ ſuccus idoneus eſt, adeoq; intybi & ſemperuiui, & reliqua refrigerandi uirtute prædita. ſed præſtantiſſimo parte plurima utimur. Nam liquorem refrigerantis alicuius expreſſum pilæ cū portulaca iniſcimus, deinde cōruſa exprimimus. cum uſus exigit, modico polentæ mixto hæc in aqua frigida merſa, refrigeramus. Linteum uerò duplicatum in ea intinctū extrinſecus aut ubi calor ſentitur, præcordijs obtendimus, non diū adhære ſinentes, uerū aliud frigidum eius loco applicantes. Iā ue-

& oleum omphacinum medicamini nonnunquā miscemus.

Hefticarum febrium agnitio. Cap. XXXII.

Hæctica febris non in humoribus, & spiritu solū, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc absq; dolore consistit, & qui ea detinentur, nequaquā febricitare se existimant: neq; enim calorem percipiunt, cū uniuersæ ipsis partibus æqualiter sint excelsæ. Duplex hefticarum febrium species est, prima ardentibus magna ex parte superuenit quæ rogantur adeo ut tempore corporis ipsius cordis madorem imant, uel etiam multo adhuc permanente. Quæ uero mature etiamnum humiditate fiunt cordis corpus occupantes, & potissimū accenduntur. Vnam sanè ipsius generationem didimus. Reliqua uero est cū statim ab initio inuadit, primæ originis diarijs similem, ex mœrore, ita lassitudine maiora cum exustione in sole, sortita. Hæc igitur non difficulter creditur remediis. Quæ uero ex ipsis in marcorem qui Græcè *μαρasmus* deuenit, omnem respuit curationem. At hæc sanè cognitu est facillima: oculi siquidem præter morem concaui eam testantur, & lemæ ipsis inhærescentes aridæ, & dispositio quædā squalida, uiuidi ipsorum coloris flos emarcescens sicca est & intenta. Quinetiam conuiuent plurimū, occupati, quemadmodum dormituri. uerū affectio, minus non est, sed uigilandi impotentia: tempora collapsa & quid. n. aliud præter ossa & cutē solam habent? Nam si uis uis ipsis uentrem inspexeris, neq; intestinū, neq; uiscus in superesse tibi uidebitur: præcordia sursum conuelluntur & cutis ipsis extrema reficcata est, pulsus gracilis, creber & rarus. Caliditas autem primo occursum lāguida, paulopost acris odens erumpit, quousq; igitur humiditatis aliquid reliquū hæctica solum febris dicitur. Cum uero periclitat, ne nihil aliud humoris superfit, absolutus iam marcor constituitur.

Hefticarum febrium curatio. Cap. XXXIII.

Hæctica febre laborantes, statim ab initio nutrirī desiderant, huiusmodi rodentium gratia. Maximum uero remedium huius est, uictus humectans. Conuenit igitur in maxima potus cremoris halicæq; sorbitionibus, & præterea adiecto ægrū nutritū, moderato frigida potu cuius neq; inflammatio quædā, neq; humorū putrefactio sub-

est, atsi magnam inde offensam fore coniecturaueris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem imposiris, quæ refrigerant auxiliis, uti. Balnea uerò hoc morbo obnox iis, quolibet tempore sunt idonea.

De semitertianis. Cap. XXXIIII.

QVandoquidem tertiana cū rigore, quotidiana uerò cītra illū inuadit: quæ ambarū mistura cōstat, horrore inducit, qui minor quidē res est rigore, maior autem perfrictione. Quapropter cū horror equali ab utrisq; extremis interuallo, mediū amborū rigoris nimirū & frigoris occupet, quod cōtemperatis inuicē extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur uel enim duæ accessiones in idē tempus concurrūt, uel statim ab initio ambæ inuicē iunguntur. Qñ igitur tertiana præpollet, magis horrida febris efficitur, & rigoris ēt non-nihil per accessionem assumit. Protinus aut talis calidior est & ardentior, tum vomitionē quandā bilis, aut deiectionem, aut madorē adfert. Quando altera pituitosa superat, perfrictiones quidē summa exercēt, pauci uerò horrores: neq; tñ sitis, neq; ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua, insultus quidem accessionis cū horrore accidit. At cum ex pituita proueniēs febris præcelluerit, depressiones pulsum fiunt, & horrores. Si uerò calidior præualeat, subito ac una uice incalescunt. Talis sanē est exacta semitertiana, ex æquiualente duarum febrium, puta tertianæ intermittētis & quotidianæ continuæ tēperatura proficiscens. Non exquisita uerò uel bilem largiorem, uel pituitam causatur, quæ iam magis etiam curationi renititur, cum modicus humor à copiosioris dominio artisq; auxilio expedite uinci possit. Si enim pituita sit superior, præsidij maxime utemur quæ in quotidiana exposuimus: sin autem flauabilis, ijs quæ in tertiana comprehēsa sunt: In totum ei quod urget incumbentes, sed ita, ne alterum prorsus negligamus.

De morbis publicè grassantibus. Cap. XXXV.

PUBLICè grassantes cōmunesq; morbos nomināt, qui multis simul obueniunt, quorum ut generatio, sic etiā causa cōis est. Cibiq; igitur cōes prauī, illiusmodi morbos cōmunes parient: item aquæ uitiatæ potio, exercitia immoderata,

ta, labores quibus quisq; assueuerat omisso, inedia, repletio, q; dum fames grassatur, aut fecundus annonæ prouentus. Item regionum naturæ, cōes subinde morbos intulerunt, uæ nonnunquā palustres sunt, aliquando barathrum habent cinum, quod uaporem exitiosum prauumq; exhalet. Hæc uidē nō continuē accidere consueuerunt. Æther uerò nos amens, tēperamenta corporū cōmutat, uel calidior impendio, uel frigidior, uel humidior euadens, siquidē in alias causas neque oēs simul incidimus, neq; eis toto die immoramur. aer autem quā omnibus circūfusus est, & per inspiratū attrahitur, ut in alia corpora, pro tēperamenti ipsius immutationibus uel afficiat, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex unoquoq; aeris statu futuros prælagiet, sed etiam fiant prohibebit, cōtrarium immoderatis circumflui aeris imperaturis uictū accommodās. Itaq; corpora morbo alicui propria intemperie uicina, hæc à simili circūdātis nos aeris tēperamento deprehenduntur. Quæ cōtrariā cœlo temperiē continent, præterquā q̃ nullam offensam experiuntur, etiam alia fiunt, dū repugnans aeris immoderatio temperamenti moderationē punit, ac qui hoc nouit, secundam ualitudinē uictur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerātia sciet, nunc calida: aqua quidem superinfusa refrigerans, itidem uis, ciborum inedia, & potu largiore: calefaciens autē, opulentio, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parcio. Præterea lignorum aceruatim constructorum incendio haud metriter aerem ad calidū & siccum mutaueris, si tūc humidus sit, quo modo Acronem agrigentinum fractitasse ferunt.

In antiquo codice hac aliquanto explanatiora sunt in eo in hæc uerba ita legūtur. ὁ δὲ περιέχων ἡμᾶς ἀέρ, τρέπει τὰς φύσεις, ἢ τοι θερμότερος ἀμείψας, ἢ ψυχρότερος, ἢ ξηρότερος, ἢ ὑγρότερος γινόμενος: Id est, Aer qui nos circumstat uel calidior, frigidior, uel siccior uel humidior temperamēta immutat. Nam huius loci ueram esse scripturam uel ex ijs quæ de ea re scribi Aetius intelligi potest.

De pestilentia ex commentarijs Rusi.

Cap. XXXVI.

Pestilentia grauiſſima omnia superueniunt: nihilque in hac sicut in aliis morbis singulis occultatum. Etenim

delirium accedit, & bilis uomitio, præcordiorum intentiones, labores, sudores largi, extrema algent, alui profluuiâ urgēt biliosa, tenuia, & flatulenta, urinæ cernuntur aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, mala habent subsidientia, suspensa pessima, nares destillat, pectus ardet, lingua torrida est, siticulosa, remissa, torquent uigiliæ, conuulsiones uiolentæ, aliæq; multa praua. † At si quis pestem uenturam prænoscat, ex malignorum anni temporum, & uitæ studiorum ad sanitatem haud conducentiū animaduersione, aliorumq; animalium præcedente interitu, his apud se consideratis, & illud præterea perpedito cuiusmodi sit præsens anni tempus, qualisq; uniuersus annus. Inde si quidē qualis uictus ratio esse debeat, optimè deprehendes: utpote cum anni tempus, si quidem rectè ortum est, ex sicco humidū nunc euaserit necessum est uictus ratione desiccare, ut humor superfluous absumatur. item uentris quoque habenda est ratio. Quibus superior uentriculus pituitam continet, uomitionibus sollicitare: quibus autem sanguis inundauerit, secare uenā oportet. Iam per urinas purgatio, aliæq; & totius, corporis, proficiunt. Quod si etiam æger ardore æstuet, & flamma usq; ad pectus pertineat, haud abs te fuerit refrigeria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; non paulatim, nam magis hoc pacto incendit, uerum una uice ac semel, ut flammam extinguat. In quibus autem ardor interiora occupat, summa uero inalgescunt, cutis in superficie frigida percipitur, præcordia contrahuntur, uenter, colliquata, partim supra, partim inferius transmittit, uigiliæ urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefacientia requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrahatur, † ac si alio quopiam modo ab internis foras poterit elici. Iam uero & hæc potio utiliter præsumitur. Aloës partes duæ guttæ ammoniaci partes duæ, myrrhæ pars una. Hæc in uino odorato contrita instar dimidiæ fabæ exhibentur. nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui hoc potu pestem non superauerit. Hæc quidem Rufus memoriæ prodidit. Galenus autem tradit ad pestilenciales putredines bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiam Theriacem ex uiperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Romam inter necino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interiuisse scriptum reliquit.

†Simplicior & meo quidē iudicio huius loci sensus uerior est in exemplaribus manu scriptis. Sic enim ea habent, *σύνειδαι* *ἂν τις μέλλοντα ἔχειν τὸν λαιμὸν προσέχων ταῖς τεύχεσις*, &c. id est, coniiciet, autem quispiam futuram pestilentiam, si attentē consideret temporum &c.

†Quod est in impressis *καθωκεν*, in manu scriptis magis explanatum est, *ἐκ τῆ βάθους*, id est, ex profundo.

De ijs qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. XXXVII.

Nonnulli, febricitate incipiunt, ubi magnam crudorum humorum copiam ore uentriculi simul offenso, con-gesserunt. His & præcordia inflātur, & os uentriculi uaiore mole, quā pro naturæ modo cernitur: adhæc color ips ab albidius, aquosiusq; magis est, mutatus. quibusdam ad niri-us. Nulli taliū sanguis mitti sine maximo dispendio solet, tñ uacuationem desiderent. Verum nec sanguinis dimissio-em, nec purgationem sustinent, utpote quos etiam sine his yncope subito adoriatur. Ratio igitur medēdi talibus est, quā frictione molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac primum à superiore crurum parte deorsum, idq; linteis o admodū mollibus, sed modicè asperis. Deinde tota brachia b humeris usq; , & superiore parte deorsum simili modo sunt ricanda. Vbi uero artus omnes abundè calidi uidentur: & me-us est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superue-iat, oleo relaxante uteris, ab astringētibus autem abstinebis. er hyemem uero etiam digerētium usus erit, quod genus est cionium, & chamæmelinum. Cum iam artus plurimum per-icueris, postea oleum detergetur, inde ad spinam dorsi transi-us est: hæc q; tota perfricabitur similiter, ab hac rursus ad cru-a te conferes: & hinc ad brachia exinde rursus ad spinam. ita oto die facies. Porro mulla, in qua coctum hyssopum fuit, his st aptissima, cauendumq; , ne uel cibum, uel sorbitionem, uel quam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sinas, nisi mul-ām tribus primis diebus duntaxat, tuis ipse manibus, quas di-i partes ordine perfricans. Sin autem robore mediocri sit, & alius sua sponte commodè non deiiciat, cum fiducia aliquid b inferioribus partibus infundes. Quod si maior iusto recre-entorum impetus ad aluum citetur: principio quidem per-coquere

coquere mulsam amplius oportebit: minus enim ea subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidē sistēda, alius sed exhibendus pro aqua mulsā ptisanæ cremor est. Si uero fluere pergāt, chondri sorbitione nutries. Si ex pulsu uires col lapsas ob imbecillitatē didicerimus, panem ex uino diluto exhibere conueniet: utiq; si nec uenter nec iecur inflammatio- ne laboret quando si hac infestentur iam corpore crudis suc- cis referto, nulla planē medicina periculo subtrahit. Sin autē quandoq; crassi abundē humores deprehendātur, oxymeli pro mulsā continuē exhibebitur. Ergo si æstas sit, & æger calidi tē- peramenti frigidāq; potioni asuetus, frigidum huic oxymeli dabis. Sin hyems sit, calidum omnibus. Sanē balneum his est aduersissimū. Porro ijs quos syncope iam premit, si partes mo- do commemoratæ inflammatione uacent, panis exhibebitur modicus, isq; ex uino quod celerem in corpus digestionē ad- iuuēt, statimq; ad frictionem ueniundum est, quæ pro tradito quoq; iam modo administrabitur, uerum quibus ex flaua bi- li, quæ os uentriculi, infestet, syncope incidit, is frigida offeren- da potio est uinum tamen tenue, fuluum & uetus.

*De his qui ob prætenues humores syncope oppri-
muntur. Cap. XXXVIII.*

Qui tenuium humorum uitio syncope premuntur, di- uersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nu- trire hos oportet paulatim & continuē. Porro ad exitium spe- ctare existimandi sunt, si uel iecur ipsorum, uel uētriculum in- flammatio obsedit, uiribus iam languentibus. In eiusmodi af- fectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sanē nu- trire est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non se- cus quàm priorum rarefacere, & frigidum ipsis aerem accerfi- re. Vngendi sunt præterea astrictorijs unguentis. tum cibi ijs dandi, qui non admodum promptē diffluant, non aqua mulsā, non ptisanæ cremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fru- ctus austeri, qui non faciliē corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane. Vinum ijs aquosum necessarium inter ini- tia est, sumptum post cibum.

Dereliquis occasionibus, quibus syncope succedunt. Cap. XXXIX.

Reliquæ occasiones, quæ syncopas concitant, quatuor sunt numero: dolor uehemens, uigiliæ, immodica inanitio, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquando motus. Sed & quintam, si placet, addas, nempe principiorum intemperiem. Celerrimè igitur cor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

De dolore.

Cap. XL.

Itaque dolor stupidus ex frigida oritur affectione. Pulsatilis autem dolor magnæ inflammationi peculiaris est. Simul autè tanquàm à palo impacto, aut ueluti a terebro forari pueriles, crassi intestini species doloris est. Punctorius autem, circa membranas constituitur. Pertundens uehementissimis non heterotranijis solùm, sed cephalæis quoque; accidit. Est autè pertundens dolor, cum à parte primario affecta, ceu à radice subito in uicinas perfertur. Porro distendentes utrinque; neruorum dolores sunt, cum & laborant, & ad utraq; extrema tenduntur. minimè uero in latitudinè porrectos nerui dolores percipiunt. at tenuiores, & uisificantesque; dolores membrana quidè sub cute porrecta inducit, quæ uero inter carnem hærescit, tanquàm diuellentes cruciatu excitat. multæ si quidè existunt inæqualiterque; inhærescunt, & ipsam carnem amplectuntur. Membranarum uero quæ ossibus circumdantur, profundus sunt, ipsorumque; ossium tanquàm dolentium magninè repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri apparet, præcedens uictus ratio uenit inspicienda, ut ne præter consuetudinè otiosa, aut cibus homo usus sit laboribus, ijsque; ex ualenti materia, uel solita excretio sit retenta. Nam si ex aliquod, uel omnia quoque; appareant, doloris causa est reuocanda: ac quàm citissimè homo uacuari debet. Sic. n. licebit tibi maxima cum securitate ijs uti remediis, quæ fluxiones dolentius particulis incubentes repellant. Si igitur sanguinis sit copia, quod distendit, ueluti in inflammatione oriri solet, protinus si uires patiuntur, sanguis dimittendus est, per magnam uenam patienti articulo propinquam. Vbi autè uitiatus humor duntaxat affligit, urgendus est. Si utraq; coeant, ambabus utere uacuationibus, sanguine prius emisso. Quod si his peractis dolor etiam remanet, constat profecto in ægrotante particula impactum esse, quod

quod afficit. Pater uerò curationem ipsam per digerētia quodque medicamenta esse moliendam. Pari ratione, & qui ex flatusoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: auxiliātes simul in his potius tum extenuantibus cibis, tum per sedē iniectionibus, item cataplasmatibus irrorationibus atq; fomētis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles grauando, contundendūe dolorem excitet, moli eidem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant, & calefaciunt. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & uiride sicco magis.

Ad syntexes, hoc est corporis colliquamenta. Cap. XL I.

QUum per uentrem aliquid non ex esculentis, poculentisq; uerum ex ipsius corporis substantia excernitur, humore in aluum ipsam cōfluente: qui quidem flauæ bili continuè per uomitum, & infra erumpenti cōsimilis est, odoris autem foeditate ab ipsa differt, tum q̄ deiectus rufus magis, & crassitie glutinosus, interim uerò oleosus appareat, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nōnihil etiam ex ipsis solidis partibus absumitur. In hac perniciosissima febris frigida potio utilis est, quæ ex fonte frigidissima petitur. Huiusmodi quoq; esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerent, thoraci, & præcordiis imposita. Item cibi refrigerantes, rectè offeruntur.

De uigilijs in febris. Cap. XL II.

AT uero eorum, qui immodicis torquentur uigilijs, crura & brachia uincire. † quo tēpore somnū captare solēt, iubemus, & excitari. nonnunquam palpebras aperire, si conuiueant cōpellimus, donec abundè fatigentur. Inde subito uincula soluimus, lucernamq; tollimus, & altā esse quietē iniungimus. si nihilominus uigiliae pertinaciter urgēt, ubi accessio remiserit, frōs nigri papaueris capitū decocto illuitur, narisq; offert papaueris albi cortex torrefactus detritusq;, & mādragoræ radice leuigatæ tantundem cum uino, & rosaceo malagmatis forma fronti applicetur, serpillōq; cum meliloto in passo decocto. Hoc etiā in accessionibus est urēdū, uel trita papaueris capita excipietes pane cū rosaceo, uel eiusdē cerato il-
linimus.

inimus. Cibus quodammodo sit magis accuratus. Adijciatur autem sorbitionibus capitum papaueris albi seminis cochlearium trium instar. † oleribus commisceatur papaueris nigri, si quidem folia fuerint uirida, quantum tribus digitis potest comprehendere: sin minus, tria quatuorve papaueris capita sicca, sinul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinetur. Iaminctus ex papaueris capitibus compositus, & præsertim ex sassa, mensura cochlearij, uel unius, uel dimidij potus, somnum reuenter accersuit. In quibus autem caput non facile humoribus repletur, & uigiliæ infestant, utere in declinationibus etiam tali suffitu. folij amomi, costi, arnabo singulorum uncia. arpopalsami drachma, styracis, amomi, ammoniaci, bdellij cythici, mandragoræ radices, lachrymæ papaueris, singulorum rachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffito.

† Hæc uerba sic leguntur in utri codice, ἡπερβαλλόντων ἐ ἀγρυπνέντων, σκέλη καὶ χεῖρας δεσμεῖν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ αὐτῶν ἐπὶ τῶν ὑπνῶν εἰσβάσι εἰς πέδαι κελεύομεν καὶ ἐγρηγορέσαι διδόναι τε πολλάκις μῦσαι ἀναγκάζομεν τὰ βλέφαρα, id est, eorum uerò qui multis uigilijs torquentur, crura & brachia debemus, quo tempore somnum capere solent, ligari, & excitari, palpebrasque sæpe aperire & claudere cogimus donec, &c. Qui sensus magis concinnus est.

† Id sic legit in antiq. lib. τοῖς δὲ λαχάνοις συνειδέτω μήκωρος ἐλάσης, simul coquatur & ferueat cū oleribus papaueris nigri.

Curatio soporis noxi, qui cataphora Græcis dicitur. Cap. XLIII.

Et Rons postea lactis modo tepenti abstergitur, & summa ualide ligamenti excipiuntur. naribus admoventur quæ incisoriam facultatem obtinent. In remissionibus etiam curbitulæ ualenter dorso, & spinæ defiguntur. Si uero morbus is non cedit remedijs, etiam quæ sternutamenta excitant obijciuntur. Ciborum materia sit sit, quæ incadat, diuidatq, ueluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febribus. Cap. XLIIII.

SI capitis dolor in febribus affigit, post conuenientem febrium uacuationē in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo,

noniacum, & similia. cataplasmatibus autem, apii semen, scœnugræcum, altheæ, chamæmelorum flos, & ut uno uerbo expediā, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subtilium partium, amarāque, tum astringentem.

† Hic locus integer est in ueteri exemplari: sic enim descriptus est, οἷον κολλήθης τε τὸν χυλὸν, καὶ θριδάκινης, καὶ τῆς ἀνθράκνης, καὶ τῆς φρέχνης, καὶ τῆς σέρεος, καὶ τῆς ὀμφακος, οὗτος μὲν γὰρ οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ σφύζει, idest, ut succus cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, solani, sereos, & uuxæ immaturæ. Hic enim non solum refrigerat, sed etiam adstringit.

De immodica perfrictione in febribus, & rigore.

Cap.

XLV I.

Rigori, qui crisis ratione obuenit, remediis occurrere nō oportet: nec concertationem naturæ dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, promptè remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut perfrictione (ex frigidiore uero, copiosāque maxime pituita nascitur) primum quidem artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino, aut cyprino, aut irino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiā piper oleo admiscebis, uel cachry, uel adarcen, uel castoreum. molliterque totum corpus infricabis. Porro ne faciliè oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colliquefacere. At si per hęc rigor non possit excalferi, ualentioribus quoque ex his factis copis, necnon dropacibus, & sinapismis uti consilium est, aliaque fomenta ritè admoliri. Item acriora ex iis quæ admoventur naribus, commodè faciunt, calaminthe, pulegium, & hyssoium. Potui dabitur ante accessionem mulsa, in qua piper, & uita sit incocta, adhæc liquoris cyrenaici cocto melle formati astar milii duabus horis ante accessionem præstabimus. Similiter & liquoris silphi. Adhæc quod in quartanis ex liquore cyrenaico componitur, multis fuit auxilio. Iam uerò in otum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterferunt, ut Archigenes memoriæ prodit. Galenus autem ante accessionem, cutem abrotano incandam præcipit, uel calamintha arida, uel cunile tum fossis, tum floribus, uel costo, uel pyrethro, utroque horum cum oleo

Scriptura quæ in ueteri exemplari multò melior & synce est Sic enim habet. ἐν δὲ τοῖς ὑπνοῖς κυμώλια ὑδατι διαλυ-
 νειανόμενα ῥάκη ὑποβάλλεται μεταφρένω, καὶ θώρακι.
 t, panni pinguefacti cîmolîa dissoluta aqua subiiciuntur
 & thoraci. librarius enim indoctus ex ῥάκη, fecit θώρα καὶ.
 Concinnior sensus est in ueteri codice. ita enim in eo scri-
 pt. καὶ θάλασσι τῶν ἀκρῶν καὶ ἀποψύξει διὰ ῥακιδίων ἀραιῶν
 θώρα πείλειν, id est, leuiter curare oportet extremorum
 ratione foruq̃ue ac exiccatione per pannos raros.

De tussi in febribus.

Cap. XLVIII.

VIII in febribus, præsertim cum rigore obuenientibus,
 occurrere conuenit. Nam tussis intentione, febris quæ
 inclinabat uires resûmit, ac redintegratur. Aduersus hanc
 ulx medicamenti ex melle cocto coactoque, hypoglottiaz
 ocant, offeruntur. Lingux autem supposita, unde nomen
 nt, eliquescent: & quod spirandi impedit facilitatem, di-
 unt: tempus ipsarum est in accessionum statu, & spatio
 paulum accessionem præcedit. datur etiam hydromeli-
 tum. Quibus autem de neruoso genere metus non est,
 oris processu exhibebis cum fiducia & oxymeli. sin minus
 pi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Itē casto-
 cum febris ardens non est, neruoso quoq; generi cōfert.
 ec linctus ex piceæ fructu, nucleis pineis, iride, semine, li-
 nygdalis amaris, & urticæ semine plurima uero ex parte
 quoq; hæc simul adiungentur. Ac resina quoque terebin-
 i in ouo exhibetur. Extrinsecus aut thoraci, & locis arte-
 ricinis, lana sulfure imbuta imponatur, ac pingue, oleum u-
 eum esto, uel irinum, uel anethinum. Præterea deligatu
 lida in longum porrecta, tussim exactè cohibet: dico au-
 oer medias partes extremasq; . Non ratione caret, & uua
 stri quæ staphis agria dicitur, tussis gratia uti, simul cum
 estica, aut cum mastiche mansa. summa debent infricari,
 ulceri, & ligaturis intercepti. deinde rursus soluenda est in
 rarium retractio. At si propter febris acrimoniam tussis
 itatur, utendum est gargarizationibus ex aqua tepida,
 on frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum de-
 o, uel rosarum, uel dulcis radiculæ. Visceribus autem, uel
 i cordi ipsi injiciuntur quæ modice refrigerant.

*De sternutamento .**Cap. XLIX.*

Sternutamenta febribus sæpe incidentia , molestant . Etenim caput replent, & uirtutem arguunt . Nonnullis sanguinem quoq; eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda . Quare aduersus ipsa remedijs pugnandum est . Cohibet itaque sternutamentum irruens, nasis, frontis & oculorum perfricatio, item oscitatio, studiosa palati, frictio, ructus, ilium intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summarum partium mollis contrectatio, maxillæ musculorū perunctio, calentis olei in aures infusio, puluinum calidum mento subiectum . Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, puluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis. Mentæ autem malorum, & polentæ odor conducit. obtundit enim sternutamenti elisum: Idem spongiæ ex mari uacuae efficiunt. Vbi uerò cupiditas sternutandi oborta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies accommodetur, & continue acriorum odorum experientia, & mentis remissio.

*De cibi fastidio .**Cap. L.*

Quibus uitiosi humores fastidium procrearint, iis illa & esculenta & proculeta dare conuenit, quæ huiusmodi succos uel abstergendo per uomitiones, seu per aluum excernere soleant, uel attèperando, meliores reddant, quorum materiam libro superiore, qui totius operis optimus est, cōprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibum respiciant, quoniā omnis facultas ex particularum intemperie infirmatur: conuenit in temperamenti speciem, contrarijs medicari. Plura de fastidio, in stomachi uitij libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autē, statim per initia cibi cupiditas, ijs quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum uerò polenta in aquā mersa, uel posca, uel diluta uini portione. Aut cuiusdā odorati pomi, & astringentis decocto, item perunctio odore grata, & moderata totius corporis frictio, ac blanda contrectatione tum faciei collutione, aquæ sorbitione modicæ. Iam stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendū quodammodo conuertitur, præsertim, ubi biliosum quid aut acidum sursum eiecerit. Secundū primos dies, † cataplasmatibus quoq; à foris stomachus ad cibum sollicitetur, ex palmulis, malis cotoneis, ænanthæ, abūnthio & aloë cōfectis.

Cibi

bi autem præparentur plures simplicesque, & frumentacei : alterius quoque generis uarietatem quandam habeant non nē ab ijs multum recedant, qui in febribus dātur, in quibus poma conueniunt, quæ non ex facili acefcunt, neque nimium acia sunt, sed matura, neque ad satietatem exhibenda, uerum quod ad aliorum ciborū cupiditatem excitandam suffi- . Præsto autem sint ægris dum alentur familiariffimi, qui corripere eos, tum inhortari queant. Porro febribus so- s, si in uitium recreatione perduret fastidium, etiam sifarū oxymelite coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, sal- entum, bulbi, & quicquid ad bonitatem stomachi facit, ac- nmodetur. Necnon & illud ipsum in memoriam reducatur bus cibus per sanitatem maximè usi sint. itē ambulationes, rationes, uociferationes, dropacifini, frictiones & exercitia iberantur. Præterea absinthii succi potio, uel aloes, aceti- q, tis instar mystri absorbtum, in id uehementer efficax est.

Simplicior scriptura est, καὶ καταπλάσματος ἐξωθεν ὁ σῶ- ρος ἰαρεῖν δῶ, id est, cataplasmatibus à foris stomachus cure- . Nam quod est in exemplari typis expressio ἐπετρεφέτω inino deprauatum est.

grandi fame. quæ græcis bulimos dicitur. Cap. LI.

Iuero in grandem famem, quam bulimon appellant Græci (dico autē cum minus quàm par est, cibos corpora sentiunt) fastidium deuenerit, hisce reficiemus, tum aliis, quæ bus admouentur, tum suillis carnibus assis, & hædinis. In ma omnibus, quæ nidorosum odorem repræsentant: sæui- ane febrium præterita, extremæ partes deligari. ipsiq; exci- debent, maxillas pungendo, & crines, uel auriculas uelli- do, re collectis autē, panis ex diluta uini potione, uel aliud ppiam distribui facile exhibetur.

De canino appetitu.

Cap. LII.

T si hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunquàm secundum ipsas, attamen gratia cognatio- nis, quam cum fastidio habet, nil fuerit mali, etiam de modico appetitu, quum ambo naturæ modum excedant, nonem instituere. Quoniam igitur à pituita potissimum

acida constituitur affectus, iis utendum est, quæ hanc incidunt, abstergeantque. Talia autem sunt maximè, dulcia, salsa, † & alioquin derergentia calida. Vinum igitur ipsis rectè datur copiosum, ex eorum numero, quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habentur colore fulua aut rubra, astrictionis expertia. Verùm dulciora potius propinantur, etiam non sitientibus. At cum ad prandium uenerint, primum ipsis pingua, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerum, aut astringens sit adiectum, offerentur. Hæc etenim, licet aduersus ipsam causam manifeste non pugnent, attamen impotentem ad cibos animi impetum dissoluunt. Inedia uerò spissitudinem pituitæ stomacho inhærentis absumit, minuitque. Iam salsamenta ipsis commodè exhibentur, ab his uina commemorata liberaliter assumpta profunt: quod ubi longiori tempore fecerint, caninus appetitus finitur.

† Codex manu scriptus habet, καὶ ἄλλως τμητικὰ θερμαίνοντα, id est, & alioquin incidentia calida. qui sensus huic loco conuenit, quanquam σμητικὰ etiam rectè legi potest.

De siti.

Cap. LIII

Sitim admodum longam fieri existimabis; ex siccitate, aut caliditate particularum, per quas humor ex ore in uentrem defertur, & siccitatis quidè remediū est somnus, caliditatis autem uigiliæ. Nonnulli uerò sitibundi ex uino, ciborumque caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem potiones appetunt, quemadmodum & cibos, præpollenti in eis humorum uitio respondentes. Cæterum siti pressos inextinguibili quandoque uidimus, ex quorū numero etiam mortem oppetierunt, tum qui uiperas dipsadas deuorant, tum qui uino ueteri sese inebriant. adhæc qui in nauigio ob aquæ potabilis defectum, marinam bibere ausi fuerunt. Verùm sitim in febribus placare solet, aspersio ex oleo frigidissimo, uel rosaceo cum impetu salientis modo super caput deturbata. Optime facit ad sitim nigra lactuæ semen commanducatū. item glycyrriza appellata. adhæc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapotium cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor: tragacanthum soluitur ouorū crudorum recentium albumine. & cum fuerit dissolutum contritumque, cucumeris semini prius leuigato adiungitur.

Postquàm emollieris, pilulæ formantur, in umbraq; siccan-
ex his una sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim
a solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorũ,
pirorum, uel mespilorum, uel pampinorum uitis, uel mali
nati succus sorbitioni datur.

De lingua scabritie. Cap. LIIII.

Humectanda est linguæ scabrities, lini seminis decocto
ægris ut in ore teneantur dato: melius autẽ facit myxion
cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum de-
so lingua infricata, aqua puriore abluitur, uel spõgia undi-
q; abstergitur, deinde rosaceo illinitur. iam ipsum rosaceũ
le cõtemperatum, in id ualde efficax est. & portulacæ suc-
in ore retentus. item rhu obsoniorum mulsæ admistum be-
acit, insuper Damascena, & mysclii (hoc autem est myxa)
ore retenta & linguæ circumdata. His adde etiam lactucæ
liculum. Archigenes autem tradit etiam salem indicum,
ore quidem & substantia communi similem, gustu autem
leum, lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinẽ
oratum, uehementer posse humectare. Cæterum in latus
umbere p̄dest, nam supinus cubitus exiccat. item os con-
ere. hiatus enim mādorem absorbit. Sternutamenta porro
erfita, linguas quouis alio plenius humectant.

De nausea. Cap. LV.

Ubi sine cibo assumpto nausea abundus æger efficitur,
cuius licet, arbitror, ratiocinari prauos humores uen-
triculum infestare. Nonnulli uerò turbantur, sed nihil
mūt, humore ipsis tunicis imbibito. Picuitosos itaq; succos
coquere oportet, seruādo ægrũ in quiete, inedia, & somno.
uiores autẽ uomitus eiicit, qui nōnunquā ex prisanæ cre-
re, uel mulsæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuā
desiderāt, quod genus est oxymel, & similia. Humiditate
ẽ praua in tunicis absorpta, picra ex aloe utilis est, uerum
e astringūt, haud mediocrẽ noxā cõciliant, quẽadmodũ rur-
cum humiditas multa citra malitiā inest, astringentia qui-
n quā utilissima sunt: medicamentũ uerò ex aloe in mar-
em perducit. Cũ uerò frigiditas humori adest. astringenti-
misceri etiam debẽt calefaciẽtia. Nota est frigidi affectus,
od neq; sitim, neq; ardorem eo detenti experiantur.

† Hic locus sic legitur in ueteri, ὅταν χωρὶς τῆ προστελευ-
ταιτι ἐμετικὸν νατικῶς ὁ κάμων γίνηται, id est, cum æger si-
ne assumptione eorum, quæ uomitum mouent, nauseabundus
fuerit. Quæ scriptura clarior est.

De bilis uomitione.

Cap. LV I.

Bilem uomentibus cataplasma applicandum ex est pal-
mulis, malicorio, galla, uino incoctis, uel posca, pane si-
mul contrito. Item acacia, hypocystis, balaustium & rhu-
cataplasmati adiungantur. Præter hæc cucurbitula admota ma-
gnificè auxiliatur, cum largiore flamma. Cibum uero frequen-
ter paulatim dabimus. † In his autem qui atram bilem uo-
munt, & inflationes stomachi experiuntur, spongiæ aceto quā
acerrimo calente madidas imponito, uel hederæ folia uino in-
cocta applicato

† Vetus codex hanc scripturnam habet, ἐπὶ δ' ἐ τῶν χολὴν μέ-
λαιαν ἐμούντων καὶ φυσωμένων τὸν στόμαχον καὶ τὰ ἔντερα καὶ
τὴν κοιλίαν. i. in his autem qui atrā bilē uomūt, & inflationes
stomachi, intestinorum & uentris experiuntur spongiæ, &c.

De singultibus.

Cap. LV II.

Singultus oritur uel ex repletione, uel inanitione, uel suc-
cis acrioribus stomachū erodentibus, quibus per uomitio-
nē redditis, cessat. Pleriq; uero medicamentū diatrion pe-
perēon assumentes, si statim uinū superbiberint, singultiunt. Quæ
aut nonnulli etiā cibo intus corrupto singultu infestentur, cui-
libet notū est, iam nō pauci rigore correpti, singultiunt. Vo-
mitū itaq; ijs qui ex repletione, aut rosione stomachi singultu
cruciantur mederi abundè comperimus, calida uero, ijs qui ob
perfrictionē. At quum ab humorū repletione singultus origi-
nem habuerit, uiolenta indiget euacuatione, quam sternuta-
mentum præstat, ob inanitionē uero creatos singultus sternu-
tatio nō finit, datur autem singultientibus ruta cum uino, uel
nitrum in mulsā, uel fesili, uel daucum, uel cyminū, uel gingi-
ber, uel calamintha, uel nardus gallica. Hæc sanè singultus ex
ciborū corruptione, aut frigore, aut repletione cōtracti, auxilia
sunt. qui autē ex frigidorum uiscosorumq; humorum copia sin-
gultum experiuntur, castoreū tribus obolis potui sument ex po-
sca, idem cuti impositū una cum oleo ueteri sicyonio adiuuat.

Insuper

super acetum scillites, uel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, præsens est remedium.

De aluo in febribus astricta, & cita.

Cap. LVIII.

Quæ crescentem aluum proritant, libro priore quantum res exegerit comprehendimus. quoniam uero eadem quoq; liquida febribus incidit, in præsentia-
tum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem præcipitati sunt. Principio igitur excipiemus quæ egeruntur, nullo remedio occurrentes ut quæ à corruptione & cruditate emanent. Sin autem uacuatio modum excedat, cohibenda aluus est, & si quidè acriora efferuntur boni succi esse, & alioquin crassioris cōuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & ptisana sorbitiones. balnea his post morbi concoctionem sunt idonea. Cum uerò pituitosiore & fluida erumpunt, contra sicciore calidioresq; cibi erunt, quatenus febres permittât. Huius generis habentur, quæ ex cōdimentis calidis consiunt. Balneis hi prohibendi si nihil aliud cōpulerit. Porro ubi cōcoctrix facultas infirmatur, astringentibus tū cibis, tū remedijs utendū est: cibis sanè, in quibus maximè malum granatum, aut mala cydonea, aut pira, aut mespila sint iniecta, uel etiam hispis, & uino tenui odorato astringente: remedijs autē cataplasmatibus, nimirū ex polenta, palmulis, absinthio, rosis, myrtis, & cōsimili materia. Cæterum considerandū uenit, quibus potissimū particulis cataplasmata debeāt imponi. dico autem stomacho, aut imo uentri: nonnūquam & circa lumbos applicamus. Cruentitas autē excretiones reprimunt ex thure cōfecta, desiccantq;, uel subtilior portio polentæ cū thure, uel manna uino macerata, uel posca. Porro acriorē humiditatem etiā iniectione per aluum, edulcare cōpetit, nunc ipsa aqua, nunc ptisanæ cremore, uel chondri, uel oryzae, uel tragi, idq; nō semel uerū sæpius. Postea uerò adiunguntur etiam rosæ siccæ, uel myrti. nonnūquam & gallæ, & ouum simul cum rosaceo uinoq; tenui astringenti, uel rosarum decocto inditum uel sedi quoq; subiectum excernenti cupiditates retundit. Cum frequens desidendi est appetitus. Agathium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immitatur.

*De sanguinis distillatione, & eiusdem ex naribus
profluio. Cap. LIX.*

Quoniam sanguinis distillatio totius corporis, aut capitis redundantiam innuit, per contusionem, uel densitatem eueniens: largior autem excretio habilis est laxare & minuere copiam, ratioq; est inde ipsam moliri, unde natura proclinauerit, his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus thyphe, ut mos est, narium uasa conuulnerare: oportet autem non exiguo fluore contentum esse, sed pro uiribus detrahare. Spontanea uerò in febribus per nares sanguinis profluvia, si in crisi fiant, excipere cōuenit. sin autem sanguis immodicè erumpat, sistere conandum est. Primū itaq; extremæ partes ualidè deligabuntur, æger sublimi capite figurabitur. Videtur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profluvia cohibere, æger non expurget narium foramina, neq; locum irriter, uerū sanguinē concrecere sinat. nasus spongia, quæ in posca inaduertit, refrigerescat, ac obturamen ex panniculo naribus profluentibus demittatur, medicamento quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam curationem inter remedia unicuiq; loco affecto conuenientia libro subsequēti uerbosius persequemur.

Si anima deficiat. Cap. LX.

Qui ex cholera, alui profluio, aliisq; multis, & uniuersim factis uacuationibus, resoluuntur, ijs aqua frigida aspergitur, & nares cōprehenduntur, os uentriculi in-fricatur, uomitus præcipitur, sto machus turbat, uel digitis immisissis, uel pinnis. præterea pluribus uinculis ualidè deligari debent. Cū per imas particulas uacuationes sunt, brachia: cum per superiores, crura. Cæterum sanguinem fundentibus prospicienda est & figura sine dolore sursum uergens, & cucurbitula defigetur, quæ ad particulas retrahat situ contrarias uacuationem experiūtibus. Curat etiam uinum aqua temperatum resolutiones ex subitis uacuationibus ortas, nisi uiscerum inflammatio, aut uehemens capitis dolor, aut mentem turbans aliquis affectus, aut febris ardens, in cruro morbo prohibeat: in his siquidem magna uinum adfert incommoda. Et si æstus fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigida æfluuerit, frigidum uinum

uinum exhibebitur. sin contraria euenerint, calidum. At si ex
 sudoris copia anima deficiunt, cutis densanda est, quemadmo-
 dum à nobis prius est dictum. Tum ut frigidus aeris perfla-
 tus accedat, prospiciendum est. Porro in uentriculum deflu-
 xionibus nihil horum conuenit, præterquàm ipsi uentriculo sto-
 machoq; corroborantia ad mouere, & affectos in balneum du-
 cere. Hoc siquidem illiusmodi fluoribus est accommodatissi-
 mum, uerum sanguinis profluvia, & sudores uehementer pro-
 ritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, uino ciboque
 abstinebunt. item balneis, si febricitent. Potio autem mulsæ da-
 tur, in qua uel thymus, uel origanum, uel pulegium uel hyssop-
 um sit incoctum. Propitium uero iis est & oxymeli. At si
 propter humores uitiosos in stomacho contentos anima de-
 fecerit, iubendi sunt uomere ab hydrelæo, digitis aut pinnis in
 os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleum quam lau-
 datissimum ipsis propinabitur. hoc enim & aluo ex inferiori-
 bus partibus infusum, subinde uacuat. Iam uero absinthium ip-
 sis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem dis-
 soluantur, iis uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti antea
 in capite de eodem comprehensum est, summaque perfricare
 oportet. Exusti in sole ad balneum ducuntur: qui perfrixe-
 runt, medicamen diatrion pipereon, ipsumq; piper assumant.
 Qui uero ob caliditatem largiorem, æstumue, aut lentâ in bal-
 neo moram animo deficiunt, curantur frigida aspersa, & si ad-
 uentum conuertas, stomachi frictione, uini cibiq; usu. Sin au-
 tem propter inflammationis magnitudinem, aut febris mali-
 gnitatem in accessionibus animus deliquerit perfrigescantq;,
 artus fricare ualenter iubeto calefacere & deligare. Adhæc ui-
 giliæ in ediamq; præcipito. Ea uerò & ante accessionem fa-
 ciunda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficit, duabus tri-
 busue horis ante accessionem, cibus offeretur, uel chondri cre-
 mor, uel panis ex aqua simul cum malignaui nucleis, aut ma-
 lis, aut piris. Si autem magni periculi metus sit, etiam uinum
 dabitur. item iis qui subito animam perdunt, his remediis suc-
 currendum est, ac ubique causam considerare conuenit, pro-
 pter quam animæ defectus accidat, atque contra hanc pu-
 gnandum est. Nonnunquam uero & symptomatis maior ha-
 benda est sollicitudo, nempe cum periculum, uel etiam mor-
 tem minatur.

*Quomodo ulcus circa os sacrum proueniens
curetur. Cap. LX.*

ET hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno
decubitu superuenit. Cum itaq; sacri ossis regio incipit
rubescere, circulum ex lana iustæ magnitudinis, parti
subijciemus, postea rosaceum, uel myrteum ceratum,
quod argenti spumam, aut cerusam habeat super-
accommodabimus. Inflammatione autem
oborta, cataplasma ex pane cum solano,
uel polygonio, uel plantagine, uel
tenera brassica applicatur. Si
ulcus serpat, lenticu-
la cum malicorio
in star cata-
plaf-
matis induci-
tur.

**FINIS LIBRI SECVNDI IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.**






PAVLI AEGINETAE

LIBER TERTIVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.

DE PILORVM AFFECTIBVS.

De alopecia, & ophiafi, & caluitio. Cap. I.



VE MADMODVM stirpiũ nonnullæ succi defectu inarescentes contabescunt: nonnullæ uero alienis à natura sua humoribus infectæ: emarcent, haud dissimili ratione id ipsum quoq; pilis usu uenit. Etenim Caluitiũ, humidi penuria fieri cõsueuit: prauitatẽ aut, uitioq; succi, Alopecia, & Ophiafis, figura tãtũ inter se differẽtes. Qm̃

in Ophiafi, partẽ oblesam, serpentis modo glabrã, ostendit alopecia, q̃ uulpes cõtinuẽ infestet, sic appellata est. Itaq; coniecturã de humore, qui superat, ex cutis colore facientes, uacuationẽ medicamẽto purgante prius moliemur: deinde loco uitiatõ auxilia inducemus. Si igitur color ad nigrius, albidiusue muratus fuerit, Antidoto Hiera quod pituitæ educẽdæ, humoriq; melancholico est. utemur: sin ad pallidius, catapotia ex aloẽ exhibebimus: singulorũ aut̃ ipsorũ descriptionẽ in lib. de medicamentis cõpositis inuenies. Vbi corpus iam totũ inanieris, medicamẽti quod pituitã per os extrahit, apophlegmatismõ Græci uocãt, usus erit, ex aceto, sinapi, & melle: isq; nõ semel,

uerum

uerum crebrior. Satius autem fuerit, si etiam in aceto origanū uel pulegium, uel thymus, uel hyssopū cōmaduerit. Cæterum in aliis quoq; capitis affectibus eadem utemur curandi ratione: primum humorem, qui præpollet euacuantes, uel purgatione, uel etiam sanguinis emissionē, si eius subest redundantiā, dein ad præsidia quæ parti extrinsecus iniiciuntur, transgredi conuenit.

De alopecia.

CVis nitro confricata, linteoq; aspero, lanæue potius deterfa, & iterum defricata, adeo ut ruborem contraxerit, uerbena in Sole ex aceto detrita, illiniē. Aut alcyonio primæ asperitatis combusto, reductoq; in puluerem cū oleo ex lucerna inungitur. Aut arūdinis radix, aut amygdalæ amaræ cortex torridus, oleo, uel adipe ursina exceptus inducitur. Hæc itaq; sunt mitiora medicamina, uerum ex euphorbio, thapsia, & adarce, oleo leuigata laurino, uel pice liquida, uehementiorē uim repræsentant. **ALIVD.** Erinaceorū marinorū testa ignē experta cū adipe ursino excepta, loco prius nitro exterso illiniē. **ALIVD.** Piperis, stercoris ouilli sicci, erysimi, arucæ seminis singulorū drachmæ quatuor, ueratri albi drachmæ treis, murium stercoreis drachma. Excipiuntur felle taurino, aut hircino, aut suillo.

Aliud experientia probatum ad alopeciam.

MAndragoræ, radicis, mali terræ, ari radicis, ceræ, picis liquidæ singulorum uncia octo, axungia porci subrumis, neriæ herbæ medullæ modicū. Axungiam, & neriū incoquito, donec herba intabescat: deinde exēptam proiicito: & reliqua axungia adiungito, incoquitoq; mox ceram, & picem liquidam. Vtitur in sole audacius. Vbi iam ulcera ad cicatricē uenerint, caput uulpeculæ urito, & alcyoniū, anchusæq; nigrae folia omnia contrita super inunctioni inducito, ut capiti pili succrescāt. **ALIVD.** Muris capitis combusti pars una, testarum marinarū tantundem, cū axungia porcina. omnia in fictili coctis utitor inspergens etiam ex ipsis siccis aliquid.

Medicamentum ex thapsia ad omnes inueteratos affectus.

EVphorbii, thapsiæ, baccarum lauri singulorum uncia, sulfuris ignem non experti semuncia, ueratri tantundem, ceræ uncia sex, laurini, uel ricinini, aur ueteris olei quod

quod satis est. In ualidioribus etiam uti uincit nasturtij uncia, alcyonij combusti uncia : iisq; nō solum ad Alopecias, uerum etiam ad omnē diuturnam perfrictionem. Summatim in Alopecij cutis prius nitro est extergenda, infricandaq; , & frequenter pili nouacula radendi. Si quidem perisq; noui ex sola infricatione, frequentiūque rasura pilos prouenisse.

Quomodo caluitium abigatur, & pili crescant.

Ex Critonis commentationibus.

LEPORVM uentriculi quinque arefacti diligenter olla fœtili friguntur. His adjicito, myrtorum, myrti summatū, acaciæ fructus, acaciæ succi, rubi canini, æqualem modū, adianthi uncias tres. Hæc omnia accuratè resiccata in pollinem coguntur, & subtili cribro incernuntur: deinde adipis ursini libris quatuor, & phocæ totidem admistis denuò tunduntur. Excepta pixide plumbea reseruantur. Cum usus postulat, quolibet oleo aromatis imbuto diluuntur.

Quæ pilos conseruent.

POLYTRICHI hærbæ pars una, ladani partes duæ, uino myrteoq; oleo exceptæ in usum adhibentur. **ALIVD.** Anemonæ flos tritus cum oleo inungitur: idem uerò, & nigrefacit. **ALIVD.** Verbenacam rectam unā cum radicibus torrefactā, rufamq; tenui cribro incernito, mixtam oleo ut sordium habeat spissitudinem æreo uase reponito. Cum liquefeceris, utitor inuicem olei similiter.

Aqua pilos augens, eosdemque denigrans.

AQUÆ pluuiialis sextarij sex, rhus alexandrini sextarij tres, polytrichi uncia quatuor, hærbæ sabinæ tātundem, ladani uncia, myrti uncia, cucurbitæ aridæ tantundem. Si nito ad dies uiginti uitreo uasē cōmadescere, bis mouens quotidie rudicula tedacea. † In sequenti tempore in aquam pilos singulos tingens, utitor quotidie. Item semen althææ in balneo illitum pilos conseruat, augetq; . pari modo oleum inunctum, in quo semen ipsum althææ decoctum est, uel simul impositum.

† Vera scriptura est in antiquo cod. τῇ δὲ ἐπιδομὴ κατὰ βάπτανδς τὸ ὕδωρ τὸν κτένα χρω καὶ ὅτω πόκει καθ' ἐκάστην ἡμέραν, id est, in sequenti die pectinem in aquam intingens utere, atque ita fac quotidie.

Quæ

Quæ medicamenta pilos extenuent.

Ficus foliorū, uitis agrestis albæ corticis, pumicis, testarū buccinorum, terræ cimolix singulorum mina. Omnibus in nouam, crudamq; ollā coniectis, lutoq; oblitis, in camino coquito, tertioq; adiciens aphronitri minæ semissem, gallas immaturas numero triginta. In puluere redacta excipito, ac utitor. **ALIVD.** Aphronitri minæ septē, pumicis tosti minę quatuor aluminis fissi, iridis siccæ, myrti syluestris nigræ, gūmi, bryoniæ radicis singulorū drachmæ quatuor, lupinorū crudorū in pollinem detritorum, congi pars quarta: Vtere absque pingui.

Ad fluentes pilos.

Aloe ex uino nigro austero illinitur, uel purpuræ tegmina ex oleo cocta, uel myrrha, & ladanum cum uino, myrteoq; uel caprillum stercus in testa combustum ex oleo leuigatur ac cuti prius rasæ inungitur.

Quomodo pili crispi fiant, & tincturis inficiantur, ex Cleopatra libris, quos de capillis crispis faciendis prodidit.

Cap. II.

Capite prius deterfo, spondyli radix cū mero pilis inungitur. **ALIVD.** Nux pinea recens ad cinerē usq; comburitur, iniectaq; pilæ teritur, myrteum unguentum superinfunditur, donec mellis fiat spissitudo. Atq; sic pili raso capite absterfoq; delinuntur. **ALIVD.** Myrti, & betæ pari mensura cum oleo pilos abstergens utitor. **ALIVD.** Gallæ uiginti numero, adianthi unciz duæ ex aqua marina in mellis crassitiem coactæ inducuntur, sed pilo urina prius deterfo, uel lixiuio, & aqua calente abluto, oblinetur medicamentū ad biduū, per quod ubi ipsum retinuerit, tertio die ablui debet, piliq; resiccati myrteo inungi. Id tenerū crispumq; & nigrum efficit capillum. At si prius caput nouacula raseris, crispior euadet.

Quæ canos arcent, & eosdem denigrant.

Olei, quod immaturæ oliuæ fuderunt sextarii tres, spicæ nardi drachma, unguis odorati drachmæ quatuor, iunci rotundi floris tantundem: incoquantur cum oleo. seorsim habebitur. Acaciæ succi uncia una, uino soluta leuigataq; diligenter. Vbi uero tertia pars olei fuerit relicta, hanc per colato, & acaciæ mixtā in fidelia excipito, ac utitor quotidie pilos inungens. **ALIVD.** Nucum uiridium corticis uncias tres, ilicis ra

dicis tantundem, uini nigri sextarios tres, ad tertias decoquūto, ac ubi id quod reliquum est, expresseris cum olei myrtei sextario iterum subiges, usus eius quotidianus.

Aqua pilos denigrans.

GAllæ sextarius unus, thus coriarii sextarii duo, myrtinigræ totidem, cyperi foliorum æqualis mensura, cinaræ manipulus, papaueris nigrorum in floribus capitulorum tantundem, aquæ lacustris sextarii duodecim. Omnia multis ante diebus macerata, ad tertias decoquuntur. Deinde illinuntur, absterfis, ficcatisq; crinibus. Ac cimoliæ terræ acetabulum cum uiua calce pari mensura inungitur. Hæc autem succo betæ elixæ soluta illinuntur. Deinde betæ folia tegminis gratia super accommodantur. ac ubi satis adhæserint, in balneo abluuntur.

Vt ruffi capilli tingantur, & flauescant.

MYrrhæ pars una cum salis floris altera, accuratè teritur. Ubi sordium facta est crassities, caput prius detersum medicamento inungitur. siniturq; per noctem, & diem, postea tunc ablui præcipies. **ALIVD.** Lupinos crudos cum aqua illinito. **ALIVD.** Argenteæ spumæ drachmam, terræ creticæ drachmas quatuor, calcis uiuæ drachmā. Ex aqua mellis crassitiē faciēs inūgito, & betæ foliis adiectis ad duos, tresve dies abluito.

Vt pili nigri flauescant.

FLoces uini in balnei sordes mittuntur, & spissitudine cerati facta sub somnū illinuntur, & mane pili flauescunt. **ALIVD.** Cyperi folia succo herbæ lanariæ fruticis madescunt. Et diluito uteris.

Quæ capillum reddunt colore aureum.

ALuminis, sandarachæ, singulorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctores utuntur, Romani uocant herbam rubiam, drachmæ octo, è cinere lixiuii quo pilearij utuntur sextarii quatuor. Lixiuuium cum thapso confusa incoquito. ubi dimidia portio relicta fuerit, humorem exprimito quo alumen, sandaracham, & crocum dilues. Deinde uase uitreo condes. Vbi usus uenerit, pilos prius absterfos illinito. postquàm uerò combiberint, ablues decocto fœnugræci, hordei, & cumini, aquæ prius tepidæ superfusa, quod sufficit, adhæc saponis quantum satis est adicies. **ALIVD.** Flores uini ustæ unā cum oleo balanino, pilis oblinuntur.

nuntur. **ALIUD.** Saponē gallico cum aqua in singulis balneis pili absterguntur.

Aliud ualde generosum.

RHYS rubri sextarius, gallarum libra una, Selydri unciae duae, herbae aurū colore imitantis (quam Romani rubiam uocant) unciae duae, polytrychi fasciculi duo, absynthij unus, lupinorum quibus cortex sit detractus cyathi duo, aquae sextarij septem. Omnia in uitreum uas coniecta, dies nouē finito comadescere: quotidie bis rudicula agitans cum usus exigit, auferes quod satis est. & hoc spongiā madefaciens, pilos confricato, humectosq; combibere finito, ubi siccati fuerint, saponē calida aqua soluto, abluuntur.

Quae pilos albos faciunt.

VERBAsCI candidi flos combustus aceto mergitur, & in saponem miscetur. **ALIUD.** Verbasci seminis, aluminis, raphanorū corticis singulorum drachma. Contundito, & glutini quod ex tergoribus boum confit, ταυρακάλαν Græci uocant, drachmas quatuor misceto.

De capitis affectibus cutem infestantibus, porrigine, quæ pityriasis dicitur. Cap. III.

PORRIGO, quæ pityriasis Græcè dicitur, est, cum tenues, & surfuraceæ squamulae ex capitis, uel etiā reliqui corporis superficie citra exulcerationem resoluuntur. Id autē euenit uitioso corporis humore, salsaue pituita, aut bilioso, & melancholico sanguine caput subeunte. Itaq; corpore toto (ut dictum est) euacuato, subscriptis remediis utemur. Cimoliam aqua prius maceratā betæ succo miscebis illinesq; & tantisper ita permittes, donec inaruerit. Deinde postquam ablueris, thus ex uino oleoque detritum perunges: die in sequenti staphida agriam, hoc herbam pediculariā ex oleo inunges. **ALIUD.** Nitri, fecis concrematae, myrobalanorum, singulorum libra, herbae pediculariae libra una semis uino dilutis caput abstergitur. sin autem reliquum corpus pruritu uexetur, siccis. Ad humidiores uero pityriasim, muria, uel lupinorem decocto caput abluendum est, hoc enim subinde sum expertus.

Ad psydracia & exanthemata capitis.

PSYDRACIA exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata uero cutis

cutis sunt exulcerationes, subrubicundæ, & asperæ. Vtrunque vitium præsidij infra positis exteritur. Argentæ spumæ, cerusæ singulorum drachmæ quatuor, aluminis drachmæ duæ, rutæ foliorum uiridium toridem. ex aceto myrteoq, oleo leuigata cuti illinuntur. **ALIVD.** Ruta & alumen cum melle trita, capiti prius raso inunguntur. Sin autem cutis à capite abscedit, oleæ folia elixa cum melle cataplasmatismodo inducuntur. **ALIVD.** Argenti spumæ, cerusæ singulorum drachmæ duodecim, sulfuris uiui drachmæ octo, cerato myrteo excipiuntur.

Ad hircuscula capitis densa rubraque.

Hæc papillis sunt similia, ex quibus sanies eliquatur. Capite prius nouacula raso, & aqua nitroque absterfo, sulfure uiuo ex hominis urina contrito utitor. Vel cretam furoriam *μελαυτρίαν* uocant Græci, cum aceto inungito.

*De manantibus capitis ulceribus, quæ acores
græce dicuntur, & fauis.*

Inter capitis uitia, quæ in cute oboriuntur, unum est quod appellatur Græcis Achor, à nostris manantia ulcera, tenuissimis cutem foraminibus perforans: per quæ glutinosa fertur sanies. Simile ipsi malū specie est, quod à faui similitudine *κίτριον* à Græcis nominatur, quod magis amplis foraminibus constat, quibus humor crassitudinem mellis referens sicut in apium fauis, continetur. Origo est ex nitrosa salsaque pituita. uictus igitur ratio ex cibis boni succi constare: omnia acris & salsa uitari debent: præsertim si inflammationem affectus respiciat. postquam corpus superfluo decenter erit leuatum, derasis capillis caput fouendum bis terve die, aut etiam sæpius, aqua calida, in qua myrtus sit decocta, uel rubus, uel lenticula, uel amari lupini, uel asparagi radix. Quum uerò plus saniei emanat, salicis folia cum aqua, uel lenticula, instar cataplasmatism applicantur. terra autem cimolia uel cretica, uel samia, uel pompholix, uel spodium, uel argenti spuma, uel cadmia, uel charta combusta, uel etiam medicamentum ex charta. Xerion, omnia ex aceto inducuntur. Smegmate uerò hoc utendum est, sulfure uiuo, & perdicij herbæ, saponisq, æquali pondere. Composita hæc sunt, argenti spumæ drachmæ duodecim, rutæ foliorum drachmæ octo, herbæ pediculariæ quam staphida agriam Græci uocant, drachmæ quatuor, chalchanthi drachmæ duæ. Aceto

PAULI ÆGIN. h myrteoq

myrteoq; in sordium spissitudinē coacta illinuntur. ALIVD. Sandicis drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ quatuor, sulphuris ignē non experti pondo drachmę duæ, pollinis thuris drachmæ quatuor, ex oleo ueteri inunguntur.

Aliud ad achoras.

Ad achoras recrementū argenti, uel molibdenam contritā oblineto. ALIVD. Ad achoras & humiditas scabies, rhododaphnæ, rosarum uncie quatuor, sulfuris uiui uncie quatuor, picis liquidæ, & picis aridæ utriusq; uncie tres, cerę selibra, olei myrtei quantū opus est. in pueris autē, lacte soluta illinuntur.

De fisis.

Ficus, nominant eruptiones, ulcerosas, rotundas, subduras, rubentes, quas dolor etiam comitatur. Fit uerò hoc malū plurima ex parte in capite, nascitur tamen & in reliquo corpore. Probatum maximē contra hos alumē fissile, æris flos tostus, & glutinum pari mensura cum squamæ æris duplo. Teruntur ex aceto illinunturq; . Præstans etiam remedium est menarum capita, combusta, elixiquē bulbi, & cinis aceto mixtus.

Aduersus capitis & menti ficiosa exanthemata, xyraphium.

Misyos drachma una semis, chalcitidis drachmæ duæ semis, squamæ æris drachma, aluminis fissi. drachma. Bene loto, hoc medicamen aridum impositum dimittitur. Die in sequenti rursus pars lauatur, spongiaq; deterfæ idem applicatur. Decidit enim ramentum crassissimum. Et si diebus subsequētis idem fiat, sine cicatrice breui confanescit. Cæterum medicamen hoc non mediocriter adhæret.

Ad capitis pediculos.

Lvpinorum in aqua coctorum diluto, caput detergeri iubeto: uel herba pedicularia, uel sandaracha, uel utraq; contrita ex oleo ueteri, seu aceto illinitur, uel piperis momentū, ne exulceret cū oleo, aut hederæ succo cū melle, † aut minio synopico cum aceto, aut cedrino liquore, aut pice liquida cum alumine, aut baccarum lauri expresso, aut oleo raphanino. Ego pediculariam ex aceto oleoque tritam inunxi, ac semper quod uolui, sum affecutus.

† Græcus codex manu scriptus ἡ σινιπιδ, id est, uel sinapi cum aceto, quæ scriptura uerior est.

*De capitis dolore, quem græci κεφαλαλγίαν
uocant. Cap. IIII.*

Capitis dolor qui græcis dicitur κεφαλαλγία, symptoma est grauissimū, ac nunc ex sola intēperata qualitate oritur, nunc ex nimia humorū copia. Interim ex utraque causa: interim uero ex primaria causa, nēpe solis æstu extrinsecus, frigore, ebrietate, aut ictu. Vehemētissimi igitur capitis dolores ex efficiētibus qualitatibus nascūtur, & potissimū ex calida: qui uerò ob siccitatē cōtrahuntur, nō æquē uehemētes existunt. Humida qualitas sui ipsius respectu, nullū plane dolorē cōciliat, nisi caliditati, aut frigori, aut humorū copię adiuncta. Itaq; de eo capitis dolore qui cū febris est eo loco explicatum est, quo febriliū curatio exposita est nūc de cæteris dicēdum est.

De capitis dolore ex insolatu contraçto.

Qui ex insolatu capite dolēt, eorū cutis tactu calida est, & primo statim manus iniectu aridior apparet: oculos habēt rubētes, frigidis asperginibus, & inunctionibus oblectantur, sentiuntq; ab ipsis præsidium. Cæterū curatio his conueniet, etiā ea, quā dolori in febribus præscripsimus. Si dolor perseuerat, infrascriptis utēdū est cataplasmatibus. prodest frōti & tēpibus inductus panis ex posca, & rosaceo. Interdū cū amygdalis, uel rosīs, siccis, aut teneris, uel cū mentha cui pulegiū sit adiectum, uel panis cū persici folijs facit ēt ocymū ex aceto & rosaceo tritū, uel hederæ corymbi in aceto elixi. Iā farinā triticeā cū rosaceo leuigatā, uel serpilli ex aqua decocto miscere cōuenit, uel cardamomū torridū leuigatumq; ex aceto & rosaceo: uel fermentū cū rosaceo, uel iridē aridā cū aceto. Sed mutantur contine singulā: nam si diutius adhæreant, inefficacia redduntur.

Pastilli ad capitis dolorem ex intemperie calida.

Crocī drachmæ quinque, chalchanti drachmæ decem, aluminis drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ septem, omphacij drachmæ tres, chalcitidis drachmæ tres, gummi drachmæ tres. Vini austeri quod sufficit. Ex posca sumuntur. Sin etiam uigiliæ infestent, aliquid ex somniferis applicatur.

De ijs quibus caput ex frigida intemperie indolescit.

† **A**t si frigus nocuit, cōtraria ijs qui ex solis æstu dolēt, affectos signa testātur. Etenim facies ipsorū non cōcidit.

sed colorē decoremq; amisit. Item frigidis nec gaudent, nec iuantur. Verum horū agnitionē tum uictus ratio, tum reliqua concurrētia firmabunt. Inunctiones igitur adhibendæ ex oleo rutaceo, laurino, uel irino, uel nardino, uel etiam opobalsamo, præsertim si recrementa fuerint crassiora uiscosaq; . Frons autem cū hoc liquore, tum ijs medicamentis debet illini, quæ ex pipere, & euphorbio præparantur. Vinū subtilius propinandū: corporis motione & balneis uti calidis præcipiendum, interim à radícula uomitu. In quibus autē qualitas citra humorū copiā diutius persistat, hoc utendū est medicamine. Piperis albi drachmæ duæ, crocomagmatis drachmæ duæ, euphorbij recentis drachmæ octo S, stercoris columbini drachma una S, aceti acerimī quantū satis est. Illinitur pars laborans, sed prius infricata.

† Locus hic sic legitur in ueteri græco exemplari. τῶς ἐπὶ ἐγκαισὶ κεφαλῇ ὅσιν ὑπεναντίας ἔχει τὰ τε σημεῖα, καὶ ἡ διαίτα τῶν ἐπὶ ψύχει. idest, signa & curatio eorum, quibus caput ex frigore dolet, sunt contraria signis & curationi eorum, quibus caput ab æstu dolet.

Si biliosus humor dolorem inuexerit.

NOtæ horum persimiles ijs, quos ob solis æstum dolor affligit. Sed maior ipsis rosio accedit, & faciei pallor. interim etiā os ina marefcit. Porro affectus hic ætatibus potius uigentibus, & tēperaturis calidioribus, uitę sollicitę, & bilem flauā coaceruantibus solet accidere. Quamobrē balneū temperatū his, in unctiones, aquæ potus, & uniuersa uictus ratio humidior, bonique succi adhiberi debet. Biliosus humor absynthij diluto, uacuat: uel aloë, aut ipsa Picrā, antidoto per se, aut cum modica scāmōniā, aut catapotijs quæ ex aloë constant. Inungenda frons, aut crocodi pashillo, aut trigono, aut quodā simili.

Si caput consortij lege indolescat.

SI caput consortij lege cū toto corpore afficiatur, cura adhibenda, ut contra intemperiem, & superantem materiam pugnemus & si copia quidem premit & maximē in uenis, sanguis mittendus est: sin autem magis qualitas urgeat, purganti utendum medicamine. Quod si particula laborante aliqua simul condolescat, ueluti iocinore, aut uentriculo, aut stomacho, his succurrendum est. Vbi calida afficit intēperies, panis ex aquoso uino

fo uino exhibetur, uel etiam ex chondro forbitiūculæ. Extrinsecus uincit superfundere, quæ modicè refrigerent, uiresq; conseruent, sicut à me prius cōprehensum est. At si glutinosi, crassiq; humores in stomacho infarcti, capitis dolorem concitent, hos quoq; amoliamur potu oxymelitis, tum simplicis, tum Iuliani. Insuper medicamentis ex hyslopo & origano, & his adhuc calidioribus magisq; incidentibus. Iam uomitus à radícula utilis, superfusiones calidiores, & cataplasmata.

De capitis dolore ex uino.

SI uinum adhuc incoctū in stomacho fluctuet, repentis aquæ potu uomere dolentem iubebis. Quod si etiam post concoctionem caput indoleat, refrigerantibus, repellentibusq; utemur, quale est rosaceum priuatim sumptum, & cum aceto, uel hederæ succo, uel brassicæ. Quin & ipsa brassicæ folia in aquā calidam demersa, & capiti circumdata ligataque, naturaliter ebrietatem arcant. eiusdem decoctæ eius in id efficax est. Item lenticula hos adiuuat, potissimumq; uētriculo humidiorē præditos. Adhæc alicia, malicorium, & mala ipsa, piraq; , tum aquæ potio, utiliter assumentur.

De capitis dolore ex ictu.

QUod si ex ictu capitis dolorem conceperunt, iis, nisi summa omnino cute percussi sint, sanguis statim emittendus est, & conuenientes aspergines capiti sunt adhibendæ. Oleoque dulci irrigandum ipsum sanisq; contegendum. Vino cibosq; pleniori, præsertim si febris adest, ægros coercere expedit. Et tota curatio ceu ad neruosarum partium inflammationem & præcipuè membranarum cerebri quas meningas appellat, adaptabitur. Si uerò & uulnus factum fuerit, huic quoque decenter medebimur.

Malagma ad capitis dolorem.

CERÆ drachmæ septem, amygdalini olei uncia tres, terebinthinæ drachmæ octo, æruginis rasæ, cinioliæ, chalcitidis singulorum drachmæ quatuor, pumicis drachmæ tres, æris usti, squamæ stomomatis singulorum drachmæ duæ. Si uidetur paulo esse durus, amygdalino emolliendum.

De cephalæa, & hemicrania.

VTERq; hic affectus, stabilis ac permanens capitis dolor est, qui strepitu, clamoribus, claritate lucis uini potu, & implē-

tibus caput odoribus excandescit ex acuiturq; . Ac alijs totum feriri caput in hoc dolore , alijs alteram ipsius partem dūtaxat excruciaci uidetur, quos etiam hemicranicos nominant. Quibus sanè intra caluariam malū consistit, ijs dolor ad oculorum radices porrigitur : quibus extra est, circa ipsam caluariam indolefcunt. Quapropter dolores cum grauitate molesti, plenitudinem testantur cum erosione infestantes, uel humorum, uel uaporum acrimoniam : qui cum pulsibus obueniunt, inflammationem : qui cum tentione, si quidem grauitas & pulsus nō adfit, spiritus tenuis, & flatulenti redundantiā innuit, si cū pulsu, membranosaē partis inflammationem : cū grauitate uero, copiam intra membranas cōtineri. At si putridus etiā humor, calidior euaserit, & cum febris simul capite dolitant : febriunt autem omnino, & quibus inflammatio dolorē parit. Quū igitur corpus totum succis æquabiliter omnibus redundat, quod plethoricum dicitur : uenā secare si uires pariantur, & acrioribus, uti clysteriis conuenit. Inde si adhuc sanguis uidetur exuberare, etiam uena nariū adaperita, quantum satis esse uidetur, detrahes. Mox hiera, quam exacueris, intenderisq; exhibēda, deinde pituitæ eductionibus, apophlegmatismos uocant, utendū est, tum ijs quæ per nares uacuant, ἐξέλινα græcis dicuntur. Eiusmodi est elaterij succus cum lacte infusus, uel etiam aridum elateriū inspiratum, succusq; cyclamini & porri. Hæc quæ sequuntur, sunt composita. Medicamentū quod naribus inditur ad ueteres cephalæas lippitudines & morbos comitiales, melanchij drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ quatuor, elaterij drachmæ quatuor. Tūsa, oleo sycionio, uel irino, uel cyprino excepta, ut cerati fiat spissitudo, narib. demittunt.

*Medicamentum quod pituitam extrahit,
naribus inspiratum.*

Cyclamini sicci drachmæ octo, nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem in uicem nitri elaterium indideris, magis proficiet. Tritum accurate calamo scriptorio naribus inspirabitur. Porro epithemata quoq; capiti admovento, & inunctiones : ubi morbus in netustatem magis inciderit.

Epithema ad cephalæam.

Vnguenti irini, peucedani, castorei singulorū drachma, baccharum lauri drachmæ duæ, rutæ summitatum drachmæ quatuor.

quatuor. Excipitur cerato rosaceo, rasq; capiti, toti ipsi imponitur. Mulier quædam in hemicranicis hoc etiam quod sequitur epithemate usa, mirandū in modū inclauit. Radicē cucumis sylvestris uiridem minutim cōcisā, absinthiumq; cum hydrelæo incoquebat: dum intabescerent. Ac hydrelæo calente mediocriter partem affectā irrorabat. radicē uero & absinthium, in puluerē contrita oblinebat. Atq; hoc solo medicamini hemicranicos, id est, altera capitis parte dolentes, & cum febre, & sine ipsa, curauit. At si malum maximè increuerit, ut dolorem ferre nequeant, utitor medicamenti etiam quæ lenire possunt, & noxia euocare, quale est quod sequitur.

Vnguentum ad cephalæam.

Liquoris peucedani drachmæ sedecim, lachrymæ papaueris, anisi, alterci quod hyoscyamū græci uocāt, croci, myrrhæ, scamonix singulorū drachmæ duæ. Aceto excepta in pastillos coguntur. Cum usus postulat, ex aceto uel posca illinūtur iis, quibus humores crassi, uel spiritus flatulentus dolorē fecit. Iā dropax & sinapismus iisdē benefacit: & pastillus ex taphia. Iā qui ex atramento scriptorio fit mirificē eidē causæ medetur, quo post hæc utendum est sicut in opere de compositis docebitur. Quin & istud mirabilem in modum ad hemicranicos ex crasso glutinosoq; humore dolentes efficax est. Euphorbij portio una cum pari castorei modo aqua excepta auriculæ demittitur qua parte indolescit, inde balneū adeundū, ubi paululum immorati ipsum assument, & cōsuetō more lauabunt. Sic quidem expertum est, uerum non alienum absurdūq; fuerit, & oleo ipsa excepta, in aurem instillare. Item quod medicamē ad coxendices inscribitur, etiam longo capitis dolore laborantes, & hemicranicos ex toto per sanat.

Ad hemicraniam ueterem.

Alliorū drachmæ quatuor, ceræ drachmæ duæ, axūgiæ ueteris drachmæ duæ, cātharidū drachmæ duæ. Vesperi illicum finito p noctē adhærere. Mane rupta papula, malagmate, quia liquidū est, καρυγδόν appellāt, ei medebris ALIUD. Baccarū lauri qbus cortex sit ablati, drach. duæ, rutæ foliorū, drach. duæ, sinapios, drachma Aqua dilutū oblini. At iis q frigori patuerūt, utilissimū est infra scriptū medicamentū ut plerūq; semel ante balneas illitū, confestim affectui medeatur, & ægrotātes

omnino sani post lauacrum euadant. Olei sabini pondo, ceræ quadrans, euphorbii uncia. Hoc dimidiæ frontis partinempe qua temporum musculus habetur, delini debet. Qui uero frigoris iniuriam non senserunt, ijs gallæ, & crocomagmatis parē portionem cum uino detritam iniugito. Sed qui ex calidis uaporibus, uel succis capite dolitant, ijs medicamēta quæ euphorbio constant, non applicabis.

Apophlegmatismus, id est, medicamentum quod saliuam mouet contro cephalæam.

Sinapeos contriti & in succū redacti ex aceto & melle drachmæ quatuordecim, herbæ pediculariæ drachmæ quatuor, pyrethri tantundem. Tusa, cribrataq; misceto, & in sole gargarizato. Porro si ob biliosum humorem, aut quandam intemperiem orta Cephalæa diutius prorogetur, eorū usu ueniet quæ in sermone de dolore capitis cōprehensa sunt. Si ne sic quidem dolor finitur, neq; cucurbitulis, neq; hirudinibus adhibitis, sed suspicio sit humores per arterias in caput esse distributos, non absurdum fuerit & arteriam post aures incidere. Porro humidioribus, etiam balinæ naturales rectè adhibentur.

De phrenitide.

Cap. VI.

Phrenitis, membranarum cerebri, quas meningas græci appellant, inflammatio est, nunc quidē ipso quoq; cerebro simul eam experiunte, nunc autem calore præter naturam in eo consistente. Causa morbi est, uel sanguis superas, uel biliosus humor: nonnunquā & flaua bilis perusta, adeo ut in nigrā degenerauerit, quando etiā grauissima phrenitis nascitur. Aliquando cerebrū septi transuersi cōsortio dolens, ex neruis qui in ipsum sparguntur uitiū cōcipit. At quæ mentis alienatio in ardentissimarum febrium statibus accidit, quæq; ex stomachi consensu exoritur, phrenitis non est, sed hoc solū, pūta delirium. Comitantur propriè phreniticos uigiliæ quidem plurima parte: interdum uero & somnus turbulentus accedit, ut consurgant, exiliant, & furibunde uociferentur. Quibus sanguineus humor morbum fecit, ij cum risu insaniunt: quibus flaua bilis ferociter, quemadmodum quibus atra uitiū contraxit, tam immaniter sœuiunt ut coerceri nequeant, omnium quæ dicunt, faciunt, & obliuiscuntur. Oculos habent sanguineo colore tetricos, ac perfricant: interim aridos, interim lachry-

lachrymâtes, uel lemis, hoc est crassiore pituita oppletos. Lingua est aspera, & sanguis è naribus destillat: floccos festucasq; colligunt, febri per totum morbi decursum acuta conficiuntur: sed quæ in alto maligna deliteſcat. Pulsus ædunt exiguos, languidos, & quadantenus etiam duos. Respirationē magnā & raram, cum cerebrum primariò afficitur. At si phrenitis sepi transuersa, quod græci phrænas uocant, consortio concitetur, & respiratio inæqualis est, & præcordia sursum conuelluntur, & multo calore ardent: sicut iis qui ex cerebri uitio insaniunt, facies incalescit, & subtruenta est, uenæ repletæ. Quod si humor pituitosus sit temperatus bilioso, uti causam, ita appellationem quoq; compositam habet. Nam uigilans coma, nominant, in uniuersum quidem cū biliosus superauerit, quippe tales ægri uigiles phrenitide laborant: cum uero pituitosus præpollet, contra in grauiorem ueluti somnum quem coma uocant græci, deferuntur. Atq; hoc malum antiquiores Galeno medici, Cathocon uocauerunt.

Curatio phrenitidis.

Quod si uires ægri patiantur, sanguis protinus è cubito mitti debet, & copiosior. At si desipiens brachium non porrigat, aut si porrigat, metus sit secundū uacuationem, sanguinis profluuij, dum manū æger subinde ob mētis turbationē iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est auferemus: itē clysteriis utemur, ex hydrelexo, uel rosaceo cum ptisanæ cremore. Si uigiliæ urgent, rosaceū, uel oxyrhodinum in caput dandū est. Aliquādo calida ipsum aqua prius superfundendū: & medicamentū quod ex papaueris capitibus uocatur diacodyon exhibebitur, nisi uirtus imbecilla prohibeat. Et alia quæ ad somnum conciliandū superius scripta sunt, huc transferemus. Decumbat æger in loco, tum lumine, tum tēperie moderato: & uariis quibusdā picturis libero, ut quæ tales deterreant. Quò amici quidā gratissimi ingredientur, & commodū incident, qui nūc blande ægrotum alloquantur, nunc acerbius corripiant. Cibis primum esto aqua mulsæ, deinde ptisanæ cremor, & sorbitiones ex chondro cum quadam dulci potione, ut apomelite, uel hydrososato, uel rhodomelo, uel dulci hydromelo. Nam uinosum hydromelum, quod in paruis uasculis ex Cibra apportatur, repudiandum, ut quod grauiores uino no-

xas in talibus excitet, & maximè in capitis affectibus, idq; anee
 concoctionem. Panis quoq; aqua lotus rectè exhibetur, intu-
 bi, lactucæ clixæ. Si multus feruor conficiat, etiam cruda hæc
 dantur. Item cucumeris medulla, peponis, duracini, & similiū.
 Aquæ frigidæ potu coercendi sunt, potissimum si septum trās-
 uersum confortii lege malo dedisse originem deprehenderi-
 mus. Quod si urina ipsis, ut consentaneum est, delirij uitio co-
 hibeatur, † foras adhibito calente hydrelæo & inferiorem uen-
 tris ab umbilico regionem, ἡτρον græci uocant, & uesicam su-
 perfundemus, deinde digitis manus, loco innixis ad reddendū
 urinam incitabimus. Reliquum corpus ipsis decumbentibus
 calido oleo perungi debet. Etenim in quiete, quoad eius fieri
 licet, seruari debent, ita ut siquidem prædiuites aliqui fuerint,
 per famulos contineantur: sin minus, uinculis constringantur.
 Nam inordinata motio uires conuellit. Iam uero alia etiam
 de causa pedes, prius foti, deligaturis constringi, manuq; con-
 tractari debent, nempe quò humores deorsum reuellantur.
 Porro si longior affectus, & contumax fuerit, ab iis quæ sopo-
 rem accersunt, καρωτικά græci appellant, abstinendum: ea ue-
 rò quæ digerendi facultatem obtinent, capitis perfusionibus
 miscenda, scilicet mentæ succus, uel serpilli uel calaminthæ,
 uel turbæ. Tum iis quoq; utendum quæ naribus inferuntur. A
 septimo die si uiscera sentiant inflammationem, cataplasmatibus
 ex lini semine, & hordeacea farina cum hydrelæo leniemus.
 Deinde cucurbitulas leues, aut cum scarificatione, tum his ip-
 sis, tum occipitio, & spinæ accommodabimus. Si corpus squali-
 dum perustumq; esse coniecturaueris, febrisq; adsit, etiam bal-
 neis utendum aquæ potabilis, & unctione liberaliore. Vinum
 tenue & aquosum, quod ὀλιγοφόρον appellant, uiribus recoli-
 gendis propinabimus, nullam inde mentis turbationem, ut est
 uerisimile, futuram suspicantes. Aut enim nulla sit cum mor-
 bus declinat, aut certè si sit, ex facili subsidet. Processu au-
 tem declinationis, gestatione corporis uti expedit, & congrua
 uirium recreatione. Sed ita phrenitici se se recolligent, ut
 ebrietatem, ciborum corruptiones, & in primis solis æstus
 caueant.

† Hæc sic leguntur in antiquo codice, ποιήσαντες ἀλέαν κα-
 ταντλήσωμεν θερμῶ ὕδατι καὶ ὑδρελαίῳ id est, foras adhibita
 calente aqua, aut hydrelæo.

De inflammatione cerebri. Cap. VII.

Cerebrum inflammatione laborans, sæpe ita intumescit, ut capitis suturæ distendantur. Dolor comitatur maximus, & diurnus, multus angor, rubor in facie multus cum tumore molli: oculi fiunt emissicii, caput inturgescit. Qui hoc malo impliciti sunt, sanguinē ex cubito mittere, item ex naribus, & uasis linguae subditis debent. Porro utitor & asperisionibus quæ per inflammationes capiti adhibentur, & cataplasmatibus, quæ humectare, & maturare sunt idonea.

De erysipellate cerebri. Cap. VIII.

Accidit quoque erysipelas cerebro, quo laborans hæc patitur: capite dolet uniuerso, adeo ut flammis id uri putet. facies frigida est, & subpallida, os siccescit. Quare sic affecto sanguis detrahendus est, & potissimum ex uenis sub lingua sitis. Refrigerantia conueniunt: quibus in aliis quoque erysipelatis utimur.

De lethargo. Cap. IX.

Lethargus itidem, cum ratiocinatricis animæ noxa sit aliqua, locum eundem quem phrenitis, nempe cerebrum, occupat: materia uero mali, contraria est. Nam ex pituita humidior, frigidiorque cerebrum madefaciente, contrahitur. Lethargicos comitatur febris lenta, non impensè acris erodensque, cum alto sopore, quæ cataphora Græcis dicitur, Pulsus his magni, rarique sunt, & undosi, respiratio nimis rara & imbecillis. somno perpetuo præmitur, à quo ægrè possunt excitari, & quocumque modo interpellentur, uix respondent: obliuiosi, mente capti, oscitant crebro, & hiant, ore nonnunquam persistunt, tanquam claudere id obliui. Deijciunt per aluū copulures quidem, liquidiora: nonnullis autem contra ueter inarescit. Urinā reddunt iumentorum lotio similem. Quidam ex eis tremiscunt, & undiquaque desudant. Huic affectui respondet Carus quasi dicas ueternosus sopor ex eadem materiæ proficiens: sed hoc discrimine uariat. Febris Carum præcedit, eaque uehementior: Lethargum subsequitur. item quod Carus etiam alia comitetur symptomata. siquidem frequenter febrium accessionibus superuenit comitialibus, cerebri compressionibus, modo esse quidem in fracturis, modo autem membranæ custode, quæ *μηννοφύλακα* Græci uocant, priorem cerebri uentriculū premente.

premente. Lethargus autem peculiarem quandam cōstitutionem obtinet : superuenit comitialibus.

Curatio lethargi.

Vires si permittunt, etiam hic uena secari debet: sin minus, clysteriis acribus aluū ducemus. Aeger decumbet in domo spatiosa, mediocriter lucida. Caput eius oleo perfundi oportet, cui etiam castoreum sit adiectum. Nonnulli in uicem olei, oxyrhodino cū castoreo utuntur: robur hinc capiti caloremque simul accersentes: reliquū uero corpus delinētes, & praeicipue extrema, olei ueteri: cū nitro tosto, uel pyrethro, uel pipere, uel cocco gnidio extergūt. Licer & cerato quod his & castoreo simul cōstet, uti. Porro naribus admoventur odorāda thymū ex aceto cōtritū, aut organū, aut pulegiū. Os ungi cōuenit, & palati cōelū detrito sinapi, cū mellis momēto. Conantq; oportet pituitā indidē affixā digitis eiicere. Si admittant etiā apophlegmatismi usus erit ex oxymelite cū hyssopo, aut pulegio, aut oryano, aut ipso quoq; sinapi. Potui exhibebit aliquid ex iis uix citō trāseūt praesertim diaspolites cochlearii, mēsurā cū posca. iis aut qui in uetustatē inciderūt, & tremuli sunt, castorei quoq; scrupulos duos, tresue dabimus. Si humoris inest copia, nihilq; aliud prohibeat, scāmoniae scrupulū, castoreo tēperatū exhibebimus. At si his affectus nō discutiūt, caput radēdū fouēdumq; est sale, milio, & similibus per sacculos adhibitis: Adhuc sinapis uti in capite prodest, tū iis quae p sternutamēta euocāt. Postea cucurbitulas occipitio agglutinare partim leues cū multaflāma partim cū scarificatione. Praeterea ad naturae excretionēs frequēter sollicitare oportebit tū iniectionibus, tū iis quae urinā mouēt. Inferiorē uētris ab umbilico regionē oleo rutaceo, aut sycionio cui sit adiectū castorei paululū aspergere fouereq;: Iā uerō ut deglutiāt crebrius admonebimus, cū calida aqua dulciū potionū, aliquā praesertim apomeli ex angusti oris uasculis, *βομβύλις* greci uocāt, instillātes. Quod si mediā infestet regionē qdā inflammatio, hinc itidē medebimur supfusionib. & cataplasmatibus. Nari bus sinapi aceto tritū, uel castoreū ustū admoūere profutērit. Alimētū esto cremor ptisanæ, uel auenæ, uel alicæ cū oxymelite, uel salibus uel pulegio, nūc quotidie nūc uno die iterposito. A cibo uinciere debet: summa cedere multū oportet, cruraq; pūgere, nōnunq; pilos

pilos ēt in ipsis uehementius euellere cōniti, quò excitent. Iñ femorū & crurū rubores excitari, *φουίμης* Græci uocāt, subinde prōsunt, Cæterum ubi morbus inclinare inceperit, gestationibus statim congruis utendū, & ad balneū reducendi sunt. Victus qui uirēs recolligat, recreetq; decenter adhibendus.

De catochō, aut uigili comate.

Cap. X.

Huius morbi causam, ubi de phrenitide sermo est habitus sumus complexi. notæ, ut summatim dicam, communes quodammodo sunt phrenitidis, & lethargi. Sed pro materia abundante uariant, peculiare autem hæ. Detinetur eger supinus, extensusq; interim facies subtumescit, & modice lethargicorum modo liuet; interim rubore tincta est, & superior gena sursum conuelli uidetur, ac excedere, ut ne conuiere quidem æger queat: respiratio nulla apparet, sed quasi emortuus decumbit. pulsus est exiguus, languidus, & creberrimus. Urina & aluus cohibetur, aut certè modice redditur. ac qui sanè mediocriter habent, liquorem aliquem infusum deglutiunt: qui uerò malo uicti sunt, ad nares regurgitant. Itaque affectus qui pituita bilem superante constituuntur à lethargicis discernimus, eo quòd neque facies tumescit, neq; liuida est, sicut lethargicis: præterquàm quòd paulatim etiam leuiter de sudant. In iis autem periculum maius est, quibus peruigilium ad est continens, urinæ non respondent, difficultas spirandi intenditur, sudores erumpunt, item quibus ad nares potus reformatur. At si mulier hoc laborare uitio cœperit, ab ea quæ uulnæ strangulatu correpta est, hac nota discernes, quòd naturaliter iacere uideatur, & inclamantes percipiat, excitetur, rursusq; somno graui sopiatur. Est ubi dicunt catochon diuersum à uigili comate, quod simplicem non mixtam habet causam, nimirum frigidiorē sicciorēq; materiā, quæ posteriore cerebri uentriculo obstructo malum hoc excitat. Ob quā etiā æger, si corripitur subito in illa permanet figura, qua correptus est, stans scilicet, uel sedens, clausis oculis, aut respiciens. Quam ob causam antiquiores Græci hoc pressos morbo, catochos, uel catochomenos, quasi dicas occupatos, detentosq; nominauerunt: recētiores affectū catochen, & catalepsi, ueluti detentio nem, & deprehensionem Curatio prædictis quidem est, sed pro symptomatum ratione quæ superueniunt, euariat.

Curatio

Curatio catochi.

Hic quoque malo sanguinis missione succurritur, præsertim quibus facies rubescit, modo uires suadeant: aut clysteres iniijciendi partim qui pituitam pollentem eliciant, partim qui bilem abundantem leniant: pari modo aliorum quoq; præsidiorum usus erit. Similiter ægros nutrire cõfert, interim diebus singulis, interim uno interposito. Porro affectus admodum periculosus est, si ex quodam alimenti, aut potus errato acciderit, qui statim ad uomitum cogendi sunt, ac parciore uictu continendi, aluus irritari, ac uiscera resperisionibus ex cumino, aut ruta foueri debent. Qui ex ebrietate uitium conceperunt, crapula dissoluta, humidior cibo tractandi sunt, qualis est ptisanæ cremor. Præterea caput inunctionibus accommodis per æstatem frigidis, per hyemē tepidis obducetur. Si crapula nequam fuerit soluta, neque ad sobrietatem reditus est, desperatae uale tudinis ægram longe fugere oportet.

De memoria iactura, & ratiocinationis, item de caro hoc est, ueternoso sopore, et fatuitate. Cap. XI.

Memoriae iactura partim per se, partim etiam cum aliqua ratiocinationis offensa accidit: quemadmodum, & mentis seu ratiocinandi facultatis noxa priuatim prius accidit. deinde memoriae iactura insequitur. Verum cum utraque pars malè fuerit affecta, fatuitas seu stultitia, quæ Græcis morosis appellatur, oboritur, causam habent communem efficientem, nempe intemperiem. Quod si humida solum fuerit, memoriae & ratiocinationis uitium creabit, torpores graues, animi sopores, cataphoras Græci uocant, longos, altosque somnos. Si uero humori frigiditas etiam accesserit, caros & lethargos: eodemque modo si sola quidem fuerit siccitas, uigilias tantum inducit: sin autem calor accesserit siccitas, deliria, & phrenitidas mouebit. Porro intemperies hæ nonnunquam obueniunt humoribus, nonnunquam cerebri uentriculis, uel ipsius uasis: uel utique in humiditate insparæ, uel in ipsomet cerebri corpore, uel etiam temporum musculis tali modo uiciatis. At si quando humores cum ipsis fuerint mixti, similem quoque morbum inferent: uerum simplex, an composita sit intemperies, efficiens, ex specie excrementorum condisces. Quod enim memoriae,

memoriz,& ratiocinationis iactura, frigiditati soboles existat, compertum habemus: ea uero humiditati ne, an siccitati iuncta sit, excrementis, ægri habitu temperatura, uictus ratione, anni tempore, & locoprehendemus.

Curatio.

SI frigida male habuerit intemperies, calefacere, si humiditati iuncta sit, etiam exiccare oportet, rursus si mixta cum siccitate, humectare simul, & calefacere. Pari modo etiam in calida intemperie refrigerare conuenit si siccitas accesserit, pariter humectare. si humiditas, refrigerare simul & siccare. In quibus autem sanguineum humorem deprehendis abundantem, uenam aperire, uel clysterijs acribus uti consilium est. deinde etiam hiera exhiberi debet, & apophlegmatismis uti conuenit. Item inunctiones capiti sunt inducendæ ex oleo, cui adiecta sint quæ refrigerant, exiccantque, rosę dico, myrti, lentiscus, aliaque similia: necnon toti corpori prospiciendum est. Quod si ex æstu, & lassitudine orta fuerit intemperies, caput oxyrhodino perfundendum, tum reliqua curandi ratione frigida, humectaque; uti conuenit: cum in alijs tum in cibo & potu. Quod si caros fatuitati, uel obliuioni accedat, huic etiam prospiciendum est, ut in lethargicis prius comprehendimus, ubi & ipsorum discrimen explicitum est.

De uertiginibus.

Cap. XII.

Vertiginum affectus nascitur cum frigidus, glutinosusque humor cerebrum occupat: unde leui occasione protinus etiam concidunt, ueluti quando aliqua circumagi extrinsecus aspexerint, ut rotas, uertices uel, aut quando etiam ipsi circumaguntur. Interim uero etiam calfacti capite, cum humores in eo contenti, uel spiritus quoque commouentur: interim prioribus cerebri uentriculis, dum caluaria contracta perforatur pressis, in quibus etiam uehementes oboriuntur cruciatus. præcedit autem in eis, quibus caput primario afficiatur, uehementis in eo dolor ueternosus sapor qui καλός Græcis dicitur, & aurium sonitus & quidam sanè olfactu læduntur, quidam uerò gustu. at quibus ex consensu uentriculi oris uertigines accidunt & stomachi rosio, quam cardiogmon Græci appellant, & nausæ simul comitantur.

Curatio.

Curatio.

Vertiginosos in accessione quidem medicamentis quæ odore mouent idoneis, excitare cõuenit. Item frictionibus uti, & id genus alijs. Vbi morbus remiserit, eius amoliendi gratia sanguis primũ mittendus est: deinde purgatio ex hiera præstanda. Interposito tẽpore acri clystere ex centaurei. uel cucurbitæ syluestris decocto utendum est. Secundũ huiusmodi uacuationes caput ipsum cucurbitulis ad occipitium cũ scarificatione lancinari debet, mox apophlegmatismi, id est, medicamenta quæ saluã per os eliciant adhiberi, & sternutamenta moueri. At quos capitis calor, auriumque sonitus male hêt, ceu uaporibus calidiorib. per arterias sursum elatis, etiã arteriæ sectio retro aures ijs adhibenda est: ut in parte chirurgica sumus dicturi.

*De morbo comitali.**Cap. XIII.*

Morbus comitalis, cum totius corporis sit conuulsio, cum principis animæ functionum noxa, partim sanè in ipso cerebro, partim uero in uniuersis huius uentriculis causam habet constitutam: ea modo est humor pituitosus, modo melancholicus, præterea etiam ore uentriculi affecto consortii lege oboritur. quemadmodũ in colicis quoque sicuti cùm de illis agemus exequemur, uel certè aliis quoq; partibus contagionẽ impartientibus nascitur, cùm aura quædam frigidior ad cerebrum ascendit, aliàs à crure, aliàs à manus digitis. Insuper uisus est quandoq; prouenire etiam in quadam muliere ab utero quo tempore esset grauida: à partu autem cessauit. Occupat hoc morbi genus maximè pueros, eosq; adhuc paruulos. deinde uero adolescentes, & iuuenes, minime senes & decrepitos. Præcedit igitur comitiales inuitus corporis, animi quæ status, tristitia, eorũ quæ perceperant obliuio, turbulentæ insomniorum imagines capitis dolor, eiusq; repletio continua ob iracundiam maximè, & pallor faciei, & inordinatus linguæ motus: nonnulli ipsam quoque commordent. Quibus autem à stomacho uicium oritur, etiam palpitatio ipsius præcedit, turbatio, & erosio: Iam ex inedia seu cibo tardius assumpto, irritantur. Vbi uero symptoma iam insisterit, ægri derepente concidunt, conuellunturque: interdum etiam exclamant uoce nihil significante at eximia, peculiarisq; admodũ nota, ipsorum existit, oris spuma: cum alia communiter alijs quoq; mor-

morbis eueniant . Non defunt quibus etiam urina & stercus præter uoluntatem excernitur. nonnullis & genitura. In quibus igitur acutissimus est affectus, statim iugulat, & accessio-
num cōtinuatione, & symptomatis, uehementia. In pluribus autem longus esse solet: eoq; si non in pubertate, uel mens-
truis purgationibus, uel per cōceptum solutus fuerit, aut si post hoc
tempus contractus fuerit, sæpe usq; ad mortis diem proroga-
tur, nisi congruam medici curationem consequatur. Coarguunt
comitiales suffimenta, bitumen, uel lapis gagates, uel cornu
caprillum, iecur hircinum comestum, & iecoris tosti odor.

Curatio.

SI infans adhuc fuerit qui ægrotat: nihil moliendum est. nam
ætate ad biliosiores, siccioremq; statum trāseunte, & uictu
moderatiore adhibito, sua sponte plerunque morbus finitur.
Conuenit autem uictus etiam solum tum infantium, tum nu-
tricum rationē habere. Qui uero post annos pueriles in mor-
bum hunc prolabantur, eorum partes conuulsæ ac distractæ
pingui oleorum aspergine foueri, uinciri & in rectum dirigi de-
bent. Deinde ore distento digitus demitti, aut penna oleo iri-
no unctæ, pituitæ auferendæ gratia. Quin & medicamētis quæ
naribus adhibentur sensum mouere conuenit, ut peucedano,
cyrenaico liquore, bitumine, pice cedrina. Post accessiones si
nihil prohibet, sanguis utiq; è cubito mittendus est. At si ni-
hil remittat accessio, summæ partes sinapismo delinendæ sunt:
cucurbitula autem præcordijs defigetur. Quod si nec his mor-
bus comprimitur, minimum in medicina spei superest. nihilo
se eius tamen medicus animo confidente castoreum necessita-
te adactus, & liquorem cyreniacum cum melle & aceto ori in-
fundet. in anuum centaurei decoctum, uel cucurbitæ syluestris
dabit. ubi ad se redierint ex morbo comitali uiribus ante re-
creatis purgatione ex hiera uacuandi sunt hæc sanè est recen-
tis & acuti morbi comitalis curatio. Deinceps quomodo in-
ueterato succurratur, trademus. Itaq; ægrotos aquæ potu con-
tinere diu expedit. aggredientes autem curationem, si nihil ob-
est, sanguinem dimittere. Interpositis quatuor aut quinque die-
bus corpusculum reficere, & sic purgante medicamēto euacua-
re, præsertim ueratro nigro, uel cucurbita syluestri, uel certe
scammonia. Porro ueratrum sine medulla tunsum cribratumq;
PAULI AEGIN. i aquæ

aquæ mulſæ cyathis quinque, uel ſex inſpargere oportet, aut melle diſcocto cum piperis momento excipere. Cucurbitam uerò ſylueſtrem, ſemine eiecto, ſed quæ medullâ referuet, paſſo implebis, ſineſq; totam nocte commadeſcere: mane paſſum auferetur potuiq; dabitur. Vel etiam medicamento ex uera: tro albo purgationem molieris: quod hæc recipit: baccarum lauri purgaturum, piperis albi, alypiados, euphorbij, ueratri albi ſingulorum drachmas octo. Hoc totū datur cum paſſo quod in cucurbita ſylueſtri pernoctarit, probe uacuat per uomitum. Vbi uerò ſat purgati ſunt, ægri balneo credentur. Tertio die in præcordijs & dorſo cute ſcalpello incifa cucurbitulæ affigendæ ſunt. deinde compluſculis diebus interpoſitis corpuſculum reſciendum eſt, & Hiera diacolocynthidos aſſumi debet, poſtea capiti & occipitio cucurbitula agglutinari. Sequenti die panis coctus in mulſa, tritus autem cum amaris amygdalis, uel ſerpyllo, uel menta, uel calamintha, uel ruta ſuperdandus: atq; id per triduum continuabitur. ab hoc, caput radendum eſt, & peucedani liquore, ex aceto diluto, in quo ſpondylion ſit coctum perungendum: rurfus interpoſito ſpacio corpuſculum reſcitur: & antidoti diacolocynthidos oboli nouem ex aqua mulſa exhibentur: & interpoſitis diebus iterū tres ex antidoto offerre conuenit. Inde medicamentis uti quæ ſternutamenta citant. poſt quinq; decē mve dies caſtoreum ex mulſa præbetur: tempore rurfus interpoſito in aluum dabitur centaurei decoctum & cucurbitæ ſylueſtris: ab hoc iterum hiera offeretur mox utendum ijs quæ ſal uam per os & nares educant, deinde ſinapiſmus capiti inducitur. iam etiam acrium ciborum eſus conuenit, cū opportunitas eſt, adhibitus. Auxiliatur hiſ etia oxy-mel ſcilliticum quotidie potum, & mel, in quo ſcilla intabuerit. inſtar cochlearij aſſumptum. Viſtus autem ratio eſt quæ incidat, extenuetq; Capparis igitur frequenter eſus, & ſaſſamentum prodeſt. Fugere oportet carnes, legumina, uinum copioſius, uenerē liberaliorem, balnea, ſinapi, & potum ſtatim à balneo, præſertim uini meraci. Exercitia proſunt & frictones, ſed capiti poſt reliquas omnes corporis partes adhibita.

De ijs qui ſtomachi uitio comitiali morbo corripiuntur.

SI ſtomachus primariò affectus, morbum inuexerit, ſollicitudo habenda eſt, ut ex ſacili æger concoquat. Panis igitur accurate

accurate elaboratus ex nino téperato quod leuiter astringat, albumq; colore sit ad horam tertiam assumi debet medicamentum uerò ex aloe bis, ter'ue singulis annis dare his expedit. Vi di autem quandoq; puellum (inquit Galenus) neutiquam hoc tentatum morbo posteaquàm radicem glycydis (dicit autem prœoniam magnani recentemq;) ex collo suspensam gestaret. Insuper agaricum opitulatur comitialibus, idem præstat sésil i, spondylii fructus, radixq; aristolochia rotunda ex aqua pota, non parum huc fuit, & continua curum scarificatio.

De ijs qui à particula quadam morbum concipiunt.

I Nuasuro quidem symptomate, ubi particulam cōmunicare morbum, senserint, siue ea fuerit manus, siue pes, fune excipi ualenter debet quæ superposita est. Cum autē remittit. recreare corpus oportet, adurens quoddam medicamentum particulæ inducentes, cuiusmodi est lepidium, & diacantharidos dicta similiaq;. Ad hæc oxymel Iulianum comiciales uehementer adiuuat, particulatim materiā emolliens. Post omnia cōmemorata & Theriace, & naturales balinæ locū obtinēt. per totum autem uitæ curriculum, cauenda maxime cruditas, cibus ante concoctionē obitum, isq; crassi succi, tarda cibi assumptio, corporis exagitatio, uinū largius & potus à balneo, sicut cōprehensum est, maximè, meracus, præterea ualde uetusta, crassaq; uina, tū acria ex his quæ odore mouēt, & caput replēt, icōueniēs ē sublimi cōspectus, in balneo mora, & capitis ex sole exustio.

De melancholia.

Cap. XIIII.

Melancholia mentis quædam alienatio est sine feбри, ex melancholico maxime humore nascens, qui mentē occupauerit: alias cerebro ipso per se ægrotante, aliàs totius corporis consensu immutato. Tertia uerò melancholiæ species est, quam flatulentam & à præcordijs hypochondriacā appellant, ob inflammata circa stomachum præcordia proueniens. quæ modo aurā quandam maligniorē, modo substantiæ humoris partē ad cerebrū sursum transmittāt. Cōmunia omnium signa sunt, metus, tristitia, homines auersantur, alij se cedunt animalia quædam bruta esse, & uoces ipsorum imitantur: alij uasa fictilia, metuuntq; ne rumpantur. adhæc mortem hi expetunt, illi eandem expauescunt, nonnulli semper ridet, nonnulli plorant. Alij uerò putant à maiore quadā ui se inua-

di, & uaticinantur futura, non aliter quàm uates & diuinaculi quos græci *ἐνθεοσκόποις* proprie nominant. Peculiares autem notæ eorum sunt, qui ex totius corporis consensu melancholia laborant, gracilis corporis habitus, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus, uel natura, uel etiam ex acquisito per sollicitudines quasdam, aut uigilias, aut prauorum ciborum esus, aut hæmorrhoidum, aut menstruorum suppressionem. At qui ex præcordijs melancholici existunt, eos testantur cruditates, acidi ructus, ardor, & ipsorum grauitas, tum quòd præcordia sursum conuellantur: interim etiam inflammatione conflantur. Adhæc quòd incipientibus, deinde maioribus effectis melancholica comitentur symptomata. quodque hæc leuentur, concoctione, uel alui excretionem, uel multis flatibus, uel uomitibus, uel iuctu. Cum autem nullum ex his, aut certe pauca eueniunt, melancholica quæ apparent signa cerebrum primario affici in totum succi contagione melancholici fatentur. Porro si quando fluxus bilis supra modum exultet in nigram fiat mutatio, insaniam, dictam græce maniam inferet, ob quam ferarum modo efferuntur insani, ut etiam eos qui imprudentius ipsis occurrunt, manu uiolenter tractent.

Curatio melancholiæ.

Qui igitur ex primario cerebri affectu melancholici sunt, crebris balneis, uictu boni succi & humido curantur una cum decet animi delectatione, sine alio præsidio, cum certe humor qui molestat nondum ob temporis longitudinem excerni cõtumax est, quãdo etiam ualentiora magisque uaria tentare oportet remedia. Itaque purgentur per initia epithymo, aut aloe. Nam uel pauxillum ex his sumptum quotidie maxime iuuat, & leuiter aluum subducit ubi uerò purgati fuerint, uti dictum est, absynthium propinabitur: nunc quidem herba ipsa in aqua macerata coctaque duorum cyathorum instar, nunc autem eius succi drachma semis, cum aqua continue liquefacta. Aceti quam acerrimi modicum sorbitioni datur soninum inituro. Iam multa obsonia in id intincta, esse conuenit. præstantius autem fuerit aceto mixtam esse scillam, polium, & tenuem aristolochiam. At cum morbo quidẽ incipienti ex totius corporis affectus cõsortio, ut supra dictum est, incidis, corpus autẽ, uiribus constet, à sanguinis missione incipiendũ est: post hanc, uiribus

bus relictis, inferius purgare conuenit medicamento ex cucurbita syluestri, tū eo quod cōstat nigro ueratro, ac si hæmorrhoidibus, aut mēsis suppreſſis malū fuerit concitatū, illas adaperiemus, hos proritabimus. Laudantur etiā facultates, tū quæ urinæ ciendæ sunt, tū quæ per sudores purgāt. Sin autem præcordiorū offensionī morbus debetur, & horū habenda erit licitudo: ac fouebūtur ipsa decocto rutæ, anethi, absynthii, pulegij, agni seminis, & fructus lauri perfundēdo. Hæc etenim dolores quoq; leniūt & flatūs discutiūt, oleo incocta, & sic affeetæ parti applicata. Cæterū præter hæc insint, cataplasmatīs etiā ea quæ flatibus discutiēdis faciunt. nēpe apiū, uel anisum, uel cuminū. Nil malū fuerit, si indatur cataplasmati & cyperus, & iris, & libanotis quam rosamarinum uocant. Cum & hæc ad-moues longū tēpore per diē & pasto & ieiuno adhærere sines. Vbi ademeris, aliud quoddā operimētū super accommodato, lanam scilicet latiorē Cucurbitulis ad flatūs digerendos leui-bus utitor: ad dolores uero inflammationesq; cū scarificatio-ne. Porro adhibita curationi diligentia, nec sinapi obliuiscere, sed acnibus smegmatis, & dropacibus super dorsum, uentrem-que uti conuenit. Quibus uitiū inueterauerit præsentissimum est remediū etiā citato per ueratrū albū uomitu purgatio. Vi-ctus oībus melancholicis conferet probi succi, & mediocriter humectās. Vitāda sunt, caro bubula ceruina, lenticula braslicæ cochleæ, uina crassa, & nigra: breuiter, quæ atrā bilē generant.

Curatio insaniæ.

Insanientes cōsimilē melancholicis curationem recipiunt. Propriā uero habēt, ut caput ipsorū tum rosaceo tum oxy-rhodino perfundatur. Itē ex antidoto picta purgabimus, uerū sanguine prius misso: nec non hirudinibus in capite utemur. Vnicē ipsos iuuat hippomarathi radix, semēq; eius ex aqua potum. Insuper Brioniæ radicis drachma ex aqua quotidie as-sumpta. Sin autem delirantes purgantium medicamentorum potionē renuāt, misceri debēt ea nesciētibus ipsis, cibis nempe buccellis uel ficibus pinguibus, uel palmulis, interdum uero potionibus adiiciendā sunt. Ante omnia uero aut in lecto ui-ciendi, ne & sibi, & iis quibus incidunt mali quippiam inferāt: aut gestandi grabato intra lecticam quandam insaniētibus. pe-culiarem γλεῦρον græci uocant, ex alto pensili.

† Plura leguntur in nostro codice, ita enim habet, πρὸς ἅγας πάντων κρατέειδωσαν ὑπὸ τινῶν παίδων, ἢ σκηδισμέειδωσαν, &c. id est, ante omnia contineantur à seruis aliquot.

De incubone, qui ephialtes græcè dicitur. Cap. XV.

Ephialten, qui latinis incubo est, aliqui à viro dictū assē-
runt, uel inde q̄ hoc malo correpti ceu insipientē ali-
quem se imaginentur Themison autē decimo episto-
larū uolumine à suffocando forte, Pnigalionem appellauit, Cō-
stituitur id uitij ex crapula, & cōtinua stomachi cruditate. Co-
mutatur eo detētos difficilis morus, torpidus in somno sensus,
suffocationis imaginatio, & ueluti quodā super incidente, op-
pressio, ita ut exclamare nequeāt hoc detēti, aut uocē edāt ni-
hil significantē. Nōnulli uerò etiā audire sæpe eum qui super
ipso incidit, ac uenerē exigere imaginātur, sed cōtractis eos
digitis fugere. Cura itaq; habenda est mali per initia, nā si diu-
tius prorogetur, continuē per noctem incidens, magnū aliqūē
morbum nunciat, ut apoplexiā, insaniam. & morbū comitialē,
cum in caput huius uitij causa ferri cōperit. Quæ enim comi-
tiales interdū, eadem ephialtici dormientes noctū patiuntur.
Itaq; cōmodū est sanguinis detractione & purgationibus uni-
uersum ægri corpus uacuare. Maximē his opitulatur, nigri ue-
ratri diachma, cui scammonia oboli tres sint adiecti, & non-
nulla ex odoratis, anisum, daucū, petroselinū. Iam hiera diaco-
locynthidos, strenue auxiliatur: est autē ea quæ ad Rufum au-
thorem refertur. Victus porro sit tenuis, nō qui inflationes pa-
riat. Succurrit ipsis & prœniz semen. Dandaq; continuē sunt
potui ex aqua grana eius nigra quindecim contrita.

De lycæone, uel lycanthropia. Cap. XVI.

Qui lycanthropia detinentur, noctū domo ægressi, lu-
pos in oībus imitātur, & donec dies illucescat, circa
defunctorū monumēta pletunq; uagātur. Hæ comi-
tes ipsoꝝ notæ sunt, facies pallida, oculi ad uidēdū imbecilles
& sicci, lingua aridissima, nulla in ore salua, sitis immodica, ti-
biæ q̄ frequēter impingāt exulceratæ, adeo ut sanari nequeāt.
Tales quidā sunt notæ: speciē uerò melancholia lycanthropiā
esse existimare cōuenit, curādumq; in accessionis tēpore, san-
guinis ex uena ad animum usq; defectū detractione: item, cibis,
probi

probi succi, æger, & balneis dulcis aquæ sustinendus est. Deinde lactis sero per triduum usus, etiam hiera diacolocynthidos, bis terue purgabitur. à purgationibus, Theriac quoque ex uiperis assumet, ac alia reliqua in melancholico affectu commemorata. Inuadenti iam morbo, asperginibus somnū accersere cōuenit, in id efficacibus, ubi somnus accesserit, nares opio illinuntur.

De amantibus. Cap. XVII.

A Mores cerebri affectibus annumerare cū sint quædā curæ, haud fuerit absurdū. Cura uero affectus est animi, ratiocinatione in motu laborioso occupata. Hæ sequaces amantiū sunt notæ. Oculi cōcaui nō illachrymant, sed tanquā, uoluptate pleni apparēt, cōtinens palpebrarū motus, & cū reliquæ corporis partes nō collabuntur soli hi amātibus cōcidunt. Pulsus ipsorū propriè nullus est, ut quidā opinati sunt uerum, qualis eorū deprehenditur, qui crura cōficiuntur. Cum uero id quod amatur in mentē ipsis uel auditu, uel uisu, & præsertim repente uenerit, tūc pulsum animo turbato cōtingit immutari neque naturalē æqualitatē, neque ordinē retinere. Hos igitur & trister, & uigiliis torfos nōnulli qui dispositionē ignorarēt, balnei abstinentia, solitudine & tenui uictu consumpserunt, in quibus sapiētiores cū amantem deprehendunt, ad balnea, cōputationem, gestationem, ludos, fabulasq; animum abducunt. nonnullis merum incutere conuenit. Nam qui amorī semper indulgent, iis difficulter abigi potest affectio. Quidam igitur obiurgandi sunt, pro ratione uitæ quam singuli delegerint. In uniuersum mens ad alias curas abducenda est.

De apoplexia & hemiplagia, uel paralyfi. Cap. XVIII.

Q Vando commune quidem neruorum principjū affectum est, eoque omnes corporis particulæ motum simul & sensum amiserunt, apoplexia morbus appellatur ita ut pariter principis animæ functiones sint oblesæ. Sin autem in altera capitis parte obstructio fuerit oborta, hemiplagia & paralyfis nominatur. Si uero unam quandam particulam talis noxa occupauerit, illius affectio particulæ dicitur. Quippe Hippocrates memoriæ prodit, apoplecton hoc est resolutum ipsi crus euaserat. Seruatur itaque in apoplectis modica quædam respiratio, quæ si permultum à

naturali functione recesserit, maximam esse affectionem putabis si paululum, exiguam. Deterrima uerò est respiratio, cum intermittitur, uel etiam ubi magna cum uolentia trahitur. Origo uitij est ex frigidiore pituita, quæ principalissimos cerebri uentriculos uniuersæ & subito repleat. Sin autem spinalis medullæ principium quandoq; totum huic cõsistatur malo, omnes faciei subiectæ partes resoluuntur, ipsa manente incolumi, eo quod sensum motumq; partes quæ ibidem habentur à cerebro excipiant. Si dimidia ipsius regio infestatur illarum partium resolutio quæ dicitur paraplugia constituitur. Si odoratus uitiatu fuerit, uel ad priores cerebri uentriculos intemperic expertos, uel ad meatus ossium quæ à percolando ethmoide dicuntur, obstructos, talis referetur affectio. Itaq; iacet apoplecti, uoce inter mortua, sensus motusq; expertes, citra febrē. Præcedit hoc malis, capitis subitus, acutusq; dolor, uenarum circa guttur extantium, sphagitidas Græci uocant, toruli eleuantur, tenebræ oculi offunduntur: itemq; splendores eisdem oboriuntur, & extremarum partium sine ratione algores, totius corporis palpitatio, difficilis motus, & dentium inter dormiendum stridores, urina ueluti æruginosa, atra, modica, & farinæ crassiori similia subsidentia quædam refert. Accidit autem hic affectus circa ætatē senilem temperaturis pituitosioribus, uictuq; tali usis. At si iuuenes, & per æstatem infester, magnam necessitatem fatetur.

Curatio.

A Poplexiæ morbus, nequaquã, aut raro curatur, ut qui mortem minetur præcipit. Si uero etiã discussa fuerit, plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit. Qui igitur quoquo modo curationē recipiunt, iis statim sanguis ex uena detrahendus est, & sicubi remissionē quandā habuerint, detrahēre cōuenit eadē die, aut sequenti, aluū autē acri clystere ex muria & melle cōtemperatis ducere. Dein oleo copiosiore sulfurato totū corpus perungere, caputq; chamæmelino, uel anethino oleo, in quo spondiliū decoctū sit uel calamintha: mulsaq; instillatur, & ea quæ odore mouēt, naribus admoventur, uti opopanax, uel sagapenum, & galbanū, uel castoreū. Oporteret autē & ori per uim aperto digitū, uel pinnam oleo madefactā inserere, ut ea quæ ipsi inhærescunt, eiiciantur. Cæterum sedes etiam iis quæ flatu educunt, perungenda est: mulsa uel

oxymel potioni dabitur Quinetiā apophlegmatismis ex thymo, uel origano cū aceto decoctis utemur. Vbi morbus se remiserit, cibis mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Si uox nondum redit, & uires permittunt, cucurbitulæ occipitio cum scarificatione deligentur si fieri possit etiam præcordiis. deinde gestabuntur ægri curru, aut lectica, aut lecto pensili, assumi etiam debent crebrius quæ sternutamenta excitāt, & apophlegmatismi. Vbi quatuordecim dies morbus excessit, ad reliquas gestationes ducentur. Cæterum sermonis etiam sollicitudo habenda est. uetus apomeli cum micis panis, uel alica dabitur: mox pauxillum ex hiera. Post uigesimum primū diem balneo ægroti credentur. † Vinum tenerū calente aqua temperatum potui exhibebitur: ac reliquo tempore uires balneis & unctionibus reficiendæ sunt: degent autem ægri in locis si fieri potest, mari uicinis.

† Melius hic locus descriptus est in ueteri καὶ δινον παλαιὸν δόσομεν πινῶν, id est uinum uetus &c. quanquam hæc admodū leuia sunt cum nemo tam stupidus sit qui δινον ἀπαλὸν nunquam dici non sentiat.

Curatio resolutionis, quæ paresis dicitur.

AT si principis animæ functionibus liberis, omniū particularū aut quārundā remissio acciderit, etiā hic qui molestat humor, qualiscunq; ille fuerit, euacuari debet. Mox hiera, cui castorei quoq; pars sit adiecta, dabitur: per initia drachma semissis, cū tantillo mellis, & aqua calente soluta, uel per se, piperis quoq; dimidio scrupuli addito. Quatuor deinde diebus interpositis integra drachma assumetur, dehinc una & senissis, postea duæ, atq; tres. Rursus totidē diebus interpositis quatuor drachmæ, si ægri uires sustinent, offerentur, mellis adiecto cochleario. Particulis autē, medicamēta quædā discutiētia, & ea quæ citē possunt cruentare, imponūtur: addendo simul castoreum, aut piper, aut pyrethrū, aut cachry, aut euphorbiū. Prodest etiā eis oleū rutaceū, uel sycioniū, uel uetus superfundere. Cibi cōueniunt frumētacei, sorbiles, uel alioqui ad cōcoctionē expediti: nec recremēticeci. Cucurbitulæ remissis partibus agglutinātur, si multæ fuerint, distinctim, si paucae, uni: post cucurbitulas delinūtur medicamēta ex pice, uel resina, uel manna. optimē autē facit cū artemisia simul incocta calamintha, & cunyla,

eunyla, & nitrum ex aqua modica, quæ inter coquendum absumatur. Alius iterum subducatur ex aloe, uel polypodio, uel scammonia, uel ex pulve diacolocynthidos. unctio uero accommodata *ὑπὸ ματα* græci à pinguitudine appellant, huiusmodi habentur uetus oleum, in quo scilla quadraginta diebus sub sole intabuerit. Si huius copia nō est, duas scillæ uncias in oleo coquito, illinitoq; uel cachry similiter præparatū, miscenda uero & ceræ uncia, ne illita diffuant. At si galbani, castorii, euphorbii, adarce, & nitri singulorum unciam semissem acceperit, multo erit medicacius. appositu etiam cōuenit ranunculus: herba incocta oleo, in quo per insolutum intabescat. Potiones erunt castorei circiter drachma: opopanax succus fabæ instar, deglutitus. Miniscē facit etiā sagapenon ad erui magnitudinē, ex mulla & castoreū cū opopanace. itē liquoris cyrenaici milij instar. Auxiliatur & antidotum ex triplici pipere, quod dyatron pipereon dicitur græcis. Vremur etiam acopis calefacientibus, & apophlegmarisiis. Post diē quartumdecimū solidioribus uti cibis exped t, & auxilio multum proficiēte, in balneū deducere. A trigésimo dropacem adferre cōuenit, & balineis cōmittere: reliquo tēpore sinapi cataplasmatibus modo obducere, in quibus & mōtus & sensus perit: attēdentes ne ideo quod nō sentiūt magis q̄ par est urātur. In iis autē qui sensus cōpotes sunt, cutis ruborē dūtaxat oportet excitare post tumorē factū ad lauacrum mittere, & mollibus ceratis medicari. Vomitus à cœna cōueniet, & is qui radiculis assumptis cietur: item gestationes, sella, aut lectica, aut uehiculo: postea ducētur ad balnea naturalia. Victus siccior utilis est, potio modica, & frictio. cibos igitur succos esse debent, sitim quantam possunt sustinentes.

De ijs qui laxatione, aut distentione resoluti sunt.

Quoniam resolutæ partes uel conuelluntur, uel laxantur: idq; uel à repletionē, uel inanitionē, attendēdum rursus est, partim etiam sanguinem detrahi debere, partim nō. Deinde in relaxatis quidē mēbris adstringentia, iis quæ laxant miscere, & frictiōē intensam moliri cōuenit. In cōtrariis, laxantibus dūtaxat utendū. frictiōē simul molli adhibita: oleo in relaxatis nitri paulū & fēcule cōtritū adiciat. sots erūt ex aqua uehementer calida, & potissimū marina, in qua decoctæ sunt lauri, uel uitiis germina, uel samscus, uel aliquid huiusmodi.

modi. Si aut æstas fuerit et natationes in mari: rubores autem in cute excitati his maximè cōferunt. Itaque cedantur et particulæ ferulis, uel urticæ ramis. Quod si perseveret resolutio, carnem, quæ intra articulos resoluta est, attractam ferris oportet candentibus exiguis tenuibusque, transmissis adurere. Cōtractis aut membris dropacem continuè superiicere commodum est.

De resolutione quæ unamquamque particulam obsedit.

QUæ à nervi diuisione oritur particularum resolutio, insanabilis est: quæ uero ab intēperie, uel humore quodam cōtrahitur, cōe quidem ex remediis cōmemoratis præsidium recipit. sunt aut peculiaria quædā singulis ipsorū dicata, quæ subiungemus. In iis igit qui canū more cōuelluntur, æqualiter in oppositū capistro appellato deduces. Profuerit etiā sanguinis detractio, ex uasis linguæ subiectis: itē cucurbitulæ priori uertebræ defixæ, tū apophlegmatismi & per nariū clysterem facta purgatio. Sciendum itaque est nō eam maxillā quæ peruerfa esse apparet, sed oppositā resolutione infestari. Gurgure autē resoluta, cucurbitulas mēto agglutinabis, perungesque; medicamentis ex castoreo, sagapeno, & liquore partico. auxiliatur et gargarizatio ex acribus. Vbi lingua resoluta fuerit, uenæ ipsius incidendæ sunt, cucurbitulæ mēto admouendæ & apophlegmatismis ex sinapi utēdum est, & linguæ exercitiis. Si uocis instrumenta resoluta sunt, thoraci præsidia adhibēda sunt, spiritus retentione, & uociferatū utēdum. In superciliis aut palpebrarum inunctiones similiter profunt, iam & futura proficit. Vesica uero resoluta siue urina impediatur, siue præter uoluntatem excernatur, inferiori uentris ab umbelico regioni, & ei quæ scrotum & anū intercedit medicamenta applicanda sunt: sed et immittendū est oleū rutaceū, uel sycionii cū butyro, castoreo, galbano, uel opopanace, uel liquore silphii: uesicæ porro hæc per colem trāsmisssa ualde profecerūt, uel sola etiā suffecerūt: ex centaureo autem, & colocynthide cum sycionio clysteres etiam intestinis utiles sunt, bene faciunt & medicamina urinæ cōsentia potui data, & castoreum cōsimiliter. In primis iis, qui nihil urinæ reddunt, per rectos siphones, quos cathēteras dicunt, in uesicam medicamina infundentur. Præterea laxantibus infidebunt, & eisdem cataplasmatibus forma oblinentur.

Qui

Qui præter uoluntatem urinam excernunt, corroborantibus auxiliis astringendi sunt, cibis siccis, porione frigida utentura ubi se recolligunt, summæ cutis ad ruborem usq; exasperatione, & lauacris sponte prouenientibus frigidis utentur. Eos autem qui resolutionem experti sunt ob spinæ uulnus, aut casum, aut uertebræ luxationem, superuenientibus, quæ mortem fatetur, symptomatis, nulla medicina periculo subtrahit. Quod si coles resolutus fuerit, iis quæ in uesica dixi, utendum: in eisdem partibus & lumbis: item quæ intendendi uim habent, usurpabimus. non cõuenit autem lac, caseus, & reliqua bellaria, lactucæ, aliæq; olera. Longanone uerò soluto, in quo nonnunquam citra uoluntatē stercus erumpit, nonnunquam cohibetur iisdem uti par est: interim hæc ab inferioribus partibus clystere demitti: aliàs astringentia, ut cupressi decoctum, lentisci, rubi: laxantia, ut adipem suillum, & anserinum, uitulinumq; & oleū: interdum rodentia, qualis est muria, uel cucurbitæ syluestris, uel similium decoctum. Neq; enim quicquam sic motum promouet, ueluti uaria agitatio. At si frigus prehenderit, etiam ex euphorbio acopon oleo dilutum per inferiora inditur. Artus autem resolutionem experti, cum communi curatione flectantur, perfricentur, extendanturq; in modum prædictum. Nam in frictione spei plurimum consistit.

De resolutione ob colicum dolorem contracta.

Nostra ætate colicus quidam dolor incruduit: ex quo præsertim superstites futuros consummata artuum motus priuatio comitabatur: tactus sensu, ut uidebatur, incolumi seruato, ceu Critica quadam ex alto oborta transmutatione, unde motus plerisq; spatio temporis sponte rediit. Qui uero difficiliore curatu extitere, etiam simplicioribus ex prædictis inunctionibus leuati sunt. præcipuè autem efficacia sunt experti, acopon ex populo nigra confectum: item quod abiete constat. Sed quæ roborandi uim obtinent, ac modicè refrigerant, multis præclarè opitulata sunt.

De conuulsionibus.

Cap. XIX.

Postquam de resolutione tractauerimus, proximum est, ut de cõuulsionibus agamus quoniam neruorum uterque affectus est: quare etiam de tremoribus dehinc dicitur. Cui igitur statim ab initio, uel non multo post morbi prin-

epia ex orientes conuulsiones longius prorogantur, ex repletionem ducunt originem. Vbi uerò sudores largos, aut uomitū, aut deiectione, aut sanguinis profluvia, aut uigilias, & aut famem, aut motus tum multos, tum uementes subsequuntur, inanitioni feruntur acceptæ. Et cum ex sanis alicui repentina superuenit conuulsio, ob repletionem cum fieri necesse est. At si uniuersum corpus, neruiq; ex febribus perardentibus inauerint, ac deinde ob siccitatem conuellantur, maximum sanè hoc malum est, & propemodum insanabile. Primum itaque partes quæ contrahuntur, ualenter uinciendæ sunt, & inordinatis resistendum motibus, oleo perfricare oportet rutaceo, aut sycionio, aut ueteri, aut quodam ex hoc genere: tum aquā nullam potui præbere. Eos autem qui ex inanitione conuelluntur, oleo, uel hydrelæo calido fouere cõpetit, si nihil prohibet etiam ad lauacrum deducere, tempetatoq; folio uti, cum oleo & frictione leuissima. Nutriendi sunt sorbitionibus ex chondro & alica, unioque tenui & quod facilè distribui possit, aquoso, nisi febris adfuerit: tunc enim ptisanæ cremor utilis erit, somnumque accersemus. Iam uerò ex plenitudine, aut inflammatione, contractas conuulsiones curabis, si copiam euacues, inflammationem uerò proprijs ipsi præsidijs discutias. fit etiam conuulsio, cum uomentes uehementius turbantur. Succurrit autem conuulsis acanthij radix, spinæ albæ, & ægyptiæ semen epotum, nonnulli centaurei tenuis succum potui exhibent, cum repletio conuulsionem parit. Atqui non modo potui dato castoreum, sed etiam à fortis cuti unà cum sycionio il linito. Si uerò malum hoc modo non finiatur, cucurbitulas cū scarificatione admouere prodest: si crura contrahantur, coxis, & postremæ uertebre: si manus conuellantur, etiam dorso, & primæ ipsius uertebre, tum ei quæ humeros superiacet. In uniuersum corpore ab affectu immuni, si labrum, aut palpebra, aut lingua contrahuntur, graue symptoma existimandum est, quòd maxima inuehat pericula, licet exiguæ partes affectæ uideantur. In his itaque sanguinis ex occipitio, & primis uertebreis detractio rectè adhibebitur.

T De tetano eiusque differentijs. Cap. XX.
 Etanus, cum & ipse conuulsio quædam sit, procreatur musculis corporis, & præsertim spinæ, à frigido humo-

re intus & foris infixo ceu congelatis: ideoq; hoc malo occupati, flectere sese nequeunt. Verum cū particulę corporis in anteriora tenduntur, affectus nominatur emprosthotonos: cum in posteriora, opisthotonos: cum in alterutram partē æquali robore intenduntur, tetanus appellatur. Pelops hæc uitia tētionem uocat, & contensionē musculorum ceruicis, æneruorumq; , per quos caput inclinatur, tenuit & circumuoluitur. At si circa posteriores ceruicis musculos malum consistat, opisthotonos ex accidente: si circa priores, emprosthotonos: si utrinque, tetanus nuncupatur. Causam tribuit musculis repletis spiritu, & aere crasso, nebulosoq; : quem impense frigidum, & concretum, eoq; ad motum contumacem affirmat, unde etiā sicca potius quā humida fomenta malo prehensis conuenire. Hæ quidem tetani differentię sunt. Curatio autem in his cum communis quædam sit, non euariat. Optimum itaque præsidium ipsis est febris, quæ per initia non fuerit, superueniens. Notæ horū sunt, angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus ipsis sardonius oboritur, rubet facies, oculi magis intumescunt, adhæc aut non urinam reddunt, aut aquæ similem, aut cruentam, cum bullis quibusdam: item aluus succescit, uigiliæ magis urgent, crebroq; à conuulsionibus periculum est, ne lecto ægri excidant, quin etiam singultire incipiunt: indolentq; , alii capite, alii clauiculis, & lumbis, quidā ipsorum subtremiti quoque euadunt. Porro facit affectū (quamuis raro) lassitudo, humi dormitio, pōderis eleuatio, casus, uulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandē neruis offensam inferre possunt. Curatur, quo modo conuulsionibus ob inanitionem generatæ, solent.

Curatio tetanorum.

Q Vibis ceruix recta intenditur, initio sanguis detrahendus est, partes lanis oleo madidis sycionio, castoreoque cum ueteri contegendæ, aut uescicam quoque latam calido oleo repletam, tendinibus superimponere oportet, & cucurbitulas admouere, cum lancinatu. leues enim noxam quoque inferunt, item ceruicibus nonnunquam cucurbitulæ defigētur, & utrique spinæ parti, adhæc pectori, quæ est musculosus, & præcordiis: interim uescicæ regioni, & renum. Porro liberaliter sanguinem auferre conuenit, modo non uniuersim id fiat. sed particulatim & per uices. Sudores lanis oleo madentibus

tibus abstergere, ne imprudentes refrigerant. Quod si tetanus in uetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere confert, non tamen diutius immorari: quippe in oleum descensus, maximè uires conuellit. Potus erit hydromeli spissius ad dimidias decoctum. Qui robusti sunt, panacis liquoris drachmam bibent. sin minus, tres obolos, uel minimum, obolum. At si quis ipsum ceu stomacho inimicum habeat suspectum, animoniacum quoque exhibeatur, uel liquoris cyrenai ci instar erui discocto melli ci-cumlitum deuoretur, & laserpicii radices duo cochlearia, tribus mulsæ cyathis inspersa, uel ipsius decoctum exhibentur, uel myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssopi quæ decocto: sed omnium securissimum expeditissimumque est duo, tria uel castorei cochlearia, partita ipsius quantitate, & per uices data. Non enim offendet etiam si secundum cibum ex eo quid exhibeas. Potus uerò ipse præter alia tum paulatim, tum modicè assumetur. Nam dum ægre potionem transmittunt, in nares ipsam propellunt, unde uehementer turbati, ad conuulsionem prouocantur. Sedes oleo rutaceo cum opopanace perungi debet, quod ab inferioribus quoque partibus iniicietur. frigidæ superfusionem, cum sit (quemadmodum ait Hippocrates) maximè temeraria, teoque posteris, credo, uituperata, & nos damnamus, deuitamusque. Unguentum hoc conuenit, nardi sextarius, ceræ uncia duæ, folii, amomi, styracis, mastiches singulorum uncia: castorei, adaracæ, euphorbii, piperis singulorum uncia: spicæ nardi, opobalsami, singulorum tantundem.

† Hæc ita scripta sunt ueteri codi. τὴν δὲ τῆ ψυχῆ κατὰ χύσιν, ὥς ἰπποκράτης φησὶν τολμηρατά τιν ἔσαν καὶ διὰ τὸ τοῖς μεταγενέτεροις ὁμαι, παραλειφθεῖσαν, frigidæ autem affusionem (quemadmodum Hippocrates ait) quum maximè temeraria sit, & ob id à posteris prætermissa utamus.

Potio opisthotonicis accommoda.

P Anacis radices, piperis albi, costi, myrrhæ, papaueris lachrymæ, singulorum pares portiones, exhibentur cicerculæ modo somnum capturis: benefacit etiam orthopnæicis. Porro uictus erit tenuis, qui expeditè distribuat, & recrementis omnino uacet.

Tremoris origo in uniuersum quidem ex neruorum imbecillitate est, quod ætas senilis palam testatur: priuatum uero plures causæ ipsum efficiunt: nempe frigida in temperies, frigida potio, & præsertim in febribus intempestiue assumpta: frigidi, glutinosique humoris redundantia, & uini usus liberalior. Qui igitur ex erroribus commissis manifesto tremunt, à noxijs abstineant. At si perseverat etiam in febribus tremor, primum corpus totum oleo sabino perfundatur: ubi autem accessiones remittunt, ueteri, aut sycionio. Summa uero corporis membra lanis mollibus prius tamen præuncta contegantur. Deinde cucurbitulæ à priori uertebra usque ad spinam, lumbosque agglutinentur, sic ut particulæ prius cū præcordijs cruda hordei farina ὠμυλυσιν Græci uocant, delinantur. Iam hæ quoque partes lanis ex ueteri, aut sycionio oleo respersi operiantur. Quod si febres inueterauerint, die uno interposito in oleum, aut hydrelæum tremuli descendant, utanturque frictionibus mollibus. Si longius prorogatur dispositio frigoris suspicione, mulsa, castoreumque potui dabitur, & calidis locis gestari debent. Cibus diductu facilis offeretur, primum sorbilis, mox uolatilium, & piscium, qui molli carne sunt præditi: febribus solutis lauandum est, sed uitari debet frigidum solium, uinique potio. Porro si crassorum, uiscosorumque succorum copia fuerit, uti conuenit iis quæ incidunt, extenuantque, uerbi gratia, rutæ ramusculo, spondylii, quantum tribus digitis comprehendi possit, castorei, & nitri singulorum obolis duobus: Datur quotidie cochleare unum cum oxymelite ad tres usque dies ieiuno, uel panacis, & piperis grana quinque ex mulsæ cyatho. Simplicia præsumpta trementes adiuuant, castoreum, leporis cerebrum comestum, althææ radicis decoctum, damassionij foliorum drachmæ quatuor in mulsa, eupatorium ex aqua. Superante autem frigore etiam zosymi unguine, item acopis ad resolutionem conscriptis, unctionibusque & cutis ad ruborem usque exasperatione, phænigmon Græci uocant, utemur: præterea exertitijs, perfricationibusque: uero qui ex uini potu tremunt, uinum circuncidendum est, quoad in totum morbo fuerint libera ti.

Ocularia, & primum de dolore ex Galeni commentarijs. Cap. XXII.

CUm in oculis uehementiores oboriuntur dolores, cōsiderato, quanā ex affectione corporis dolore ipsis in inflammationibus accidat. Vel. n. dum ab influentiū acrimonia uehementius eroduntur, uel quia tunicæ succis repletæ tenduntur, uel quōd crassis succia, aut spiritibus flatulentis quodāmodo intenduntur, graues in ipsis dolores oboriuntur. Rosiones igitur purgantibus curare præsidij, noxium humorē uacuādo par est. Item cādido oui liquore in oculos infuso. Vbi uero concocta iam fuerit inflammatio, corpusq; superfluis uacuum balnea ipsis aptissima sunt. Ex repletionē autē contrāctas inflammationes sanguinis detractione, alui ductione, & paritū inferiorum frictione perſanare conuenit. Intenſiones autem, toto prius corpore uacuo: item humoribus qui sursum tendūt, ad inferiora reuulsis, deinde loco iniectis remedijs, quæ discutiendi facultatem habeant. fomenta itaq; adhibenda ipsis sunt, & fœnugræci decoctum infundendum. In quibus autem sanguis crassus oculorum uenulas intendit, sic tamen ut corpus totum plethoricam affectionem non præ se ferat, uini uſus est, quod possit excalfacere, uacuare, & meatus aperire.

De perturbatione, & lippitudine quam proprie ophthalmiam græci uocant.

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno, non ex corpore, sed ab externa causa aliqua proueniens, ut à sole, fumo, puluere, oleo: quare etiam occasione ipsius separata, promptissime soluitur. In genere huius perturbationis, lippitudo est: uerum non extrinsecus tantum, sed ex interiore etiam causa cæca ingruit, perque tres quatuorue, aut quinque dies plerumque durat, facillimè descutitur, si obseruentur oīa quæ foris accideria turbare lumē possint, itē parciore cibo, aquæ potu, aut inambulatione, & alio ex facili respondente.

De inflammatione.

Cum inflammatio ipsos oculos occupauerit, post totius corporis uacuationem, perungendi sunt ijs quæ impetus humorum possunt repellere, & irritationem lenire, quale est, quod ad Neilum authorem refertur, diarodon, uel etiam Me-

diacum, Nardinumq; . Vbi membrana adnata inflammatione tenetur, medicamentis utemur, quæ græci ab uno die monemera uocant, cum oui cādido infusis . Die infecuto nisi inflammatio crescat, nardino delinentur: fotu ex meliloti decocto uti conuenit. ubi uerò crassus humor est, qui lippitudinē facit, medicamentis accommodantur, quæ neq; infarciendi uim habent, emplastica græci uocant, neq; humores increassent, sed quæ diffundere, humectare, & excernere idonea sint, quale est Chiacū. At si humores in capite fuerint impacti, cucurbitulā occipiti admouere oportet, uel scarificare, nel hyrudines fronti qua oculus dolet, adhibere, panemq; purum aqua maceratum cū modico rosaceo, aut polentis incoctis capitū papaueris decocto, similiter cum rosaceo, superdare . efficaciore autem utendū est cataplasmate, ex croco, melilotis, palmularū carnibus, teneris coriandri folijs ouorum luteis tostis micis panis in sapā intinctis, rosacei momento, & papaueris capitum contritorū decocto. Interdum semen quoq; ipsius ad leniendū dolorem miscetur . Si magna doloris necessitas est, etiam opij paupillū adijcitur: ubi dolor abest, stupefacientia græci κακωτική appellat . uitari debent. Quod si mediocri inflammatione infestet, aloen per se, uel aqua uel oui albo dissolutā illinito. ut autē expeditius sit auxilium, croci drachmas sex, aloes drachmas sedecim, gūmi drachmas nouē coniecta in unū aqua pluuiali excipito, singitoq; collyria. † Iā quæ uocantur diacrocū lippitudinū iniitiis sunt idoneæ: in quibus uerò tumor cedematodes hoc est mollis cedensque & exalbidus habetur: tū circa palpebras, tū membranā adnatam sine tunicarū offensa, benefaciunt etiā liquida collyria (Græci hygrocollyria uocant) & ex croco, & atramento sutorio & melle præparata . hoc autem est laudatissimum .

† Aliter hæc leguntur in antiquo exemplari, καὶ τὰ διακροκα δ' ἐπ' ἀποκαθάρσιν πρὸς τὰς ἀχῆς ὁφθαλμῶν εἰσὶν ἐπιτίθεται, id est, quæ diacroca appellantur oculorum conturbationibus sunt accommodata .

Liquidum collyrium quod dolorem leuet anodynon appellatum .

CRetæ sutorig, mellis attici, succi sænigræci singulorum partes portiones incoquito, donec mellis spissitudinem habeant. deinde specillo duos angulos attingito .

Ad defluxionis impetum, qui epiphora græcis dicitur.

ADfluxionum impetus, per initia quidem conuenit inedia, aquæ potus, & multo magis ueneris abstinētia: Aluus sub duci, facies posca aquosa collui debet, præsertim si feruens fuerit fluxio, sin minus, atramento sutorio cum melle frons & palpebræ delinantur. Nonnulli atramentū sutorio aqua dissolutū ad collutionem exhibent. Porro qui defluxu citra inflāmationem uexantur, uel etiā cum inflammatione quidem, sed ita ut supra os caluariæ affectus consistat, agglutinamentis utendum est in frōte: simplicibus sanè, uiridibus uicis folijs, uel rubi succo, uel portulacæ, uel coroniorū cum polēta tenui, uel galla leui cum uino, & polentæ polline, uel cicuta, uel psyllio cū aqua, uel solano, uel cochleis cū testis suis in puluere redactis, à tempore ad alterū tempus illitis: In uniuersum iis quæ astringunt, refrigerantq; Compositis autē his: pollen frumē raceus, & myrrha, uel thus cū oui aquato illinat, uel samia terracū myrrha, & manna similiter ut oui albor inungetur. In frigidioribus autem humorū cursibus sulfuris uiui, bituminis, picis, colophonix singulorum drachmæ duæ item Musæ pastillus, & Aster, similiaq; probe repellunt. Iam uerò Theriace uino astringente dissoluta, fronti q; illita frigidos humorum influxu, sistit. quin etiam eadem pota uehementer his succurrit. Ipsi uerò oculo, lana, aut panniculus tenuis, oui albo madens imponitur; item caseus recens similiter oculo applicatus, acres maxime influxus cohibet. tum collyria à reprimendo dicta staltica, si illinantur, instillanturq; ex oui aquato idem efficiunt. At si in imo, & sub ossē hærescens humor longiore spatio duret post generales corporis uacuationes, medicamentorū usus est quæ per nares atq; os pituitam eliciunt, errhina & apophlegmatismos appellāt: caput raderetur, & rubor in cutæ excitabitur. Porro in his etiā curandi rationes, quas in capite manu administramus assument, nempe Angiologiam arteriotomiā, hypospatismum, & periscyphismū, ut græci appellant: & in uertice usq; ad os adustionem. Iam cucurbitulæ occipitio incisa cute admotæ, impetum fluoris possunt reuellere. Fluxiones extra caluariā notāt, uasa in fronte & tēporibus distēta, & capitis ueluti uinculū, tū quod ex agglutimētis sicca præsidio sunt. Si hæc desinit, & fluoris impetus prorogetur, & iternutamēta nonnunquā moleste elidantur, humorem sub caluariā teneri, censendum est.

De chemosi.

CHemofin appellant, cū utrāq; palpebræ ex uehemēti inflā-
matione inuerſæ fuerint, ut uix oculi ab ipsis cōtegātur, &
albū oculi nigro sublimius euaserit, rubrumq; ēt magna ex pā-
te nigrū occupet. Curā uenæ ſectiōe, medicaminū purgātē,
collyrio diarodō albo, & qđ à cinereo colore uocat̃ σποδίακόν,
cū lacte, uel oui aquato. Eodē uerò palpebras, tēpora & frōtē il-
linere oportet, tū fomentis & cataplasmatibus lenib. uti. cū autē
remittit inflammatio, acriorib. quale est etiā uiride diarodon.

De hypophthalmatis, & emphysematis.

Hypophthagma uenarum adnatæ membranæ ruptura dici-
tur, ex ictu potissimum eueniens. Instillatur itaq; ipsis
sanguis palumbi, uel columbæ, uel calido lacte muliebri thuris
paululum conterens, uel muria, & præsertim ex sale cappado-
cico: sicut utitur ex hyssopi decocto. Porro tumor mollis, œde-
ma uocant, oculis ex ictu obortus, fomentis ex posca conti-
nuis, & spongia ex eadem superdata discutitur. Recte huic spe-
cularium combustum, & sterqus columbæ æquis portionibus,
uino aut aceto contrita illinunt. Iam caseus recens uel rapha-
ni cortex, uel uua passa sine acinis, singulatim ex posca, uel
mulsâ applaudentur. Eadem faciunt ad Emphysemata:

Ad emphysemata pruriginosa, & psorophthalmias.

Emphysema palpebræ tumor est, œdemati similis: psoro-
phthalmia autem pruriginosa eiusdē scabies, ex falso & ni-
troso humore contracta. Conuenit ipsos suouere, posca, leni-
culæ decocto & rosarum. Hygrocollyriū autem hoc æris drach-
mæ sex, misyos tostī, myrrhæ singulorum drachmæ tres drach-
ma una semis piperis drachma uini Chij & passi cretici singu-
lorum cyathus unus, & dimidijs: incoquantur quoad mellis
spissitudinem habuerint. Hæc est Erasistrati compositio, quæ
panchrysos uocatur: facit etiam ad anginam, ulcera oris, puden-
dorumq; & aurium dolores. Inungant & oleo palpebras, som-
num initari. Ab acidis, salis, & acris abstineant.

De sclerophthalmia, & xerophthalmia.

SCLEROPHTALMIA, durities oculi, & difficilis mo-
tus est cum labore, ruboreq; citra humiditatem. foue-
re igitur ipsos crebro, spongijs aqua calida imbutis ex usu
est.

est. Item ouum palpebris in lecto imponitur, cum rosaceo: uel adeps anserinus. Frigida & quæ indurant uitanda: caput uelandum, ungendumq; alius ducenda: Xerophthalmia, quasi dicas arida lippitudo, pruriginosa oculorum est siue fluore dispositio. Curatur balneis, inunctionibus, & uictu probi succi: utrisque uerò cōmuniter conueniunt medicamenta acria, ut uel la chrymas prouocent, per quæ & duresces emollietur, & siccitas humectabitur. Talis est Erasistrati quoq; panchrysos, & quod dicitur Dicenteton, item cui nomen est Stratiotico.

De ectropijs.

Hic affectus palpebræ inuersio est, aut propter cicatricem, aut excrescentiam carnis nascens. In quibus igitur excrescentia inueterauerit, æruginem rasam torrefactam conterito & admovento, uel plumbo usto cum sulfure uiuo, & loto utitor, uel utrisq; paribus & æruginem & plumbo. Nam ex cicatrice proficiscens Ectropion, si in totum curare studueris, id manu faciendum est.

† Verior lectio est in antiq. ἡ περίβρω κακωμένω χρω μετὰ θείῃ ἀπὸς καὶ πέπεως, id est, plumbo usto utere, cum sulphure ignem non experto & pipere.

De ægilope, & anchilope.

Aegilops abscessus est, qui inter maiore oculi angulum, & nares fit: qui ruptus, si negligatur, usq; ad os in fistulā dehiscit. priusquam uero abscessus in ulcus erūpar, Anchilops uocatur. probe igitur faciunt glaucium & crocus una cū perditij herbæ succo imposta, crebro aut uariare oportet, & neq; in uomicæ eruptionem degenerabit. ALIUD. Halica cocta in aceto & probe trita, nō solum incipientes, sed etiam in uomicā mutatos persanat, rumpitq; & usq; ad os penetrat. Hoc usus non solum ægilopas, sed etiam anchilopas curabit. ALIUD. Ruta satiuā una cum lixiuio, quod ex cinere & calce confectum est, contrita, coctaq; & imposta pulchrè admodum ægilopas emendat, & ad usque os permeat, initio erodens, postea non ita: ac mirum est, q̄ ne cicatricem quidem indecoram hoc præsidium relinquat. ALIUD. Cochleas cum testis suis tritas imposito. interdum aloë, uel myrrha admista. Præsidium hoc antequam ægilops in pus degenerauerit, & postea cum ruptus fuerit abscessus, cum desiccat. ALIUD. Cum manus opera ægilopa &

anchilopa aduris, hoc utere cataplasmate, lenticulas decoquit, & cum melle utitor ubi crusta exciderit, uam passam excipiens liquida terebinthina, utitor in modum emplastri. Hoc enim & purgat, & carne replet, & cicatricem inducit.

De trachomate.

TRachoma internæ palpebrarum regionis asperitudo est: harum intensio, ut ueluti incisuras habeat, *σύνκλις* à fici similitudine *gizæcis* appellatur. Cum inueterauerit uitium, callosq; contraxerit, stylosis uocatur. Collyriis igitur utendum est tum eo quod ex uino, tum quod ex duobus constat lapidibus, ipsoq; hæmatite lapide, ex aqua loto subiectis palpebræ abstergentur: Hermatioq; cum Cygnarii modico. Adhæc diacroc collyrium pariter pŕorophthalmiis citra exulcerationem efficax est palpebræ inuersæ illitū. At si durior callus, his non cesset remediis, palpebra inuersa pumice raditur, aut sepiæ testa, aut foliis fici, aut etiam instrumento, quod à palpebrarum rasura ble pharoxiston græci appellant.

De chalazijs.

Chalazion, otiosi humoris in palpebra colluuius est in qua ammoniacum aceto detritum simul cum galbano inungitur, facit etiam terebenthina pariter cum cerato excepta.

De crithe tuberculo.

CRithe, paruulum abscessus tuberculū, oblongum, palpebræ cilio obueniens. Id cera alba foueri oportet: muscæ capite abiecto reliquo corpore infricari, uel hordei diluto perfundi.

Ad palpebrarum pediculos.

Expurgatis prius pediculis, marina tepida palpebras colluere oportet. Deinde medicamento subscripto cilium attingere: aluminis scissi partibus duabus, herbæ pediculariæ parte una, tritis utitor.

De madarosi, uel milphosi.

Hic affectus palpebræ pilorum defluuium est. Ad quod cura prius uniuersi corporis habita, smegmatis utere, quibus ab honestandis palpebris nomen est calliblephara. Terræ ampeŕitidis, croci gallicæ, ladani, singulorum pari portione contrita utitor. ALIUD Scimeos tosti lotiq; drachma, plumbi cōbusti & eloti drachmis quatuor, croci toridē nardi iudicæ drachmis tribus, in

bus, in puluerem redactis utitor. **ALIVD.** Palmarum ossium cōbustorum tribus drachmis, nardi gallicæ drachmis duabus: leuigatis utere. hoc etiam scabiosis oculis medetur. **ALIVD.** Neapolitæ ad palpebrarum defluuia, *μολφώσις* appellant, longosque palpebrarum affectus. Stimeos, cadmiæ, chalcitidis, mihiyos xenici singulorum pares portiones. crassiuscule contundito, & melle respersa torreto: leuigatis utitor.

De ptillofi.

Ptillofis, palpebrarum crassities est, callosa, rubicunda quibus accidit sæpe pilorum etiam defluuium. Præter prædicta igitur etiam hoc summe facit, Muscerdæ cōbustæ, & melle contritæ, inunguntur.

Ad superciliorum defluuia quæ madarosis dicitur.

Plumbum digitis oleo, uel adipe anserino unctis detritū illinitur. **ALIVD.** Hoc est subnigros reddit: nuces autellanæ exustæ simul cū adipe caprillo, uel ursino infricantur. **ALIVD.** Hoc efficax est et barbæ alopeciiis. Alterci drachmæ duæ, muscerdæ drachma, polytrichi drachma irini unguenti cochlearia quatuor Tritis perbelle unguentum admiscetur. fortisq; prius adhibito illinitur. quod, si rasa pars ante fuerit, magis proficiat.

*De palpebrarum pilis oculum irritantibus *τρίχισιν* appellant.*

Pilis qui oculū pungunt prius euulsis, locus statim sanguine ranæ per se inungitur, uel cum cinere chamæleontis albi, uel sanguis cimicum, uel fumaricæ quæ in hordeo nascitur succus, cum gummi, uel tellinarum salsarum cinis cum cedria, uel loti cinis, uel alumen liquidum quod phorimon appellant, uel muscæ caninæ sanguis admodum in id efficax est.

Pilorum glutinans medicamentum.

Conglutinant pilos infractos bitumen, mastiche, colophonia, gummi, cochleæ par glutinosa.

De encanthide & rhyade.

Encanthis naturalis in maiore angulo carūculæ excrescētia est. Rhyas aut huius imminutio. Enchātidis igit quæ aduersus ectropia dicta sunt, similibusq; urēdi nel exedēdi facultate præditis, hæc *ονανθικα* illa *ρυστικα* greci noīant, absumes, sed nō totas, ne eius loco Rhyas sub nascat, uerū ad naturālē usq;

magnitudinē. Rhýadas, carnosā parte in totū, uel rudi manuſ opera, uel medicamentis abſumpta, inſanabiles exiſtimato. Quod ſi pars ipſarum imminuta fuerit, iis quæ mediocriter aſtringunt, carnemq; creantibus reſcitur: qualia ſunt medicamenta ex croco, glaucio & aloe conſectaitē collyria diacrocu inſcripta, nec non altercum prodeſt in uino coctum, impoſitūque, & aluminis ex uino pauxillon.

De ulceribus.

VLcerum in oculis genus quidem unū eſt, differentia uero ſpeciales diuerſæ: etenim in cornea membrana quæ græcis ceratoides appellatur, ulcus cauum, anguſtum, & purum, à ſoſſula botryon græcis dicitur: quod aut latius botryo eſt, ſed minus altum, cælo ma nuncupatur. Argemon in pupillæ circulo naſcens, ambientia cōprehendit, ut etiā in exteriorē pupillæ parte rubicundū, in interiorē candidū appareat. Epicauma ulcus eſt ſordidum, & cruſta obductum, quo repurgato humores oculi ſæpe effluunt. Iam uero aliæ plures ulcerum ſunt differentia, de quibus dicemus cōmunius. Si igitur ulcus ſimul cū inſtāmatione obortū fuerit, curationē ex iis quæ inſtāmationem lenire poſſunt, & concoquere, moliemur, nō neglectis iis quæ ad ulcus propriē pertinet. Talia uerò ſunt collyria, libanium, cygnus, & pelaria uocata, item aſter & ſimilia: inſuper quæ ex amylo, terra ſimia quæ & τῆς dicitur & ceruſa conſtāt: omnibus autem magis leniendo dolori eſſe Ilamonem nouimus, uerum diu ei inſiſtendum non eſt, eo quod admodum ſtupeſciat. Laudatiſſimū uero & quod diazematōn a decoctione dicitur, ut quod ſtupeſcendi uim non habeat. At ſi cum ſtuatione ulcus inſeſtarit, collyrium aliquod illi admiſcebimus, quale eſt diahydraz, & Chiacum, præterea Cygnus ſuluus & quæ repellendū ſine roſione facultatem obtinent. Sin autē ulcera ſordida fuerint, muſſa mediocriter aquata, & ſœnugræci decocto utemur per ſe, & cum aliis ad id dicatis collyriis. Si acriora ſint albis, ſeberiano & ſœnugræci diluto: ſi non acria, diaſmirnes, & nardinis. Purgata uerò ulcera medicamentum Cleo probe poteſt cicatrice obducere, eamq; præterea concoctorem reddere.

¶ Exemplar græcum typis expreſſum ita habet *διγμυτέραν τῶν ἐλκῶν*, id eſt, ſi acriora ſint ulcera &c.

De oculi procidentia quæ πρόπτωσης dicitur.

PROPOSITIS tuniculæ quæ græcis ab uux acino ῥαγινδῆς dicitur, procidentia est, quæ erosa rupiæue cornea tunicula accidit. Ea cum nondū creuit q̃ muscæ capiti similis sit, myocephalon nominatur. Cum uero amplius & eo usq; succreuerit, ut acinum uux repræsentet, staphiloma, quasi uuatio ducitur: ubi plurima facta est accessio, ut palpebras transiliat, melon, hoc est malū. Si uero obcalluerit, elos, id est, clauus tunc dicitur. Si igitur ad myocephalon ferè oculi procidentia degenerauerit, repellentibus cōstringentibusq; ipsum medicinis utendum est: Chio nimirum, Phæo, Nardino, & Theodotio: item eo quod dia thallias, & quod diaceratos uocatur. iam uero spōgiam leniter ipsis posca, aut uino adstringente, aut rosarū decocto imbutā, super dare cōmodū est, aut splenium. Principarum uero obtinet ad procidentias omniāq; ulcera, medicamentum cui nomen est Olympiacum, uel Olympus, cum succo oliuæ, uel polygonii, nel polij. Eadem hæc etiam clauis conueniunt & staphilomatis. priusquam inallescāt. Vbi uero alborem, aut callum contraxerint, bullus remediis locus est.

De oculis pululentis.

ALiquando membrana à cornu dicta ceratodes, purulenta efficitur, nunc altius nūc in superficie, ita ut pus habeat unguis figurā, quæ causa est ut hoc etiā malū unguis oculi nominetur. Huc ergo spectat curationis ratio ut uel pus discutiat̃, medicamētis mediocriter in id efficacibus quale est aqua mulsa, & sœnugræci succus, ex eoq; collyria, similiter libanium, & quæ ex thure cōfiūt, dia libanu inscripta, uel rūpatur uomica, & uehementioribus repurgetur, quod genus sunt diasmirnes, & hygidion. At si pus in oculis citra exulcerationē coierit, etiā hoc liquido collyrio utendum est. Atramenti sutorii, croci singulorum drachmis octo, myrrhæ drachmis quatuor, mellis libra. Cæterū phlyctæna cū sit ceratoidis mēbranæ excrescentia, ex humore quodā tunicas ipsius excoriantē, purulentorum curationi subiicitur. Hygia, hoc est liquidū medicamentum ad suppurantes oculos quos hypopios uocāt: Bassi croci, aloes, myrrhæ singulæ unciz, uini quadrans, mellis optimi selibra. Crocus ex uino modico teritur, deinde alo & myrrha. Vbi crassitudine acceperint, mel additur. Vnita in uitreo uasē reponuntur uti licet

uti licet bis quotidie, aut si necessitas urgeat, ter. Quando quidem oculum simul purgat, & carnem cicatricemq; inducit.

De cicatricibus & albuginibus.

Que per summa oculorum cicatrices fiunt, aliqui hoc nomine solo cicatrices dicunt, alij uero nubeculas. Alius aut delitescentes, albugines, medicamentis absterforijs, extergentibusq; discutiuntur. Nebulas igitur anemonæ succus abstergit, & minoris centaurij succus cum melle. Vetustiores autem cedria extenuat: & æs solum aqua tritum modo collyrii, ad hæc quæ detergent collyria: quale est quod cornu ceruino constat, dia ceratos elaphiu dictum: item Rhinarium, Hecatombe familiaq;. Albugines uero nitrum cum oleo ueteri detritum diligenter, & inunctum probe, extergit. Item sepiæ testa coibusta, cum melle leuigata. Inter collyria hoc bene, & leniter abstergit. Collyrium. Mamiræ, guttæ ammoniaci, myrrhæ trologdytidis, crocodilorum fimi, singulorum æqualia pondera, in collyrium coactis utitor, uel crocodili terrestris fimum ex aqua leuigatum illinito, in collyria redigens. Rectè autem sal capadocum aqua soluitur, quo collyria albuginibus exterendis dicata dissoluens instillabis.

Quomodo cicatrices tingantur.

Gallæ, acaciæ, singulorum drachmæ quatuor, atramenti sutorii drachmæ duæ illinentur. Collyrium autem hoc proficit, floris mali punici, cytinorum, atramenti sutorij, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quatuor, stimmios, gallæ, singulorum drachmæ duæ. Aqua teruntur: si flos mali granati desideretur, interius membranosum quod grana intercedit, misceto.

De ungui oculorum, quod pterygion græcis uocatur.

Vnguis quod pterygion græci uocant, neruosa membrana adnatæ excresecientia est, quæ ab angulo quidem oritur, sed adusq; oculi coronam peruenit, ubi uero supramodum fuerit adueta, pupillam obtegic. Magni igitur & inueterati ungues solam manum exposculant. Recentiores uero & magnitudine mediocres, præsidij eliduntur abstergentibus, qualia aspretudini idonea sunt, & albuginibus. Inter simplicia igitur æs combustum, uel atramentum sutorium simul cum porcino felle pulchre faciunt. Efficacius autem hoc est quod sequitur: atramenti sutorii pars una, gummi pars se missis: uino leuigata illinitur, uel
etiam

etiam collyria formantur, nonnulli uero caprinum fel melle mistum inungunt.

Ad ungues oculorum, suppurationum, & hebetudinem. Oribasij.

Lapidis magnetis, æruginis rasæ, minii sinopici, suffiminis ammoniaci singulorum drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, mellis attici cochlearij dimidium. Idem ualet aduersus albugines.

De carbunculo & carcinomate.

Carcinoma tunicæ ceratoidis affectus est: cui dolor adsit, distentio, rubor tunicarum, cruciatus punctorius ad usque tempore magisque si moueantur, cibi torquet fastidium, acribus irritantur, & excandescunt. Hoc malo nulla medicina subtrahit. Nihilominus dolor leniri lactis potione debet, item cibus frumentatius & alioquin probi succi, omni acrimonia liberis. Collyria leuia infundantur, ut spodiaceum, seberianum & consimilia. Cæterum bonæ totius corporis temperaturæ prospiciendum est. Carbunculus autem, & ipse malignum ac contumax ulcus est, crustatum aliàs bulbo, aliàs palpebræ, quemadmodum reliquis pariter corporis particulis accidit. Itaque in bulbi carbunculis per initia quidem clystere primum, mox lacte discocto, mediocriter purgare conuenit. deinde spongia foto erui farinam, uel triticeam ex aquæ mulsæ decocto obducere instar cataplasmatis, nonnunquam & iridem detritam applicare, & lacte oculum eluere. Si ulcera serpendo depascant, lenticula cum melle, uel malis cydoniis incoctis forma cataplasmatis obducuntur. Si latius depascendo penetrent, foliis oleæ decoctis, uel malicorio in uino cocto leuigatoque ex melle. At si cessent proserpere, crustaque medicamento quod subiugetur, imposito, exciderit, & ulcera sint pura, lutea ouorum tosta, leuigataque cum croco & melle cataplasmatis modo inducentur, quousque ad cicatricem perueniant. Medicamentum autem est hoc, spodii drachmæ quatuor, myrtæ non nimis torrefactæ drachmæ treis totidemque oboli. Detritis in uino amineo quousque inaruerint, passum creticum uetus miscetur. Vbi leuigata sunt inuicem, liquida, pixide fictili excipiuntur, subiungunturque. Ad palpebrarum uero carbunculos malum granatum acidum, totum frustum concisum aceto incoquito. Vbi intabuerit probe, in lacte uore magis

uoremq; detritum, illinito in lintheolum ac utitor, bis tēue quotidie immutans, noctu semel.

†Hic locus integrior est in nostris exemplaribus, in quibus ita descriptus est. *προνοῖται δὲ καὶ τῆς τῆ ὁλοῦ σώματος εὐκρίσεως* πρᾶνται δὲ τὰς ὁδύνας τῶν κινῶν ἀφέτημα φακὲ ἔγχυματιζόμενον ἢ χυλὸς πολυγόνου ἢ ἀρογλάσσε, ἢ ἀνδράχνης, ἢ δὲ ἀνδράκωσις, id est, bonæ totius corporis temperaturæ perspicendum est. Carcinomatis autem dolores lenit decoctum lentis impositum, uel succus polygoni, uel plantaginis, uel portulacæ. Quam ueram esse scripturā ex Aëtio faciliè intelligi pōt.

De mydriasi.

Cum pupilla colore quidem nihil magis euariat, sed multo est quàm naturalis status exigit latior. interim ex toto uisum impedit, interim permultū, & oīa quæ conspiciūtur ab ipsis minora quàm sint uidetur esse, Mydriasis quidē affectus est, causa autē ipsis humor quidā excremēticius, itaq; curationē ipsius sanguinis emissionē à cubito, uel purgatione tentabimus: sin minus, uenas in angulis oculorū diuidere oportet, deinde cucurbitulam occipitio ad mouere, & marina frontem, & oculos perfundere. si marina desideretur, muria, uel poscæ. Medicamentis autē ijs utendum est, quæ etiam ad pustulas conducunt.

De phthisi & atrophia.

Phthisis affectus est, quo pupilla sit angustior, obscurior, rīgiorq;. Res lumini obiectæ, in his maiores apparēt. causa uero est dēsatio, quæ siccitati potius fertur accepta. Sed phthisis ab atrophia hoc dignoscitur discrimine, qd illa angustiorē pupillam, hæc totum oculum minorē, humilioremq; reddat. Mederi his cōuenit exercitio, & studiosa capitis, faciei, & oculorum fricatione: Adhæc aquæ in faciem superfusione & unguine quodam calfaciēte in caput dato, oculos autem medicamento, quod rarefaciat, & acriore oblinito, quale est infrascriptum. Ammoniæ drachma, crocomagnetis drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, æruginis drachma. Tritis in aqua, formatisq; utitor.

De nocturna cæcitudine quæ nyctalops dicitur.

Nocturna cæcitus, quī Græcis Nyctalops dicitur, uitium est quo per diem homo cernit, Sole dein occiduo obscurius, noctu omnino nihil. Curari debet sanguine ex cubito, & oculorum

& oculorum angulis uacuato, mox purgatione, uel per clystrem inanitione adhibita. Deinde apophlegmatismi indicentur, aut sternutamenta prouocare oportet. Ante cibum hyssopus potui, uel ruta dabitur. Si his remedijs morbus non cedit iterum purgationem moliemur ex scammonia, & castoreo: oculi uero melle despumato illinentur, claudenturq; premendo liquamenta, contiuen-doq;. Alumilis combusti partes duæ, salis fossitij pars una. Trita cum melle sublinuntur. A. L. I. V. D. Iecur hircinum assatur, aquosa inter assandum sanies inde emanans collectaq; inungitur. Quin & ipsum iecur comedendum exhibetur, coctique uapor oculis excipi apertis præcipitur.

De glaucomate, & suffusione quod hypochyma dicitur ex commentarijs Ruffi.

Glaucoma, & hypochyma ueteres unum quoddam malignus esse existimarunt. Posteriores autem glaucomata quidem humoris, qui ob similitudinem crystallicæ κεντραλλοειδής appellatur, uicia, præ humiditate in glaucium colorem transeuntis iudicarunt. Hypochymata humorum affusionem, qui inter tunicam ceratoidem, & crystalloidem concresecunt. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt: hypochymata autem curantur, sed non omnia, proinde suffusione tentatis succurremus, antequam malum radices egerit, consistatq; sanguinis ex cubito detractio, & purgatione. item iniectionibus acrioribus, ueluti ex centaurij, aut cucumeris amaræ decocto peritis, & alui solutione crebriore, cucurbitulisque occipitio cute incisa admotis. Cæterum aquæ potus toto uictus curriculo comperit, cibisque uti qui extenuant. Proderit autem temporis spatium, & apophlegmatismis diebus aliquot uti. Quibus uero ceu culices, oculis obuersari perperam uidentur, ex quadam humorum prauitate, uel biliosioribus uaporibus sursum distributis, medicamentum dialoes amarum exhibetur subinde uel inde sumetur purgatio. In oculis autem medicaminibus utendum est, primum simplicibus, puta melle, cum oleo, & feniculi succo. postea etiam compositis, quale est hoc. Sagapeni drachmæ duæ, liquoris cyrenaci, uerratæ albi singulorum drachmæ sex. Alij addunt in mellis heminis octo. Nos autem tradit Oribasius, subscripto utemur, caucalidis succi, chamedryos, sanguinaræ singulorum æquis portionibus contritis.

Benefa.

Benefaciunt item collyria, & quod succo feniculi constat, & Protheus, & Thallaserus, & diaopobalsamu, & quæ ex his quæ parantur, præsidio esse solent. Insuper feniculi decoctum per initia superfusum adiuuat. item ex succis confectum, opobalsamo, melle, oleo ueteri, & similibus.

De glaucomate & suffusione, ex commentarijs Demosthenis.

FLoris æris oboli quinque, myrrhæ drachmæ tres, nardi indicæ drachma, lapidis hæmatididis drachma: aphronitri drachma, salis floris drachmæ duæ, opobalsami drachmæ nouem. melle attico excepta offeruntur.

De obscuritate, & hebetudine.

Obscuritas, quam amaurosim Græci uocant, est totius cernendi uisus plerunq; absq; manifesto oculi affectu impedi-
mentum. Hebetudo (quæ amblyopia Græcorum lingua uocatur) obscuritas uisus est, ab occulta quadã causa proueniens. Curatio communis sanè est ei quam in suffusis diximus. Priuata uero est, ab angulis sanguinem mittere, hirudines admo-
uere temporibus, inferiores partes perfricare. Procedente tem-
pore etiam ijs quæ sternutamenta prouocant, utendũ est, tum uomitu ante cibum, & inunctionibus, primum ex mellis, & olei æqua portione, deinde composito quod subiungitur. Croci obolis duobus, fellis hyenæ drachma, piperis communis gra-
nis octogintaquinque feniculi succi drachmis sexdecim, guttæ ammoniaci drachma. Contritis ad læuorem aridis ex succo,
mellis cochlearia quatuor adijciuntur. Præparata excipito ærea
pyxide & utitor. priusquam uerò illinantur oculi, in mari-
nam calidam demersi fouebuntur.

De strabismo.

Infantès ab origine strabones curantur larua faciei circūposi-
ta, ut in rectũ uideant. Nam strabismus cõuulsiora musculo-
rum qui bulbũ mouent, dispositio est, & lucerna è regione po-
sita, & non à latere elucet. Præterea cū ad nares cõueniunt ocu-
lis floccos rubros agglutinare uincit angulis qui circa tempo-
ra habentur: ut uisu ad hos incõiuenienter directo, oculos emēdet.

De oculorum expressione qui ἐπιεσμός appellatur.

Exprimuntur oculi nonnunquam, ut exerti perseuerent. qui-
bus sanè strangulatus, mali causa est, ex cubito uenam inci-
dere

dere oportet: sin alio modo id acciderit, medicamento purgare ueratro nigro, uel scammonia. Ex doloribus autem contractas oculorum expressiones, quæ frequenter sanè etiã ex partu accidunt, uteri purgationes soluant: unde has promouere conuenit. in uiris autem post sanguinis. detractiõẽ. si non remiserit uitium, cucurbitulam occipitio defigere commodũ est. Lanam melle imbutam imponere, aut panni floccos cũ aqua, superq; duplicatum linteum illigare leniter. His prodest & marina frigida fronti superfusa, item sereos, & polygoni succus cum meconio illitus, tum alia quæ reprimere possunt, & contrahere.

De confusione.

Confusiones ex ictu, curamus sanguinis detractiõẽ à cubito, totum oculum sanguine, potissimum quidem palumbi recens occisi, sin minus, etiam colombar replemus: deinde lanam mollem in ouum cum uino, rosaceoque contusum demersam imponimus, illigamusque: sequenti die idem facimus, & tertio fomenta exhibemus, lac instillamus, applicamusque idonea, deinde sublinimus medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur: quale est Chiacum.

De myopia.

MYOPIC dicuntur Græce, lusciosi nostris, qui prima natali die propinqua sanè uident, remota uero non item. Insanabilis est huiusmodi dispositio ut. quæ ab imbecillitate spiritus uisorijs proueniat. Contrario his modo senes afficiuntur. Cum enim propinqua non uideant, procul distita assequuntur.

Auricularia & primum de auriũ dolore. Cap. XXIII.

Aurium dolorem ex frigiditate contractum, ubi ex anni tempore, præcedente uictu, uel ægrotantis quoque percunctatione: an ob exteriorem causam acciderit, didicerimus, inde quòd dolor alte citra grauitatem, uel distentionem, uel ardorem fixus sit, calefacientibus curabitur præfidijs, nempe oleo rutaceo, calido uel nardino, uel laurino. calido, uel amaracino, uel philiato, uel spicato, uel communi, cum euphorbio, uel piperi, uel castorco, uel commageno, dicto unguine, uel liquore balsami in meatum auditorium instillato. Iam uero oleum in quo allium decoctum sit, uel cypa, instillatum auxiliatur. At ex calida conceptum intempe-

rie dolorem, in quo feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensione sensus est, contraria medicantur oui albumen subactum in aurem demissum, quemadmodum oculis adhibemus, lac muliebri cum quodam collyrio, quod dolorem lenit, uel succo perditij herbae, cum modico rosaceo: ipsumque rosaceum, uel oxyrhodium, uel succus solani, uel coriandri, uel hastulae regiae, uel oleum in quo lumbrici, uel aselli qui sub aquaris stabulantur, incocti, uel oleum amygdalinum per se, uel buccina uiua numero tria, in eo decocta naturaliter proficiunt. Quod si glutinosi, crassique succi dolores fecerint, capitis, ipsiusque auris grauitas, & praecedentis uictus ratio testatur. sola uero citra grauitatem distentio ipsius auris spiritum flatulentum, cui exitus non patescit, indicat. Itaque in ambobus uitiis uetere medicamentis, quae aperiunt, inciduntque, cuiusmodi est aphronitrum cum aceto, & melle. Item fel ouillum cum oleo communi, uel amygdalino: praeterea porri & cepae succus tepidus cum melle, aut origanum tritum, cum melle & lacte muliebri instillatur. Ad uehementiores aurium perfrictiones fel caprillum cum succo porri inditur. Verum in iis quos multus dolor, longusque urget: & grauis simul auditus existit, haec quoque usurpari debent, cuiusmodi dracontuli succus est, arbrioniae, & similia. priuatim uero qui ob flatuosum indolescunt spiritum, cucurbita ex aqua calida fotu prius facto, circa aurem fixa strenue auxiliatur. At si grauitas, distensio, simulque calor, & dolor pulsatilis, aut etiam febricula oboritur, inflammatione aurem laborare censeo. Atque ante omnia hic sanguis emittendus est, † deinde fotu frequenti utendum ex oleo dulci calente per specillum lana inuolutum, meatui uero adeps anserinus, uulpinusue, aut medicamen basilicum cum rosaceo, uel cyprino, uel irino debet instillari: extrinsecus ea quae dolorem lenire, & concoquere possunt, cataplasmatibus modo superaccommodare. Si dolor uolentus est, iis utere, quae leuiter sensum stupefaciunt: non enim mediocriter periculum est, quod cerebrum neruo per quem facultas audiendi erogatur inflammato. uicinum sit. Probe igitur hoc dolorem lenit, opii pars una, castorei partes duae, cum lacte muliebri, uel oui albumine, aut uino dulci tepido instillantur. Tam pastillus Crocodae, Aster, Philonis antidotum frequenter his pro fuerunt. uerum conuenit crebro souden-

tem aut oleo communi, aut ex quodam calido fomento lanā, hoc ipso imbutam in aurem conicere, sed ita ut partes inflammatione tentata quā fieri potest minime attingantur. At si dolor in uetustatem incidit, ac in pus degeneraturus est, medicamento utitor, quod ex lini seminis succo conficitur, una cū rosaceo, aut chamæmelino solutum, instillatis. Cum autem aqua medicata, meatu recepta auditorio dolorem parit, si quidem copiosa fuerit, ose, uel etiam arundine ipsam exugere ratio est. Sin autem pauca specillo auricularia lana inuoluto ex tergens, oleum quoddam instillabis quod sit partium tenuiū, aut rosaceū, aut oui album, aut lac muliebre. Calida uerò omnia mediocriter esse conuenit, quæ auribus adhibentur.

† Hic locus magis expressus in ueteri exemplari, in quo ita est descriptus. *Δει δὲ συχνῶς πυριῶντα, ἢ τῶ κόνειῳ ἐλάει, ἢ τινὶ τῶν θερμῶν μύραν χρῆσθαι, ἢ καὶ ἱριον ἐν αὐτοῖς τέτοις βαβεῖν μένον ἐπιτιθέναι τῇ ἀκοῇ*, id est, oportet autem assidue fouere & oleo communi, uel aliquo medicamento uti, atque eo madefactam lanam auri imponere.

Ad ulcera quæ simul cum inflammatione affligunt.

Licium & meconium æquali portione trita cum melle iniiciuntur.

Ad dolores maximos, pus & grauem auditum.

AMygdalinum quibus corticem detraxeris & aphronitri singulorum drachmæ tres, opij drachmæ tres, thuris drachmæ tres, croci drachmæ quatuor, galbani drachmæ duæ, myrrhæ drachma Aceto læuigata instillantur. si dolor quidem exercet, rosaceo dilutā: sin autem pus profluit, mulso, uel oxymelite: si grauer auditum, aceto recentia ulcera glauciū solutū aceto, persanat: itē ex eo collyria, tū quæ appellatur diarodon, diacrocū, & diasimrines quemadmodū rursus suppurantes citra dolorem ferri recrementum cum aceto diutius læuigatum.

Ad sordium duritiem.

Nitro aceto diluto cum aqua auris illuitur, cumq; sordes deterse sunt nitrum aceto solutum cum rosaceo instillatur.

Aliud ad sordes.

Cardamomi & nitri exiguum, cum ficis pinguibus sine granis exceptum, & in collyrij formam redactum, auriculæ committitur. Tertio quoque die educitur. Copiosas enim

fordes extrahit, & abunde leuat. Proficat hoc etiam aduersus carnis excrescentias, longos dolores, exulcerationes, recipit aloes, thuris, myrrhae, singulorum drachmam, myseos drachmas quatuor ex aceto in pastillos digeruntur, cum usus requirit aceto & rosaceo soluta instillantur, Item Andronis pastillus & Herae, & musae.

Ad diuturna ulcera.

Cedria melli admista illinitur. ALIUD. Myfi ustum & in puluerem redactum inspiratur. Per clysterem uero auricularium eluuntur aures posca, uel oxymelite, uel mulso, uel decocto quorundam repellentium (uerbi causa) lenticulae, uel rosarum.

Ad aures cruorem fundentes.

Lentisci decocto auris illuitur, polygonij uero succa cum paucissimo aceto instillatur, uel lycium, uel amurca, uel acacia, uel porri succus.

Si caro excreuerit.

Nitro ex aqua calida, simul cum squama aëris, & sandaracha pari modo auriculam illinito. Vbi crustam, acceperint, mel se repurgato.

Aduersus aurium uermes.

Absynthij decocto, uel centaurij, uel porri eluuntur: capparis autem foliorum uiridium, aut fructus succus instillatur, uel cedrinus liquor, uel urina humana uetus, uel album ueratrum cum melle, uel calaminthae succus, uel scammonia cum aceto, uel succus absynthij: oleum uero meatui indicum usque ad superiora, exire ipsos compellit: potius autem est oxelæum. Eodem ad ea quae auribus incidunt animalcula utitor.

Ad calculos & similia quae in aurem inciderunt extrahenda.

Specillum auricularium lana inuolutum in resinam, aut gummi, aut aliud quoddam glutinans medicamentum intingendum, idque in aurem injoiendum, ac quod in ea est protrahendum. Si hoc modo nihil efficitur, oleum calidum continue instillato. At si ne sic quidem exciderit, aut comprehensum fuerit: alijs quoque utitor modis: ut in parte chirurgica docebimus.

Ad sonitum aurium intra seipsas.

Si in febribus, aut harum crisi bus sonitus aurium euenerit: nullum

lum ei negotiū facessere oportet, quippe statim magna ex parte finiuntur. Sin aut post morbum perseueraueris, absynthij decocto ubi aures foueris acētū, rosaceumq; infundi debet, uel raphani succus cū rosaceo, aut ueratri nigri cū aceto. Ad ueteres aut sonitus, qui ex crassis glutinosisque humoribus creātur, inde uerò illos cognosces qđ nō subito, sed paulatim in crescent, nā scūturq; aceto, nitro, & melle aurē illinito. ALIUD. Veratri albi drachmæ duæ, castorei toridē, croci drachmæ tres, nitri drachmæ sedecim, ex aceto contrita, in pallillos digerito ac uitor.

Ad ueteres sonitus, & tinnitus.

EVphorbium cum cyprino oleo leuigatum, calefactumq; ne usurpato, in quibus autem ob multam sentiēdi facultatem uapores, & flatus sursum distribui percipiuntur, castoreum, & cicutæ semen tritum cum aceto instillatur.

Ad grauem auditum, & surditatem.

QUæ ab origine quidem, uel etiam post natalem diē, sed longissimæ, & absolutæ surditates constituuntur, nullo remeio illidi possunt. Quæ uerò nō absolutæ quidem, sed diuturnæ tamē, & ipsæ curationē non recipiūt, aut certe difficillimam. Quæ ob biliosum humiorē sursum uergētem nascuntur, uacuationibus per medicamenta bilē ducentia ex facili aboleruntur quidā etiam sua sponte affectu liberantur, bile inferius descendente. At ex crudis crassisque humoribus prognatas surditates, uel grauem auditum, uenæ incisione curato, aut omnino purgatione, ex Hiera, tum apophlegmatismis & errhinis item balneis sua sponte scaturientibus, uel ex aqua marina. Porro in meatum ubi facultas audiēdi est, conuenit instillare, quæ ad sonitus tradita sunt. Priuatim uerò hæc: urinam & fel caprillū, aut scorfini fel, aut rutæ succum cum melle, aut castoreū, cum oleo anethino: & hyssopum medicamentum cum nardino unguine, uel caprillum fel cū galbano: uel quod recipit castorei drachmas duas, nitri, ueratri albi singulorum drachmani.

Ad contusionem aurium quæ θλάσις dicitur.

Hippocrates quidem nihil ipsis adhibendum præcipit. Cum uerò sæpe ab ægrotis cogamur, utendum est his. Myrrhæ, aloes, thuris, acaciæ, pari singulorum modo: ex aceto inunguntur aut panis calidi pars interior cum melle in.

pila contusa obducitur: aut hoc: bituminis, thuris, aloes, cochlearum carnis, bulborum polentæ per modus, ex aceto leuigata imponuntur. Quòd si inflammatio oborta est, sesamum leue factum applicatur, uel chondrus, cum aceto coctus, laxiora autem esto cataplasmata, & citra deligaturam aut leuiter deligentur. & lana oleo imbuta auris aufractui demittatur.

De parotidibus.

Parotis glandularum iuxta ipsas aures affectus est, materia morbi illic eructante, alias à capite humoribus uidelicet in eo impactis; aliàs à reliquo corpore in febribus critico modo proueniens. Si igitur, alte adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiutari præsidij, quæ coactas sordes extrahant, uel etiam cucurbitula agglutinata, uel crebro fotuum usu. Nam si in altum recurrat colluuius, periculum haud mediocre subsecuturum est. Sin autem inflammatione tentata in tumorem fastigatur, è contrario iis quæ leniunt, & concoquunt, utemur cataplasmatibus, quale est ex farina hordeacea, & aut triticea, aut semine lini cum mulsâ, aut fœnugræci, aut altheæ, aut chamæmelorum coctionem expertorum iure incoctum. item quod ex rumice, & axungia insulsa constat. at si exuperare sanguis tibi uideatur, prius ipsum uenæ sectione uacuabis: modo uires permittant. Tumore autem non discusso, medicamentis utere quæ puri mouêdo sunt, nempe farina tricea cum pinguium sicorum decoctû, uel oleo, tum medicamento quod ex polline, & quod ex fermento confectû est. Vbi iam ascensus, ad suppurationem spectarit, nê cute ferro discissa pus excerneretur, uel acri medicamento rumpeatur, cuiusmodi existit smidion appellatum, & diascorodon, hoc est ex aliis præparatum. Cæterum mitiores parotidas etiam fots ex muria discutit, item medicamentum diaperanu. Hoc sane etiam pus iam maturatum discutit, præter quod dolori leniendo sit efficacissimum. Ad inueteratas parotidas buccinorum, aut purpurarum combustarum cinerem cum melle, uel axungia imponemus, aut ficus marina incoctas, uel marrubium cum sale. Induratas autem iam emollit & medicamen Mnafei, & Ariobarbianos. optimum etiam quod ex succo lini seminis præparatur. ante hæc autem obducere ammoniacum conuenit, mista cum cataplasmatibus pice liquida, uel seuo tauri-

no, uel bdellio, uel styrace, uel medulla ceruinæ.

De narium & olfactus uitijis. Cap. XXIIII.

Olfaciendi facultate oblata, si uox seruetur incolumis, ad priores cerebri uentriculos morbus refertur: qui aut ex intemperie sola noxam cōceperunt, aut etiam ex humorum copia. Sin autem uox quoq; mali contagium senserit laboriosior quodammodo reddita propter ossa quæ à colatu ethmoide græcè uocantur, obstructa, affectū rursus malis quibusdam succis contractum esse censeto. Itaq; cerebri intemperies, ubi ex notis sæpius à me dictis deprehensa fuerit, contrariis curatur remediis. humores autem apophlegmatissimis euacuare oportet: maximè uerò utitor medicamentis quæ per nares ualidè educunt, & quæ odore mouent tenuis substantiæ, quemadmodum in defluxionibus quas κατάρρεως græci uocant, adhibeto. Cum autē totius corporis humorū copię suspicio subest, hæc prius, aut sanguinis dimissione, aut purgatione ex Hiera uacuatur. Ita quoq; in polypode, & ozæna faciendū est, deinde loco ēt affecto inducuntur remedia. quin & Theriace pota sæpe magno fuit præsidio. Cæterū polypus, tumor præter naturā in naribus oritur, substantia respondens polypodis carunculæ: eiusdem uerò naturæ est & sarcoma. Ozæna uerò ulcus est, putridum ex humorum acrim illius creatum.

Ad polypodas & Sarcomata.

Squamæ æris drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, sandarachæ drachmæ quatuor, ueratri nigri drachmæ duæ: naribus inspirantur. In usu hoc est laudatissimū, nam tredecim diebus, insigne affert præsidium. benefacit & atramentū sutorium cum aceto. **ALIUD.** Malicorij drachmæ duodecim, atramenti sutorii drachmæ decē: chalcitidis drachmæ octo, fellis taurini, amomi, myrrhæ, calaminthæ, marrubii, singulorū drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ, ueratri albi drachmæ quatuor. sicco utitor. **ALIUD.** Diphrygi trito nares, linamentoq; ex ellychnijs contorto attinguntur, dilatanturq;.

Ad ozænas.

Misyos, chalcitidis, myrrhæ, singulorum drachmæ septem, atramenti sutorii drachmæ sex, aluminis scissilis, gallæ, squamæ æris, singulorum drachmæ quatuor, aluminis rotundi drachmæ duæ, thuris drachma una, aceti sextarius. totum in

uase zreo coquitur. Vbi ad mellis spissitudinem uenietit, ex carptis linamentis utitor. ALIUD. Aeruginem & aris squamam pari portione aridum medicamentum facito.

Ad fœdum narium odorem.

MYrrhæ, acaciæ, amomi singulorum drachina. melle cocto excepta summo narium inter septo iubeto agglutinari. ALIUD. Amomi, myrrhæ, rosarū siccarum partes æquales, nardino unguento exceptas illinito. Item benefacit aduersus fœditatem odoris, & malagma hedychroë cum uino admotum.

Ad narium ulcera.

CERUÆ libra, argenti spumæ quadrans, recrementi plumbi tantūdem, uel plumbi combusti. omnia uerò lota esto, excipianturq; uino, myrteoq; oleo.

Ad ulcera quæ uocantur glycea.

ARgenti spumæ dr. ch. quatuor, rutæ nouellæ totidē, aluminis scissilis drach. duæ. Myrteo oleo acetoq; excipiuntur.

Quæ sternutamenta citent.

VERATRUM albū, uel castoreum, uel piper, uel struthium, uel simul omnia: non autem oportet inspirare, sed pinna, uel digito penitissimē, in nasum demittere ubi sternutamentū frequentius est, medicamento sedari debet. Infunditur nardinū, uel rosaceum, uel glycelzum. Iam quæ odore mouent, sternutamenta sedant, anisum, ocimi stipulæ contusæ: sed ante hæc omnia caput desiccandum est, smegmatis ex nitro & pumice factis, uel etiam asclepio uocato utendum, & Constantini sapone, & sale cappadocico, similibusq;.

Ad sanguinis eruptionem ē naribus:

SANGUINIS ē naribus profluuium, quod febribus superuenit, secūdo uolumina inter illas sum executus. De eo aut quod alia quacūq; de causa accidit nulloq; sisti pōt remedio, in præsentia tractabimus. Chalcitidē cōtritā linamēto ex ellychnijs cōtorro, aqua imbuto, uel eo quod à genitalis humani forma priapicon appellāt exceptā, nariū foraminibus demittes. Vel testā ouī exustā admiscebis, & dimidiatā gallæ partē, uel lycio indico attinges. Vel fimi asinini cinerem inspirabis. Vel eius expressi succū instillato, uel molaris lapidis aceto extincti, uapor naribus attrahatur. Vel hoc quoq; medicamento obstruēti utitor,

utitor, Mannæ, thuris, partē unā, aloës partem dimidiam. Caudido oui liquore excipito: ac utitor, per linamentum ex ellychniis contortū, extrinsecus leporis pilis unctioni impositis. Vel funiculū lucernarū in nares conicito. Vel cucurbitulā leuem directē, quā sanguis profluit præcordiis magnā affigito. præcordiis autē magnā, & perseveranter admouero. Vel aures ualidē obstruatur, frons spōgiis ex aqua frigida foueāt. Vel cucurbitula occipitio agglutinetur: cum sanguinis detractione: interim etiā uenā incidere, si nihil prohibet, & summas partes uinculis excipere. præsertim brachia, & femora, sicut in uenæ sectione fieri solet. Eadem motu cōcuti iubeto, manu uerō frictione, pedes autē obambulatione. Nam uenis indidem sanguine repletis, nariū uasa deplentur. Item spongia in poscam frigidā demersa, naribusq; profluentibus à foris strictim admodum: id quod requiritur, subinde perfecit: melius autē proficit longo ex linamentis intortis penicillo naribus prius subiecto.

Ad faciei uitia.

Quomodo facies à rugis asseratur. Cap. XXV.

Thuris drachmæ quatuor, fuci quod φῦκος dicitur græcis, drachmæ tres, argenti spumæ, piperis, singulorū drachmæ octo, omnia ex ichthyocollæ contusæ diluto soluantur, in pastillos redactis utitor. ALIVD. Eburnei scobis drachmæ octo, thuris masculi, ichthyocollæ pares portiones. Vtitor, quemadmodum est prædictum.

Ad faciei nigrities.

Iridis, uel ptisanæ fresæ singulorum sesquiseptarius, salis ammoniaci, cornus ceruini combusti, thymiamatis ammoniaci, singulorū uncia dux. Aqua dissoluta in pastillos coguntur, ac itetum aqua trita ante balneū illinuntur. ALIVD. Ptisanæ, erui, thuris, iridis illyricæ, aphronitri singulorum chœnices duo, costi, amygdalorum amarorum singulorum drachmæ uiginti. Ouorum albumine. lacteq; asinino subigito, ac utitor ueluti prædiximus. Benefacit etiam pastillis Peponatos.

Ad ephelidem & lenticulas.

Terræ cimoliæ torrefactæ, semicōgii, aphronitri costi, drachmæ octo, erui farinæ elixatæ drachmæ quatuor, fellis taurini, eburnei scobis singulorū drachmæ octo. Leuigatis facies defricat. ALIVD. Fecis drachmæ decē, erui farinæ drachmæ

decem, lomēti drachmæ decē ueratri albi drach. quinq; aphro-
nitri drachmæ decē, alcyoni drachmæ decē, tritis abstergito.

Ad suggillata.

PEr initia decocto sēnigræci postea & meliloti oculi fouēs,
Nilei collyriū diarodon aqua solutū illinito: deinde dia-
mirnes. Et si nihil profecerit, id quod diasandicos inscribit, cō-
bustū, pērungito, uel hyssopum cū aqua applicato. Vel hyssopo
in panniculum illigato & calida aqua respersa foueto: uel acri-
mūria item raphani corticē cum melle detritū impones. hoc
etiam ueteribus efficax est. Porro ad uetusta faciei suggillata,
& liuores tordili partes duas, terræ sennæ partem unam cum
melle admoueto, curā adhibita ne exulceretur.

Aliud deterforium.

HYssopi, thapsiæ, casia singulorum drachmas duas, ceræ tan-
tundem, terebinthinæ drachmam inijcito, cauens ne exul-
cerationem excites, eoq; frequenter tolles.

De uaris.

EXigui sunt & duri in facie tumores. Oxymelite illinito, uel
argēti spumā cū terebinthina, aut olei cādidi momēto tritā
infricādo perūges: uel alumē fissile cū terebinthina, uel amygdā
la amara aceto macerata infricanē. In callū uero cōcretos ua-
ros, saponis gallici drach. quatuor, thuris, thymiamatis ammo-
niaci singulis drach. aq̄ dissolutis perūgito, & post horā eluito.

Ad uaros, pilos, & aspredinem faciei.

CERæ drachmæ decem, terebinthinæ, drachma, uisci drach-
mæ duæ. Liquato una oleum superinfundens atq; hoc me-
dicamento faciem abstergito, tollit enim radicibus. ALIVD. Pa-
pauer detritum, uel pulegium cum sale, acetoq; applicato.

Ceratum thaidis quo facies rubescat.

CROCI, erythrodani radices, fuci, thuris, myrhæ sing. drachmæ
duæ Adipe uitulino, oleoq; mastichino excipiūtur: deinde
illinūtur. Interposito tēpore, sponsia ex calēte aqua facies ab-
stergitur. Cæterū faciei remedia, et reliquo corpori cōueniūt.

*De oris affectibus, & primum de dentium
dolore. Cap. XXVI.*

DEntium dolorem siue gingiuarum inflāmatione, interim
in proprio ipsorum corpore, interim in neruo, qui ad ipsos
pertinet,

pertinet, oriri contingit. quapropter ualentissimorum in hoc medicaminum usus est Atq; inde plurima ipsorum quàm acerrimo aceto præparantur At gingiuis propter inflammationē dolentibus, præsentissimum est remedium, oleum lentiscinū, calore temperatum, si in ore retineatur, esto autem id recens, nam uetus tanto recenti deterius, quanto calidius. Communis autem ratio etiam hic seruetur, ut humor qui in toto corpore superat, prius euacuetur.

Ad dentium inflammationem.

OS colluatur aceto, in quo decocta sit galla, uel halicacabī radix, alterci semen, foliā uē, uel pulegiū, uel solani succus, uel capparidis radix, uel myrti folia, uel poliū, uel cucumis syluestris radix, uel rutæ folia cū oxymelite, uel cornu ceruinum, uel acetum scillites, uel pyrethrū, cū hyssopo. At erosionem expro denti, styracem cū opio imposito: uel sulfur uinum cū lycio: uel alterci seminis uaporem excipiat per infundibulum. Item Philonis antidotum denti circumlitum, dolorem sedat. Quod si defluxione laborēt dentes, myrti, lentisci, & gallæ decoctio colluuntur, uel rhus syriaci, balaustij, uel malicorij. applicantur aut salis partes duæ, aluminis usti, & aceto extincti tritiq; pars una: deinde uino perluuntur. porro gingiuis cruentis alumen tenuē inspergitur, uel aloë cum uino eluuntur: uel rubi radice uino decocta: uel rhu syriaco. cruentis autē & defluxione tentatis gingiuis crudum salsamentum in olla comburito, quoad in carbones redigatur. puluere attingito. At mobiles stabilis aloë inspersa, uel rhus syriacus, uel alumē scissile, uel galla, uel rubi radix per se, aut cum uino incocta.

Aliud ad dentes.

NVcis uiridis corticē terito, eiusq; ius, cū habes, in id conijcito myrrham uerā, & alumen scissile, ubi omnia in unitatem coegeris, in usu infundito, ac in gingiuas qua parte dens indolet, demittito & persanabis. **ALIVD.** Allium, piper, herbam pediculariam quæ staphis agria dicitur, detrita, in linamento in globulos coges quos circa dentes uersans humorem in capite contentum elicies, dentemq; sanabis. **ALIVD.** Ad dentes mobiles, & gingiuas fluxione pressas omniaq; oris ulcera depascencia Chalcitidis tostæ drachmæ duodecim, cadmiæ drachmæ octo, utitor sicco, aut cum aceto, sine dolore dentes. tollit, fa-

rina cum liquore tithymalli imponitur, & super hederæ foliū accommodatur, ac per horā finitur, sua. n. spōre dens conteretur. Dentiū smegma, quod & parulidibus benefacit. Aluminis latercularij triēs, salis ammoniaci tantundē, myrrhæ, costi, pyrethri, singulorum drachmæ quatuor, piperis grana octoginta.

Ad parulidas.

Sulfuris uiui, piperis, aluminis scissi, æquales portiones. Ac parulis inflammatio quædam est in aliqua gingiuarum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationē cōuertitur, & cum suppurauerit, scapello incisa, linamentis insertis distendētur. Epulis autē carnis excreſcentia est, quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet: nonnunquam cum febris & dolore. Quoniā igitur reprimi debet, utendū est, æruginē rasa priuatim: uel cum pari galla, uel fori combusto, uel alumine quolibet cremato, uel galla per se uel squama æris cum aceto diebus sat multis leuigata desiccataq;.

Smegma dentium.

Aristolochiæ radix cōbusta, cerui cornu combustum cū mastiches momento, sal candidus melle respersus & fici foliis inuolutus exustusq; donec in carbones mutetur. ALIUD. Buccina sale respersa, uisitaq; cochleæ terrestres cum melle combustæ, lanæ succidæ crematæ cum modico sale. Singulis ipsorum grati odoris gratia misceatur iunci rotundi flos, uel nardi spicæ, uel folium malabatri, uel iuncus odoratus angulosus, uel iris.

Dentium candorem concilians, & oris suauitatem faciens gingiuasque reprimens.

Pvmicis, salis costi, iridis singulorum drachmæ quatuor, iunci odorati angulosi drachmæ quinq;, spicæ nardi drachmæ, piperis drachmæ sex. Tritis utitor.

Ad Stuporem dentium.

Stupori benefacit portulaca commāducata, uel oleum quod immaturæ oliuæ fuderunt infricatum, uel amurca in æreo uase cum oleo cocta, donec mellis spissitudinem habeat, atque uetusta si perungatur, magnum affert momentum.

Ad dentes attritos.

Dentibus attritis, baccarum lauri, aluminis scissi, aristolochiæ

chiæ sarmentorum quæ clematicis dicitur, singulorum pares portiones iniiciuntur.

Ad gingiuas corrosas.

Rosarum floris drachmis octo, gallarū drachmis quatuor, myrthæ drachmis duabus, si gingiue erose, & humiditatis uitio haccidæ, colluantur, sanescunt. Idē præstat lac asinum, oliuæ foliorum decoctū, acetum scillites: arida uerò admota, ærugo ferri, cytini. Tumidis excresecētesq; gingiuas portulacæ succus in ore retentus, muria ex colymbadibus oliuis, calidū, calidum, uel lentiscinum, uel melinum amurcæq; discutit: sicca autem, ærugo ferri, uel arsaristolochiæ radix, arnoglossi semen, dyphryges, atramentum sutorium tostum, cytini.

Ad disrupta labra.

Amurca cocta illinantur: uel hoc prodest adeps anserinus cum melle, terbinthina æquali portione, rosarum floris, hyssopi, rosacei, singulorum momentum.

Aduersus linguæ morbum qui batrachus appellatur.

Batrachus tumor est, ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maximè in pueris: itaq; locus misyos, æruginis rasæ, pari pōdere sicco perfricatur. Mento autē adhiberi debet medicamentū. Anthera, uel spherion, uel ex ouis parygrum. In adultis remedium est uenas sub lingua diuidere.

ALIUD. Valet etiā ad oris ulcera, quas Græci aphthas uocant, æruginis rasæ, gallæ, chalcitidis singulorū equale pondus cum passio. os etiam his colluitur. ALIUD. Erui farina cū melle prius absterfis, delinitur, galla leuis cum melle, uel rosarum flores similiter. Vel oliuæ foliorum decocto colluant.

Ad tonsillorum inflammationem.

Si in febris tonsillæ, & columella inflammationem senserint, gargarizare cōuenit decocto furfurū, aut rosarum, aut palmarum, aut myxæ, aut lenticulæ. Cum uerò inflammatio remittit, consistitū, mel ipsis adijciendū est, quod per initia facere nō oportet, nec in augmento, ne acrimonia fluxionē quandam cōcitent. Vbi in suppurationē conuersa eruperit, gargarizandum est, ex mulsā uel lenticulæ decocto, uel rosarum: idq; faciundū est, donec in totum soluatur: aut stomatica collutio ad gargarizandum etiam exhibebitur. At si pestifera tonsillis ulcera

ulcera oboriantur, utendū quidem & præsceptis, sed priuatim exhiberi debet medicamē diamoron, ex aqua calida, uel aqua mulsa, quæ rosarū inspersum florē obtineat, uel costū, uel -hus sicca, uel decocta, uel glauci soliorum aridorum decoctū quod amarum est. optimē autē facit, si succū, ut ad collyria utimur, in mulsa dissoluis, ipsius autē fruticis sicci, si inspiretur, usus est laudatissimus, aut si digito admoueat, cura uero habenda est ne prorsus attingatur, aut certē leniter admodū. Profuit & pastillus Andronius. Post hæc acria irritantia uē gargarizatur ex medicamento, quod ex dulci radica quæ glycyrrizē dicitur, constat: aut eo quod croco, uino scybelite, terra chia, & myrra cōponitur. deinde amylo, & tragacanto. Vbi iam cōsiterit ulcerum depastio, gargarizandum medicamento ex lacte & samia terra confecto. ALIUD. Ad tonsillas quæ post inflātionem induruerunt, ἀντιόλας græci nominant. Ex malo punico dulci cum cortice tuso succus exprimitur, & eius partes sex, mellis uni mistæ cōquantur, donec eis mellis spissitudo sit & perunguntur. ALIUD. Gallæ omphacitidis uncia duæ; aluminis scissilis uncia, salis ammoniaci tosti tantundem. Pulvere attingito. ALIUD. Gallæ drachmē octo, misyos drachmē duæ, salis tosti drachmē quinq; utitur pulvere. est autem Antias, tonsillarum tumor, schirrum præferens.

De uua.

VVa si inflammationem experitur, gargarizandum ex iisdem, quæ tonsillæ inflammatae postulant, & mediocriter astringentibus, qualis est mali punici succus per cochlear, uel instrumentum, quod ab uua attollenda staphileparton appellant, subiectus, tum per se, tum cum melle assatim cocto. uel dulcis radix, mali punici succo mista. proficit etiam succus dulcis radice cum melle illitus. iam hæmatites lapis uuam reprimat, & phrygius combustus, & ageratus, item ex lapide phrygio medicamen ad pudenda inscriptum. His adduntur terra samia, erethrias, sinopis, lemnia, & omphacium, per se & cum horum aliquo. Item spinæ egyptia succus & alumen scissile rosæ uero, & semen, & folia lenius operantur, adhuc lenius gummi, tragacantha, sarcocolla, amyllum: quibus utendum dum magis una prematur ab astringentibus constricta. ubi æqualiter crassa fuerit ipsa, quod

uitium

uitium iam uiam Latini, κινῶν Græci propriè dicunt, gargarizationibus fidendum etiam ijs quæ ex myrrha, & croco, & iunco anguloso fiunt. Contusiones autem cauendæ sunt, ob quod pinna potius perungere conuenit. compositum uero hoc utile est, rhus syriaci drachmæ octo, croci drachmæ quatuor, costi drachmæ octo, rosarum seminis drachmæ quatuor. Præterea gingiuis benefacit, linum ex purpura marina, quod uiperæ collo circumdatum ipsam strangulauerit, deinde circumadigatur consillis, & colli uitrijs, mirabili quodam modo opitulatur, ut Galenus author est.

Ad sanguinis ex ore profluium.

Porri folia contusa imponuntur, uel sponsia recens in picæ crudam mersa comburitur, in pu'uerem coacta utitor, ac ualde utile est remedium, & collutiones oris ex rosis siccis, aut uiridibus. Ad hæc decoctum frigidum, uel pampinorum uitis, uel lentisci foliorum, uel rutæ, uel malorum cotoniorum, uel rosarum, uel uuæ acinorum, uel lenticularum.

De angina, eiusque speciebus: ubi etiam de strangulatis: uel alio modo suffocatis agitur. Cap. XXVII.

Interioribus faucium, pharynga Græci uocant, musculis in flammatis angina accidit, quæ synanche Græcis dicitur: ex terioribus, parasyranche. Eodem modo & in superiore gutturis parte, λαρυγξ Græci nominant, habet: cuius si interiores musculi inflammatione conflitentur, cynancheni: si exteriores, paracynanchem efficiunt. Hæc autem comitantur omnes: recta ceruice spiratio, dolor cum difficultate spirandi, nonnullis etiam febricula oritur, faciei rubor, ceruicisq;: & tumor in quibusdam os egri apertum habent, & deuorare nequeunt. Cynanchicos uero strangulatus quoque interdum secutus est. Pueris raro talis affectus oboritur, cum scilicet ceruicis uertebrae affectæ loco suo excidunt. Verum illis ceu curationē non recipientibus, ac deploratis, manum admoliri non oportet. Reliquis autem sanguis protinus è cubito mittendus est, sed non subito ac semel, uerum pluribus interpositis uicibus euacuabitur. quippe cumulata, semelq; facta uacuatione, anima ipsis deficiente, suffocationis periculum superuenit, dum materia in affectam partem collectam prorumpit. Si per hæc non leuantur, eas quoque uenas incidere conuenit, quæ sub lingua sunt,

sunt, uel ipsa quoque lingua scarificanda, si propensior foras cum tumore appareat. Alius acriore clystere subduci debet, pedes aqua calida foueri, extremæ partes ualide deligari, collum laniis succidis, uel etiam oleo imbutis contegi, crudaque farina ordeacea, quæ Græcis *ᾠμηλσις* dicitur modo cataplasmatibus obduci. gargarizandum uerò per initia ex eis quæ in tonsillarum inflammatione dicta sunt, uel simplici diamoron, † cum rhus decocto. Potius autem est diamoron, quod syluestribus moris conficitur. Deinde & composito diamoron, uel eo quod diacaryen à nucibus uocetur perungantur. Cum autem morbus uiger, consistitque, & nitri momentum admiscendum est, aut etiam sulfuris uiui, nisi acrimonia quædam prohibeat. item sterqus caninum aridum contusum, & cum melle perunctum, præstantissimum & remedium: idque album maxime, item syluestrium hirundinum cinis similiter efficax est. Si malum longius prorogatur, etiam perunctione diabesasa, utemur, nunc uires ipsius remittentes, aliorum mistura, nunc iterum intendentes. Cucurbitula quoque, uel hirudo sub mento, & circa ceruicem admoueri debet. utendumque gargarismatis ex iride, hyssopo, melanthio, abrotano, dulci radice, ficis pinguibus in mulsâ decoctis, uel rutæ succo cum lacte, uel sinapi cum oxymelite. Sin autem ex his quædam acrimonia percipiatur, oleum ipsis quàm optimum calens exhibetur, aut rosaceum per se, aut cum cremore ptisanæ, aut fœnugræci gargarizandum. Cibus sit triduo aqua mulsâ, inde ptisanæ cremor cum dulci quadam potione, deinde & ouorum lutea perliquida, ac sorbitionibus utendū ex chondro, ubi deorare melius cœperint, & cibis qui ægri uiribus respondeant. Cū morbus cœperit inclinare, ægri deambulationibus & balneo credentur: pars affecta cerato ex oleo rutaceo operietur, reliquæque uiriū recolligendarum ratio, ut par est, adhibebitur. Porro ex strangulatis, quibus spuma iam circa os emanat, manus admoueri non debet: si Hippocratis cōsilio acquiescimus. Alij uerò uitæ restituuntur, aceti infusione & piperis, uel urticæ seminis in aceto triti acerrimi. Verum quia ægre magnoque negotio assument, compellere eos ratio est. Discussis autē colli ruboribus, statim sursum respiciunt, & ad se redeunt. similitudo in his qui naufragium passi sunt. Summatim in omnibus qui suffocantur. Nam ita horum calor recreatur, refocillaturque,

† In nostro codice est οὐν ἀφελήματα ἔοιās, id est, cum decocto mali punici.

De grauedine, destillatione, raucitate, & tussi. Cap. XXVIII.

Communis est hisce uitijis, excrementitij humoris ex capite in subiectas partes descensus: si in nares decumbit κόρυζα Græcis, grauedo Latinis appellatur: si in fauces, & palatum, simplici uocabulo κατὰ ῥίνα, nobis destillatio. si in guttur, & asperam arteriam defluerit, ut etiam membranam internam quæ hanc integit, exasperauerit, rauca uox efficitur, uocaturque malum Græce βρόγχος & ἀσθμώϊκον Latinis raucitas. In quibus non solum ex capite, sed etiam uehementi clamoris conatu, & spiritus inspiratu frigidi asperitas contrahitur inflammatoria. Si morbus perseueret, fluxioque in pectus, pulmonesque defertur, tussis oboritur ipsis maligna, ac contumax. Iam & propter intemperiem subinde tussis accidit, interim ob calidam, ut in febribus: interim ob frigidam, ut aquilonijs diebus, eaque magis sicca est. Iam uero alijs quoque morbis tussis nonnunquam symptoma efficitur: uerbi gratia, pleuriticis, iecorariis, phthisicis, pulmonariis: Galenus itaque in diuturna tussi grandines quasdam ex pectore educi memorie mandauit. Alexander autem calculum quendam grauem, qualis in meatibus urinariis nascitur, post longam tussim expulsus: ac inde illam quoque cessasse prodidit. Porro nos in sanguinis reiectione calculos excerni uidimus, quemadmodum cum illuc peruentum erit, exactius commemorabimus. Qui igitur ex æstu grauedinem, uel destillationem concipiunt, his calor sensus oboritur circa partes affectas, acris, tenuisque humor destillat, tum per nares, tum per os, faciesque rubescit, & nasus. Qui ex frigore, iis caput undique & frons distenditur: meatusque ossium quæ à colo ethmoide uocant, clauduntur, ne uox deorsum per nares transmeet: si uero longius malum trahatur, tussis quoque affligit, pituita educitur, nunc cruda & liquida, nunc uiridis. Quibusdam & febris superuenit: quæ ob æstum laborantes nihil iuuat: frigore pressis, etiam concoctionem efficit.

V *Curatio destillationis, & grauedinis.*
 Si calida præpollet intemperies: iis pugnandum est præ-
 sid. is

fidijs, quæ dolori capitis ex tali causa contracto conueniunt. balneo utendum est, caput aqua copiosiore calida perfundendum. Cibi uero his proderunt ad sorbitionem aprati, oua forbilia, amyllum, liba dulciaria, quæ ictria dicuntur, sesama, necnon amygdala item nux pinea, & quæ ex lacte fiunt bellaria: uina dulcia, non uetera. medicamentum diacodion linctum assumptum, & quæ his congruunt composita auxilia. Quod si frigida intemperies afficiat, & morbus contumax sit, modico utendum cibo est, caput calefacientibus, tenuiq; substantia præditis nardino, rutaceoq; debet perungi. Irinum uerò non solum illinitur, sed etiam naribus instillatur: intus nares thure, & myrrha cum oleo perunguntur, præsertim si perfrictio grauedinem crearit. Alios naribus odoranda adhibita iuuarunt, ut lacineæ panniculorum combustæ, uel melanthium, uel cuminum uisum illigatumq; in panniculo. Iam cyphi silenaicum, id est lunare olfaciant, frontique illinatur, cui simul unum ex emplastris, quæ inflammationem arcent, agglutinabitur. Exempli gratia Icesium, uel Oxera, uel Barbarus, uel Athens. Ad stillationem uero ex frigore ortam, & cyphi potus utilis est. Thorax autem balsami liquore illinatur idemq; per lanas succidas cum styrace, & irino, uel anethino circumfouebitur. Cibus calidioribus, & ad concoctionem promptis uti commodum est, ubi iam materia concoquitur medicamen quod pituita per os educat, idoneum erit, tum capitis smegmata, nempe Constantini sapo, atque eius generis consimilia.

Raucitatis curatio.

Raucitau quæ arteriacum & branchum appellauimus, comperent quidē superius comprehensa, uerum priuatim ubi arteria, & caput eius quod larinx dicitur inflā matoriam quandam affectionē experiuntur, emplasticis, id est, obstruendi meatus facultate præditis per initia utemur, donec inflammatio remissior enaserit: talia uero sunt quæ ex passio cretensi, tragacantha, gummi & amylo cōstant. Item pinguium palmularum decoctum. & dulcis radicis cum sapa, donec mellis spissitudinem conquirat. Item compositionem quas quod sub lingua teneantur, *επολωττιδας* appellant usus est. Ante omnia uinū hoc tempore circuncidendum: postquam inflammatio moderatior fuerit reddita, uinum dulce assumetur, tum confecta ex melle, lacte,

lacte, cū amylo, uel pane filigineo. Adhæt forbitiones ex amygdalis, butyrumq; utile. At si humor in particulas se receperit: transeundum est ad ea quæ ualentius abstergūt, cuiusmodi est ferculum ex faba fresa paratum, & quæ ex melle præparantur. His adde brassicam & porra probe cocta. medicamenta uero calidiora & ad tussim accommodata profunt, quæ constant sapapa ex ficis pinguibus confecta, thuræ, iride, terebinthina, styrace, galbano, pipere, cinamomo, casia & his similibus.

De tussi.

Tussis quoq; eadem ratione curanda. hoc solum inspicitur num aliarum particularum consensu fiat ut gurgulionis distillantis, uel capitis, an alijs morbis coincidat. His ubi quàm fieri potest optime erit prospectum, quemadmodū à me cōprehensum est, diceturq; in posterum, tussis curationem moliere. Compositorū uero præsidiorum enumeratio hic subiecta est.

Catapotia ad distillationem in fauces & tussim.

Styracis, myrrhæ, opij, galbani singulorum pares portiones. passo excipiuntur, uel priuatim in pila contunduntur, & ad magnitudinem erui terna, quaternæ uel aut quina, noctu dormituro dantur: passumq; superbibitur. Hæc ad acrem tenuemque fluxionem ualent. ALIVD. Alterci seminis drachmæ duodecim, nucleorum pineorum drachmæ sex, croci drachmæ duæ. sapapa, uel passo in usu excipiuntur.

Eclegma.

Mellis uncia, butyri semūtia, simul incocta exhibetur: itē ex hyssopo, ficibus, nucleis pineis, & iride decoctū sorbetur.

Catapotia ad ueterem tussim accommodata.

Styracis drachmæ sex, myrrhæ drachmæ duæ semis, terebinthinæ, galbani, opopanacis, iridis singulorum drachmæ duæ, piperis albi, nitri, seminis alterci, lachrymæ papaueris, singulorum drachma, sine ullo liquore in pila tusa in catapotia rediguntur: utitor ut prædictum est.

Ad aspredinem gutturis, tussim & sputū cruentum.

Amygdala amara, quibus cortex sit detractus uiginti quinque, seminis lini torrefacti drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ, pini nuclei triginta, oui in adipe cocti luteum, Tragacanthum, aqua maceratur. Totum uero passo excipitur:

si uerò & sonus uocis fuerit oblatus, mel miscetur in passi uicē & praesertim in quibus educi ex gutture aliquid oportet.

Arteriacae quae quod sub lingua teneatur hypoglossis appellata, facit ad obcisionem uocis, raucitatem. item ad eos qui egre reijciunt, anaphoricos graeci nominant.

TRagacanthae drachmae sex, gumi tantundem, myrrhae drachma, thuris drachma una semis, piperis albi grana uiginti; croci drachma una, dulcis radice succi drachmae sex, palmularum trium caro, passi cretici, quantum sufficit. Atque succus tragacanthae solus ipse sub lingua loco dulcis radice succi retentus. Eiusdem decoctum spissitudinem habeat quadruplum inditur.

Arteriacae ad abscissum uocis sonum conuenit, & eos qui uocis exercitio utuntur.

Porra sex coquito, usque ad iertias, atque ipsa proijcito, iuri ipsorum succum alicui admiscero, mel & ouorum prius decoctorum lutea tria simul incoquito, circummagistras anethi ramusculo.

Compositio ad tussim, graece bechicon appellatur.

Pulegij sextans, nucleorum pineorum, cnici seminis, lini seminis singulorum uncia, piperis cocti triens, melle cocto excipiuntur. **A L I V D.** Hyssopi pulegij, piperis singulorum uncia, petroselinii semuncia.

Medicamentum tussim ueterem concoquens.

Mellis drachmae sedecim, terebinthinae drachmae duae, galbani drachmae quatuordecim. Vbi simul fuerint incocta, orbiculi finguntur, circa fabae magnitudinis, nucis uel auellanae atque ex his delingitur. **A L I V D.** Aridam tussim curant tum arteriaca medicamenta, tum aquae nonnunquam feruentis sorbitio nam dum propter pituitae crassitiam non excreant, reijciunt quae, humectantibus aliquantulum iuuantur, caeterum conuenit ipsis etiam hyssopi, iridis, & pinei nuclei decoctum.

Pastillus a fumo distans capnisflos ad tussim continuam.

Styracis, piperis, mastiches, petroselinii, singulorum unciam, sandarachae scrupulos sex, baccas lauri duas. Melle excepta in carbones proijcito fumumque excitato, ut tussiens hunc

per

per infundibilum aspiret. conuenit & qualemcunque petrifactionem expertis.

De orthopnœa, & suspirio, & spirandi difficultate.
Cap. XXIX.

Qui febris expertes, crebro ueluti à citatiore cursu respirant, ab accidenti quod superuenit nostris suspirio si, Græcis ἀσπυρία appellant, iidemque hinc quod omnem figuram totius thoracis rectam seruent, strâgulari metuentes, orthopnœici dicuntur. creatur hoc mali cum fistulosæ pulmonum cartilaginee crassiss, glutinosissque humoribus fuerint infarctæ spirandi autem difficultas commune est symptoma, quod & his, & alijs compluribus affectibus superuenit. In curandis suspiriosis huc omnis cura dirigenda est, ut per extenuantia, abstergentiaq; medicamina, glutinosus humor, & crassus absumatur. Acetum igitur ipsis conueniet scillites & oxy melitis ex ipso præparati potio, ipsaq; scilla tosta læuigataque cum melle. Ex antidotis hiera, & purgatio continua ex ualidissimis medicamentis petita, à radícula uomitus, aristolochia rotanda, pota, cētaurii magni radix, spondylii semē, radixq; calaminthæ semē hyssopus, iris, melanthiū: asellorū qui sub aqua riis uasis agūt sextarius in uas fictile coniectus, carbonibus subditis frigitur. Vbi candorē acquisierint, teruntur, & melle cocto excepta mystri mensura ante cibū secundumq; ipsum dantur. Quod si necessitas urgeat, etiā uena ante hæc omnia incidetur, & quantum uires patiuntur sanguinis detrahetur: aluus clysteriis sollicitatur, Thorax à foris, sicibus & loli j farina obducendus est, cui adiecta sit resina, cera & mel. Inspargatur autē ipsi iris & manna. Nō inutilis est & farina ordeï cruda, cum resina, cera, iride, & manna, unguētis autē utēdū calidioribus, irino, anethino, rutaceo. Sed quod subscribitur medicamētū, huic uitio proprie dicatum est, pumicis pars una, fæculæ, quæ est uini fæx, combusta, partes quatuor, auripigmenti pars una, iunci rotundi floris partes duæ, alcyonii pars una, aphronitri partes duæ. Contusa incernuntur, unguentisq; excepta, thoraci infricantur. Malagmatis utendū est quæ serosas superfluasq; sanguinis humiditates, græci ἰχθυῖδες nominant, possunt extrahere.

Potio suspiriosis apta.

POLII, abrotani, castorei, chamæpyteos, guttæ ammo-

niaci, singulorum par modus. Melle subacta exhibentur. **ALITER.** Nonnulli dederunt, aphronitri cochlearium cum tribus mulsæ cyathis. **ALIVD.** Aphronitri drachmæ nouem, piperis drachma, silphij drachma semis. Cochleariū ex aqua datur. **ALIVD.** Castorei, suffiminis ammoniaci, singulorū drachmæ sex, piperis grana uiginti, passo excipiuntur. Instar fabæ cū mulsā exhibetur. **ALIVD.** Sinapi drachma, nitri spumæ tres oboli, elaterij semiobolus. Totum in pastillos octo digeritur. Bini duobus diebus offeruntur, nam sine molestia supra purgant. His qui præfocantur, aphronitri drachmæ tres, cum tribus hydromelitis cyathis assumētur, ac cum cardamomo nonnunquam, subito auxiliatur. benefacit etiam coxendicibus.

De peripneumonia.

Cap. XXX.

Peripneumonia pulmonis est inflammatio, quæ plurimū ex ualentibus in eam partē distillationis, aut angina, aut suspirio, aut pleuritide alijs'ue morbis contrahitur: Aliquando etiam ipsa inflammatio affectus origo est. Hæc subsequitur spiritus difficultas, febris acuta & ardens grāuitas distensioque pectoris tumor & magna repletio faciem occupat, materia sursum ignis instar impetum faciente. Malæ itaque in his rubent, oculi intumescunt, supercilia deorsum nutant, tunica oculi ceratoides, ob cornus imaginem dicta, in pinguedinē languescit. Cum uera signa ad æstum flagrantiores declinare uidentur, pulmonis inflammatio Erysipelatis naturam respiens, subesse existimabitur. In ijs igitur qui ex alijs morbis huc decidunt, sanguinis de tractio uitanda est, maxime si diu hoc in statu fuerint, uel si per initia sanguinem dimiserint. Verum alius in morbi remissione clystere ducenda est, si ægre respōdet, aut cucurbitulæ, ubi nihil obstat, pectori, & lateribus admouendæ sunt, exæque prægrādes, & multæ, cute incisa. Sin autē peripneumonizæ affectus statim ab initio inuaserit, sanguinem mittere, suffragrācibus qui huc requiruntur, numeris, ex usu est: Sin minus, cucurbitulus certè desigere: quibus tantū elicietur sanguinis, quantum uires patiuntur. Quod ad cibū uero attinet, danda est sorbitio ex prisanæ cremore & chondri cum melle, uel ex amaris amygdalis cum similagine, aut chondro, dulci quadam potione admista, hydromalo, uel apomelite, uel hydrosato. Rectè sumitur & recens butyrum, cochlearibus circa tribus,

bus. Propinatur autem ipsis ficum cum hyssopo decoctum, uel iridis in mulla coctæ, uel leuigatæ instar duum cochlearium mulsæ insperforum. Hoc iridæ, ab inferioribus partibus expurgat. At uirtutis tuendæ gratia, crebrius potui assumitur, mulla per se & cum nucleis pineis, ac cucurbitulæ uniuerso thoraci laboribusq; agglutinabuntur. Ceratum uerò cyprinum quod contineat iridem inspersam, imponetur, uel ceratum ex rutaceo oleo, & iride sicca, uel epithema ex cera, resina medulla ceruina, butyro, æsypo medicamento, iride sicca, & nardina unguento.

De cruentis sputis.

Cap. XXXI.

CRuentum sputum si disrupta uasorum commercia excitant, multum sanguinis euacuabitur. Et quidē modo manifesta ex causa, ut alto delapsu, clamore, & cōsimilibus, modo ex occulta, ueluti plenitudine, aut frigore immodico, nam id uenis rumpendis esse habile scribit Hippocr.

Si uerò exesa parte aliqua sputū cruentū æditur, nō conferim, sed paulatim sanguis reiicitur, sic ut acres quidam prauiq; cibi, uel inedia, uel acris ex capite destillati o præcesserit. At si ex adaperitione, ἀναστροφῇ appellant, nullū quidē ex prædictis, præterquam plenitudo interdū præcedit, sed uictus humidior, calidiorq; balnei immoderati usus, calidi nimis loci inhabitatio morbum facere uidebitur, & neq; inflammationes, neq; febres, neq; dolores experientur: sicut in iis euenit qui exeso uasorum corpore, διάβρωσιν appellant, sanguinē reiiciunt: Imo contra leuius faciliusq; agent (ut uerisimile est) euacuati.

Quod si hæmorrhoides, aut mulierum menstrua nō responderint, erit particulis, erūpens sanguis subtrahet. Idē uerò hic pariter iis qui ex uase plenitudinis causa rupto uacuātur, satis ad ualitudinem proderit, nisi ex ulcere, aut immodica uacuatiōne noxam senserint. Quæ uerò exesis uasorū tunicis sanguinis fit euacuatio: nunquam commodè cadit, facitq; ualitudini.

Quod si per uomitum excreetur, clarum est eū ex stomachi, aut uentriculi regionibus procedere. In quibus & per annum infra descendens nonnunquam uacuatur. Si cum tussi, ab instrumentis respirationi dicatis prodit. Iam uero spumans & subalbidus fit ex iterualloq; reiicitur, ut dolor absit, & pressio, ex pulmone ferri notum est. In quibus temporis spatio, febris sequet̃ continēs, præsertim iis quibus ex erosione profluit,

& non nihil ex pulmonis substantia, aut arteriæ asperæ circuitus qui *βρόχιον* dicitur, aut uena egeratur. Notus certe quidam mihi est ex iis qui sanguinē ē pulmone reiciunt tēporis processu maxima cū tussi, & sanguinis copia, calculos quatuor, aut quinque; expuisse asperos tribulorum modo, ad magnitudinem siliquarum trium, aut quatuor, ac deinde dolore leuatus est. paulo post tabe cōsumptus inrerit. Porro si pituitosa cum tussi leuiore, uel screatu quoque; adatur, eaque; spumosa leuiorque, ex aspera arteria prodire scito. Si uero ater sanguis & in grumū concretus fuerit doloremque; in loco testetur, ex thorace educi significat, per pulmonē arteriam uē translatus. Qui uero screatu, ex faucibus per palatū educit. Cæterū si quādo à capite destillet, cū irritatione quadā, & tussi æditur, ut qui ad asperæ arteriæ caput defluat: iterumque; sursum feratur, hæc acris plurius ex parte distillatio, uel capitis dolor, uel grauitas præcedit. Accidit autē nōnunquā per palatum sanguinem uacuari, & propter hīrudinē deuoratam, & alicui indidem particulæ adhærescentem. Verum de hac in lib. de uenenis pertractabitur.

Curatio ob distillationes humoris aeris.

Quibus destillatio cruentū sputū cōcitauit, uena protinus debet incidi, nisi uehementer acris humor destillauerit, ac pro uirium modo sanguis detrahi. Extrema deligari, oleoque; ueteri calido, uel sycionio præter caput perfricari. cibis adhiberi. frumētaceus cui succus alicuius austeri adiectus sit, ut mali granatī, pīorū, malorū, uel illa eadē simul incoquāt. dormituro ex pastillo diaelectru dat tertio die mellis costī mōmētum delingitur. Quod si morbus longior hæc uicerit, capiti raso medicamentū, quod ex fimo syluestriū colūbarū cōstat, imponis, & post tres horas medicamēto deposito, balneo ægrum cōmittis, sic ut caput nequaquā inungat. Deinde ubi sorbitionibus alueris, somnū capturo. Theriace antidotū datur, iterumque; die insequēti, ubi dederis, similiter totum corpus, præter caput perfricato. huic autē ceratū ex thapsia, aut aliud quoddā iniicitur. & rursus utendū sorbitionibus. Quod si malū in ætatē incidit. cucurbitula occipitio desigenda est. At si acris admodum fuerit distillatio, sanguinis detractio cauēri debet: alimentis autem & præfidiis iis tū quæ supra, ubi de distillatione egimus cōprehensa sunt, tum quæ mox dicentur, utendū. Qui ob fri-

goris iniurias sanguinē expuūt, thorax illis fouēdus est remediis, quæ calfaciūt ipsum simul & desiccant, quod præstat medicamentū diadyopeperion, i. quod duplici pipere cōstat, una cū pastillo diaelectru, hoc est ex succino exhibitum. At qui ex respiratoris sanguinē reiciūt disruptis ortis uenarū, aut patefactis, uenā iis secare cōuenit, nisi sanguinis copia prorūpat. oēs aut quos hoc uitii premit locis aeri expositis decūbēt, lecto immobili, figura sublimi, cauētes ne uelēmēter respirēt loquanturq; imponēda aut extrinsecus supra partes affectas, spongia ex repente posca. A septimo die lana succida cum rosaceo, uel myrteo, uel lentiscino, cui interim acētū interim uinū austerū sit additū: si copiosē efferēt, farinæ pollinē, & mannā thuris cū aceto superaccōmodamus, uel alumen, uel acaciā, uel malicorium, uel gallā cū aceto, uel palmulas cū polētis, & malis cydoniis in uino austero decoctas. post hæc aut & emplastrū diaiteō hoc est ex salicibus iniiciendū, præsertim ubi moderatior sanguis fertur. Per os autem hæc sumpta proficiunt portulaca cōmanducata benefacit efficacior autem succus ipsius epotus, balauistiū, rubi fructus & flos, quercus mēbrana cortici subiecta, & quæ glandis putamini subest tunica, maximē uero cocta ipsa utūtur: fagi aut & ilicis mēbranæ præstātiores sunt, terra samia quæ aster dicitur, ad oēm sanguinis teiectiōnē. Itē lemnia sphragis, lapis hæmatites in tenuissimū pollinē detritus cū succo mali punici, uel polygonii, pondus aut lapidis erit scrupulus unus. Cōposita medicamenta hæc profunt, pastillus diaelectru, diacoralliu, & qui ex spina ægyptia conficitur, itē puluis confectus ex terra samia quæ ἀστυς dicitur, lemnia sphragide, corallio, simphyto, amylo, omnibus pari modo.

Cum signis exesi uase reiscitur.

IN his autem qui corrosis partibus expuunt sanguinem, idque potissimum, ut destillatio præcesserit & opii partē semissem adiicimus. Insuper medicamentum his facit, quod samii asteris, agerati lapidis, lemnia sphragidis, æquas portiones capit: duobus cochleariis potum ex duobus planraginis succi cyathis. **ALIVD.** Lemnia sphragidis drachmas sedecim, samia terre, quæ aster dicitur drachmas octodecim, amyli drachmas octo. sarcocollæ drachmas quatuor gummi drachmas duas, pulueris cochleare unum cum decocti palmu-

larum cyathis duobus. Superbibant autem etiam poscam frigidam, uel palmularum, uel malorum, uel piorum, uel pampinorum uitis, uel eiusmodi cuiusdam decoctum. nutriuntur uero, si uires quidem requirant, ad secundam tertiamue horam, sin minus citius quartam. Panis sit lotus ex aqua frigida, uel alicui, uel chondrus † cum quodam succo refrigerante, puta mali granati, uel myrti, uel omphacometitis, uel oua sorbilia, uel aliquod ex lacte bellarii, cum quodam astringente. Inter olera, seris, cichorium, plantago, cum oleo immaturo, acetoque incocta. Ex fructibus mala, pira, mespila, malum granatum, corni fructus potus erit si febris careat, uinum aquosum, modicum: si febris adest, ex praedictis quaedam potio, uel hydromalum cibaticum. Porro qui uomunt sanguinem, iisdem sustentandi sunt, sola hac cura adhibita, ne crebro cibum sumant: quippe ex facili curantur: quandoquidem auxilia etiam quae bibuntur particulis ipsis sanguinem fundentibus palam appropinquant. At sanguine in uentriculo grumi instar coacti, coagulum potandum est maxime leporinum, aut lixiuum ex fici cinere, cum aqua, uel thymum, uel satureia cum aceto, uel etiam ex lacte scissili uacuari debent, aut ex aloë. Rursus qui per palatum creatu sanguinem reiciunt, gargarizabunt ex astringentibus, fronti; & capiti admoenda sunt quae ex naribus sanguinem fundentibus accommodantur. Haec eorum qui sanguinem expuunt curatio est, quam summa obire cura conuenit propter imminens ex immodica uacuatione periculum: si quidem copiose uacuatus sanguis quemadmodum in his qui iugulantur, mortem infert praesentaneam, si affectus remanet, in tabem transire minatur. postquam igitur omnia, ut postulat ratio, peracta fuerint, & sanguinis fluor substituerit, uires ipsis recolligendae sunt, roborque adhibendum, ac recentium porculorum perunculi, ac cerebella huc faciunt: corpus perfricari debet. uitari autem, balnei frequens usus, & uini potio, iga & uenus.

† Scriptura quae est in ueteri codice est multo uerior, μετὰ τινος τῶν τυφόντων χυλῶν οἷον ῥοιᾶς ἢ μύστων, &c. id est, cum aliquo succo adstringente.

De purulentis & tabe quae phthisis dicitur.

Cap. XXXII.

Puris illuues quod ἐμπύημα graecis dicitur, in uacuis thoracis regionibus, uel membrana quae costas succingit, colligitur.

colligitur. interim propter sanguinis educationem, ulcere ad cicatricem non perducto, quod etiā tabes statim comitatur si ex pulmone fiat reiectio: Interim ex inflammatione suborta: que deinde in abscellum conuersa, ruptaq; fuerit, quemadmodū & in laterū doloribus, quam pleuritidē uocant, nonnunquā accidit: uel propter confluxum ex capite manantem. notæ igitur empyematis adhuc cōsistentis erunt, grauitas thoracis, tussis ualida, siccaq; cum dolore, aliquando etiam cū humiditate, ob quā releuari quoq; uidentur, febriculæ per initia affligunt, languidæ, inordinatæ, & ad iudicandum difficiles. postquam uero abscellus ad uomicam inclinauerit, uehementius cum quodam horrore febricitant, ac in sermonis proprietate conturbantur, spiritu molestati. Rupto abscellu, pus educitur, nunc purum, nunc sæculentum, & nonnunquam sursum abscellus erumpit: quando etiam periculosior est: nonnunquam infra. Ac ea que inferius tendunt, partim in uentrem & intestinum transsumuntur, partim in uesicam traductione per uasa quædam administrata. semper autem febris hæctica laborant, quoad sursum omnia fuerint eduicta. In quibus, nisi summa adhibeatur diligētia, protinus purulēta illa collectio in tabem quam phthisin græci uocant transit, pulmone exulcerationem sustinente. In qua iam phthisi confirmata, genæ liuescunt, desudationes in frōte, ac ceruice sunt, carnes colliquantur, ungues curuantur, pinguesq; & exalbidi uel pallidi apparent. Malo iam uincente, uenter turbatur, præcordia sursum conuelluntur, sitis ipsos magis conficit, cibi que fastidium urget, & id quod sursum uergit, uehementer fædi odoris est.

Curatio.

Primum igitur puris collecti concoctio adiuuanda est fermentis per spongas, & cataplasmatibus, ex hordei farinis cū ficis pinguibus incoctis, resina modica, columbarū fimo, nitro, & hibisco. Rupturam uomicæ promouet etiam sani lateris incubitus. mulsæ autem sorbitio interposito tempore, & ptisanæ cremoris cum melle. Valentiores, bibant decoctum quoque hyssopi, & thimi cum melle. opitulatur etiam rupturæ, & salsamentorum esus, & catapotia hieræ diacolorynthidos dormituro data. At ubi pus excerni cœperit, iterum dabitur hyssopi, iridis, & dulcis radices decoctorū in mulsâ potio, uel dulcis radi-

cis radiculā cum sisamo detrita. Item pollen, mulsā & oleo incoctus superaccomodatur. Quod si ulcus ægrè possit sursum repugnari, cōpositis utendū est, puta medicamento dia prassiu, hoc est ex marrubio, simplici & cōposito. item, dia orobon, id est, eo quod eruis cōstat, necnon dodecatheo & phyloxeno appellatis. Verū in tabem quæ phthisis dicitur prolapsis, porra capitata, quæ in chondri & ptisanæ sorbitionibus contrabuerint, exhibentur: quæ simul per se bis cocta offeruntur. Porus autē aqua cœlestis erit, atq; mulsā inde confecta. Extrinsecus applicantur per initia quidem remissionū, cataplasma ex semine lini & polline ex decocto fœnugræci, uel maluæ, olei mellis & foliorū althææ. temporis aut processu, ad cerata ex butyro, cyprino, laurino, & iride transitus est. quin & emplastri Mnasei usus conducit. Verum si thorax fluxione infestetur, medicamentum diaiteon, hoc est, ex salicibus confectum rectè imponitur. atq; superius in purulentis simplicia dicta, nonnullaq; composita ipsis propinantur. Tussi uero grauitè affligente, thymum, hyssopum cū succo radiculæ dulcis melle decocto excepta, formataq; sub lingua tenenda dantur. Cæterum cōueniet ipsis & antidotum Mythridatis, diebus intercedentibus: sic quod uiperis constat. Optimum uero auxilium est, & boli armeni positio. item Eldræ Antidotum, nihilo prædictis minus proficit.

De laterali dolore, quæ pleuritis dicitur.

Cap. XXXIII.

Pleuritis, qui nobis lateralis dolor appellatur, propriè inflammatio est mēbranæ, quæ costas succingit: Huic simul accedit spirandi difficultas, tussis, febris continua, dolor usq; ad iugulum & præcordia pertinens. Sed pleuriticus morbus à iocinoris inflammatione, in qua èt omnia modo cōprehensa apparent, his notis discernetur, quod pleuriticis dolor punctorius adsit, tussis aliàs sicca, cum & crudus morbus significatur, aliàs cū sputo, quod humoris qui morbum facit index est. Rubrū liquidè & suberuentū æditur, cum sanguis superat. Flauum uero & subpallidū, cū flaua bilis: quemadmodū rursus album, & leuiter spumosum, cum pituita. Ob melancholicū uero succum: nigrius pulsumq; durum & serræ modo inæqualè obtinent. Iocinoris autem inflammationi, neq; punctorius dolor, neq; pulsus adeo durus superuenit, uerum tussis perpetuo sicca

seca & quæ nihil emolitur, male habet: facies pallidior appetet. At quibus pleuritides ex musculorum exteriorum inflammatione creantur, quæ propriè pleuritides non sunt, iis cum eò quod sint sine tussi, sine spûto, ac sine pulsus duritie, ad manus tactum locus affectus indolescit: atque si tumor purulentus non fuerit discussus, extrinsecus incidi postulat, cum pleuritis quæ inflammationi membranæ costas integrentis fertur accepta, eo non feratur. Illa namque, nisi uel extra, uel intus, expurgetur, purulenta colluies empyema Græci uocant, multo citius in perypneumoniam degenerat.

Curatio.

I Taq; si dolor ad iugulum usque peruenit, remedium est sanguis dimissus sin autem ad præcordia descendat, purgatio. Recentiores autem omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationem, quæ purgatio solet accersire. Quod si uires non patiantur, neutrum facere oportet. Clysteribus acerbis utendum: & si quidem dolor fuerit mediocris, aqua mulsæ, & ptisanæ, uel chondri cremor propinari post illos debet. Vbi morbus inclinauerit, porrum cremoribus rectè iniicitur, uel calamintha, uel pulegium, & urticæ semen, cum melle delingitur. Porro uehementes dolores à corporis uacuatione leniendi sunt lana calente, aut sulfurata imposita, aut etiam fomentis ex milio, aut furfure per sacculos adhibitis, aut ex aqua calida, aut oleo in uescula. Lanasque succidas imponere utile est cum oleo & uino ex marina præparato. Vel sal iniicere, uel cataplasma diaspermon, id est, quod seminibus constat ex decocto chamæmeli, althææ, uel ficorum pinguium, iridis, absynthii, mellis modo dico cum oleo nardino. Quarto die cibi erunt sorbitiones cum mellis momêto à septimo autem linctus ex amygdalis. & urticæ semine, ex melle simul contritis dabitur, uel eclegma quod ex butyro, & melle coctum est, utendumque; medicamento ex melle cocto, quod quia sub lingua tenetur, Græci uocant hypoglottida. Epithemata conuenient cum quod à graui odore dysodes nuncupant, tum diasampsuchu, id est quod constat amaraco. Itè emplastrum peganera dictum, locis dolentibus utiliter accommodatur. Præterea ad curationem bulbi cum axungia cocti frequenter fuerunt abunde. A luo iniici debet ab inferioribus partibus butyrum & terebinthina. At efficacius eclegma est ex fructu piceæ,

piceæ, aniygdalis amaris, lini semine, nucleo pineo, & amylo æquali portione cum melle. Quos torquent uigiliæ medicamen diacodyon delingere conueniet. Ex antidotis, & Athanasia, & alijs ad hoc compositis utemur. Post quartumdecimum diem, si malum remanet, cucurbitulæ ipsis admoueri, tenuiorq; seruari uictus debet. Deinde morbo inclinâte balneo æger creditur, frigus uitabit, solidior utetur cibo. At si inflammatio membranæ costas integrentis non discussa, in pus transire uideatur, supra commemoratis utendum.

Ad laterum dolores sine feбри.

L Arerum doloribus sine feбри, bdellium medetur, & costus, brassicæ caulium combustarum cineri adipiç; mixta. Nam id medicamenti assatim discutit.

De cordis affectibus. Cap. XXXIIII.

C Ordinis affectus si quidem primario accidit, omni destitutus medicorum auxilio, in præsentaneam mortem præcipitat: nempe cū inflammationem, erysipelata, & intèperies ualidas in acutissimis febribus ipsum experitur, uel sanguinis profluuiū ex sinistri potissimum uentriculi uulnere. Ac si consortii lege afficiatur, cerebro, iocinore, ore uentriculi laborante, tum si ob tristitiam, metumq; & alias pleraq; causas, syncopen appellatam, quæ subitus est uiriū collapsus sustinebit, quæq; indicatur, animæ defectu, pulsuū paruitate, extremorum perfrictionibus, & sudore circumfluo. Quæ inquam sincope, si ualida est, medicinæ locus non est. Si uires adhuc tantillum constant, aliquando ad sanitatem recursus est. Idem ualentes cordis palpitationes sæpe ex sanguinis in eo concepti copia, aut feruore contrahuntur. Idem uero cor si incaluerit, magnam crebramq; ædit respirationem, si perfrixerit, paruam & raram, quomodo autem cardiacæ syncopæ possint emēdari, secundo uolumine, inter ea quæ febribus superueniunt, sumus executi. Tantum uero hic adiiciendum est, si symptoma euincit, postquā extrema perfricata fuerint, inunctaq; & post puluerem ex pauimento iniectum aliaq; uiriū recreationi apta, particulis sudore diffatis iniicere emplastri modo conuenit myrtum detritam, uel cimoliam cretam, uel succinum, uel malicorium cum manna, uel terram samiam cum gummi. Extremis autem frigentibus, adusque inguina & alas sinapi uel

uel pyrethrum, uel adarce imponitur. Cibus erit panis ex aqua aut uino frigido temperato, suum periculi, articuli, rostra, alæ, omniaq; frigida. Capiti fronti q; omphacinum, aut alstringens aliquod cum gummi, uel rosarum decocto imponetur. Præcor dijs & stomacho cataplasma admouebitur ex palmulis, rosis, cenanthe, acacia, hypocystide & alumine.

De palpitatione cordis.

NOui (Galenus inquit) qui annis singulis uerno tempore, cordis palpitatione affligeretur. Aduersus quam uenæ sectionem trienniū expertus commodā, quarto anno sanguinē prius misit quā symptomate corripere, atque ita securus fuit, eōq; modo multis subsequētib; annis scitauit, & conuenienti uictus ratione usus est attamen & hic ante senectutē, fato functus est, quemadmodum alii quoque omnes, nonnulli in febribus acutis subita syncope oppressi similiter interierunt alii ipsoꝝ etiam citra syncopen, ueluti apoplexia tentati repente diem obierunt. Complures ita affectoꝝ ætatem egerunt, minoꝝ annis quinquaginta, maioꝝ uero quadraginta.

De mammillarum affectibus. Cap. XXXV.

LAc à partu sæpe casei modo coactum māmillis inflammationes parit. Utendum igitur per initia est hisce rebus. Spongia mollis posca tepente imbuta, expressaq; loco appositē superaccommodatur illigaturq; uel palmulæ cū pane ex posca in leuorē contritæ, uel ouo toto utendū est cum rosaceo, & cerati momēto, uel alumen, psyllumq; cum coriandro, uel portulaca applicato Vel lapis pyrites tritus cū cerato impositus illigetur. At distentione oborta, uel lacte in grumos concreto, panis ex hydre læo, aut mulso instar cataplasmati sūiicitur. Aut panis cum perdicii herba uiridi simul cū cerato, bis quotidie, aut lomentū cum hydromelite, uel sapa applicatur. Quod si uero pondus ferre nō poterint, superfusione utendum est ex dulci oleo calēte, per lanas delicioꝝ. Fetus autē adhibendi ex uapore calidæ aquæ, uel decocto sœnugræci, uel althææ, uel apii seminis. Delinere uero māmillas conuenit poline farinaceo cum seminis lini, aut sœnugræco cum hydromelite, aut sesāmo quod cum melle aut butyro sit leuigatum. Cæterum ne lac exugatur cauendum est, nam maior per lactationem materies illuc citabitur. Inclinate autem inflammatione,

cerata

cerata hæc recte induces, betam oleo incoctæ quo ad intabuerit, ipsam quidē proiicito, oleo autem ceræ modicum iungito, ac utitor. **ALIVD.** Quorum crudorum lutea decē, cerato mī scētur, qui uncīæ duæ & semis ceræ, rosacei uncīæ quatuor sint adiectæ. Postquam radícula agitaueris, murīæ quantum recipere potest indito, & rursus ubi permoueris, utitor. Porro ad māmillarū durities, facit & medicamentū ex melle: tū omnia medicamēta molliendi facultate donata. Cū uero in abscessū uertitur, iis utendū est, quæ in parotidibus cōprehensā, sunt item illis, quæ, ubi de abscessibus tractandum eris, enumerabimus.

Archigenis de erosione māmillarum cum malignitate.

VInti Adriani boni sextarii uiginti, rhus quo coriarii, utuntur libra, cupressi pilularum tantundem, gallæ omphacinæ nigræ selibra, casīæ tantundem. Contusa uino diebus decem commadescant, deinde coquantur agitata cupressi rudicula, donec dimidia ferē pars fuerit absumpta. atq; tunc herbæ proiciuntur, succus coquitur dum mellis spissitudo fiat, deinde uitreo uase reconditur. In ulceribus depascentibus mero utitor. Sin autem crassius fuerit medicamen, uino liquari debet: ut applicetur māmillis depastis, auribus suppuratis, gingiuis ex humiditate putridis, intestinorum torminibus. Idem uero dolores etiam lenit, lacte dilutum. Aliæ mammarum exulcerationes communem reliquis ulceribus curationem recipient.

Quomodo māmilla conseruentur.

CVminum cum aqua tritum māmillis obduducitur, deinde spōgia extrinsecus imposita, ex posca pectus cinctura stringito, à tribus diebus cum uino deposito, māmillis florem bulborum cum melle superaccommodato. Et deligatum rursus triduum finito, idque ter mense facito. **ALIVD.** Cicuta in pollinem detrita, ad nouem dies imponitur: spongiaque extrinsecus, sicut cōprehensum est: pauculis diebus interpolitis idem facito: Quin & Naxiæ cotis detrimentum, uirginum māmillas conseruat tueturque.

Ad fædum axillarum odorem, sudationesque.

ALuminis liquidi partes duæ, myrrhæ pars una. Vino dissolutis utitor. **ALIVD.** Plumbaginem combustam, uinoque odorato extinctam, ex uino terito, myrrhæ momentum iniiciens quoad sordium fiat spissitudo, ac utitor. **ALIVD.**

Argenti

Argenti spumæ drachmæ sedecim, myrrhæ drachmæ duę, amomi drachma. uino excipiantur. ALIUD. Aluminis liquidæ drachmæ octo, amomi, myrrhæ, spicæ nardi, singulorum drachmæ quatuor. uino leuigatis utitor.

De stomachi, præcordiorum & uentriculi affectionibus.
Cap. XXXVII.

DE cibi fastidio quod febribus superuenit, grandi fame, quam Græci bulimon uocant, canino appetitu, stomachi imbecillitate, animi defectu, insuper siti, singultu, nausea, & syncope, libro superiore, ubi de febribus tractatū est, abunde disseruimus. quare de eisdē rursum dicere opportunum non est. At inflammationes oris uentriculi & iocinoris, astringentia misceri desiderant. Nā si sola relaxatoria medendi ratione curationem tentes, uitæ periculum intuleris. Ob quam causam, siue oleū fuerit quod superfunditur, siue cataplasma, recte adiicitur astringēs aliquod, uerbi causa, absynthiū, uel nardinū unguentum, uel melinum, uel & malū cotoneū incoctum. Ceratum uero eius notæ est quo subinde utimur, ceræ cādidæ uncia, per æstatem drachmis septē, aloes, mastichæ, singulis drachmis, olei omphacini, uel melini, & nardini quantum ad spissitudinem in usu satis est. Sin maiorem requirat astrictionem, ubi tam fuerit imbecillis, ut ne cibis quidem sit retinendis, admisceatur etiam omphacii drachma, aut absynthii succi æqualis mensura, & tertio ad hæc hypocistidis, cæpanthæ, & rhus succi. Augendus autem cerati modus, qui aliorum medicaminum numero proportionem respondeat. Quod si inueterale sit inflammatio, indurescitque, uaria iam magis applicare oportet. tum ea quæ ex aromatis nonnihil, & emollientibus, discutientibusque continent, cuiusmodi est quod ex meliloto præparatur. philagrianum, & quod ab odore grato *euasides* dicitur, & uiridis iaspidis torques à collo suspensus, ut stomachum contingat magno est præidio. In calida autem stomachi intemperie & ardore cum eius resolutione, uel animæ defectu, uel quodam cibi fastidio, ex quacunque tandem occasione, præterquam febre, aqua frigida cū uue acerbæ succo propinatur, uel malorū cotoneorū decoctū, uel pampini uitis, uel semen cucumis leuigatū cum frigida. Verū stomacho uesicam aqua frigida repletā, uel cucumeris

cucumeris ramenta imponito. Catapotia quę siti restinguendę sunt, danda, ut supra de siti à nobis dictū est. Porro medicamentū quoddā stomachum ex humiditate superflua imbecillem, refrigeret confirmetq; istud est. Rosarum uiridiū foliorum drachmę sex, dulcis radicula succi drachmę quinq; uino dulci excipiuntur, & ut sub lingua tenēri possint, formantur. Ceterum in quibus crassior pituita calesceri incidiq; desiderat, hoc medicamentum proficit, & fœniculi radicis cortis uncia duę, aceti sextarius unus & dimidiū, aloes quadrans, mellis libra quatuor. Radices cum aceto coctę exprimuntur, abiciunturq; Mel autem inditum ad spissitudinem usq; coquitur, & tunc aloę trita inspergitur. Tria huius cochlearia cum aqua sumuntur. quidam uero sine aloę ipsum preparant. iam uero medicamentū diacalaminthē his idoneum est. Quibus autē cibus acescit, coriandri seminis drachma, polentę modo inspersa cōmode bibitur, uel mastichę cochlear, uel lactucę albę seminis cochlearia duo. Compositum autē hoc est, piperis drachma, anethi drachmę tres, cumini drachmę quatuor. trita cochleari uno noctu sub somnum ex uino temperato prębentur. Porro in quibus atra bile uitiosus est stomachus & inflatione laborat spongię in accessionibus oleo acerrimo imbutę applicentur. Deinde si malum remanserit, alumen cum ære læui, melle exceptum ad mouetur, sereos succus bibitur, uel menta potui inspergitur. Si flatibus turget stomachus, & distenditur, calaminthes decocto mediocris mellis piperisq; mensura mixta exhibetur. Ad stomachi peruersiones conueniunt malignati acidi nucleorum succi partes tres, mentę succi pars una. Vbi coxeris quoad unitatem coierint, ante cibum, mystum unum dato.

Ad Stomachi salinam.

ACeto scillite, aut sale conditarum oliuarum iure, aut summitatis olę decocto os colluatur, aut etiam minimum ex ipso deuoratur. Inter omnia pręsentissimum est, aloę aqua diluta. Ad eos autem qui cibum non continent, quos ueteres proprie stomachicos nominant, fœnugręci farina melli mixta, & maluę semen tritum aridum applicatur. certum uero ex cera, irini olei fæce & castoreo,

De cibi fastidio quod Gręci anorexia vocant.

FASTIDIUM, quod anorexia dicitur est, cum stomachus

chus aut intemperie uiciosus, aut humorum redundantia pressus cibos auersatur. Calidam intemperiem testantur, sitis, nidorosus, oletosique ructus, si cibus quodammodo præter uoluntatem sit assumptus. item si frigidiora potius & elaboratu per uicacia, hac tetenti queant concocquere. Frigidam contraria indicant. neque enim in hac ægri sentiunt, neque frigida sustinent, & acida nonnunquam eructant. Qui humorum uitio cibum respuunt, partim ob tenuitatem, ac rosionem illorum ita laborantes, uentriculi demorsu torquentur, nauseaque magis & siti conficiuntur. Quibus autem humores computruerint, interdum ij etiam febricitant. At quos crassi uiscosique succi male habent, ij plane nec rosionem uentriculi, nec sitim experiuntur. communiter autem omnibus superuenit nausea. porro si in uentriculi sinum humores se receperint, etiam hos ipsos euomunt. si uero, infarcti uel etiam imbibiti tunicis adhærescunt, nausea solum, non uomitu præmuntur, præterquam cum cibos assumpserit. Qui igitur ex calida intemperie fastidio laborant, refrigerante uictu curantur, præcipue qui ex aceto assumentur. Panis ergo posca imbutus esui, ipsaque posca potui datur. Item ozigala, & quam Romani melcam appellant, quod ex lacte quoddam est opsonium, intybi & portulaca, interim etiam aqua frigida, omniaque mediocriter secundum eius quæ subest intemperiei contrarietatem. Nam immoderatus horum usus, non modo non iuuat, sed etiam sæpe insanabilem morbum efficit. Frigida intemperie laborantes, contrariis medicari conuenit, uino ueteri & condito, hydrogaro, item anisi, rutæ & petroselin decocto iam pipere ex aqua calida communi, uel etiam ipso medicamine, quod inscribitur diatrion pipereon, uel cui nomen est diacalaminthes. Dabis etiam nonnihil theriacæ ex uiperis confectæ, quæ nec ipsa, fastidio ob humorum copiam laborantibus inidonea est. insuper allia his & alimentis & medicaminis nomine conueniunt. Sin autem humorum abundantia fastidium excitarit, tenues, mordacesque, aut uomitu, aut per aluum euacuabis. facilem itaque uomitum reddit aqua temperata, uel mulsæ dilutissima præbibita. Satiùs fuerit, si ante hæc humectantia exhibeas alimenta, ueluti ptisanæ cremorem, uel ouorum lutea. Cæterum quomodo ex facili uomas, priori libro est expositum. At si difficilius æger uomat, præstat materiam ad aluum elicere copiosiore temperatoque

alimento his prius humectatis. Purgans uero medicamentum esto, uel picra ex aloe, uel ex malis cotonijs præparatum, cui adiectum sit aliquid scammonia, uel quod constet rhodomeliste. Si uero citra scammoniam aloes potius copia ipsos euacuare liceat, melius feceris, eò quòd illa stomachum offendat. Quibus crassi humores uiscosiq; fastidij authores sunt medeberis extenuando ipsos incidendoq; tum oxymelite, tum iis quæ ex hoc & muria componuntur, ut cappari, oliuis, sinapi & similibus. Non inepta sunt his, & quæ ex frigida intemperie fastidientibus consulimus, maximè post uacuationem, quæ nimirum fiet oxymelite Iuliano. Extrinsecus utendum quæ calfacere stomachum & corroborare queant, inunctionibus & malagmatis, qualia sunt potissimum quod dicitur diaomphacos, & Marciatum aliæque consueta unguina: insuper epithemata, Baïum & Euodes huiusq; notæ reliqua: his addentur exercitia & frictiones potissimum. Ad eos qui frigidi humidique humoris, uel talis intemperiei uitio difficulter concoquunt, cibumque respuunt, ea quæ ex malis cotonijs consunt, pertinent. Dico autem quod uocant meloplacuntion, item quod ex malorum cotoneorum succo præparatur, tum quod ex carne eorum constat. præterea dia citriu, idest ex cytrio confectum. Malagmata uero, Marciatum & quod ex acerbæ uuæ succo componitur. item Baïon, Polyarchion, atque his finitima. Sin ulcus fuerit in stomacho, aut uentre, omnibus acribus & cibis & potionibus abstinere oportet, uti uero medicamentis quæ leniunt, puta sorbitionibus ex oleo, tû ijs quæ ex amylo, terra samia, lemnia spargide & lacte, uel melle paucissimo conficiuntur, ut etiam purgent citra rosionem. Epithema facies ex palmulis coroneis, & polenta. Ceratum ex melino, uel rosaceo cum ammoniaco & thure. Ad hæc Nelei epithema conducit, & emplastra ex salicibus, & Icesion. Notæ ulceris sunt uomitus sanguinis, uel puris, uel etiam ramentorum.

Ad solum imbecillentiq; stomachum, & ob hoc cibum non concoquentem, ualet hoc, Aloes, masliche, masti. hes, styracis singuli sextantes, absynthij triens, cenanthe quadrans, gleucini selibra, melini quadrans uini quod satis est. Nonnulli etiâ cypheos & rosarû singulos sextantes miscent. Hæc in leuorè redacta, purpura, uel lana, excipiuntur, ac stomacho imponuntur. Quidâ ceræ selibrâ adiungentes, epithema ipsum faciunt.

Ad

Ad ileosas stomachi affectiones, hoc est uehementes & conuulsorios dolores.

O Prime facit pastillus Amazonum: inuenies autem huius scripturam, tum aliorum ad stomachū compositorū materiam ad calcem libri de medicamentis compositis explicatam.

De flatu uentriculi.

Cap. XXXVIII.

Flatu in uentriculo generantur, humoribus, uel cibis, ex qua caliditate in uapores dissolutis. nam frigiditas hoc nomine quod extenuare ac dissoluere nō sit idonea, nullo flatu procreat. Vehemens caliditas cum non tantum extenuet, sed etiam discutiat, flatu generationem impedit. minor uero caliditas diffundit quidē & transmutat alimentū, uerū minus quā opus sit: unde flatu excitantur: quare calidis eos medicamentis extenuare conuenit, cumini semine, & apij, & spondylii, & dauci, in oleo decocto. Vbi uerō adfectioni adest frigiditas, ruta, bacca lauri, nigella, & feniculum oleo incoquantur, misceturq; bitumen & oleum laurinum: Ac si inflammatio dolores comitetur, in uicem calefacientium laxantibus uteris, acetū decoquens, cui gallinæ anserisq; adipem adicias. iam uero polij fasciculus, uel calaminthæ decoctū cui mellis pauxillum cum piperis drachma sit iunctum, flatibus infestatis auxiliatur. Hæc itaq; dum uehemens dolor inciderit, adhibenda consulo, dum mediocri, etiam fomenta ex milio sufficiunt. Cæterum cucurbita bonæ magnitudinis umbilicum undiq; comprehendens toto symptomate frequenter subito liberat, castoreumq; ipsis prodest, tum ex posca potum, tum extrinsecus cum oleo sicyonio appositum, uel si cum tormine intestinorū flatu incidant, medetur. Itē talus suis cōbustus, potusq; tormina & flatu tollit. Idē facit aristolochia rotunda. Iam uerō aduersus dolores flatuosos ex uētris obstructione, uel crassitie, uel perfrictione obortos, uinum meracius, à cibo sumptum proficit. Vbi somnus accesserit, etiam ex toto leuat affectos,

De cholera.

Cap. XXXIX.

Cholera est immodica uentris perturbatio suprà iniraq; ex continua ciborū cruditate proueniens quæ inquam cruditas nonnunquam ex magna alimentorum prauitate, interim ex uitiosorum humorum superfluo contrahitur. Si igitur nausea abundus æger est, & turbatur, cibis etiamnum

crudis in uentriculo manentibus, aqua tepida propinari debet, deinde uomere oportet, digito, uel pinna ori indita: item alui ductione adiuuandus est. Vbi uerò hæc exinanita est, con-
 quiescere, & præcordia oleo dulci cum uini modico, uel masti-
 chino, uel etiâ nardino si hyems fuerit souere conueniet, som-
 numque permitttere. Vbi iâ exacta apparuerit concoctio, bal-
 neis & probi succi cibo utendum est. At si inanitio fiat immo-
 dica, sufficient quidem initio uel ea quæ secundo libro de uen-
 tris perturbatione comprehensa sunt. Sin autem perseueret
 euacuationis impetus, uenter concidat, pulsus minor creber-
 que euadat, cataplasma adhibendum ex palmulis cum cenan-
 the & acacia, item hypocistidis & malicorij succo. Adhæc offe-
 rendus est ad sorbendum aquæ mediocriter frigida cyathus.
 Præstiterit rosarum, uel cenanthe, uel rhus, uel uitis capreolo-
 rum decoctum, uel mali granati acido dulcis succus, cui mentæ-
 paxillum sit inspersum. Porro si excrementa fuerint aciora,
 uexetque ardor, & sitis, cucurbitæ semen cum aquæ cyathis tri-
 bus, tum intybi, & portulacæ in posca coctæ alimentum nomine
 exhibeantur. Verum si fluxio sisti nequeat, uinum quoddâ au-
 sterum, potui dandum est, si febris absit, palmarianum, uel ami-
 næum, uel spathites, uel omphacomelites. Sin absit, rhoetes,
 uel myrtinum, uel cibiriticum hydromalum & potui, & cum
 mica, uel halica, uel chondro. At si respuant cibum frumenta-
 ceum horarios seu suzaces fructus mandent, mespila scilicet,
 uel pira, uel mala cydonia, uel punica: quod carnosum est & du-
 rum expuant. Si ne his quidem auxiliis cibum retinent, ex-
 trinsecus contra uentriculum ipsum, cucurbita leuis quam
 maxima admouenda est. Dum autem ipsa adhæret cibo ali-
 quo ex prædictis ali debent. Ad conuulsorias autem contra-
 ctiones calida linimenta, oleo, imbuta, musculis circumpone-
 re oportet, tum cerata liquida, quibus adiectum sit aliquid ca-
 storei & sicyonij. Ante hæc artus aqua calida superfundendi.
 At si uigiliæ torquent, somnus, iis quæ aduersus illas prodidi-
 mus, conciliabitur. Si uires autem non prohibent, etiam me-
 dicamentum diacodion ipsis propinabitur: ubi morbus inclina-
 uerit, ad balneum deducuntur, eibus ad refectiōē, pulli galli-
 nacei erūt, colūbæ, uel suū petunculi, similiæ. Alui profluuiū
 διαρροια græcis uocatur: quod ciborū corruptela est, plerumq;
 sua sponte cessat, ægris non citius alimentum sentientibus q̃
 absoluta

absoluta facta fuerit concoctio, & corruptorum euacuatio: si
autem remaneat, iis quæ in cholera dicta sunt, utendum.

*De leuitate intestinorum quæ lienteria dicitur &
caliaco affectu. Cap. XL.*

CVM lienteria duplex sit species, una sanè ex superficiali
intestinorû exulceratione: secundû quosdam uerò
et am ex cicatrice, quam dysenteria magna ex parte,
uel aliæ fluxiones excitant: altera ex facultatis cibum in uen-
tre continentis imbecillitate, secundam opinor differentiam
cum cæliaca dicta afflictione cōmisceri confundiq;. Etenim in
hac cū uenter præ imbecillitate nequeat cibos & concoquere
& distribuere, læuia, cruda & per liquida redduntur, & aluo in
omnibus fluida. Verum in lientericis celeriter, quæ assumpra
sunt, egeruntur, tamq; intensa est cruditas, ut alimenti assump-
pti genus apertè cognoscatur, atq; hac nota potissimum à cæ-
liacis discernuntur. Itaq; semen lini cū palmulis ipsis obducit.
Summè autē facit lentiscus, rubus oxymelite incoctus: cū ad-
est inflatio cum inû miscabitur, anethumq;, & rura: augescente
uerò profluuiio adiungemus mala cotonea, alumen liquidum,
acaciam, hypocistidem, gallam, uel quædā, uel omnia. Cerata
ex oleo myrteo cum uino quodā alstringēte. Epithemata cali-
diora quæ ex baccis lauri, & quod ex seminibus cōstat. Astrin-
gunt autē magis diacœnanthes, & diagigarton, i. ex acinis malo-
rum punicorû: Itē quod ad Antyllû authorē refertur, & Ery-
thrii mirificû: si uerò morbus in uetustatē incidat, etiā uentri
rectè applicatur & ceratû ex sinapi, ipsumq; sinapi. Portiones
cōueniunt, simplices quidē, plantaginis, uel rumicis, uel mali
granati cortices, uel sorba arida, uel immatura, uel omphaciû
siccum, ex uua aminæa, tribus obolis potum. Qui febricarent
cū uini austeri cyathis sex: febricitantes autē cū aqua pluuiali
sumunt. Porro aluus arida gallinarû potui inspersa, stomachû
minus attingit, tû ea quæ urinā citant, exempli gratia, apium,
adianthum, similiaq; epota deriuationē moliuntur. Cōposica
uerò sunt polyide sphragis, pastillus ex succino, item ex spina
ægyptia cōfectus, insuper elidiû appellatus, & diaspermaton.
Item hoc est præstantissimû quod sequitur, rumicis syluestris
seminis fescuncera, plâtagnis seminis uncia .4. hypocistidis suc-
ci drachmæ sex, gummi uel acaciæ drachmæ tres. Excipiuntur

cotoncorum ad tertias decoctorum liquore. ALIUD. Cumini, piperis, rhus. syriaci, balaustij singulorum fescuncia, malicorii uncia, laseris fescuncia : aut eius pulueris drachma potui inspergitur, aut oxymelite macerata dantur mane & uespere. ALIUD Myrti nigrae cochleate, eiusq; dimidium, anisi, rosatum succarum, cenanthes singulorum cochlearis dimidium, palmulas uiginti, in pastillos cogito, & drachmam unam cum aqua, aut diluta uini portione porrigito. iā Theriace ex piperis optimum his est praesidium. Cibus autem, si acris & biliosa sit deiectio, ex chondro, oriza, halica, & similibus erit : quibus cum astringens aliquod decoquetur. pirum, malum cotonium, mespilum, & id genus alia, item lac decoctum probe his proderit. Potus erit, aut uinum aquosum, tenue, aut dulcis quaedam portio. Sin autē pituitosiora excernunt, contrarius ipsis cibus exhibetur, nonnulla stomacho grata admiscuntur, anisum, cuminum, uel apii semen : Adhuc lenticula his cocta plerunq; ipsis profuit, cum aceto modico, uel oxymelite commanducata. Præterea brassicae & ipsae his coctione expertae : praestat autem secundum ipsorum coctionem in posta fieri. Vinum assumetur uetustius calidusq;.

† Rectior est scriptura ueteris codicis *χειματισμένος ἐπὶ παντὶ τῆς γαστρὸς*, i. uentre omnino fluxionem abunde accipite.

† Veteres libri hoc loco hanc scripturam habent. *Ἐποκυλλίδης χυλῶ 3.6 ἡόμερος ἢ ἀκακίας ἴσον*, id est, hypocyllidis succi drachmae sex, gummi uel acaciae par modus.

De tenesmo. Cap. XLI.

Tenesmus interdum dysenteriam praecedit : saepe uerò & ipse solus paulatim generatus, definit. Est autem affectus hic, implacabilis desidendi cupiditas, qua nihil praeter modica cruenta, uel mucosa, egeritur, quae totius prope mali causa est : factaq; in loganone inflammatio edematodes hoc est mollis & cedens haerentis illic stercoreis opinionem, & deiciendi ea desiderium mouet. Galenus memoriae prodit etiam calculum quendam in tenesmi affectione per anum fuisse excretum. Subinde uerò obstructionem stercoreis in tenui intestino coacti, tenesmus securus est, qui astringentibus quidem obturantibusq; remediis magis increuerit : elysteribus autē acrioribus, nempe mulsa cum sale, uel medicamine quod emolliat, per

per os assumpto, ut damasceno, uel pinguibus siccis, rore marino sero lactis stercore excreto, confectum finitus est. Quod si igitur citra talem causam, tenesmus obortus sit, conuenit inflammationem, cruda ordeï farina calida & fortè ex uino, oleo myrteo, uel rosaceo, uel omphacino lumbis & inferiori uentris ab umbilico regiõni adhibito lenire ad ea uero quæ longanoni mucosa impacta sunt, mulla indita aluo abstergendo muriaq; sæpe demissa auxilii fuit abundè. Sufficiunt autem salis drachmæ sex in aquæ calentis hemina. Porro dolores intentionesq; leniuntur infessu sænugræci, uel malug, uel seminis lini. Alii autem frequenter hunc quoq; infessum felicem sunt experti, rutæ, myrti, cytini, lauri, cupressi. æqua singulorum uiridiũ portio in aqua coquitur: est autem Marcelliani. Vbi altè affligit inflammatio, irritationesq; iniici debent ab inferioribus partibus cremores frumentacei cum quodam alstringente decocto. oleum uero dulce inditum retentumq; dolorem soluit. Cum autem crebra desidendi est cupiditas, etiam Agatidem spissamẽ ris calidis sedi apponent, aut fursures calidas in fascia, aut spongiã, aut aliquid huiusmodi.

De torminibus quæ dysenteria dicitur. Cap. XLII.

Cum intestina intus exulcerantur, latini tormina, græci dysenteriam appellant, quæ nunc ex tenesmi mutatione, uel quadam ex prædictis alui turbatione prouenit, nunc per se incipit, in qua excernuntur primum biliosa, uaria. deinde leuiter subrueta, postremo saniei similia cuiusmodi à mortuorũ cadaueribus solèt p̄uere. At quæ à bile nigra oriẽ, exitialis est, ut quæ cancrũ cū exulceratione testet. Si igitur ab exulceratione, crueta stercorei cõmixta deiici cū dolore & torsionibus cernantur, ulcus tenuia intestina obsidere nota est, quæ per os potissimũ remedia desideret. Sin aut syncerum stercus descendat, crassa, quod enematibus magis cedit. Porro cum multũ sanguinis seorsim excernitur: affectũ cruentã dysenteria appellant: quanquã interim sanguis etiã nigrior, quam naturaliter esse debet, & splendescens deiiciatur, cum scilicet iecur alimentum distributum non probe conficit. Iam uero cū retentrix ipsius facultas, uel alteratrix imbecillis est, sæpe eiusmodi descendũt ut recēs in eis caro lota esse uideat. Atq; hæc iecorariã uocat dysenteria, de qua in iocinoris affectu agemus.

Itaq; utendum est communiter ijs quæ in coeliacis & aliis præter naturam excretionibus comprehensa sunt. Priuatim conueniunt, lemnia sphragia, quæ etiam depascētem modo dysenteriam per sanat, & pota & in aluum data, si intestinum malsa prius fuerit abstersum. Deinde muria & lactucæ succus potus conuenit dysentericis ipsaq; lactuca in posca cocta & sibi donea est, item plantago, rubi tum fructus, tum folia, & altheæ radicis decoctū, hippuris ex aqua, uel uino bibita, eiusq; succus, p. delit. Mori succus immaturus exiccatus, atq; hoc magis batina mora similiter reficcata. siccant etiam uentris fluorem oua ex aceto cocta comestaq; Satius fuerit, si cōmista quibusdam ex iis quæ ad dysenteriam faciunt, frixaq; & sibi exhibeas. Vtilissimum his est omphacium, rhus rubrum, eiusq; succus, malicorium, galla, acini uuæ, melpila, myrra, corni, cochlearum integro tostatum cinis. Compositum hoc bene facit, cochlearum cineris partes quatuor, gallæ partes duas, piperis partem unā in puluerem redacta obsoniis inspergito, uel ex aqua, uel ex uino albo aquoso potui dato. Generose iuuat dysentericos quos nondum alvus putre occupauerit, & sanum ossa uorantium stercus aridum, cum lacte caseato, ex lapillis marinis injectis potatum. composita uero ex ægyptia spina pastillus, itē Philippi, tum qui ex cornu ceruino constat, adhæc qui ex seminibus conficitur, quiq; ad Trigonem refertur. Iam catapotia ex macere admiranda. maximè autem commendatur & hoc: opij, croci, lycii indicii, acaciæ, rhus, thuris, gallæ hypocistidis, malicorij, myrrhæ, aloes, æquales singulorum portiones, nempe tres obuli ex aqua propinantur. **ALIVD.** Rhus drachmæ octo, gallæ, malicorij, singulorum drachmæ quatuor cochleare unum ex uino datur. **ALIVD.** Rhus drachmæ octo, gallæ, acaciæ, gummi, singulorum drachmæ quæ opij drachma. Exhibetur drachma ex uino temperato Hoc autem eclegma ipsis conueniet. Myrtorum nigrorum, rhus syriaci singuli sextarii, palmularum thebaicarum duæ libræ, nialorum cotoneorum carniū libra, mala granata acida cum ipsis corticibus decem, uini astringentis sextarii duodecim, ad tertias decoquuntur. Percolatis libræ sex mellis iniiciuntur, & ad spissitudinē iam incocta linctu exhibero. Notum uerò est cataplasmata quoq; ex astringentibus componenda, quorum materiam explicatam habes. Porro aluo indita, dysentericis. propter

tenelmos

tenefmos infestantes, ex usu fuerint, cremor orizæ, uel chondri, uel huiusmodi alterius cum adipe caprillo, uel hircino, tū ea quæ capite de tenefmo diximus. Si autem sanguis profluit, ex inferioribus partibus infundere oportet succum polygoni, uel plantaginis cum acacia, uel hypocistide, uel id genus aliquo. Sin urgeat fluxus, etiam quod sanguinē cohibeat quoddā iniiciendum est, ut cinis laniæ succidæ, uel spongiæ inanis, pice liquida, uel sanguine bulbuli imbutæ uel alumine liquido, cōbustæ, uel asinini stercoreis succo. Huic & Andronis pastillus præstant est remedium. tum qui Musæ ascribitur, ac persimiles. Insuper subiecta collyria multo sunt in id efficacissima, in quibus potissimum etiam dolores circa deiectionem hūnt. Vbi uero ulcera intestina depascantur quæ tum sædo ex cerementorum odore, tum putredine, tum quod non statim per initia fiat, sed temporis interuallo, agnoscimus, enematis quæ crustam inducunt utemur. cuiusmodi sunt pastilli nomine Faustiani, item diachartu, id est ex chartha inscriptus, ac Brynius, Theoniusq; : Præterea qui ex suberibus constat, ex lenticule decocto, uel cuiusdam astringentis, iniecti. Atq; hoc enema est ex ijs quæ ad modum expertus sum, glandis caliculi combusti (Est autem calyculus concavum illud unde querna glans prodijt, quo coriarij utuntur) Auripigmenti consolidæ, rhus syriaci, æquales partes his cōtusis, duo cochlearia ex cipto cremore orizæ & succo anchusæ quæ folium habet spinale, amplum nigrumque, quod chærospileton appellant Item ouorū candidi liquoris similiter ad uncias duas ternasue immittito. Epithemata uero in cœliacis enumerata sunt. Item uentris inunctiones quæ astrictoria ac siccante constant materia, glutinatorio quodam adhibito, gummi, thuræ, taurocolla, polli-
ne, in similibus cataplasmatibus locum habeant. † Alimentum his erit per initia. pulticula ex ovo & lacte. deinde sorbitiones frumentaceæ per se, & cum lacte, item lac mediocriter coctum maximè commendatur. Holerum usus non est necessarius quidem, attamen gustandas exhibebis serim coctam, intybum, plantaginem, brassicam b s coctam, poma quæ ἐπώ-
ρα dicuntur astringentia, carnibus ipsorum reiectis, uel alijs quæ asperare intestina possunt. Verum si multa sit caloris intemperies, etiam intybus cruda esui danda est, & aqua potioni frigida. Alia uero potabilis aqua cœlestis esto: si uero labo-
raverit

rauerit stomachus, uinum quoq; propinandum est. Postea ex aucupio sicciore & concoctioni morigera sumantur: balineis dulcibus utentur, à quibus si fluxionem experiantur, spongiam magnam, uel panis siliginei micæ uino ascalonite, uel quodā astringente calido imbutas, toti uentri imponere oportet, cōtra quem cum deligaueris, sic lauare iubeto.

† Hoc loco uetus cod. habet, τροφή δ' ἐστὶν τῶν ὠμῶν ἀρχὴν ἔχει, id est, alimentum per initia his sint oua. Sed uulgatē scripturam bonā ossē ex Aëtio quiuis intelligere potest, apud quē uox ὠμάλα est, quam interpres oua lacti mixta reddidit.

De morbo intestini plenioris, quem græci colicon appellant. Cap. XLIII.

Colon, cum pars sit intestini crassi, à dextra ilium regione procedēs, ad finisteriorem cincturæ modo pertinet. Huic dolores grauissimi plures ob causas suboriuntur. uel enim ex crasso pituitosoq; humore intra tunicas ipsius recepto, uel ex spiritu crasso, & flatulento qui non habet exitū, uel propter inflammationē, intestini, uel ob acres mordacesq; humores. Qui ergo ex humore crasso, ac pituitoso dolorem cōcipiunt, hi per totum abdomen in alto excruciantur, præsertim sensu, qua parte colon situm est, ceu terebra pertundatur. Hos torsiones quoq; affligunt, ructus, nausea, uomitio cuiuslibet humoris, potissimum pituitæ. Aluus grauiter impedita nihil reddit, ac ne spirituum quidem transmittit. Stercus autem quandoq; excreum, bouino simile uidetur, leue & flatus plenum, Præcedens horum causa est magna ex parte, continuus ciborum frigidiorum, crassiq; succi, usus, repletio, cruditas, ortiū & his finitima. Qui autem ex spiritu flatulento indolescunt, ijs tensionis magis sensus obuenit: qui autem ex inflammatione, ijs feruorem internum percipiunt, & febris non ignaua, urinæ retentio simul & stercoris pulsus in uētre molestat, sitis, ardor, nausea, bilis potius uomitiones quæ nihil leuant malum, summam inter colicās affectiones hæc est grauissima, quæ in Meum transicionem minatur. at quibus acres rodentesq; succi dolorē mouent, sicut etiam qui ob inflammationē dolent, hos ardor sitis & uigilia torquet, † febricitant aut oīno uel minus quam illi, urina redditur aeris, & biliosa per aluum descendūt.

Sæpe

Sæpealui deiection maiorẽ excitat cruciatũ, grauiusq; irritant calidiores cibi potusq; assumpti: Itaq; doloribus quos frigidi & glutinosi ac crassi humores contraxerũt, medebimur sic ut nõ uehementer calfaciamus, quippe huiusmodi humores iis quæ nimis excalfaciunt, præfidiis fundantur, ac in spiritalem potius substantiam rediguntur Quapropter & incidi, & cõcoqui medicamentis debent, quæ non insient, sed extenuent deficcantq; nec per morbi initia ualde calefaciãt. Prius itaq; aluo stercore leuata, cõgrui clysteres ex oleo iniiciuntur in quo decoctum sit cuminum, uel ruta cũ adipe anserino, uel gallinæ, aut cucumis syluestris radicum decocto, & myrrhæ drachma, melle & oleo, aut ex myrrha, melle, & oleo sicyoneo. Iam uero commune oleum iniectum, sæpe uitream simul pituitam expulit, ac dolorem subito finit. At si ob doloris uehementiam etiam enema retinuerint, glans aluo demittenda est, ex melle, cumino, nitro, rutæ semine sicco, brassicæ caule probe polito & muria madefacto, uel cinere brassicæ melle consperso, uel cucurbita syluestri trita cum melle, nitro & cumino. Glandes autem digitorum sex erunt, ut strictiorem animum musculum quem σφιγκτηρὰ uocant, exuperent, sedemq; ungere oportet, ciclamini succo cum melle, & nitro, uel centaureo cum melle, & nitro. Si dolor non remittitur enema præter commemorata sit. Resinæ terebinthinæ uncia, uel opopanax drachma, uel galbani drachmæ quatuor, bituminis tantundem, cum nitri drachma, & aquæ uncia, olei rutacei uncia quinque, aut amplius. fatus autem partibus indolentibus superaccommodandi sunt ex cumino, uel anethino, uel sicyonio oleo. Cataplasma admouendum, trisperrum appellatum, cum cumino, baccis lauri, apii semine. Epithemata uero conuenient, diaspermation, diadaphnidon, adde diameliloton, & Poliarchion. Inseffus autem utilis ex decocto fœnugræci, althææ, chamæmeli, artemisîæ, anethi, lauri, & similibus. Item in oleum calidum, aut hydrelæum descendere alienum non est, potui offertur absynthium, & cuminum æqua portione, uel panax cum aqua, uel castorei, anisi, piperis, singulæ drachmæ cum oxymelite. Quod si dolor non conquierit, propinatur ipsis medicamentum diatrion pipereon, uel theriaca. Iam sinapismo, & dropace in remissione doloris utẽdum est, ac balneis naturalibus: † à balneis

neis autem aquæ potabilis abstineant, nisi doloris circumstan-
 tia compellat. Vbi iam prædictorum aliquo medicamento fa-
 cta prius fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incalescantq; laco-
 nico intra ignitos parietes inspergendo nitrosa quædã imeg-
 mata. Cum dolor est uehemens, mediocriter lementibus uti
 conuenit, qualis est pastillus ex castoreo, tum a'uo ab inferio-
 ribus partibus inditus, cum potus, similiaq; his medicamina.
 Nam quæ ualenter stuporem inducunt, uitare oportet. quippe
 paulisper quidem leniunt, sed longiorem affectionem reddūt,
 dum materiam incrassant. meatusq; intestini condensant. Por-
 rò ubi iam pituita fuerit extenuata, purgabitur hiera amare-
 scente, uel his catapotijs: Aloes, euphorbij, cocci gnidii. scam-
 moniæ æquali singulorum modo. dantur duobus scrupulis. Vi-
 ctus utilis erit calidior sicciorq; per initia morbi, à cibo absti-
 nebitur. deinde acria assumētur. Porro igitur ipsis exhiberi co-
 cta cum condyto debent, apium, asparagus palustris, cruda al-
 lia, & maxime ijs qui talibus non offenduntur, ipsumq; uero
 condytum bibant panem uero cum ipso assumant. Insecutis
 diebus etiam reliqua boni succi alimenta concoctaq; facilia
 dabuntur, sic ut repletio cruditasq; uitetur. At si flatulentus
 spiritus doloris author fuerit, secundum clysteres qui flatu di-
 scutiant, potionesq; etiam cucurbitæ quàm maximæ cū flamma
 ac leues toti abdomini defixæ, frequenter abundè auxilii
 præstiterunt. Porro cum inflammatio intestinum exercet, ue-
 na in cubito aperienda est sin urinæ difficultas distorqueat, &
 ex talo sanguis detrahi debet, & prædicta admoueri præsidia,
 * præterquàm quæ acria sunt & ualenter purgant: utendum
 uerò iis quæ magis leniunt, enematis, cataplasmatibus & super-
 fusionibus, in oleumq; descendendum, ac cucurbitulas ipsis
 defigemus, ceratum abdomini applicabimus quod habeat ce-
 ræ quincuncem, olei chamæmelini uncias duas, rosacei tan-
 tundem, lementi semunciam, uirella ouorum quinq;. Hæc
 succo lini seminis soluuntur. Victus tenuis ac febricitantium
 proprius ipsis conuenit, quousq; inflammatio discutiat. At
 qui si propter acreis rodentesq; succos dolitant, oleum ipsis ab
 inferioribus partibus iniicietur, in quo scænuæcū decoctum
 sit, uel althea cum tenera adipe recenti anseris, uel gallinæ uel
 etiam cremore ptisanæ cum rosaceo, uel succo quoq; lini semi-
 nis. Propinandumq; ipsis Antidotum picra dialees, & balne s
 uen-

utendum ex dulci aqua, cibo sobili ex chondro, uel prifana, piscibus saxatilibus. In summa uniuersus uictus humidior erit, & frigidior. Abstinentum acribus omnibus, cum cibis, tum medicamentis, foruque ex asperginibus, & cataplasmatibus, uini portione & potissimum ueteris. Cum autem dolor præpoller, etiam iis utendum est quæ sensum obstupefaciunt. nam offendunt minus aliis huiusmodi affectiones medicamenta quæ tenues, mordacesque humores incrassant, & mediocriter refrigerant. Puto autem colicam affectionem, quæ etiamnum regnat ex huiusmodi prouenisse humoribus, quæ ab Italiæ quidem regionibus incepit, in aliis autem multis Romanorum Reipublice locis pestiferæ cuiusdam suis modo sit grassata: ex qua plerique in morbum comitalem, alii in artuum resolutionem sensu incolumi, nonnulli in utraque sunt prolapsi: ac eorum, qui in comitalem morbum inciderunt: plures interiire. Ex illis uero qui in resolutionem, plures euaserunt, tanquam in crisi, causa aliorum ex loco quem infestauerat, conuersa. Sic igitur laborantes, medicus quidam in Italia curauit uictus, quadam ratione infideli refrigerante & maxime temeraria. lactucas enim non coctas refrigeratasque ipsis porrigebat, intybumque similiter supra satietatem comedendum. Item uuas, mala pisces dura carne præditos, omniaque; crustacea quæ uocant Græce *ὀστρακόδεσμα*, pedes bubulos, bulbos & similia, non solum facultate, sed & tactu frigida. uinum raro præbebat, cum autem dabat frigida miscebat, ipsamque; frigidam uel etiam poscam frigidam exhibebat, ab omni alio calido, & medio cibo abstinens. Atque plurimos sic præter omnium opinionem persanauit, imò nonnullos qui iam in morbum comitalem, uel resolutionem prolapsi erant, propemodum sanitati restituit.

† Veteris Cod. hæc est scriptura, *πυρέττει δὲ οὐδὲν ἥλως ἢ ἐκίνας ἤ τταν*. Sed uulgarem lectionem, uel eam quam habet codex Orosii *πυρέττει ὑμῶς*, meliorem esse ex Alexan. Tral. intelligere licet, qui scribit, eorum qui colico dolore laborant, *ἢ καὶ οὐ πυρέττει διατελεῖν τῆς πλείους* id est plurimos non esse sine febre.

‡ Totus hic locus sic legitur in antiquis libris. *τῶν δὲ διὰ διατοῦ ποτίμῳ λήρων ἀπεχιδῶσαν, πλὴν εἰ μὴ διὰ τὴν περίττασιν τῆς οἰσίνης ἀναγκάζοιτο, δυνάκε δὴ πρῶτος ἐνέοντας αὐτὲς τινὲς τῶν εἰρημίων. φαρμάκον λένει καὶ πυρίαν αὐτὴν κελεύει ἐν τοῖς δια-*

πύρετις

πύρρσις τῖπρσις, id est, à balneis aquæ potabilis abstineant nisi doloris intensio compellat, ubi iam prædictorum aliquo medicamento facta leuiter fuerit euacuatio, iubebis ut lauent, incalecantque laconico in locis ignitis.

* Hoc scriptura est in ueteri codice πλὴν τῶν δριμέων καὶ τῶν διεραϊνόντων ἰσχυρῶς, id est, præterquàm quæ acria sunt & multum calfaciunt. Quæ scriptura rectior est.

De tenuioris intestini morbo, qui ileos dicitur:

Cap.

XLIIII.

Ileos cum affectus sit maxime acutus, & dolorificus, symptoma quoddam habet periculo grauior. Qui.n.hoc malo sunt oppressi, miserabili morte perunt, ad uitæ finem, stercus per os reddentes. Contrahitur id uitij cruditatibus, & obstructo recrementorum itinere, iis nimirum retentis, quæ iam corruptionem experta sunt: ex letalibus medicamentis, cunq; in scrotum prolabantur intestina, & cum inflammatione sentiunt, colica affectione plerunq; præcedente, causamq; adferente. Pueros itaq; superfusionibus, cataplasmatibus, enematis, glandibus & fomentis, sicut in capite de colicis comprehensum est, curare oportet. Adolescentibus autem & ætate floridis indubitato sanguinem detrahere: sin minus, uincit multas ac leues cucurbitulas toti abdomini admouere: Loco autem dolenti, etiam cute incisa: item perfricare & deligare artus, & tunc efficacioribus clysteriis & iniectionibus uti. Ad hæc in oleum calidum descendere, antidota purgationesq; assumere, breuiter omnia adhibere conuenit, quæ ad colicos scripta sunt, præter eos qui ex acribus, rodentibusque succis indolescent. Mirifice autem ipsis facit etiam si uomuerint, anethū coctum, porumque, à potu panis in calidam demersi frustula statim esse, dum incalescunt. Ad eos autem qui cibos non retinent, rhus & cuminum in eadem trita potui dato in senis oxymelitis cyathis. Qui ex medicamento in ileon inciderunt, ut uomant compellendi aquæ calidæ potu. Noxiorum autem medicamentorum nota, quinto libro habes expressas. Deinde oleum calens propinari debet, uel iura pingua ut denuo uomant. Diebus aliquot interpositis, theriace potui detur. At si obstructio perseveret, lacte scisso cum scammoniz, uel aloes, uel cuiusdam purgantis momento, aluū inanire confert. Si ex intestini prolapsu

in scrotū affectus processerit figuratīs statim ipsis sublimibus in inguina cōpelletur delapsū intestinum, fasciāq; deligabitur.

De renū & uesicæ affectibus, & primum de calculo. Cap. XLV.

MOrborum cognatio, ordinē disciplinæ transgredi nos compellit, nam cōmunis est Colicis, & lapidem in rene habentibus aluus initio astricta, uehemens dolor, fastidiū, cruditas, & tormina: Propria uero, colici habent omnia hæc magis intensa, nephritici minus. At colicis quidē in dexteriore potius ileū parte dolor excruciat, & usq; ad stomachū, iecur, & lienem peruenit, aluus omnino cohibetur, adeo ut ne spiritus, quidē infra trāsmittatur. Cum uerō necessitas stercus expellit, flatulentū bouili modo est. Interim etiam uitrea pituita excernitur, urina copiosior pituitosaq; redditur. uerū nephritici grauē in ipsis renibus infixum dolorē impacti pali instar sentiunt, eiusdemq; lateris ac è directo subiectus testiculus indolet, femur eiusdē partis directē obstupefcit, excernitq; etiā sponte quidem raro, omnino autem clysteris aluus citata, flatus, stercusq; e biliosius egerit. urinæ pauca, & arenosa magis prodeum: meatus per quem urina distillat, astringitur. hæc indicia calculos in renibus esse fatentur, quæ adultis potius oboriuntur. in uesica autē pueris magis calculus solet concrefcere: notæ harum sunt cruda & subalbida urina cui subsideat arenosum. Pruriunt laborantes crebro, & contrahunt pudēda, intenduntq; & continue ad urinā reddendam urgeantur, ac stillicidio uexantur. Materiam igitur calculis creandis suppeditat crassius, terreusq; humor. Effectrix ipsorum causa est ignea renū, aut uesicæ caliditas. At in renibus quidem medicamentis uti conuenit, quæ calculos cōfringunt dissecantq;, non autem manifesto calefaciunt. Talia habentur basilicorum asparagorū radices rubiq;, nitrum combustum, graminis radix, adianthū, bdellium, lauri, rad. cis cortex, althææ semen, cicer nigrum arietinum spongiarum calculi, acetum scillites, phu, meon, asaron, carpesion, saxifraga. Non uerō, & esu, & potu prodest, cardui, radix, eiyssimion, & prionitis. balneis autem crebro utantur, & post lauacrum statim quædam ex prædictis bibant. Cæterum superfusiones, cataplasmata, fotus, infessus, relaxantia. & quæ leniunt, ex colicis huc transferre conuenit.

Compositæ

Compositæ portiones sunt, rutæ sylvestris, maluæ sylvestris, apii radices incoquantur uino, & liquor inde expressus temperatusq; aqua, duobus cochleariis porrigitur. Hoc inspergi potest. Balsami fructus, lapidis spongiarum, pulegii sicci, maluæ sylvestris seminis singulorû pares portiones. ubi contusa fuerint, † cochleare inde cum uini temperati cochleariis duobus exhibetur. Item sanguis hircinus inarefactus, cicadæ siccæ sine pennis pedibusq; lapidis iudaicus, qui tecolirhos dicitur, ex mulso in calido balnei folio offertur. tum medicamenta composita, quæ ex ipsis præparantur. Insuper, Fusca nephritice, & ad hoc composita, condita. His accedit laudatissimum remedium troglodytes: est autem passerulus omnium auium minimus, ea sola excepta, quæ Regulus appellatur. Hoc enim solo paulo maior est, eique similis colore inter cinerium & uiride, tenui rostro, in muris maxime & sepibus degens. Hic inquam rotus sale conditus crudusq; frequenter commanducatus, calculos iam creatos per urinam expellit, in postetumq; generari prohibet. Combusti integri cum pennis cinis uniuersus per se & cum pipere, phyllique momento ex mero & melle potius, idest potest efficare. Ad dolorum uero acumen & uigilias bona sunt remedia. Sorita, & Philonis medicamentum. iam sanguinis missio adhibita dolorem sæpe leuauit, celeriter calculum emoluit. Tuetur à calculis, ne fiant, primum sane cibus boni succi, & moderatus, dein exercitia, rarusq; leguminum omnis generis, frumentaceorumq; usus, item casei abstinentia, lactis, & quæ ex ipso præparantur, obsoniorum, uini nigri, carniū copiar, & omnium summatim crassi succi, ac nimis calidorum acriumq; hydrogarorum dico, & conditorum & similia. Hæc enim si obseruentur, non solum lapides nondum creatos prohibent concreescere, sed etiam iam factos, confringere, uel excernere idonea sunt, bibant autem oxymeli cum quodam simpliciore urinam citante, ueluti adiantho, apio, graminis decocto. A balneo ieiunus ante uinum aquam temperatam potet. ac in medio prandij frigidam superbibat, si nihil prohibet. † Vbi prauis humoris copiam presentiscunt, sanguine detracto, aut purgatione uacuentur. Omnium uero presentissimum est ad calculos arcendos secundum balneum, aquam temperatam prius bibere, quam uinum, aut aliud alimentum assumas: ac uelicæ calculos in pueris,

pueris, ualentioribus emolire præsidij, delectu ex supra comprehensis habito. Quod si impendio excreuerint, aut ceruici uesicæ impeerint, iniectione recti syphonis, catheterismum uocant, per quassatum utendum, aut etiam calculi incisio adhibenda, ut in parte chirurgica dicitur.

De inflammatione.

AT si inflammatio renes, aut uesicam exerceat, quam hæ notæ testantur, loci affecti ardor, dolorq; cum grauitate, febricula, mentis alienatio, uomitio bilis synceræ, urinæ reddendæ impotentia, & præsertim ubi uesica inflammationem experitur: sanguis statim detrahendus est, utendûq; superfusionibus, quibus leniendi potestas est, & cataplasmatibus ex ruta, anetho, fœnugræco, althææ radicæ, clysteriisq; mollibus, & iniectionibus ex oleo, papauere, adipe anserino. In uesicæ affectu etiam, opii semibolum cū myrrha, croco, & oleo, in aluum demitti, mulsaq; potui sumi debet, ab iis abstineri quæ ualde urinam citant, ac multa potio uitanda, nisi acris biliosusq; humor superet, tunc n potui quoq; liberaliori indulgendû est, ac una uice cumulatim, qui ex aliquo citra rofionē, urinā mouente, sumetur. Seminis lini partes duæ, amyli pars una, cochleare ex aqua datur, item cucumeris & peponis semen. Cum ardorem igneū renes sentiūt, linamētā ex uino & oleo rosaceo, uel aqua & oleo rosaceo, uel melino super accōmudantur, aut ceratum ex cera & rosaceo chamæmelinoq; uel melino & luteis ouorū confectum cum aceti paululo, uel polygoni succo imponatur. Postea etiam emplastrum quod à succis diachylon dicitur, cum chamæmelino adhibeatur. calida aut nemiū uitanda, ne puris generationē susciēt, itē quæ impendio refrigerant. quippe ab his renes facile in scirrū indurescūt. Ad hæc balneis. cū inflāmatio instat, abstinendū: uictus qui in febribus dari solet, & ab inflammatione arcenda nomen aphlegmanton sortitur utilis est.

† Hic locus sic descriptus est in ueteribus codicib. *διδῶς κοχλεάριον μετ' οἷνυ κεκραμένυ καάδων.* β, id est, cum uini temperati duobus cyathis.

† Locus hic integrior est in uetustis codicibus *πλήθους δὲ καὶ κακοχυμίας συναισθάνονται διὰ φλεβοτομίας ἢ καάδουσας κενούσας,* id est, si sentiant plethoram & cacochymiam sanguine detracta aut purgatione uacuentur.

*De abscessu & exulceratione partium per quas
urina descendit, græci uocant.*

DOlores circa ilia oborti, horror inæqualis, & febris inordinata, abscessum in renibus fatentur. In uesica autem præter cōmemorata, loci cruciatus testatur. Cæterum affectus renum, hac nota deprehenditur si homo in sanum recumbens latus, in opposito percipiat dolorē ceu ē sublimi rene suspensio. In quibus utendum est incessu ex hydrelæo, item cataplasmatibus ex polline, oleo & resina, uel erui farina, cum melle, uel cardamomo, uel columbæ stercore, cū ficis pinguibus. Pus autem utem per urinas confarctim excretum, abscessum esse ruptū, & ulcus in particula ostendit. Quoniam uerò etiam sine abscessu, instrumenta per quæ urina fertur exulcerationi patent, uasæ, aut rupto, aut exeso ex materia acri uel lapide per radente, distinguenda est renum exulceratio, ab ea quæ uesicam exercet, uel meatus quos ἀπὸ τῆς ὀφθαλμοῦ uocant, hoc pacto, Renibus quidē exulceratis in lumbis dolor exercet cum grauitare & sine impedimento urina redditur, cui pus mixtū reperitur, carnosus particulis innatantibus. Vesica autē exulcerationem experta, totum uehemens in pectine imoq; uentre mouet, urinæ difficultas urget, pus ubi reddita urina est, subsidet, squamulæ foedi odoris, uel laminis similes in sunt furfuracea autem subsidencia uesicam scabie laborare notāt, si uerò meatus urinarij sint exulcerari, etiam puris mixtura medio quodam modo habet, & pilis similia potius in lotio feruntur, dolorque mediam inter renem & uesicam, regionem occupat. Si autem pus aut sanguis excernatur, idq; citra urinā, nullius particulæ ex prædictis, sed pudendorum exulceratio significatur. Itaq; cum uasæ urinæ dicata exulcerationem sentiunt, aqua multa bibitur, aut scœnogræci decoctum cum melle, aut cucumeris semen cum passo. Pus reddentibus per urinam, bolus armenus datur, aut ferularum combustarum cinis, quarum tribus digitis comprehendipotest, ex passo, item lactis potio uehementer his auxiliatur. Composita autem hæc, seminis lini, seminis cucumeris, tragacanthæ, singulorum drachmæ duæ: pastilli finguntur. **ALIVD.** Noces pinæ numero uiginti, cucumeris domestici seminis grana quadraginta, amyli drachma. Excipiuntur heminiis duabus decocti nardi apij seminis. Archigenes in epistola ad Atticum

ticum iubet, cum urinæ difficultas urget, papaueris albi torridi seminis detriti drachmam unam capi, quæ decocto iunci rotundi, aut calami, aut dulcis radicis inspergatur. Dolores autem ex ulceribus contractos hoc lenit: cucumeris domestici purgati seminis grana numero triginta, nuces pineæ duodecim. amygdala amara corticibus exuta triginta quinque, croci quantum ad colorem satis est. Ieiunus quotidie assumet cum lacte, aut passo. Mitius erit si pro nucibus pineis maluæ seminis æqualem modum iniicias. Elidere autem potest (inquit) uesicæ exulcerationes etiam cyphi & antidota inde confecta. Ego uero in uetustioribus hoc usus, nunquam aliud magis uarium desideravi: chamædryos, chamæpyteos singulorum drachmæ uiginti quatuor, asari, piperis albi singulorum drachmæ septem, cinnamomi drachma: optime detriti cochlearia duo ex passo cretico, porrigo, si febris adsit, ex aquæ cyathis tribus, ubi uerò mordax est exulceratio, etiam amyli duobus cochlearijs & cucumeris seminis granis quindecim adiectis, uoti compos euasit. Hæc quidem ex Archigenis scriptis sunt. Item medicamenta, diaphysalidon, id est ex halicacabo, & antidorum ex syluestris maluæ semine, nec non ex tragematis confectum benefacit. Regioni inter scrotum, & anum, nec non inferiori uentri cerata imponuntur ex æsypo lota, butyro adipe anserino, styrace. In uesicam autem infunditur clysterio mulla aquosissima, uel lac cum paululo mellis, uel cum cucumeris semine, uel candidus oui liquor cum pompholyge, uel dictorum medicaminum aliquo. Si ulcus pascendo serpit, pastillus ex carta iniiciendus est, aut Bithinius: & cataplasma ex palmulis & uuis passis cum galla, acacia, hypocistide, & alumine debet imponi.

De sanguinis renum profluuiio.

Renes infirmi lotium subinde retinere nequeunt, sed patentes redditi sanguinis nonnihil ex uena laxant, aliasque crassities remittunt. Sæpe renes etiam iuxta circuitum quem admodum hæmorrhoides, sanguinis profluuiio laborant. Inani uerò subleuantur, in quibus nihil subito tentandum est, si sanguinis cursus sistatur. At si fluxus eius perseveret, uena in cubito aperitur, ac medicamentis quæ ad sanguinis sputum, aliasque sanguinis eruptiones inscribuntur, in renibus ac uesica sanguinem fundenti, utendum est. Maximè uerò dari debet symphyti

radix, & tragacanthum uino maceratum. Ad hæc polygoni & plantaginis succus, cum posca, aut amygdala amara cum passo. Vel hoc, aluminis scissi drachma tragacanthi drachmæ duæ, gummi oboli quinque: ex passo assumetur: item cataplasma ex orde farina cruda cum posca & rosaceo, aut ex palmulis & pane filigineo cum acacia, uel hypocistide, in uino astringenti, uel posca decoctis obducitur. Cum uesica sanguinem fundit, etiam cucurbitulas in illis & coxendicibus defigemus. Cæterum particula quæ sanguinem fundit, hisce notis agnoscitur, loci dolore, & quod sanguis urinæ miscetur, aut è contrario, uel luti in pure comprehensum est. Concretus in uesica sanguinis inde adeo deprehenditur, quod post illum urina subito cohibeatur, & fibræ quædam sanguineæ (ut uerisimile est) aut humiditates cruentæ emanent. Datur autem potui artemisiæ decoctum, heliochrysiq; , uel cunilæ, uel raphani semen, uel liquor laseris, uel cyrenaicus, uel apij succus, singula in aceto temperata: aut leporis coagulum, aut hinnuli, aut hædi in oxy melite, aut lixiuium cum oleo: spongiaq; à foris ex muria, uel lixiuio calido accommodatur. Quod si uitium his non abigitur, secatur locus inter anum & penem, quemadmodum in calculosis: ablatisque grumis commode curantur.

De renum duritia.

QUæ durities in renibus contrahuntur, nullū sane dolorem mouent, sed uidentur renes ipsi tanquā ab alijs suspendi, coxæ stupent crura impotentia uacillant, urina modica egeritur: Totus deniq; habitus duricie renū laborantiū ijs potissimū qui aqua subter cutē laborāt, similis est. Hi ergo emollientur ceratis, malagmatis, frictionibus & fomentis. Ad hæc quæ urinam cient, assumuntur, aluusq; subduci clystere debet.

De diabete.

CVM poculēta, statim qualia assumpta sunt per urinā transmittuntur, diabetes uitium appellatur. Qui igitur eo sunt occupati, immodica siti cōficiuntur, unde quoq; dyspæcon græci affectū nominant: qui ex retentricis sane renū facultatis impotentia contrahitur, attracticis autē maiore robore, ut totū corpus ob immodicum calorem exhauriat exugatq; . Itaque aduersus hunc pugnantes, cibum pleniorē, quique difficulter confici queat, nec liquidus sit, offeremur, ueluti alicam cum rosa

rosato, uel rhodomalo, uel hydromalo, uel uino non uetusto, uel alijs quodam calido. Ex oleribus autem intybum, serim, lactucas. inter pisces erunt saxatiles, suum petunculi, uulue, pira, mala, punica mala, & frigida potio. Item polygoni succus, heleniumq; rectè ipsis propinatur ex uino nigro, palmularumq; & myrti dilutum, præcordiis & renibus obducitur polenta ex aceto & rosaceo, folia uitis cotyledonis, parietariæ, portulacæ. sudores excitandi, uomitusq; à poru frigido, omnibus quæ urinam mouent, abstinentum. At sanguinem per initia mittere non fuerit alienum.

De stillicidio urinæ & eius difficultate.

Cum neq; inflammatio, neq; calculus, neq; aliud quippiam ex prædictis infestat, urina aut acris est, totusq; habitus, uel etiâ reliqua signa, bilem testantur, ex hac uel urinæ difficultas, uel stillicidium contrahitur. Quare ex usu sunt quæ hanc inalterant contemperantq; prisanæ cremor, pisces, balnea, uictusq; idoneus: acris uitanda sunt, uinû, exercitia, ita & tarda comestio. Quod si urinæ tenuitas, alborq; & reliqua signa frigidam fateantur intemperiem, cõueniet uinum calidum, cõdita, tum quæ urinâ cient & medicamina & cibi, adhiæ infessus calidiores. At si præter alborè, etiâ crassities in urina appareat, pituitosus humor cẽsendus est, qui ceruicem uesicæ obstruxerit ubi utendû est oxymelite, tum iis quæ constant ex hyssopo, pulegio, uel thymio, uel silphio, aquæ mulsæ incoctis, item superfusionibus calidioribus. siue aut humor crassus, siue calculus, siue grumus, uel eius generis aliquid obstruēs, urinæ transitum impediat, siphonè rectû catheterè appellauim, indere ex usu est, nisi particulæ inflammati prohibeat. Porro in febribus urinæ difficultati medemus, superfuso rutaceo, uel anethino, uel ueteri oleo. Si aluus stricta est, iniicietur ab inferiori parte decoctum scœnogræci, uel maluæ, uincitq; insidere ægrotâtes supra cõprehensos in hydrelæum, uel aliquod dictarû specierum decoctum cum oleo. Ceratum hoc magnifice proficit, syluestris maluæ radices in sicyonio cum aqua modica decoctæ donec inarescant, ipsæ quidem proiciuntur, succus autem oleo miscetur, rutæ quarta pars, ceræ & castorii quantum sufficit.

De uesica resoluta.

Vesicæ resolutionem nunc urinæ difficultas, nunc spontanea

nea ipsius emissio comitatur, ut in ipso capite de resolutione supra expositum est.

De urinae incontinentia.

M Vesculus, qui ceruicem uesticæ ambit, relaxatus, hoc mali generat. Quare pueris etiam maxima ex parte solet accidere. Communiter itaq; roborantibus potissimum uti conuenit, ut œnelæo calido & similibus: abstinendum iis quæ ualide refrigerant: calidis fouendi potius eggi, quatenus fieri potest. Etenim frigiditas ueluti resolutionem representat, naturaliter autem hæc opitulantur. Galli guttur combustum ieiuno bibendum in aqua tepida præbetur, uel leucanthemi flores similiter, uel leporis testiculus derafus in uinum odoratum, cōtra hæc uitia bibitur. Uel calamintha myrrhæq; ante cœnam propinetur, uel rutæ syluestris semen torrefactum per triduum potui exhibeatur. Cæterum pudenda eius qui hoc detinetur uitio, cimolia cum succo herbæ perdicis perunguntur.

† Huius loci hæc est lectio i ueteri, καλαμίνθην ἢ σμύρναν δὲς πρὶν, i. uel calamintha myrrhæq; in uino ante cœnā detur.

De iecinoris affectibus.

Cap. XLVI.

I Ecur pluribus uitiis oppottunum est. nam imbecillitate, inflammatione, erysipelate, scirro, abscessu, ulceribus, & obstructionibus corripitur. Primum de imbecillitate ipsius dicendum est, à qua propriè iecinorosus nominare ægro tantes consueuerunt. Si ergo alius in succum quidem conuersa uerum liquidiora deiiciat alimento minus probe, aut neutrquam in iecur distributo, sic tamen ut uenter à noxa sit immunis, attractricem uisceris facultatē infirmari suspicio est. Si uerò in eis recens caro lota esse uideatur, alteratricem, tum eam quæ sanguini creando est dicata. At si ex calida intēperie sit, imbecille, recrementum alui tēporis spatio fœculentius apparet, ualdeq; fœtidum, bilis insigniter colorata crassaq; descendit. Iam uerò etiā quando iecoris substantia cū ea colliquatur, & totū corpus cōsumitur & febris urget, cibiq; fastidiū, & biliosus uomitus. Cū aut frigida affligit intēperies, neq; frequens, neq; copiosa alius est: quippe affectus lōgius prorogat, & certis diebus ueter cumulatius deiiciet, sed minus fœtida ceu sanguinis crassi

crassi faciem, ut propè atra bilis uideatur. Item plures & uarii deiectionum colores, frigidam notant intemperiem, in qua febris languida apparet, facies non collabitur, maior ciborum appetentia inest. Harum intemperierum alterutri si accedat siccitas, recrementa erunt sicciora & pauciora, magisq; ægri sistant: si uero humida, liquidiora & copiosiora, tum sitis minus excruciat. At si inflammatio iecur infestat. omnibus quidē ex æquo dextra parte sub præcordiis dolor est: idemq; ad iugulum supra, ad usque costas spurias infra peruenit. Huic dolori accedit febris acuta, tussis sicca, sitis, cibi fastidium, spiritus diffcultas, lingua primo rubra apparet, mox nigra: bilis euomitur, & aluus non respondet. Quum autem similia in pleuritidis signa existant, quo modo hos ab illis discernas, capite de pleuritide comperhensum est. Si uero Erysipelate iecur conflatur, flammeus ardor gliscit, urunturq; ægri, & marcor sequitur, qui *μαρasmus* græcis dicitur. Priuatim uero cum caua quidem iecoris inflammationem experiuntur, nausea adest, uomitus, cibi fastidium, & flammeus ardor intenditur, anima deficit, & sæpè membra perfrigescunt, ut aqua subter cutem transfundi inde incipiat. Rursus si gibbam ipsius regionem inflammatio exerceat, præter alia superius cōmemorata, tumor quoq; manifestius in superficie oculis & tactui conspicuus est. hæc quidē ualidam grandemq; inflammationem testantur. sin obscura quædam fuerit, iubebimus egro, magnam ædat respirationem. Et si dextra parte præcordia dolere dicat, moderata iecoris inflammatio censebitur. Quod si oblongus inflammationis tumor, qua parte muscoli incumbunt, appareat, sed ita ut nulum ex prædictis adsit, illos ipsos eadem inflammatione occupari noscemus. Grauitas autem cū distentione, & doloris, dextra præcordiorū parte sensus, nullo substante tumore, nulla febris urgente, uenarū signatur obstructio, qua uenæ portas & cōcaua iocinoris perreptantes iis quæ per gybba ipsius excurrūt, committuntur. Itaque si in abscessum degenerat: inflammatio, dolor & distentio ipsis increfcit, rigores sine ratione accedunt, dolentesq; iocinore, in sinistram magis latus decumbere nequeunt, rupto autem abscessu, uel per urinas, uel per aluū cumulata puris subluuies prorumpit. At si tumor in scirrhotam affectionem deciderit, dolores quidem remittunt, sed tumor cū duritie est conspicuus, quæ ambiunt partes extenuant

& tempore procedente difficulter poterunt discerni. Quippe aqua inter cutem protinus comitatur, & tota præcordia humiditate conteguntur. Itaq; aduersus calidam iecoris intemperiem, refrigerantibus, tum is quæ uiscus mediocriter confirmet, uti consilium est. id autem præstat seris & cichoriū, interim crudum, interim coctum cum coriandro assumptum, item decoctum ipsius, epotum, & succus non solum, uerum & puluis ipsius mulsæ insparsus & calidis, & frigidis iocinoris utrius opitulatur. Adhæc intybum troximum & sonchus eiusdē sunt generis. Benefacit etiam mali medici succi cyathus in aquā mulsam demissus, similiterq; filicis succus. At si cum obstructione mediocris affligat intemperies, ea ex uino quodam tenui, & quod urinæ mouendæ est, porriguntur. Catapotium uero quod recipiet radices cichorii drachmas quatuor, chamæpyte os radicis drachmas quatuor trita cum melle cocto dantur ad nucis auellanae magnitudinem, quibus aquam calidam superbibere conuenit, iam ex opio & semine alterci confecta propinātur, ipsumq; Philonis antidotum. In quibus calor intenditur, etiā rosaceum primi meriti ipsis, uel melinum potui datur. Esui, ptisanæ cremor, uel chondri cum hydrosfato, similiter panis ex aqua, cum quadam id genus dulci potione. Et summatim cibi erunt, qui mediocriter refrigerant, non obstruunt: uinum omnino circunciditur, nisi alteram ob causam, nempe stomachi imbecillitatem, hoc requirant, tum enim ex tenuibus & ijs quæ græci *ὀλγοφόρον* uocant, aquosum aliquod exhibetur: Ac Erysipelas quoq; in eum modum curabitur. Porro in frigida intemperie contrariis pugnandum est. Panis igitur recte cum uino assumitur, item brassica bis tæue incocta, castaneasq; esse confert & uuas passas tum ex gallinis quod satis est: uinumq; bibant: sed prius ipsis eupatorium, uel asarum, uel medicamentum diapedereon propinari debet. Iam ex iis quæ prius ad celiacos & dysentericos inscripta sunt, idonea deligi debent: cyphoides autem appellatæ compositiones, ad calidas intemperies neutiquam conueniunt. nisi modica quedam caliditas cum humiditate copiosiore oborta fuerit. ad frigidas autem optima sunt remedia, magisq; si cum humiditate, aut iecoris obstructione euenerint. Si uerò obstructio ex crassia & utinosisq; cōtracta humoribus fuerit, corruda & præsertim huius semen datur, item lauri radices cortex. eupato-
riumq;

riumq; ex oxymelite, uel lupinorum amarorum decocto cum rura & pipere. Ad hæc farina lupinorum pota, & capparis radicis partes duæ, costi pars una cum uino: & medicamentum diabacanu ad obstructions quas crassi uiscosiq; humores excitarunt salutariter sumitur: præterea iris & pistaciorum fructus cortexq; marrubium insuper & amygdalæ amaræ, & ex ipsis pastilli, dracunculi, ariq; radix, agaricum, acetum scillites, oxymel, iecur lupi, aridum tritum & cochleario datum, omnibus iccoris affectibus ex uino dulci succurrit, item antidotum Theodoretum efficacissimum est remedium iccori obstructo, scirrho indurato diuq; inflammato. Item colicis & ictericis, similiter etiam picra ex oxymelite. Cibi his dandi sunt calidiores & qui aperiendi facultatem habent, nēpe porra ex oxymelite, syluestris asparagus, & capparis, reliquaq; obsonia ex condimento aliquo calefaciente, quodq; meatus referat, incocta. Vinum tenue ac uetus utile, uitanda sunt alimenta crassi succi, balnea crebra, eaq; potissimum à cibo. Si morbus in uetustatem incidit, etiam uenæ sectio purgatioq; adhibenda, si nihil prohibet. Cum autem iecur inflammationem experitur, sanguis ex cubito dextro intrepidè mittendus est, & copiosus si uires sufficient. Extrinsecus farina hordeacea & sœnugræci, & semine lini cum palmulis, uel malis cotoneis, meliloti flore, absynthio, chamæmelino obducetur. Illud autem in summa præcipiendum est, ut astringentia emollientibus semper admisceantur. Epithemata uero iniici debent, tum quod ad Nileum authorem refertur, tum quod à grato odore euodes dicitur: item Philagrianum & Apollophanis, necnon ex melilotis confectum, deniq; quod coptum appellatur. Porro ad maximas inflammationes hoc ualde experientia comprobatum est, absynthii comæ, nardi gallicæ, asari, croci, singulorum uncia, iridis, myrrhæ, styracis, bdellii, ammoniaci suffiminis quod thymiama appellant, singulorum uncia duæ, medullæ uitulinæ uncia quatuor, cerati lentiscini libræ quatuor. Ad hæc oxymel ipsis dandum est, simpliciaq; auxilia, nempe, asarum, nardus gallica, uel indica, iuncusq; odoratus rotundus, petroselinum. Alius irritanda est, urtica, uel mercurialis, coctorum esu. In declinatione morbi epithimum & polypodium ex malsa porriguntur, aliusq; inaniri postulat per clysterem, initio quidem ex aqua malsa cum sale, uel nigro, facta autem

tem inclinatione, miscetur hyssopum uel origanum, uel cnicum, uel centaureū & cucurbita sylvestris. Summatim uero ex uia iecoris pars per aluū: gibba per urinas expurgatur. Alimentum his dabitur, cremor prisanæ, in quo apiū decoctū sit. At inflammationis quæ Erysipelatis naturā referat, curationem superius sumus executi. Abscessu aut facto, ruptura adiuuanda cataplasmate trispermio, cū resina, manna pice, radicibus altheæ, columbæ fimo, caprillo stercore, præbitorum aut ius decoctorum ad tertias polij & fumarie quæ in ordeo nascitur, item decoctum thlaspis uel cichorij, & chamædryos radicis bibant: uonicaq; abscessus facta, mulla conuenit, & quæ in renibus exulceratis cōmemorata sunt. Extrinsecus imponitur medicamentum Mnasei, reliquaq; emollientia Item Icesion, uel quod salicibus constat. Si uero iecur scirrho induratum fuerit, parum in medicina spei est, affectu in aquam subter cutem transeunte. Attamen emollientibus admiscenda sunt, ammoniacum, bdellium, medullæ, adipēs, & quæ his similē potentiā obtinent. Potiones expediunt, quæ angustias uisceris recludunt absterguntq;: Huiusmodi sunt quæ urinam citant, & calculos cōfringunt. Adhæc quæ nuper ad iecoris obstructionem dicta nobis sunt: alimento nimirum decenter adhibito.

De malo corporis habitu, qui Cachexia dicitur. Cap. XLVII.

Pincipia hydropicorum affectum uocare nostri malum corporis habitum, Græci καχεξία consueverunt. Auxiliū est, nisi aliquid impedit, in sanguinis detractione, quæ particulatim ac per uices adhibita ad tertium quartumue diem producit. Sed uacuandi sunt potissimum, qui hæmorrhoidibus, aut mēstruis nō respōdentibus in morbum inciderunt, quemadmodum iis qui copia uitiosorum humorum laborāt, uacuatio sanguinis per uenā uitāda est: purgandi aut sunt ex hiera, dia colocynthidos uictus erit tenuis, & desiccās. Aquarum naturalium usus adhibetur, primū aluminosarū, nitrosarūq; magis, mox sulfurosarū: pluribus diebus interpositis aliud balneū accommodabit, uarioq; exercitationis generi credetur ægrotantes, maximè aut ei quod per medicos aliptas, i. reunctores administratur. postea ueratrum assumente mirifice quoq; iuuat ipsos & absynthij potio, & cotabismi. & dropaces. Si affectus in hydropē deciderit, aquæ subter cu-

ter cutem curationi subiicietur, quemadmodum exponemus.

De aqua inter cutem.

Cap. XLVIII.

CVM iecur uehementer perfrixerit, interim sanè primario, aut inflammatione, aut scirrho, aut alio implicitu uitio, interim lege consortij quod cum aliis partibus habet sanguinis elaboratio non succedit, ac uitii aquæ intercutis quod hydrops græcè dicitur, inde contrahitur, in quo nonnunquam spiritus copia cū humidi momento intra mēbranā, quæ peritonæos appellatur, & intestina colligitur, ut abdomē percussū tympani modo crepitū elidat: qua ratione ēt tympanias nūcupatur, qui stomachi, alui, & coli inflationibus, febribusq; longis superuenit. nonnunquā uero ex duritie peritonæi, aut uulue in mulieribus, aut ex scirrho generatur. Aliquando contra humorum abundantia cum paucissimo spiritu, in eisdē regionibus collecta tanquam in utre quodā conseruatur, unde malum, ascites nominatur hydrops, & ipse ex causis quas comprehendimus, contractus. Plurima uero ex parte, ex duritia & scirrho lienis, & iocinoris longisq; intestinorum profluuiis, in quibus fit ut uenter quidem intumescat, reliquum autem corpus quod alimentum non sentiat, cōsumatur. Nonnunquam etiam in tota corporis mole frigidior pituitosiorq; sanguis cōtinetur, qualis partim à iecore descendit, partim ex tota carne corporis ueluti in aquam resoluta emanat, adeo ut corpus albedo, & pituitæ colore e mortui instar appareat, uocaturque hydrops leucophlegmatias hypofarcidios, uel anasarca. Quem lentæ febres, malus stomachi habitus, hæmorrhoides diu suppressæ fluxus muliebris, spiritus difficultas, uigiliæ sine ratione oborientes, causæq; his cōsimiles mouerunt. Curatio igitur communis ab euacuatione incipit. Verum ascites & tympanias appellatus medicamenta requirit, quæ aquam educāt. Cui autem anasarca nomen est, sanguinis detractione succurrimus, maximè si affectus origo ex hæmorrhoidibus, aut menstruis suppressis exiit, nisi prius cū malo habitu premebantur sanguinem emiserint. Et hic igitur ut in iis qui malā corporis habitudine sortiti sunt, per uices tentāda est uacuatio. Deinde stercois bouis gregarii aridum exactè tritū, coctumq; in posca, uel oxymelite, sulfurisq; pars quarta superinspersa, toti uētris capacitati iniiciatur, uel stercora caprillā in pueri urina ad for-

dium spissitudinem macerata, applicato, per uentrem summè ipsos purgat. Item cataplasmatibus utendum ex fermento, ficis pinguibus, calce, nitro, iside, cardamomo, sulfure uiuò, ammoniaco, baccis lauri, uua taminia, columbarum ruralium fimo, uel omnibus, uel quibusdam ex his cum oxymelite. Post quæ ephithema spongium appellatum ex caprillo stercore mirificè humiditatem uacuat, tum per latètes meatus, tum per aluū. Insequentibus diebus emplastra persiccantia imponuntur, tum dia iteon, id est, quod ex salicibus est, tum quod icesium dicitur, uel quod Cureo ascribitur, uel diadaphnidon quod ex baccis lauri factum est, uel polyarchium, uel epithema diaspermatoñ ex seminibus præparatum. Atq; hoc indubiè mirificos præstat effectus, quod sequitur. quippe humores ex alto eripit: lapidis pyritis, sulfuris uiui, guttæ ammoniaci, singulorum drachmæ duodecim. cumini drachmæ sedecim, nitri drachmæ duodecim. Excipiuntur cera modica, & terebinthina, pelliq; illita, toti uerò ab imponuntur. Tus radices sambuci decoctæ in uino potui datur, uel cucumer syluestris uino austero maceratus per triduum, cyatho uno propinatur. Accessio autem fit quotidie usq; ad cyathos tres: Hoc quod subiungitur, uaria constat mistura: balsami, nardi, calicæ, cumini, dulcis radiculae, hyperici, iunci rotundi, asari, dauci, amomi, myrtillæ petroselinæ, calami aromatici, piperis, seselis, spondilij pares portiones, faciunt autem bene etiam singula per se, & omnia quæ urinæ ciendæ sunt similem facultatem obtinent. Caterum scilla cocta, cū melle trita & linctus modo exhibita, sine grauitate urinam mouet: coqui autem possit etiam in aqua, iis qui bibere uelint. Iam hoc quod sequitur præcipuè bonum est: interioris scillæ libræ duæ, in uini austeri sextariis tribus adusque tertias incocta porrigito ex uino quotidie, orsus à mystro usq; ad unciam. Istud urinam optimè prouocat, quod recipit aluminis liquidi circa fabæ magnitudinem: ubi aqua dissolueris, linteoq; percolaueris, ad tres dies propinato, uel uno interposito. Conuenit etiam his pitra ex oxymelite Adhæc Theodoretus, & ex amaris amygdalis pastillus. Plura uero aquam educūt, sed hæc usus comprobauit, gnidia grana quadraginta, aut quinquaginta, uel lathyrides uiginti, aut triginta, uel euphorbii siliquæ quinque, aut septem, uel squamæ æris drachmæ duæ, aut uel cū micis panis exceptæ, ac in orbiculos digestæ, uel sambuci

buci radicis corticis succus epotus cum condito, uel chamelezæ foliorum, æris combusti, anisi singulorum par modus datur in aqua, per initia quidem drachma una, diebus aliquot interpositis etiam duæ, & plures. Atque insequentia, mirifica sunt catapotia: aloes, euphorbij, cocci gnidij, singulorum uncia, rhei semuncia, excipiuntur succo braslicæ, fingunturque catapotia, dantur siliquæ septem, aut nouem. Antidotum ex gariophilo, aquam mirabiliter elicit, iam uinum quod aquæ educendæ est, dare tentabimus. Est autem hoc præstantissimum scillæ uncia tres, seminis apii, capparis radicis corticis, piperis, singulorum drachmæ quatuor, cocci gnidij decorticati drachma, phylli drachma, malabathri galbuli duo, uini optimi hemina duodecim, mellis crudi libræ sex. Contusa cibataque uino perfunduntur, scilla simul leuigatur, dantur cyathi tres: post humoris euacuationem, etiam theriaca utendum est, & stercoris bubuli cochlear ex uino porum quotidie strenuè auxiliatur. item clysteres adhibendi acres, nisi uenter sua sponte humescat: tunc enim exiccare ipsum magis conuenit. Porro in mulieribus quas aqua subter cutem male habet, etiam pessus hic utilis est. Anisi, cardamomi, cumini, nitri, aristolochiæ, fœnugræci, pulegii, ficuum interioris pares portiones susino excepta mulieribus subiiciuntur. Secundum hæc aquis naturalibus, uti continenter expedit: ad hæc in arena contexti desudent: aliis autem lauacris abstinebunt. Quod si uero interim lauent etiam, utentur in lauacro nitro, sale, sinapi, calce, & persimilibus inspersis. Hæc sanè uel citra lauationem utilia sunt, aridaque cum oleo uentri adfricata. At si id uitium est, cui ansarca nomen est, reliquas partes exerceri, quatenus licet, oportet & siccas ad solem perfricari. Reliqua uictus ratio siccior assumetur. Cibus itaque erit salsamentum, sinapi, & allia: ex auib. syluestres, & siccæ magis. Inter olera asparagus, bisacutum, porrum, sinapi, caulicis, reliquæque syluestria. Obsoniis miscabitur sal theriacus, uel iamblicus: uinum uetus, tenue, ad urinam mouendam efficax ebibitur. Sin autem facultas datur, ex marina confectum: omnis potio liberalis uitanda est, aquæ in totum. Quod si cum febris aqua subter cutem inuadat, calidioribus, acrioribusque cibis & auxiliis abstinendum, mixtim uero his utendum, ita ut ei quod magis urget, occurramus: si uero id morbi genus est quo uenter sonitum ædit, Tympanias uocatur, purgantia, & quæ

quæ uniuersum corpus emaciant colliquantq; releganda sunt item ex ijs quæ urinam mouent efficaciora. Illis autem quæ extenuare & discutere spiritus possunt, tum intrinsecus, tum à foris utendum est. aut cucurbitulæ leues crebro toti uentri suffiguntur. Sin id uitij male habet, in quo ueluti in utrè aqua contrahitur ascites uocatur, nisi prædictis cesserit remedijs, ad perforationem ueniendum est quæ παρὰ λένθους dicitur, quod nulli alij aquæ subter cutem generi conuenit.

De Liene.

Cap. XLIX.

CUm lien melancholicum humorem, qui ueluti limus sanguinis existat, à iocinore trahere soleat, si quidem facultas attractrix infirma fuerit, meatus uel obstruetus per quem prius trahebatur, niger icterus constituitur, sanguine impuro per totum corpus disperso. At si lienem grauitas, & distentio, uel etiam dolor exerceat, obstructio indicatur: si nihil horum euenerit, attrahendi potentiae imbecillitas. Quinetiam si atræ bilis uomitus sine febre aliâ uel malignitate oboritur, retentricem lienis uim laborare indicium est. Expultricis imbecillitas cibum fastidium efferet, dum non amplius melancholicum excrementum, ab liene ad uentriculi ostium deferretur, appetentiamque excitat sed in ipso liene obstruitur, primum sanè inflammatio huius, cuius notæ sunt, feruor, dolor, & distentio, excitatur. quæ paulopost in schirtum degenerat, sic ut feruor quidem dolorq; finierit, tumor autem & duritia maneat, Hoc pressis uitio, os fœtet, gingiuae exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt, ob quæ simul affecto iocinore, cutem subeuntes aquæ colliguntur, sicut comprehensum est. Itaque intemperies ipsis eandem cum iocinore curationem postulat: si adest inflammatio, sanguis à cubito sinisteriore, uel ab extrema manu dimittendus est, eo quod reuulsio longioribus interuallis fieri debeat, uel etiam propter naturalem quandam cognationem: deinde cataplasma inducendum ex quæ citra euidentem calorem extenuant, admixtis quibusdam etiam nunc astringentibus: uidetur autem hanc facultatem habere suapte natura, qui uocatur flos salis. Porro est & hoc cataplasma mirificum, scœnugræci triens, farinæ hordeaciæ, nasturcij, singulorum uncia, si cum pinguium libra, uerbenacæ herbæ aridæ uncia,

dæ uncia, ficus, aceto quam acerrimo macerantur. Deinde cum
 alijs prius contulsis incoquantur, postea iterum coquantur. Vel
 stercus caprillum cum cruda ordeï farina coctum ex posca in-
 ducitur: adhibeto, si placet, & salis florem, fouendo autem prius
 cyprino cum aceti momento, malagmatis utitor, primum sim-
 plicioribus, quale est hoc. Cerae sesquilibra, centaurij libra, ni-
 tri triens, terebinthinæ, seminis uiticis, capparis radices corti-
 cis, singulorum quincunx. Coctis quæ liquari possunt, arida in-
 sparguntur. iam quod ad Nileum autorem refertur præstan-
 tissimum est. Verum ubi inflammatio in scirrum degenerat, ua-
 lentioribus uti conuenit, ut etiam cutis summa exulceratur,
 quale est quod ex fimo caprillo constat, & citrinum. huc acce-
 dunt Macherionis, Curei, item ex baccis lauri confectum, &
 ex salicibus. Quod subsequetur, etiam ipse expertus sum, auri
 pigmenti uncia duæ, sandarachæ uncia duæ, cerae libra, tere-
 bintinæ libra, picis aridæ tantundem, galbani uncia, opopana-
 cis uncia, capparis radices corticis, glandis unguentariæ, singu-
 lorum uncie quatuor, lachrimæ ammoniaci scrupula sex, nar-
 dini, uel cyprini uncia quinque. Ammoniacum etiam cum
 aceto applicatum, leni sæpe profuit, item potum scrupulis
 tribus quaternisue cum uno castorei, si priusquam in lauacrū
 descendant, sicum siccatum comederint, sputoque eam reddi-
 derint, uel ammoniaci pars una, castorii tantundem: datur
 drachma. hæc etiam ad induratos scirrho, proficiunt, quem-
 admodum capparis quoque cortex ex aceto contritus, appli-
 catusque. Idem bibitus aceto, uel oxymelite, crassos, glutino-
 sosque humores uacuat, interim sanguinem. Iam salicis cor-
 tex, consimiliter inungitur, & cinis ex officia fabrili cum cru-
 da ordeï farina ex oxymelite inductus. Item centaurei succus
 à foris impositis, epotusque, & lupinorum amarorum deco-
 ctum cum ruta & pipere potu assumptum, nec non farina ip-
 sorum obducta, & aqua in qua candens ferrum subinde extin-
 ctum est, febricitantibus per se data cyathis tribus. febris caren-
 tibus autem cum uino & aceti cyatho uno, uel rumicis sylue-
 stris radices cum scilla tres oboli, uel chamædryos, uel serpilli
 acetabulum totum cum oxymelite, uel anagallidis, quæ cœru-
 leum florem obtinet, duo oboli, cum posca bibuntur, uel ace-
 tum scillires, uel oxymel. Cōposita autē hæc, panacis radices,
 guttæ ammoniaci, capparis radices corticis, herbæ lanariæ,
 scillæ

gènere, cui nomen anasarca, in pituitosam humiditatem, est mutatio. Verum talis arquatus dignoscitur hac nota, quòd nò subito, ac una uice, sed paulatim procreetur, sic ut nullum ex commemoratis adsit. Iam uerò noxii medicamenti potus, & uirus extrinsecus à uenenato animali illatum, regium morbum parit. Itaque calide iecoris intemperiei, & inflammationis uiriumque imbecillitatis, curationem supra sumus persecuti, ubi de ipso agebatur, quam etiam integram huc transferre oportet ne eadem mihi sint repetenda. At si meatus conceptaculi fellis utrique sint obstructi, uel alter duntaxat, uenam, in cubito dextro ipsis diuidi consilium est. Nonnulli uero, tum his, tum illis qui ex iecore inflammato, arquatum contraxerunt, uenam propter minimum dextræ manus digitum, incidunt. Cataplasmatibus quæ inflammationem arcent utendum est, & purgatione ex hiera, nec non clysteres idonei sunt, potui rectè datur arquaticis, ius apij, uel adianthi, uel rumicis, uel serpilli decoctorum ad tertias, uel absinthium potioni inspergitur. Præclare faciunt raphani succi cyathi duo, cum uini cyatho uno poti. Et cichorei succi cyathi bini, uel terni per se aut cū uino poti. Sed qui iecoris inflammationi arquatum fuerunt acceptum, mulsum bibent, uel decoctum tenuis aristolochiæ, uel hyperici, uel adianthi, uel herbarum lanariarum, uel erythrodani si militer, uel cornus ceruini scobis drachma, cum uino, uel pastinaci syluestris decoctum in uino, ut tertia pars supersit, uel sulphuris uiui drachma in ouis sorbetur. Hæc etiam propter obstructionem arquato laborantibus ualde auxiliantur, seminis autem attriplicis scrupuli octo, cum chrysattico, aut alio passo in solii ingressu poti, uacuationem magnam præstant. Rectè etiam picra datur, & sicca, & ex oxymelite, & Theodoretus. Iam ex amaris amygdalis pastillus datur, & cinamomi quartum tribus digitis comprehendi potest, in mulsi cyatho uno, uel aqua temperata, uel myrrhæ ad fabæ magnitudinem cum piperis granis quinque, tantundemque cinamomi. Qui uero ex calida solidarum partium intemperie in arquatum inciderunt, molli frictione, exercitiis moderatis, unctione & balneis tractandi sunt, cibo humido & mediocriter, refrigerante, cremore prisanæ, intybo, feri, cichoreo, piscibusque, uino tenui aquoso. Qui ex lethali potione, aut ex uirulentorum animalium moribus in hunc affectum sunt prolapsi, de iis quinto uolumine

tractabitur. Porro si bilis in oculos faciemque se receperit, elaterij instar erui cum lacte muliebri naribus in balneo instillato, & statim in solium descendat, cauentes ne caput immergatur. Post balneum uictu, recreatis, rursus medicamentum errhinon in sole, naribus infundito. Bene facit etiam cyclamini succus, porri, & nigellae. Acetum uero accerrimum naribus attrahat in solio desides, continetque; et pressis naribus paulisper, & mirifice uacuabitur.

De umbilico prominente.

Cap. LI.

Causam umbilici prominentis, & quomodo id uitij manu curetur, in parte chirurgica docebimus. Quoniam uero nonnulli etiam medicamentis in naturale statum redierunt, ipsa hoc loco dicemus. Aluminis scissilis drachmae quinque, flocium uini drachmae octo, rosacei decem, gallae immaturatione drachmae duae. Vino diluta, & in mellis spissitudinem redacta loco affecto inducuntur. Extrinsecus spongia posca madens superiniicitur, & fasciola deligatur. *ALIVD.* Fabae frax, corticum gallae, balauftij pares portiones, coquuntur in aqua: ubi dissoluta fuerint, tritaque diligenter, spongia, ut praedictum est, imponuntur. *ALIVD.* Plumbi scobis drachmae sedecim, cicuta, manna, cerussa, hypocistidis succi, singulorum drachma, uino dissolutis in modum praedictum utitor.

Quomodo impuberes imberbesque diu maneant, & particulae naturales testesque conseruentur, ibidem etiam psilothra numerantur. *Cap. LII.*

Cimolae cretae, & cerussae aequales partes, alterci succo excipiuntur ut sordium spissitudo fiat, deinde oleo lentiscino quantum sufficit adiecto contundito, ac utitor. *ALIVD.* Cicuta succum, solani, alterci, lupini foliorum teneriorum, psillij aequalem modum. ubi contriueris, utitor, sed locum prius abstergito abluitoque. Oportet autem pridie quam usurpare uelis, aquam bibere. Medicamentum pilis abolendis dicarum, psilotrum appellatum. Asellorum domesticorum, qui tacti conduplicant sese in orbem, pilulae rotundissimae similem, graeci κατωιδίης ονίσκως uocant, drachmae duae, sandarachae drachmae quatuor, calcis drachmae octo, aceti ueteris cyathus. Lixiuia est ficu tantundem: coquito in fistili, ac in balneo utitor. *ALIVD.* Calcis uiuae partibus duabus, auripigmenti totidem, terrae

terræ cimoliz parte una, in aqua coctis quemadmodum expli-
citum est utitor. *ALIVD.* Simplex odorisque expers: calcis
uiuz utriusq; sextarium, sandarachæ unciam. Coquito ut di-
ctum est, & utitor. Porro quæ pilus adimant, in ocularijs expo-
sita sunt.

De ramicum generibus.

Cap. LIII.

Cum intestina peritonæo rupto deuoluuntur, operosa
nimium est curatio, cum uerò ob raritatem illius de-
scendunt, faciliior sanandi ratio est: ac huic malo pueri
potius, utpote humidioris naturæ, sunt opportuni, multiq;ue
adeo citra manus operam medicaminibus impositis, & conue-
nienti deligatura perfanati sunt. Utendum uerò est remedijs in
fra comprehensis, ubi hoc solum addiderimus, affectus solo lo-
co disserre. Quando nanque intestinum etiam num supra in
inguinibus iacet, nostri inguinis ramicæ græci, *βυβονικήλη* uo-
cant. Cum in scrotum iam infra delapsum est intestinorū ra-
mex, græce *εἰτερονικήλη* dicitur. Malicorij igitur drachmæ, de-
cē gallæ immaturæ drachmæ quinque, in uini austeri cyathis
tribus incoctæ, & leuigatę imponantur, intestino prius confri-
cato, & aqua frigida superfusa: decimo die soluuntur, sed ita, ut
æger in lecto maneat diebus triginta, bibatq;ue cupressi deco-
ctum cum uino, uel eius globulorum tres obolos, ex diluta ui-
ni portione. hoc medicamentum auxiliatur pueris.

Aliud glutinatorium.

Symphyti radice, marrubii succi, amygdalarum amararum,
gummi, pares portiones. *ALIVD.* Terebinthinæ fescuncia,
ceræ, thuris, myrrhæ, ichthyocollæ, cochlearum cū suis testis,
singulorū uncia, ichthyocolla in aceto diebus tribus antè ma-
ceratur. *ALIVD.* Cupressi, galbulorū uncia, gallæ tantundē,
melicorii semūcia, taurocollæ uncia tres, mānæ thuris, semun-
cia, symphyti tantundem, cochlearum cum testis uncia. Galbu-
li & malicorium uino astringenti diu incoquantur. Et cum re-
liquis leuigatis excepta, in usum accominodato. *ALIVD.*
Aloes, malicorii, thuris, hypocistidis succi, glutini fabrilis, picis,
bituminis, singulorū fescuncia, uini dulcis qđ sufficit. *ALIVD.*
Magis uarium, facit etiā adultis cum morbus uetustatē nondū
senferit: chryfocollæ, taurocollæ, sarcocollę, ichthyocollæ, lapi-
dis Gagatis, lapidis hæmatitis rhus, syriaci, & coriarii, acaciæ

singulorum fescuncia, lapidis pyritis ignem non experti, magnetis cœrulei coloris, aluminis scissi, mannæ thuris, singulorum uncia, picis brutiæ uncia quinque, cochlearum cum testis uncia, argenti recrementi quod helcysina dicitur, uncia quatuor, gallæ, squamæ stomomatis, æris singulorum uncia, bituminis uncia sex, Myrsinati quod satis est. Vino astringente arida excipiuntur, Medicamento tam spisso ut digitos non coinquinet, uritor. Quod si iacere non sustineant, triangula ipsos fascia crassiore, quæque intestina possit constringere, tuto deligabis. A cibis instantibus abstinendū, uino copiosiore, crebris balneis, ualido motu, nempe cursu, saltu, clamore, & id genus aliis.

Ad aquosum ramicem qui hydrocele dicitur, ut humor collectus euacuetur.

Piperis grana centū, lauri baccæ octoginta, nitri drachmæ uiginti, ceræ drachmæ quadraginta, olei heminx dimidio exceptis uritor. **ALIVD.** præstantissimum. Lapidis asii floris drachmæ sex, uuæ passæ acinis uacuæ drachmæ duæ. cumini æthiopici drachmæ octo, nitri rubri tantundem. Trita imponi to, fouens uesperis & mane: quidam uero adiiciunt etiam sulfuris drachmas octo. **ALIUD.** Calcem uiua balnei sordibus exceptam cum cerato impones, & paululum nitri calci miscebis. **ALIVD.** Radicis brassicæ crematæ cinis adipe suillo ueteri liquesfacto exceptus inducitur: per triduum soluitur. † Ne autem humoris magna fiat colluues, hoc utere malagmate, Cerae libris duabus & semisse, picis triente, guttæ ammoniaci triente, aluminis liquidi fescuncia. Proficit etiam medicamentum diægron hoc est ex populo nigra & reliqua extrahentia.

† Antiquus codex, πρὸς δὲ τὸ μὴ πάλιν συλλογὰν εἶναι γυνέ-
σθαι, Ne autem rursus humor colligatur.

De inflammatione testiculi scrotique & alijs ipsorum affectibus. Cap. LIIII.

Scroi inflammatio hisce agnoscetur notis. locus primo contactu indolescit, feruor, duritiesque intensa apparent. Testiculo autem inflammationem sentiente non ex leui tactu dolēt affecti, sed innixis ualidius digitis rubor & durities ipsius per summa minor extare uidetur: impressis autem digitis durities in alto occurrit, & febris nonnunquam oritur. Itaque testiculorum inflammationibus propriè cōuenit sanguis

ex talo dimissus: cōiter aut oībus cataplasmata & cerata. Imponi igit debet ex lomēto diluta uini mixtione cocto cū uuis passis pinguibus acinorū expertibus cumini, uel hastulæ regiæ radix incocta, cōtritaq; misceat tenuissimæ parti polētæ æquali: uice cataplasmatīs adhibeat uel lini semē ex diluto uino, uel fēnugræcū ex mulsā, uel lilij radix ex mulsā, aut recentibus uini flocibus cū polētæ polline. Vel senecion. & coriandrū uiride cū uuis passis quibus acini sunt exēpti. Sin multus infestat ardor, folijs alterci cū triticea farina, aut cicerū obducitur, uel arundinis folijs, uel cucurbita cruda. Si uetustior est morbus cū duricie, cucumeris syluestris radix in mulsā cocta, leuigataq; cum lolij farina admouetur. Itē hoc efficax est auxiliū, uuarū passarum quibus acini sint exēpti, uncia quinque, cicerū subseruefactorū fescūcia, cumini uncia, sulfuris uncia nouē, nitri uncia, resinæ uncia tres & semissis cōtrita oīa cū melle in cataplasmatīs formā digerēs, utitor. cerata aut hæc sunt, olei cyathus, colophonizæ uncia sex plūbaginis, cumini, uuarū passarū, lomentī singulorū triens, ceræ sextans. Plumbago cū olco adusq; alī quantulam spissitudinem incoquitur. deinde cera resināq; inditur. Sublata ab igne semifrigida, uuis passis cōtritis, farinisq; superfundito. **ALIVD.** Olei anechini & rosacei, ceræ, resinæ piceæ, singulorū quincunx, cumini uncia duæ & semissis, stercoris asinini fescūcia cuminū teritur cum stercore asinino, ceratumq; refrigeratū miscetur unaq; leuigatur, deinde in panniculum illitū admouetur, lana superaccomodata. olei omphacini, uel butyri, uel resinæ æquali modo utitor. Quod si à sudoribus ulcerata scroto excitetur, gallā detritam, uel alumen inspargito, pingui aut hircino felli & perungito. Porro ad testes aphræ ulcere pressos terram cimoliam cum aqua prius illitam, finito siccescere, calidāq; aqua abstergito, myrtum siccam, & smyrnij paulum in puluerem redactum applicato. Si caro in testiculis excreuerit, cinis sarmentaceus nitro & aqua maceratus curat inductus. Pruritu scrotum irritante, nitrum, pedicularia, Græci staphidagrām appellant, alumen liquidum, acetum contritum, rosaceoque, illinitur in balneo Vbi laueris, candidus oui liquor cum melle parti inungetur.

De seminis profuuo & ueneris insomnijs. Cap. LV.

Seminis profuuium quod græcè γονόρροια appellatur, est inuita, ac præter uoluntatem excretio, quæ continuè na-

turalibus nō intensis, ex retentricis naturæ facultatis imbecillitate prouenit in qua ex usu est cōquiescere, lumbos pubemque hapsō ex uino & melino uel œnanthino cōtegentes: mox cataplasmatibus obducere ex palmulis, malis cotoneis, œnante, acacia hypocistide, rhu, & similibus. Insidere oportet lentisci, rubi, & id genus aliorū in uino, decoctionibus, uel etiam, aquis cibisq; uti siccatibus: post prima morbi tēpora ad exercitatoriam rationē deducere, qua totū corpus, partesq; affectæ confirmantur. Cæterū quō seminis paretur fecunditas, libro primo, ubi de sanitate tuēda agitur, abundē tractauimus. Vbi etiā illorum qui uenerē exercere nequeunt, scripta est curatio, itē quæ ad ueneris insomnia proficiant. porro iuuabit genituræ profluuiū laborātes, & lectus frigidior, & dextri lateris, uel sinistri incubitus, itē medicamēta frigida lumbis substrata, qualia sunt coriadrū, cicuta, cerussa, portulaca: omnia uero ex aceto.

De satyriasi. Cap. LV I.

Satyriasis est naturalium palpitatio, quæ cuidā seminis uasculorum inflammatoriz affectioni cum intentione superuenit. Hæc palpitatio nisi finiatur, in seminariorū uasorum resolutionē, aut conuulsionē delabi consuevit, ac qui conuulsi fuerint celeriter intereunt. obeuntes autē uentrē inflantur, & frigidū sudorem emittunt, ac mulieribus quoq; , sed raro hoc mali accidit. sanguinē igitur protinus dimittere conuenit, uictu uti tenui, & abstemio, eumq; assumere quotidie, ualenter nunquā, sed paulatim. Laudatissimum igitur est remedium, beta, malua, & mercurialis momentū, & ius esculentum cochlearū: nil mali fuerit etiam ex simplicibus clysterē ab inferiore parte inticere. Quæ uerō urinā mouent, medicinæ cauendæ sunt, lumbis refrigerantia quoq; admouere oportet, ut solani succum, aut portulacæ, aut alterci, aut cicutæ. Necessē uero est, colem, & inter anum, scrotumq; locum refrigerantium, quibus leniendi uis inest, aliquo demulcere, nempe argēti spuma cimolia creta, cerussa, aceto dilutis, aut aqua, aut uino dulci, aut sapa sepino cubitu cōquiescere nocuum est. Rursus confert bibere nimphæ radicē, iridē, & adiantum. Rutæ uero succi potus profuerit, & seminis profluuiū laboranti, & cui naturalia sunt arrecta. Cibus datur frumentaceus modicus, sitis inducitur. At si prorogatur uitium, cucurbitulæ cute ferro incisa defigēdæ sunt. Si plenitudo adsit ēt hirudinibus uacuare,

cuare, & uentrē cruda ordei farina ob linere, alienum non est.

De priapismo. Cap. LVII.

Priapismus est firmū genitalis incrementū, quod in lōgū latumq; intumescit, citra ueneris appetentiā flatulentus nimirū est spiritus qui particulā in tumore attollit, ex humoribus crassis, & uiscosis modici caloris opera procreatus. Notū uero est cuilibet, particulas nō esse calfaciēdas, sed leniter refrigerādas cerato rosaceo, cū aqua cōtuso, itē chamæmelino cerato in genitali & lūbis imposito, uictus & medicamēta exhibentē, quæ extenuare citra manifestū calorē possunt. Appli cabuntur ēc quæ naturali modo operātur, experimētis ac usu probatā. Nymphaea igit potui dabit, uiticis semē rūtæq; uiridis obsonijs mixtū. Sed p initia id nō assumi debet, ut quod uehementer calefaciat, uerū post aliorū extenuatiū usum. Si uacuatione uti libeat p uomitū id facies. Nā per aluū factæ, uicinas particulas sæpe fluxioni oportunas efficiūt. Exercitiū fricatioque flatib. discutiēdis rectē adhibētur. Nulli p̄dictorū uenus pdest, nisi quibus ex huius abstinentia semē abūdare conicimus.

De particulis inefficacibus. Cap. LVIII.

Qui hoc uitio laborant, non ruunt in uenerem eoq; pusillanimes fiunt. Causa horū est, particularū resolutio, uel seminis inopia. Cū igitur ea quæ semini gerando sunt, libro primo inter præcepta salubria exposuerim, tum quæ simplici uirtute ad uenerē incitant, nunc ualentiora adijcere oportet. Cōmuniter igitur medicamētis quæ à lassitudinibus reficiēdis, acopa dicūtur, ad resolutionē inscriptis, hic quoq; utendū est. Priuatim stellio cōcrematus, in pulueremq; redactus cū oleo magno dextri pedis digito, illinitur, & uenus exercetur: ubi cessare uoles, digitus abluatur. Iā medicamentū ex stellionibus uaria constans mistura efficax est. Potui uerò dantur quæ incitant, quale hoc primū est, piperis, baccarum pini, petroselinī, ceruini genitalis ramenti, terebinthinæ pares portiones, melle excipiuntur. ALIUD. Cicerum crudorū, baccarum pini, singulorum uncia duæ, seminis erucæ, piperis, singulorum uncia, mellis datur quod drachmas duas impleat cū uino. Item satyriacē dicta ex multis composita congruet, atq; id genus alia. Inspicere præterea oportet reliquas morbi causas, & conuenientem ipsis correctiōnem accommodare.

Pudendorum & ani remedia. Cap. LIX.

Naturalium aniq; ulcera circa inflammationem oborta, medicamentis indigent, quæ uehementer resiccant: cuiusmodi sunt ex charta cõbusta, anethũ ustum aridum, cucurbita cõcremata. At siccis recẽtib; ulceribus, etiã aloẽ præsens est remedium, si arida in puluerẽ redacta applicetur. Porro omniũ leuissimũ est, & nihilominus efficax põpholyx. At si humidiora euenerint ulcera, piceæ cortex per se lapis hæmatites. an etiã altẽ descenderint, manna prædictis miscbitur. Si pascendo serpant, lenticula cum malicoriis induce tur, utendumq; est Coraco ex phymelite appellato, & birhyno, adhæc, eo quod ex charta usta cõponitur. Rimas autẽ naturalium sedisq; Græci uocant rhagadas, iuuat resina fricta, cum rosaceo cõtrita, ut sordiu fiat spissitudo, adiecto etiã luteo oui, opioq; uel hederæ foliorũ cõbustorũ cinis cũ rosaceo in plumbea pila tritus admouetur. Iã pastillus ex œnelæo, & lapis phrygius admodum probata sunt remedia ad rimas, tũ sordida circa ani orbẽ ulcera, præsertim quæ elidi nequeunt. Aliud simplex quod ẽt acrimoniã obtundit. Cadmiæ combustæ, elotæq; uncia duæ, rosarũ ungue ex foliis defecto, uncia sex. puluis inspergitur parti uino prius aõstusæ. Ad condylomata uerò faciunt chalcitidis, æsypi, medullæ ceruinæ, rubi foliorũ æquales portiones cũ cerato, idẽ præstât pastilli ex œnelæo. Quod si in cole intra genitalis foramẽ ulcus delituerit, pus, uel sanguis citra urinã redditus fatebitur. Curatur primũ aquosa mullâ collyrium, mox lacte, postea collyrio Asteri lacti mixto, aut pastillo Leuco, aut is qui uocatur dialotarion in plumbea pila subactus demittitur, uel etiam penna nicta perlinitur, inde tenue linamentum tortile unctum imponitur. Præstantissimum uero est etiam quod capit gallæ, pompholygis, amyli, & aloes pares modos, rosaceo, & plantaginis succo leuigatos.

Ad naturalium dolores.

BVtyri, resinæ, paribus portionibus pulchrẽ liquatis obducito, uel ex seminis linis succo, æquum myrrhæ & resinæ frictæ pondus leuigatum imposito.

Ad intumescencia pudenda.

Vitis foliorum tenerorum triginta numero, cerussæ drachmæ quatuor trita applicantur. Cæterum sotu ex aqua marina

rina frigida coles utitor & quiete, penemq; deligato. Carnosæ naturalium excreſcentias, quas Græci thymos uocant, compeſcit, nec ſinit rursus augeſcere cinis palmitum cum aceto cataplasmatis modo illitus, item ſalicis corticis combuſti cinis. In uniuerſum & thymus, & myrmecia, & uerruca penſilis quæ dicitur acrochordon per medicamenta ualenter exulcerantia eliduntur: ijs autem quæ exedunt, emoriuntur. Propriè contra hæc uitia proficit, elaterium cum ſale impoſitum, groſſi cū aceto, nitro & farina. Liquor ſici illitus, ſmaridis caput ſaltum crematum in cinerem, ærugo cum ſulfure uino combuſta, thyſmalli liquor illitus, ocymi folia cum atramento ſutorio, uel heliotropii maioris ſemen cum uino cataplasmatis modo applicatum.

Ad ani inflammationem.

Cerux uncia quatuor, pompolygis uncia, uel cadmix tene ræ, thuris, ſingulorum uncia: ſereos ſucci hemina diluuntur, ſuccus autem paulatim affunditur, donec abſumatur. Deinde ceratum ex uncijs duabus ceræ, & roſacei libra conſectū: ubi deaſeris miſcetur, ualideq; emollitur. Demittitur autem inſtrumento quod à pure trahendo πύλκρον Græci nomināt, & ſuperdeligatur, facit autem & ad ani fiſſa cum inflammationem ſentiunt, item aduerſus ſedis exulcerationes, cum ardore, aut roſione inſeſtantes.

Ad ſedis eryſipelata.

Medicamenti, quod ab herbarum ſuccis diachylon appellatur, libra, roſacei quantum ſatis eſt, panis puri libra, croci uncia, opij uncia, crocus & opiū paſſo macerantur, panis aqua. Deinde leuigatis iſtis, medicamen diachylon, & roſaceum admiſcetur, emolliturq;: Vtile eſt etiam ad podagras calidiſſimas ALIYD. Arcet etiam ani inflammationem ceruſſa cum uino roſaceoq; in pila plumbea, & cochleari plumbeo trita inunctaq; uel ceruſſam & oui candidum roſaceumq; in eadem pila leuigata, dum ſordium ſpiſſitudinem habeant, perungito.

Hedricum ad ani dolores.

Alterci folia tenera, portulacæ folia tenera, micas panis in uino tinctas, ouorum tollorum lutea pari pondere, roſacei quod ſatis eſt, ubi locum roſarum & meliloti decocto foueris, cataplasma imposito.

*Hedricum optimum ad ani inflammationes,
eiusdemque excrescentias.*

Cerussæ, spumæ argenti, suffiminis ammoniaci, bdellij, singulorum scrupula sex, terebinthinæ uncia, cetæ semuncia. Arida succo solani, alterci, uel portulacæ conteruntur. Quæ liquatur, ubi illis adiuncta fuerint, excipiro. Et emolitis rosaceo, utitor. Iam medicamē phicotychæ. & dia molibdenes ad hæc dialotarion. Præterea pastillus dia halicabu & dia rodon ad ani inflammationes genitaliumq; laudata sunt remedia.

Ad excrescentias ani.

Excrecentijs si inflammatio adest, ut edum generatim iam commemoratas, & propriè hoc pastillo, cerussæ quadrans, pompholygis uncia, argenti spumæ sextans, mastichæ scrupula sex, alterci succo excipiuntur. Si careant inflammatione, cupressi galbulorum combustorum cinis loco dolenti, uino prius absterfo inspargitur, uel cucurbitæ aridæ corticis combusti, uel palmularum nucleorum cinis similiter, uel testarū ouorum, & sceniculi cinis, uel succi mali punici foliorum, æqualis modus. Vino albo deterfa pars diebus septem eluitur. callosa autem tubercula calce & auripigmento cum aceto acri trito rectè etiam in sole perungis.

De hæmorrhoidibus.

Oris uenarum, quæ quod sanguinem fundere solita sint grecis *αιμορροϊδες* appellant, iustò largius inanitis, habitum in aquam subter cutem resolui contingit, & affectos, infelicitèr contabescere: periculum uero est, etiam ne largum sanguinis profluvium accadat, quemadmodum ne idem in totum supprimatur: unde laboriosa est curatio. Quare cum plures sint hæmorrhoides, unā purgationis gratia relinquere oportet. Quædam uero superius existunt, non apparentes, eoq; difficilem curationem recipiunt. Cæce autem nihil quidem excernunt, sed dolorem mouent acriorem, hæc itaq; succo cyclamini illito aperiantur. Contra eas uero quæ immodicè fundunt sanguinem, spinæ ægyptiæ, foliorum sambuci, artemisæ, singulorum uncia quinque, sileritidis uncia quatuor, coquantur in aqua heminis octo ad dimidias, inde herbæ proiciuntur. aquæ uero miscetur pulvis hic cretæ sutoriæ, aluminis rotundi, singulorum

lorum drachmæ octo, argenti spumæ drachmæ quatuor, gallæ drachmæ tres, misyos drachmæ duæ, sereos tantundem. ubi puluerem decocto solueris, septies quotidie irrorato. in secundo die pari modo aliã confectionem mensura æqualem superfundito: sic tertio. Et si reliquæ aliquæ remaneant, quarto die acu compunges: si sentiat æger, aut cruor emanet, decoctum similiter facit, pulueris uero partem dimidiam miscebis. Cum foueris, puluere attingito, ut exactè adurantur panis ob inflammationem instar cataplasmati inducetur. ALIUD. Panis purus in garum primæ notæ tinctus, uetusq; in nouo fictili, & pertritus applicatur, ano prius uino abluta. Facit etiam ad excrescências. ALIUD. Sereos drachmæ duæ, chalcitidis drachma, misyos tantundem, atramenti futorij quod chalcantum dicitur drachmæ tres, aluminis scissi drachmæ nouem, æris combusti drachma, cretæ futoriæ drachma sicco utitor. Cibi erunt ijs qui supramodum inaniuntur, pauci sanguinis efficaces, & minimè recrementicij, quiq; siccant, & astringunt, cuiusmodi est chondrus ex posca locus: oryza & alica. Ex oleribus conueniunt inrybus, cichoreū, portulaca: inter uina, quæ astringunt. In hæmorrhoidibus autem obcœcatis, his contrarius uictus proderit: potissimum uero loliginum, sepiarum, multipedarum, torpedinis, selachiorumq; esus probè conueniet. hæc enim sanguinem commouent, item quæ mensibus ciendis sunt, hisce congruunt.

Ad procidentem anum.

ERUCÆ fructus, gallarum cerussæ, acaciæ, hypocistidis succi, picæ corticis, thuris, myrrhæ mineæ, paria pondera. Sicca admoueto, ano uino prius austero deterfa. ALIUD. Recrementi plumbi, rhus syriaci, singulorum drachmæ octo, rosarū floris drachmæ quatuor, myrrhæ mineæ drachmæ duæ. Utitor sicut priore. ALIUD. Picæ corticis, mannæ, spumæ argenti, singulorum drachmæ octo, cupressi orbiculorum siccorum, plumbaginis singulorum drachmæ duæ, utitor quemadmodum præceptum est. itè urina ipsius ægri calens adhuc superfusa adiuuat.

De uteri affectibus & primum de mensum purgatione.

Cap. LX:

Mulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis uero ante tertiumdecimū, aut duodecimū,

decimum, plerisq; autem post quartumdecimum erumpunt. Tēpus cuiq; purgationi præfinitum nō est, ordinatumq; , multis ad duos trēsue dies , haud paucis usq; ad quintum profluit, aliis etiam ad usq; septimū : raro ad duodecimū purgatæ sunt. Porro desinunt menstrua aliis anno quinquagesimo, paucis autem usq; ad sexagesimum durant. Nonnullis à triginta quinq; annis, præsertim obesīs, menses cessare incipiunt morata igitur purgatione, lauandum est circa statum menstruale tempus, ac præsumetur potui, aut sesamū, aut capitatum porrum cum pipere, & ruta simul incocta. Potio autem ex passio cretico erit, cuius heminæ mensura pota ambulationibus menstrua dimoueantur, Cibus sit, lolligines, sēpiæ, polypodes, & quæ eiusdem sunt generis: quippe sanguinem propriè commouent,

De mensium suppressione .

SUpprimitur menstrualis purgatio, interim toto corpore male affecto, nonnunquam uero locis peculiari uitio conflantibus ex frigidityte insita, aut ictu, aut intemperie ab origine, seu acquisita malignitate magna uero parte ex abortu: uel principaliore quadam parte primario affecta, nempe iocinore, aut uentriculo, aut thorace, aut id genus aliqua, longo morbo uitata. At suppressio complures affectus, & longos solet procreare. Cum igitur propter aliquod interaneorum affectum primarium purgatio circunciditur, aut moratur, ex usu maximè fuerit, id quod primariò afficitur curare, inde uteri habere rationem. Notæ uero quibus hæc deprehenduntur, in superioribus sunt expositæ. Cum uerò nihil illorum adfuerit, constat palam primario affectu uterum occupari. Itaq; si ætas non prohibet, aut habitus, aut aliud quippiam, uenā oportet incidere, idq; non ante statum mensium tempus: sed ubi iam præterierit, decem dies superadijciantur. Detrahetur autem sanguinis, neque plus duabus libris & dimidia, neq; minus una, si quidem uenam diuiserimus. Sin autem non, hiera diacolocynthidos purgari debent, duarum drachmarum pondere, in sex mulsæ cyathis. Si febris adsit, hiera quidem uti non expedit, uerum sanguinem mittere in primis febriculæ diebus est opportunum. A purgatione reficiendæ sunt mulieres diebus pauculis: in sequentibus autē, ex exercitæ obambulationibus, inferiorum frictionibus, & balneo. Cibi congruunt

distribui

distribui faciles, & liquidi, olera, dulcia omnia, pisces saxatiles, ex auibus teneriores, lactis potio, ex melle confectioes, *μελιν τρώματα* uocant, uinum tenue, album, non adeo uetustum. carnes in idoneæ his sunt, & legumina, præter ptisanam. Vbi statum mensium tempus propinquum est, dantur ex marinis selachia, & malachia, ut dictum est, item ostracoderma, hoc est testaceam cutem sortita, capitata porra, cum ruta & pipere cocta, eorumque ius potui datur: infernæ partes uinculis, tribus quatuorve diebus constringuntur. Cum instat tempus purgationis, tollitur deligatura, myrrhæ obolus bibitur, aut fabæ instat, uel castorium ex passo, aut mulsæ, uel decoctum artemisiz, aut saluiz post balneum ex passo, & absynthii. Absynthites autem uinum per totius curationis decursum potatur. Vbi accesserit iam menstruale tempus, si nihil, aut nulla mentione digitum fuerit excretum, ex talo sanguis detrahendus est. Post septimum, aut octauum diem, purgatione ex hiera utendum est, secundum quartum diem, dropax inferiori uentris regioni lumbis & feminibus applicetur, atque aquæ potu triduum usâ sinapi cum aqua panis macerati portione adusque æquinoctium admoueat, deinde lauet, in secundo mense ficus siccata in uicem panis misceantur decocto fœnugræci, maluz, pulegij, rutæ, & artemisiz. In sinum uero demittetur, susinum, aut amaracinum, pessusque inferatur ennepharmacus, aut libaninus. Est autem pessus lana concerpta, & in rotundam, digiti humani formam redacta qua medicamenta cõtineantur. Hæc igitur curatio plerisque ad purgationem abunde fuit. Sin autem uehementioribus indiguerit medicamentis, hæc sunt, iris illyrica cum uino pota, iunci angulosi, ariq; radix, cassia, iunci rotundi flos, & nardus, helenii radices decoctum, myrrhæ ad fabæ Græce magnitudinem cum passo ex dimidio mulsæ cyathopotatæ, atque dictamni decocti cyathi duo, item ammoniacum, & sagapenum. Quæ minus stomachi uitiis sunt opportuna, etiam opopanax paululum in globulos redactum percocto melli intinctum, assument. Iam uerò consueta nobis semina menses mouere possunt, sed minus: fœniculum, cuminum, apium, daucum creticum, seseli, amifison, cicer, fructus cedri, ac omnia quæ urinam prouocant. Commode etiam sinui muliebrium imponuntur myrrha, absynthii, aut lupinorum decocto trita, aut rutæ succo leuigata, bdelliumque similiter, styracis, syluestris

syluestris oleæ gummi, aut rutæ succi itidem, aut longa aristolochia, in collyrii formam concinnata. Per similitur etiam magni centaurei radix, aut ueratri, aut liquor scammoniae, & cucurbitæ syluestris medulla per se, & artemisia applicata cum ruta, insuper & galbanum suffumigatum. Eadem uero & foetus solent educere.

*De immoderata purgatione uteri & sanguinis
profluio. Cap. LXII.*

Immodice purgationes mulieribus oboriuntur, interim mensibus adactis confarctimque; ac concitatus erumpentibus, interim ob legitimum partum quæ plerumque etiam sponte sua cessant: Crebro autem abortus causa, uehementi laborant profluio, ut subinde periculum accedat. Imprimis igitur extremi artus ab alis & inguinibus, uinculis excipiuntur. Posca non frigida potui datur, muliebria ex eadem fouentur, & iniiciuntur locis multæ lanæ, ex uino, oleo, uel rosaceo, uel melino, uel myrteo expressæ. Cibus dabitur chondrus lotus ex posca: uel oryza, uel alica: uino autem abstinebitur, & hydromalum austerum, aut omphacomeli, aut huiusmodi quippiam ipsis exhiberi debet. Balaustrum in posca propinari, uel hypocistidis, uel acaciæ succus, uel lycium, uel samius asier, uel succus immaturæ uugæ siccus, uel rheon, uel lenticulæ ex Italico fictili combustæ cinis: aut sesamum editur in posca maceratū, quoad molle delicatumque; euaserit: insinuati uero pessii per naturalia, sanguinis fluorem sistunt, hypocistidis succus, aut acaciæ cum manna in aceto contritæ. Mirifice auxiliatur spongia in uino, aut liquida pice demersa, pessarii modo adhibita, uel combustæ ipsius cinis cum aceto, uel posca eodem modo insinuatus. Similiter etiam suberis in Italico fictili concremati cinis. A foris autem imposita iuuant astringentia epithemata, & cataplasmata ex palmulis, & cotoneis: quæ malicoria receperint, aut fageam glandem, aut rubi surculos, aut lentisci folia, balaustrum, acaciam, hypocistidem, gallæ modicum, alumen. Maxime uero hoc, taurocolla madescit posca, quousque soluatur. de inde in linteolum ualidum illinitur, lumbisque agglatiatur. Efficacia ad hoc sunt, & glutinantia emplastra, ueluti Armonia, Icesios, Athene, Meline, Indica, & similia. Pessulis quoque ad sanguinis profluuium uti oportet. Gallæ interius leuigatæ, & thuris

& thuris lachryma aqua diluta naturalibus inferitur, uel cytini, uel mala punica dulcia similiter, uel polygonū tritum. Composito autem, aluminis scissi, gallarum interioris, acaciæ succi, mannæ, singulorum uncia quatuor, ouorum tostorum lutea quatuor: arida leuigantur succo plantaginis, miscenturq;. Cū usus exigit, excipiuntur in pessum ex lana, & in rosaceum intinguntur, insinuantq; naturalibus. Iam cucurbitulæ leues mægnæ frequenter subrer māmillas affixæ abundè retrahunt. Infessus autem profluuiio sanguinis laborantibus cōuenit, ex marino iunco, Græci uocant oxyschœnum, capitibus myrti, rosis, rhamni folijs, rutæ surculis, æquali pondere in aqua coctis insidere iubeto. **ALIVD.** Mali punici dulcis radices corticis, myrti, cupressi corticis singulorū tres partes, gallæ pars una, aquæ quod satis est. Infundito autem per uterinum clysterem succū plantaginis, aut fereos, aut polygoni, aut solani, aut perdicij herbæ, aut psyllij, aut hypocistidis, aut acaciæ, eaq; lana aut digito, aut specillo, aut pinna in longitudinem figurata, adusque orificium imponatur. Insuper pastillus Andronis per uterinū clysterem infusus cum quodam ex succis commemoratis, aut uino astringente efficax est remedium.

De fluore muliebri.

Cap. LXIII.

Vluz fluor, totius corporis quod expurgatur est distillatio: Talē uerò speciem id quod euacuatur, repræsentat, qualem etiam humor in corpore superans obtinet. aliud rubrū, ueluti sanguinis sanies, aliud candidum, puitæ soles est, pallidum aliud, quod bilem testatur, aliud uero aquosum, at si sanguis purus, sicut in uenarum sectione, efferatur, at tendendū est accuratè, ne quædam in uulua erosio sit excitata. his notis fluor deprehenditur, loci continuè madent humoribus, colore uariâtibus, laborans decolor est, cibum non sentit, eumq; falsidit, in obambulatione difficulter, spirat, oculos habet prætumidos, nunc cū dolore, nūc citra illū, aut cū exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Toti igitur corpori auxiliâtur quæ citra manifestū calorē exiccant, cū affectus sit humidus, frictio totius corporis, & unctio ex melle abunde cocto, medicamina dantur urinam cientia, utpote aqua, cui asarum & apium sit incoctum: uacuatur etiâ totum corpus per aluum: præterea portulaca commanducata, succusque

cusque ipsius potus praesidio est. Item balaustium, rubi fructus & flos, quercus liber qui cortici ligni subiaceret, & tunica glandis putamini subiecta. Equisetum maxime sistit rubrum fluorem, potum ex aqua, aut uino. Vel hypocistis, lentisci fructus torrefactus, cum uino sumptus, samius aster, lemnia sphragis, coagulum leporis, aut haedi, aut ovis, aut uituli, aut cerui, uinacea trita, myrti, uua immatura sicca, piceae correx. & quae ad uulsum sanguinis profluuium laborantem dicta sunt, non admodum efficacia. Vbi uero cum labore fertur, per siphonem uterum, clysterem uel alicui succum, aut tragi, aut oryzae demittes cum aliquo medicamentorum quae dolorem sopiunt, αἰόδυνα Graeci uocant: & in accessionibus quidem lenire oportet: cum autem remittit, circuitum enim nonnunquam habet, habitum corporis mutare noxium humorem euocando expedit uariis gestationibus, obambulationibus, uociferatu, inunctionibus, cucurbitulis, dropacibus ad partes superpositas uinculorum iniectionibus, frictionibus, psilothris, smegmatis, sinapismis, uomitibus à radícula uictus ratione uiribus recolligendis dicata, balneis, uino, uario ciborum genere.

De inflammatione uteri, & declinatione. Cap. LXIII.

INflammatiō uuluae, pluribus ex causis oboritur. nempe ex ictu, mensium retentione, frigore, & inflatione: adeoque ex abortu, & ob sinistram partus additionem. Comes inflammationis uuluae est febris acuta, dolor capitis, tēdinis basis oculorum, brachialis, digitorum, & colli deorsum retractio, declinatio ad opposita stomachi ex consortio dolor, oris uuluae conniuentia, pulsus exigui, crebriq; Et si languida fuerit inflammatio, haud ualido ipsius uteri dolore torquentur. Sin uehemens, & ipse totus pulsatilem cruciatum percipit, undiquaque inflammatione obsessus. si pars ipsius illam sentit, in ea magis dolor intenditur. nam si posteriora ipsius solum laborent, inflammatione, dolor lumbos inuadit, stercus longanone compresso, retinetur. si priora, dolor inferiore mē ab umbilico uentris regionem occupat, & stillicidiū, aut urinæ difficultas uesica pressa excitatur, lateribus inflammationem expertis inguina tenduntur. & crura gēturantur. Extrema ad fundum uteri parte inflammata, in umbilico dolor, potissimum cum tumore infestat. Cum uero os uuluae inflammatio affligit, in abdomine dolor est, digitoque

roque immisso os occurrit durum rigidumque. Itaq; in curatio-
 ne primum usui uenit fots ex uino & oleo, uel uino & oleo
 rosaceo super infernam uentris regionem & lumbos per hap-
 sum ex lana puriore eitra deligaturam adhibitus. Cibo astine-
 tur triduum, secundum quod sanguis ex cubito mittendus est,
 si nihil prohibet. alendæ sunt chondro ex aqua, mulsâ, uel pa-
 ne, uel ouo scorbili, uno die interposito. Post quintû, cataplas-
 ma superaccommodatur, polline farinaceo, semine lini, fœnu-
 græco, ex mulsâ, in qua papauerû capita decocta, reiciantur, &
 oleo. at si inflammatio erysipelatis naturâ sortira excandescat,
 meliloto in passo cocto tritoq; ouorum tostorû lutea adscito
 cum rosaceo, uel melino, uel crocino, & cataplasmatibus modis
 adhibeto aut palmulas uino temperato feruefactas, cû polen-
 tarum polline, & quoddâ ex enumeratis unguentis leuigato,
 applicatoq; in morbi declaratione ceratû nardinum, aut cypri-
 num iniiciendû est. Per totum uero morbi decursum, etiam in
 sessus utiles sunt ex decocto fœnugræci uel seminis lini, mal-
 uæ, artemisiæ, & oleo. In iis aut quæ non sustinent calorem, ex
 aqua calida rosaceo super fuso, pessos aut in usionesq; adhibe-
 re cõuenit ex æsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino
 unguento fusino, & cera chyrrenica. in quibus autem calorẽ fe-
 runt, etiâ pessus qui ab aureo colore chrysus nuncupatur, ipsis
 conueniet, itẽ enneapharmacus, rursus in quibus non tolerât,
 ex ouo rosaceo, adipe anserino, uel gallinaceo adaptabit. Por-
 ro ad inflammationes magis furibundas emplastro dia chylon
 quod est ex herbarû succis in uase fictili cû rosaceo liquefacto.
 miscetur succus plantaginis, uel fereos. uel cichorii, uel intybi
 Aut hoc utere, adipis anserini, uel suilli recentis drac. quatuor
 cerati rosacei, uel fusini sextantes, ouorû tostorû luteorû unc.
 croci drach. myrrhæ tribus obolis, opii obolis duobus, uel lo-
 co opii, papauerum capitû decocto, si dolor multus ex cruciat,
 lachrymæ papaueris instar lenticulæ cû lacte muliebri, & suc-
 co fœnugræci in pello subiciendû exhibeto. At si inflâmatio
 cû duritiâ infestat, tetrapharmacû rosaceo solutû, applicatur,
 uel iufunditur. Si a naturali sede uulua declinauerit, p accessio-
 nes similẽ inflâmationibus curationẽ recipiet. ubi uero remit-
 titur dolor, & declinat, leuioribus utẽdû. Quod si malû inuera-
 teuerit, noxia ex alto euocâtibz utendû, quæ metascritica di-
 cunt. Extrinsecus autẽ duritiæ oborta, malagmatis pugnandû,

nempe dia melilotu, hoc est ex fertula campana confecto, item Mnafæi, cefi, melinæ Serapionis, aut pyrinæ, uictus aut per initia tenuis adhibetur. Vbi paulū declinauerit malū, ægrotantes ad balneū ducentur, uarioq; magis cibo & pleniore nutriendi.

De uulue abscessu.

Cap. LXV.

INflammatiōe in abscessū transeunte, dictæ quidem notæ intēsiōres erunt. Præterea uero inordinatæ febriū cum horrore accessiones obueniunt primis quidem temporibus intensæ, cum doloribus ad ultimum, ubi suppurauerit, aliquantulum remittūt. Postquā uero erumpit uomica, dolores aciores subinde uisi sunt ceu lancinantes & punctus modo incidere, febriculæ uehementius infestant. Atq; urina nonnunquā retinetur, nonnunquā stercus, impedimento ab affecta uteri parte facto. Alias tumor in pube eminet, & ueluti exundationis sensus cum abscessus maior fuerit. At quod in expositis locis est, etiam instrumēto ad perspicendum iniecto, aut digitorū tactu deprehenditur præterquā quod dolores ob neruosā oris uulue membranā aciores urgeant, sicut infundo sinuq; minus doloris percipitur, & digitis quidem tumor non occurrit, os autem gracilius ostenditur. Suppuratio itaq; celerius ad iuuāda est cataplasmatīs ex fœnugræco, semine lini farina hiordeacea, ut frumentacea, cui ficus coctæ adiciantur interim & stercus columbinum. In fessibus etiam ad inflāmationem aptis frequentius utendum. Item pessulis ex terebinthina, myrrha, æsype, butyro conuenit. Abscessus autē rupto, si ad uesicam pus eualerit, lactis & cucumeris seminis potu utendum est, sin ad longanōnem ruptus sit, lenticulæ & malicorī decoctum in detur aluo. At si in sinum pudēdi eruperit, mundum quidē a pure, rosaceum infundetur, aut cādidum oleum, aut tetrapharmacum regale, aut butyrum recens. sin autem offeratur sanies tenuis, fœtida, ceu ab ulceribus depascētibz, magis astringēs erit enema ex myrto, palmulis, & lenticula. Si uero humoribus etiam ex cretis, inflāmatio diuexet, persistere iu cataplasmatīs, & in fessibus, ratio est. Cœterum si in uulue ostiolo abscessus sit obortus, neque rumpatur, partibus, quæ puri incumbunt, extenuatis, ad puris excretionem, quæ manu administra-

tur, diuertere consiliū est, ut in chirurgica pertractabimus.

De uteri exulceratione.

Cap. LXVI.

EXulceratur subinde unlua ex infelici partu, aut fœtus extractione, aut eius corruptela, uel ex medicamentis acribus uel fluore, uel abscessibus diruptis, si igiŕ prompta in conspectum uenerit exulceratio, instrumento locis inspicendis idoneo deprehenditur. Sin alte defecerit, ex iis quæ excernuntur. Humor enim diuersus excernitur, ex inflammato quidem ulcere, paucus, cruentus, aut fœculentus cū magno dolore, ex sordido autem copiosior, & sanes cum minore cruciatu, depascente, fœtidus niger cum doloribus uehementioribus, aliisq; inflammationis signis, iam quæ laxant medicamina irritant, contraria leuant. Cum purum ulcus est, humor paucus, æqualis, odoris expers, crassus candidus, cum sentiendi facilitate habetur. Si inflammationem experitur ulcus, iis quæ ad illam scripta sunt, utendum est. Sordidum, pitisanæ cremore cum melle illuendum est, aut terra pharmacum iniiciendum cum sulino, uel mulsā, in qua fœnugræcum sit decoctum, aut malua, aut surfures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro quo magis expurgetur, etiam marrubium, aut eruum, uel melli adiuncta erui farina uel iris, uel alumen rotundum, uel aliquid simile inspergatur. Hæc ipsa etiam extrinsecus, ex mulsā macerata, instar cataplasmatismis illinuntur. Peculiaris prodest hoc medicamentum. Crocus primæ notæ leuigatur cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino inungitur linteolo, uerum quod infra ponitur, isto quoque efficacius dolores discutit. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde incoquatur, donec intabescant, postea feruntur una cum rosæ foliorum drachmis quinque, croci drachmis tribus, iure capitū papaueris aduulso, inde ceræ cum rosaceo liquatæ drachmæ duæ ipsis superfunduntur, ac in pessulo subiiciuntur rosaceo perunctis. Salutare est etiam medicamen ex ouis, croco, rosaceo, apipe anserino, cerui medulla præparatum. Item Aegyptia citra æruginem mirifice ad exulcerationes conducit † ubi autem pascendo serpunt ulcera cum inflammatione quidem obducitur panis tepida maceratus, ex hydromelite, oleo, althæa fœ-

nugræco, palmulis pinguibus. Iniicitur autem plantaginis succus, solani, polygoni, & sereos primum per se, mox cum uino austero aut aceto. At citra inflammationem, si urgeat depassio ualentiora iniicientur, ueluti decoctum malicorii, rosatum, summitatis oleæ, cupressi, malorum cotoneorum, rubi, myrti, lentisici, rhammi, rhus, coriarii ex uino astringente, postea uero aluminis, acaciæ, lycii, hypocistidis, ex eisdem uero decoctis parabitur etiam infusus. Si nihil proficitur non alienum fuerit medicamen ex charta cum posca primum demittere, deinde cum aceto, aut Antheram, aut chalcitidem, aut attramentum sutorium, ex eisdem liquoribus, & quæ dysentericis congruunt, cibis dandus boni succi, modicus Purgato ulcere, ægrotans balneorum ciborumque uarietate sollicitari, uinoque refici debet, quo caro statim procreetur. Pessili loco subiicitur medicamentum diamoron, hoc est ex moris, remissum cadmia, uel ladano uel plumbagine. A foris autem emplastrum, quod cicatrici ducendæ est, abdomini coxisque imponitur. Quæ admodum enim cataplasmatum, ita etiam emplastrorum facultas per latentes meatus traducetur.

† Hic locus sic legitur in antiquis codicibus. *νεμῆς δὲ οὐκ ἔστιν φλεμονὴ μὲν καταπλαττέον ἄρτω καθαρῷ πεφυραμένῳ δὲ ὑδρομέγιστος*, ubi autem est nomē cum inflammatione induce re cataplasma opoietē ex pane puro subacto ex hydromelite.

De cancro

Cap. LXVII.

Cancrorum uuluz alii cum exulceratione, alii citra ulcus inuadunt ubi igitur exulceratio non est, tumor in uuluz ostiolo reperitur durus, inæqualis, prætumidus, colore sæculentus, subrubet, interim subliuidus, ac uehemens dolor exercet inguina, abdomen, imum uentrem, & lumbos ad manus contactum. uariamque medicinam excandescunt. Eryulcerato autem cancro, præter dolores, durities, tumoremque, ulcera erosa ac inæqualia conspiciuntur, plurima ex parte, fordidā, labris prætumidis, albicantia, tursam humorum colluuiem concretam habentia. Quæ uero puta dicuntur, sæculenta, liuida, subrubra, & cruenta appatent, sanies inde manat continuo tenuis, aquosa, nigra, aut ruffa, grauiter olens. Interdum uero sanguis defertur, alixque notæ in uulua inflammata expositæ. Itaque affectus nulla medicina sanatur. Quemadmodum

modum etiam Hippocrates pronuntiauit, lenire tamen est in fessibus ex scœnugræco, malua, ac cataplasmatibus similibus. Insigniter autem leniunt, solanturque in accessionibus malua, aut althæa in mulsâ intabescens, & rosacei paululo leuigata, & applicata. Ad hæc cataplasma ex ficis siccatis melilotis, ruta, thure, buniade herba diligenter cum oleo confusa. Item quod constat palmulis in passo coctis, cui adiecta sint ouorum lutea, polentaque, uel ex papauere cum coriandro, aut polygonio, aut seri. Hæc in doloribus usui sunt, Pollea ceratum iniiciatur ex rosaceo, aut mirteo, aut œnanthino, aut melino, cum palmulis in passo coctis, proprie uero conuenit præparatum ex amurca in uase æneo collecta, quæ torrefacta leuigatur, & rosaceo, cerato, adusque emplastri spissitudinem excipitur, hæc quidem extrinsecus conferunt, intus autem oleum quoque lenit, ubi fuerint exulcerati, item lac muliebri infusum. Pars modo succus plantaginis tepidus. Sin cruentum sit, succus polygoni cum thuris modico dolorem sopit. Ad hæc pessuli ex croco, muliebri lacte, lachryma papaueris, & œsypo. Omnibus autem efficacius est etiam ad sedis affectus medicamentum quod recipit, Argenti spumæ Italicæ lotæ selibram, thuris malculi, œsypi, adipis suilli recentis, butyri recentis, ceræ thyrrenicæ, singulorum sextantem, rosacei trientem. Argenti spuma ex sereos succo trita, liquatis iniicitur. Cibus dabitur qui faciliè in corporis membra queat distribui, bonique succi, pinum paucissimum, aquosum, acrium esus, & alimenti copia uitanda est, ut quibus cibi prompte corrumpantur.

De scirrho & duritie.

Cap. LXVIII.

Scirrhum contrahit uulua, alias repente, ut nulla causa euidens præcesserit plerumque uero eundem inflammatio mouet, quæ nec soluta nec in abscessum mutata fuerit. At scirrhorum, genere comprehenditur etiam durities, quam

Græci uocant, circa uulvæ ceruicem potissimum obueniens, tumorem quidem pari modo representans, sed minus actui renitentem & cum mediocri dolore. Comitatur autem hos quoque uteri in opposita declinatio & tumor qui ratione deprellionis ut uehementer remittitur, cum grauitate, motuque difficili, non crurum modo, sed totius etiam corporis, atque obundis actionibus pigritia. sequitur non probe curatas,

malus corporis habitus, aquam inter cutem representans. Per initia igitur sanguis educi, aut purgatio ex hiera Archigenis, assumi debet. Deinde cataplasmata ex caricis, œsypo, nitro, absinthio, & cucurbitulas cute ferramento incisa adiuuere consilium est. Malagmata uero hæc, Polyarchion, & diaspermaton hoc est ex seminibus confectum, & quod baccis lauri constat. Infessus ex caricarum decocto, artemisiæ, pulegij, althææ, pessulos ex terebinthina, galbano, myrrha, iride, œsypo, dropace, aquas naturales sulfurosas, bituminosasq; usurpare commo- dum fuerit, si uires constant, etiam helleborismus conuenit.

¶ Vetus liber. ὁ γκος πρὸς ἄλγον τοῦ πλῆσους ἰσχυρῶς ἀντί-
τος, idest, tumor ratione plenitudinis uehementer resistens.

Pessulus emolliens.

CEræ ponticæ nardini unguenti, singulorum quadrans, iri-
ni, gleucini, cyprini singulorū uncia duæ, adipis ursini an-
seriniq;e, botyri, œsypi, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singu-
lorum uncia. **A L I V D.** Polii drachmæ duæ, myrrhæ drachmæ
quatuor cum uino Mendefio tritum irinoq;e imbutum subiici-
tur. **A L I V D.** Ceræ thyrrenicæ, adipis uitulini, terebinthinæ,
medullæ ceruinæ, mellis attici, olei ueteris pares modos. Me-
dicamentū noxia euocans quod Græci dicunt meta syncreti-
con, & ad inflationes, uuæ passæ candidæ sine asinis, uncia tres,
rutæ uiridis foliorum uncia duæ, aquæ marinæ fescuncia, cy-
mini drachmæ quatuor, mellis quod sufficit. Inunctum uero
pessulū cyprino oleo immergito, & subiucito. Præterea Chry-
sis ab auro sic dictus pessulus Libaniusq;e, & Enneapharmacus
affectui sunt utiles uerum Titianus his magis accommodatur.

De mola.

Cap. LXIX.

MOla quoque induratus est tumor, interim in uulua
ostio, interim etiam per totam ipsam prominet, ta-
ctu lapidis duriciem refert, ita ut ea & quæ superiacēt
deorsum trahantur, corpus emacietur, color prauus appareat
cibi fastidium urgeat, menses supprimantur Mamillæ inturge-
scant, ut in quibusdam per initia, de sætu concepto sit suspi-
cio. Insecuto autem tempore discernuntur, nonnullæ uero
aquæ inter cutem præbent opinionē, sed hoc intercedit discer-
minis

minis, quod tumor durus sit, nec sonus fiat cum digiti iniiciuntur, quemadmodum in morbo hydropico. Cum autem intenditur, in aquam subter cutem reuerta degenerat. Nonnunquam etiam insanabilis magna ex parte affectus redditur, quibusdam & sanguis erumpit. Itaque decumbere in domuncula angustiore minus luci exposita, modice frigida cubili immobili, omnibus ex æquo confert, sed ita ut pedes habeant clariores quietosque. Nam motum quamlibet fluxionem concitat. Ac tumores duritiasque iis remediis quæ in scirrhis & duritiis, uulvæ dicta sunt, persanabimus. Porro hydropicas suffusiones, illis quæ in capite de aqua intercute comprehensa nobis sunt sanguinisque eruptionem, ut etiam fluorem muliebrem curabimus. Ceterum sunt qui molam carnem asserant informem, ipsis uulvæ tunicis adhærescentem, fœtus modo in lucem edidi. Atque hæc morbi species uictus ratione laxante tractabitur, quo citius excutiat.

De inflatione uulvæ.

Cap. LXX.

INflatur uulva ex frigore, uel corruptione fœtus, uel ex ægro partu ostiolo conuiiente, uel sanguine in grumum intus coacto. Alias spiritibus in concauo ipsius spatio conceptis, alias in raritatibus uulvæ corporis, quas tumor pubis & imi uentris comitatur cum duricie & dolore punctorio, qui ad septum transversum usque & stomachum inguinaque pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Auxiliatur ergo primum sanguis demissus, si nihil obstat, mox in accessionibus inedia, fomentaque ex oleo rutaceo adhibentur, in seculis ex rutæ pulegii, artemisii, cassiæ decocto, similibusque, cataplasmata ex semine apii, cumini, anisi, ameos, farina lolii. Ad hæc cucurbitulæ, tum leues, tum cute incisa affixæ. At si diutius uitium se prorogauerit, purgatio ex hiera picra utilis est, drôpæces sinapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem si contingat, auferet, leniter ipsum dissipans, rursusque admouebit cataplasma, ex ficu, nitro, & absynthio. At epichemata molentia erunt, Polyarchion, dia spermaton quod est ex seminibus, & diadaphnidon, ex baccis lauri præparatum. Præterea pelli ex ruta, melle, & nitro. Maxime uero hic conducet,

ficuum pinguium contusarū drachma, cumini drachmæ duæ aphronitri drachma at acrimoniæ causa, in lac prius immergatur. Iam emollientes pessuli sunt huic uitio accommodati.

De uulvæ strangulatu

Cap. LXXI.

STrangulatus uulvæ ad superiora recursus est, quæ principalissimas partes in doloris consortium perducit, utpote arterias quas uocant carotidas, cor, cerebrique membranas. Comitatur affectus, cum accessio propinqua est, torpor mentis, pigritia, crutum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Cum iam instat strangulatus, grauis sopos premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprehenduntur, impediunturque, uox obmutescit, crura contrahuntur. deinde maxilla rubere incipiunt, faciesque repletur. Cum remittet, humiditas quædam ad tactum ex locis mulieribus præcedit, uentrisque strepitus, ac aliquod ex interaneis progreditur, ipsaque uulua paulatim laxatur, atque sic mens ipsa, & sensus redit. Cæterum morbus iuxta circuitum mouetur, sicuti comitalis, idque nimirum uulua repleta, aut seminali, aut alia materia, qua intus cõputruerit, ac multæ rursus a morbo sese recolligunt, nonnullæ uero in ipsis accessionibus perierunt subito, quibus pulsus quidem crebriores, & inordinate intercidunt, deinde etiam in totum abolentur. Modicus uero humor superficiem irrorat, respiratio primum languida est, mox in totum abscinditur. Porro uitium hoc hyeme & per autumnum magis infestat iuuenulas ad uenerem procliues, steriles & potissimum si ex medicina sumpta fuerint infœcundæ, item alias perfrictiones expertas. In accessionibus igitur summa de ligare, conuenit, crura tota, corpusque totum perfricare, ut animo destitutæ sese recipiant, item quæ scædioris sunt odoris, naribus oportet admouere. Exempli gratia linamentum ex lucerna extinctam, castorium, picem liquidam, cedriam, lanas & lacinia combustas. Quidam uero & matulam naribus admouerunt cum urina ueteri, uel deiectione cucurbitulas adglutinare uincit inguinibus & imo uentri cum multa flamma, & leues & cute incisa. Quod si longius accessio se produxerit, etiâ quæ flatibus educendis sunt, proficiunt, ut quæ colica dicuntur, ano subiecta nempe cuminum, nitrum tum melle. Item sterus

stercus clystere subducere profuerit, ne illorum appositu sedes prematur. In uulua uero unguenta odoratissima infusa, ipsam solent detrahere, sicut amaracinum, malabathrinum, ac si napi, partim naribus offeratur, partim applicetur pedibus. De inde inclamabit aliquis ipsas uoce asperiuscula, excitabitque, & ea admouebit, quæ per sternutamenta euocant, ex castorio, stuthio, & pipere. ubi accessio conquierit, uomitum cogere, cibum nullum aut paucum præbere oportet. A septimo die, purgatio ex hiera diacolocynthidos dabitur, post triduum cucurbitulæ defigentur lumbis & illis. Mox castorei potione utemur, nunc artemisiam decocto, nunc ex mulsâ, in quibusdam enim hoc uel solum ad integram morbi curationem abunde fuit. In sessus porro & pessus molientes his adiungentur. Atque hæc ad accessiones prochiunt, uerum ut totum corpus rehas, a sanguinis dimissione auspicatus, ad purgationem ex hiera transgrederis. Inde picran ex aloe factam exhibes drachmæ pondere cum tribus aquæ mulsæ cyathis, diebus continuatis, uel interpositis mensurâ duarum drachmarum, cum senis aquæ mulsæ cyathis. Iam dropacismos, cucurbitulas, & sinapismos utiliter applicas, nec non acopa ex euphorbio. Postea exercitiis uti, frictione & uocis exercitio prodest, denique & aquis naturalibus.

De uulue procidentia.

Cap. LXXII.

Vulua procidit raro quidem, sed multis occasionibus, uel enim ab alto delapsa, & in coxas firmata, membranis, quæ interaneum id continent, ruptis, aut extractio ne secundarum simul ipsam extrahentium, ut quæ eidem adhærescant quemadmodum in partu difficili, uel indiligentius imperitijsque extracto foetu, uel ex uulnere, uel aliqua animi perturbatione, scilicet nunciato filiorum interitu, aut hostium insultu, aut periculosa nauigatione, aut eiusmodi quædam causa. Ut cum tota corporis mole soluta, uulua simul sit deuoluta uel ob resolutionem, imbecillitatemque particularum, ut in declinantibus ætate potissimum accidit. Procidit autem iuxta os ipsius. Quidam uero & totam uulua prolabi memoriæ produnt, quod a uero longe abest. Qua enim ratione sursum redacta queat affirmari? Conuenit igitur foecibus clystere prius euacuatis, urinæque excreta, quo uulua uedi-

quaque

quaque sit libera, laborantem figurare supinam, ut coxas habeat sublimiores, poplitesque flexos cruribus diuaticatis. Deinde hapsum capere ex lana, figura & crassitudine sinu muliebri proportionem, tenuique linteo circū dare, & in succum acaciae, uel hypocistidis uino dilutum demergere, tum uuluae inferere, & citra uiolentiam totum quod procidit sursum agere, quoad tota moles in sinu factus subsederit. inferna ab umbilico regio spongia in posca expressa extrinsecus contegenda est. Mulier iacebit extensis adaptatisque inuicem cruribus, ut alterum alteri incumbat. Inde cucurbitulae agglutinabuntur cum flamma copiosiore umbilico & utrisque aliis, naribus odorata admouebuntur olfactanda. Tertio die lana sinui iniecta, mulier infideat in uino nigro austero modice tepido, uel in decocto myrti lentisci & malicorii. His probe peractis, lana ingesta tollitur. Altera inuicem prioris eodem humecta medicamento inferitur. Cataplasmata a foris imo uentri superiniiciuntur ex palmulis, polenta, uel lenticula & maliconio cum oxymelite, ac tribus diebus interpolitis rursus haec fient, quoad perfecte curationem absolueris. At si processu temporis id quod prolapsum est, putredinem fuerit expertum, id ipsum auferetur, nullius metu pericula. Etenim uulua uniuersim ablata ubi computruerit, mulierem superuixisse commemorant.

De muliebrum locorum clausura, quam phimon

appellant. Cap. LXXIII.

LOci muliebres circa ipsorum os clauduntur, uel ex praecedente exulceratione, uel in schirrum durata inflammatione. Curabuntur in fessibus qui emolliant, ex hydreleo & fenugraeci decocto, consimilibusque cataplasmatibus & pessulis. Porro si malum inueterauerit, suffimentis uaporibusque iis qui ex aromatibus consunt utendum erit. Iam uero soluit etiam hoc uitium cum nihil aliud sit quam uuluae ostioli strictio, pessulus ex aësyro, nitro, resina, & terebinthina.

Vt sterilis mulier concipiat. Cap. LXXIIII.

Communiter itaque ambobus congruit, & uiro & mulieri uniuersum corpus conseruare probe temperatum laboris, cibi, balnei & reliquorum omnium mediocritate,

tate, & quod inter ea maximum est, curare ne habitu sint obesciore. Neque enim pingues liberis procreandis sunt idonei, eo quod genitalibus mutuose contingere haud possint commode, tum quod momentū seminis emittant. Neq; tamen nimis extenuati, liberis operā dare feliciter queunt, lauabunt autem ipsos omnia calefacientia & leniter infantia, uinum itaque calidum modice sumptū. Et ex oleribus, eruca, hominū, erysimum & cōsimilia, ruta uero & calamintha omnino uitanda sunt. At si humorum quodam uitio scēmina non concipiat, hos expurgare, aut proba uictus ratione emēdare expedit. Proprie uero mulieribus conueniet, curam locorū genitaliū quā fieri potest maximam habere, & menses sine ullo impedimento emanare. Cum igitur propinqua est purgatio, cibi potusq; quam maxime licet, mediocritatem, curā habebunt, & ex iis quæ purgationi irritandæ sunt, aliquid assument, cuiusmodi sunt odorata olera & acria, utpote scandix, erithmon, scēniculum, apiū, smyrniū. Porro uulūq; intemperiem corrigere oportet, frigidiores itaq; notat menstruum retentio, uictus frigidior, & crassi succi, stupidum quid in uentris parte infera lumbris, & cruribus oboriens. Quæ uero penitus refrixerunt, ne uenerem quidē appetunt. Quare conuenit cū aliis remediis, tum fomentis omnibus & iis quæ constat sufficere, calori reuocare. Nec abs re fuerit, castoreum bibere, & ex seminibus odoratis, cuminum, anisum pulegij comam iuniperi fructum, pipere singulis adiectio, at fomenta ipsarum uuluarū, partim uapores erunt qui inferius per sellam assumentur, partim a qua calida ad collutionē injecta, in qua decocta sit saluia, artemisia, ruta, iuncus odoratus angulosus, pulegiū, accorum, seminaq; odorifera, hæc singulatim etiā inferiori uentris regioni ab umbilico applicantur. Præsidio est, & polyarchi epithema. Item inferioris uentris coxarumq; fricationes nihilominus condicunt. In super in pestis subiiciuntur ex myrrha, ruta, galbano & castoreo, ubi prius aqua mulsā, aut marina uulū foueris, proficit et adhæc pestilulus gone appellatus. Calidiores locos fatē corpus totū calidius, menses pauci & laboriosi, genitaliaq; mulieris exulcerantes, corrigunt modice humectis & frigidis, cuiusmodi sūt olera quodē lactuca, malū, blitū, cucurbita, cucumis, pepō, triplex, portulaca, aliiq; cibi cōsimiles, uesicæ abdomini & lūbis frigida applicant cataplasmata, succiq; illinuntur. At humiditatis uitio

fecunditatem

fœcunditatē frustari indicat in coitu, uulua humescēs, tenuius & copiosum menstruum. His uictus utilis est siccior, labores, superiorū perfiricationes, uomitus, cibi sicci & mediocres. Pro fuerit & uulua acerbis medicaminibus cōtinere, quale est lenitisci decoctū, myrtorū rosarū, rhus, item mali granati floris, rubi ramusculorū teneriorū, & gallæ. Sicciorē uero uterū contrariis curare oportet, balineis dico, inunctione, & alimēto humido, olerosoq; mediocri uino & nō nimis ueteri. Quod si a crassioribus succi cōcipere impediātur, siquidē rodens aliqui fuerit mulierē probe purgare cōuenit medicamēto quod cuilibet humori propriū est, maxime autem picra ex aloe, mox sero lactis aluum ducere, & uictū probiorē deligere. Pituitosus autem humores laboribus uacuare, sudoribus, & uomitu, uel per inferiora. Cæterū ex medicamētis epithymū quoq; euphorbiū, piper, dauci semen, petroselinī semen, omnia cōtrita drachmarū duarum pondere potui recte dantur. Hoc & uentrē probe ducit, ac uulua calefacit, quemadmodū sæpe iam menses eruperunt etiā iis quæ purgationē nō sunt expertæ. Postquā uero uterū emendatum esse cōstiterit, mensuris bene respondentibus, tunc uenus est inennda, purgatione desinente. Iam uero qm̄ spiritus similiter in uulua inclusi cōceptionē impediūt, notas ipsorum ex capite de uulua inflatione sumemus. Medemur aut parciore primū uictus, mox cuminū, anethū, apii semen, rutæ, anisi & pleraq; aromata præstamus, partim potāda subiiciēda. Connuentes locos aperiemus iniectis clysteriis odoriferis, fomentisq; ex malua, semine lini, & fœnugræco, & oleo. Nonnunquā etiam melle, ualidiorebusq; artemisia, cunila, calamintha, pullegio, & anthemide. Præter hæc cōuenit uti terebinthina, nitro, cucumere agresti, elaterio, casia, picis sero. quibus autē os hiat, uictus, fomenta, medicamina sicciora alstringentiaq; granamali poucis, leotiscus, rubi radices, myrra, & quæ humidiorū uulue congrua sunt adaptantur. Peruersiones autem fomentis instaurare ac dirigere oportet, item iis quæ molliunt, insertis. uenus aut a tergo exercita, ad concipiendū uidetur cōducere.

De uulua scissuris, condylomatis, & hæmorrhoidibus. Cap. LXXV.

IN uulua ostio rimæ, quas Græci rhagadas uocāt, ex enixu uiolento fiunt. Primum sane latent cū recentes adhuc ex partu

partu sunt dolores, postea uero paulatim percipiuntur, alias manus tactu alias in coitu. quoniam & propter afflictionem cruorem reddunt, deprehenduntur autem sinu adaperto. etenim disruptiones scissurarumque in ostioli circuitu oculis patent. In quibus manuum operationem rodentiaque; medicamina uitantes, simplicioribus infestibus, pessulisque; utemur, prodest etiam tetrapharmacum dilutum. At si callum contaxerit, medicamento quod charta constat, ex rosaceo utendum. Sin autem ipsius uim non tulerint, iridem illicam terebinthina exceptam imposito. ulceribus iam cicatrice obductis, conueniet ex cadmia præparatum, aut aliquod ex iis quæ sedi consecrata sunt, ueluti quod dia lythargyru, hoc est argenti spuma inscribitur. Cum uero scissuras ueteres in condylomata degenerare contigerit, similibus excindi, atque cicatricem duci debent. Cæterum hæmorrhoides uuluarum os, & ceruicem infestant, quæ in partibus instrumento ad perspicuendam uulua accommodato exploratis, deprehenduntur, inde quod excrementa in accessionibus appareat dolorifica, cruenta & subrubra. At ubi remiserint, fluxio citatur citra dolorem subliuida & sæculenta. In his igitur cum morbus remittit, uollesella modo fieri queat, præhensas amputare oportet, sin minus, certe medicamentis ipsas destingere, partim attingentes sicco malicorio cum galla aut huiusmodi aliquo, partim iis quæ in uulua sanguinem fundente exposita sunt utentes, † quæ etiam profluiis, & hæmorrhoidibus conducent, eo potissimum distinctis, quod uulua continuo cruore manet per remissionem non solum in menstrualis purgationis tempore.

† In antiquo lib. hæc est scriptum, α καὶ τὰς δι' ἀρρώστιας αἰποῦσας αὐτοῦσας, idest quæ ob imbecillitatem sanguinem fundentibus, &c.

De partu difficili.

Cap. LXXVI.

Difficilis partus accidit, aut uitio parietis, aut fœtus, aut secundarum aut foris aduenientium. parturientis quidem, si crassa obesitasque; sit, aut uulua tota exigua, aut dolorum imperita, aut timidiuscula, aut inflammationem in locis genitalibus aliave particula experta, aut alio quodam modo laborans, aut natura imbecillis ut fœtum nequeat propellere, aut si ante tempus pariat. At fœtus uitio, si uel inuicitate magnitudinis existat, uel exiguus & modice grauitatis, uel ma-

gni

gni capitis, uel monstrosus, ut, biceps, uel mortuus, uel uiuus quidem sed imbecillis, ut foras non possit procedere, uel si plures foetus, sint. Nam Herophilus, quinque; ædidiſſe mulierē, memoratæ prodidit. Vel si figurā naturæ contrariam obtineat. Naturalis siquidem figura est foetus, prima quidem, qua manus femoribus porrectæ sunt, & caput nusquā inclinans ad os uulvæ recta dirigitur. Proxima huic, ubi in pedes conuersus est. Aliæ omnes præter has a natura abhorrent. Ob secundas, quod uelamentum intus est, partus redditur difficilis, si aut non auellatur ob crassitiem, aut priusquā ouus est propter subtilitatē aberrumpatur, humore siquidē euacuato, infans præ siccitate egredeuoluitur. Ab externis difficultas oritur, aut frigore, quod uulvam densauerit, aut calore immodico, qui uires dissoluerit, aut ex quodam fortuito accidente. Si igitur ex astrictione, aut ueluti foetu adfirmata pariendi oriatur difficultas, laxatione prius opitulandū, infundendo largiter oleū dulce, & calidū, cū decocto, scœnugræci, aut maluæ, aut seminis lini, aut etiam oua quod leniendi facultate prædita sint. Deinde & pubem cum abdomine & lumbis cataplasmate obducere, quod semine lini constat, aut aqua mulsæ, aut hydrelæo, in febribusque similibus prodest. Insuper laxationes balineis moliri, nisi febris, aut alia quædam occasio impederit, mouereque; parientē sella in aere calido mediocriter, Nonnulli etiam cōquassationes ualidas, sterutameutisque; ciendis idonea adhibuerunt. Timidæ, mentis robur ad mouendum, imperita dolorum docebitur, ut ualidissime spiritum comprimat, & ad inguina depellat. Animo deficiens iis quæ deliquio abigendo sunt, naribus ad motis recreabitur. Alleviata mediocriter, cibo modico refocillabitur. Obesam mulierē in lectulo resupinā figurare oportet, ut ad femina genua succlinet, inflectatque; quo uulua ad abdomen tendens, e directo ostioli habeatur, quod ceratis, aut pinguitudine delinire digito oportet, & sensim aperire. Atque si morbus aliquis paritulas male habeat, etiam huic prospicere. Ad hæc stercus detentum molli clystere emoliri, & secundas clauſas diuidere, aut digitis, aut feramento quod πολυκίπαν uocant, in ipsis occultato sinistra manu præcedēte, ac humorem quendā oleosum in uulvæ spatium interius clysterio indere. Verum ubi foetus præter naturā figuratus fuerit, naturālē reddere figuram decet, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, par-

tim in rectum agendo. Et si quidem manum pedemve præmi-
serit, non attrahere membro prehensum oportet magis enim
affirmatur, uel luxatur, uel etiam abrumpitur, uerū digitis hu-
mero infantis, uel coxæ affixis iussus in conuenientem locum
id quod præmissum est, diducere. Porro si cū firma adhæsiōe,
totius infantis indecora fuerit figura, sursum prius ipsum ab
utero sublimē detrudere cōsiliū est. deinde præhensum rur-
sus ad os dirigere. Postremo si plures uno infantē deferantur
iterum a superiore, infernaq; parte referes. sic ut omnia sensim
& citra contusionem fiant, oleo locis perunctis. Tempus quo
in sellam collocabitur parturiens est, cum uulua os dehiscens
digito occurrit, & quod præruptum est, procumbit. Verū si non
procedat, quod infans mortuus sit, aut alia de causa, ad extra-
ctionē quā Græci ἐμβρυοτομία appellant ueniendum est.

De coxarum morbis

Cap. LXVII.

COxarum dolor ab articulari morbo nihil differt nisi
quod ipse causa, nempe crassus pituitosusque humor
in sola coxarum compage, articuloque concretus in-
fideat. Dolor ipsis gibba in natibus regione inguinibusque ad
genua usque, in plurimis autem ad summum usque pedem
pertinet. Per initia igitur ægro nobis oblato, facibus clystere
uacuatis, uena in cubito secanda, cum sanguinis detractione,
si autem uetustas uicium occupauerit, ex talo partis affectæ im-
minutionem sanguinis moliemur. In accessionibus fortu hoc
utendum, Cyprini cyathis octo, aceti cyathis quatuor, niri
cyathis duobus, cachryos cyatho uno. Succidis lanis calida ad-
mouentur. Deinde applicabitur ipsis farina lupinorum ama-
rorum cum oxymelite, aut farina lolii cum resina, cucumeris
syluestris radice, nitro, calamintha, cachry, bacis lauri. Iam
calamintha sola utiliter ex oxymelite, aut aqua mulla admo-
uetur. Emplastro uero hoc quod leniendi facultatem obti-
net, utendum est. Cere drachmæ cētum, terebinthinæ drach-
mæ uiginti quinque, eruginis drachmæ sex, myrrhæ, galba-
ni, iridis, singulorum drachmæ sex, cedriæ drachmæ quin-
que. Propinabitur ipsis liquoris cyrenaici quantum erius im-
plet, aut castorij drachma cum opopanacis tribus obolis.
Porro radice capparis cortex potui datus, & cataplasmatibus
admixtus est remedio. Cum autem dolor multus excruciat,
etiam

etiam medicamenta a dolore leniendo ἀνόδυνα dicta locū habent, utpote quod ad Philonem refertur, & quod duplici pipere constat. Hoc autē enema inferetur, mellis cyathus unus & semis, olei tantundē, aquae cyathi dno, nitri drachmæ octo, terbinthinæ drachmæ quatuor. His calidis iniectis, anus debet foueri, ut longiori tempore ea retineantur, mucosa uacuat, nō nunquam & sanguinem, quando etiam magis opitulatur. At si malū perseueret, quod ratū est, iterū frequentius eo utendum est, in uicē aquae, centaurii decoctū admiscendo. Sanguinē uero trahit & thlipsis semen per inferiora inditū, succus elaterii, & medicamentū ex ipso factū, uel quod ipsius radicibus cōstat. Item oleum sicyoniū, salforū pisciū muria, & oliuarū colymba dum probe per anum ingeretur. Cucurbitulae coxendici multa cu flāma, cute prius incisa defigendae, interim quoq; hirundines. Quod si his malū non finitur, ad purgationē eundū est, aut ex hierā, aut colocynthidos partis internae pbe cōtritę drachma offertur in aquae mulsae cyathis duob⁹, aut paulo amplius aut minus, pro laborantis uirtute, & alui facilitate dabitur. In aqua uero mulsā ruta decoquatur. Puls etiam ex cucurbita syluestri confecta recte hos expurgat: In quibusdā uero & uomitus a radiculis citatus per initia profuit. Cū morbus se remiserit, dropaces ipsis applicantur, acopaq; ex euphorbio sunt utilia. praesertim quod a uarietate uocatur pœcilon, item balineae naturales his accōmodae. Si desiderant, in aliis lauabūt balneis cōmemoratisq; utēdū est acopis, & cōpositis nitris, medicamento Asclepio, & eo qđ ex euphorbio, adarce, nigro ueratro, castoreo, pyretro, pipere, pedicularia, quā staphda agriā uocā, simili pōdere confit. Scđm balineas inspergētur picis aride unc. tres, sulfuris ignē nō experti unc. duz, cuti adhuc calidæ, quae charta etiā conteget. At si ne hæc quidē pfeceant, uel reliquis morbi remanētibus, cōgruū erit & sinapi cū caricis, uel ēt per se illitū. In totū uero hos restituit sanitati, iberidis herbe usus quā lepidon quoq; alii agrio cardamō hoc est, syluestre nasturciū appellāt. Quae uerō apud nos fruticosa nascit similib⁹ laurii foliis & multo ampliorib⁹, respōdere, multa experimēta testāt, nō solū in coxarū, sed in aliis quoq; diuturnis affectibus, p estatē uero lōge sūt efficaciora. Atq; si folia tūc nō pduxerit, corex ipsius radicis contūdīt cū adipe suillo, ut emplastri spēm repræsentet inde linteolo dēiori illitū locis maxime dolētib⁹ imponit, nē-

pe totā

pe toti in natibus gibbo & femoribus, finesq; tam diu quoad cuticula superior nigrescat, aut ex toto lueat. Postea ipsum auferes, lotoq; ægrotanti ceratū impones, opopanacis drachmas quatuor, quæ aceti cyathis duobus dissoluantur, excipiunturque cerato cyprino: Quod si taliū aduentum usus abominetur, emplastris uii resectorijs oportet, è quorum numero hoc quoq; est, ceræ, resinæ pityne singulorum drachmæ duodecim, terebinthinæ, columbarum syluestrium stercoris, sæculæ uini combustæ recētis, singulorū drachmæ sex, galbani, sesquidrachma. Atq; ex reficientibus est quod læna appellatur. utilia uerò sunt quæ ex lixiuio & nitro præparantur. Iam nonnulli ijs usi sunt potionibus quæ ad annum continuantur, in quorū grege habetur medicamentum diateslaron uocatū: chamædryos pondo, gentianæ deunx, aristolochiæ rotundæ deunx, rutæ seminis sicci sextarius. hæc tusa creataque dantur quotidie cochlearij mensura ieiuno & probè concoctione obita, ex duobus aquæ frigidæ cyathis ad annū, donec morbus finiatur. Eadem promittit medicamentum dia hepta, id est ex septē confectum, & quod ad Proclum authorē refertur. Exercitia absolūtur, inambulatione, cōtinuis, flexionibus, saltatu, & cursu. Cibus mediocriter tenuis & concoctu facilis, conuenit. porro si malum nulli ex commemoratis cedit, aliàs in suppurationem conuertitur, aliàs neruis qui artus conuincunt, laxatis, membrum luxatur. Quare cū uitū longius se prorogat, articum tribus quatuorve locis urere oportet, ut in chirurgica dicetur, ac complusculi diebus ulcera adaperita, sine cicatrice seruare.

De podagra & articularijs morbis. Cap. LX XVIII.

Non sola particularum corporis imbecillitas, podagricos articulariosq; cruciatus excitat, quoniam accessiones, sine ullo temporis interuallo urgerent, quatenus infirmitas imbecillibus articulis semper incumbit. item ne humor quidē solus hos dolores creat, quandoquidē non solis uitium articulis insidet: sed utrunq; , & humor à natura alienus, & particularū imbecillitas morbū adfert articulum. quoues enim, alitrix particularū facultas, imbecillior, eborum grauaturs copia, ex qua cruditates enascuntur, humor superans, in quodcunq; articulamentum, quod antea imbecillius euaserit, se confert, & artubus sese insinuans, colligantes nervos disten-

dit, dolorem excitat: neque enim nervos, per quos motus disper-
satur arbitrarius, affectu primario inflammatio infestat, quo-
niam oporteret etiam medios internodiorum locos ipsam oc-
cupare, utpote tibias medias aut femora aut cubitos, aut bra-
chia. attramen afficiuntur iidem nerui lege consortij, quod cum
articulis ineunt. Quousque igitur & solus humor pedum arti-
culamenta molestat, podagra vitium nuncupatur. Vbi uero
causa in omnes corporis articulos compulsa fuerit, *ἀρθρίτις*
Græci, nos articulares morbos appellare consueuimus. Quo
uitij nomine, uertebras, humeros & maxillas comprehendimus,
omnemque articulum, quicumque morbo implicatur. Nonnul-
li uero aures, dentes, guttur, & nonnunquam iecur, lienemque
articularijs doloribus consistari pronuntiant. A quibus nisi
de subito vitium in artus sese recipiat eructetque, periculum
breui tempore laborantes occupauerit. Sed humor superans
qui iuncturis sese inferit, nunc biliosus est, nunc sanguineus,
alias atra bile uitiosus, plerumque etiam pituitosus, crudusque, co-
pia alimenti, aut cruditate, aut otio congestus, uerum uetusta-
te in articulis crassescit, & glutinosior euadit: sic ut in duritiem
contumacissimam, quam Latini tophum, Græci poron appel-
lant, occalleseat. Interim uero diuersa humorum colluue, ui-
tium contrahitur, ob quod ægrè dignosci, & difficulter medi-
camentis elidi potest, uel etiam penè nullo remedio sanescit.
Cæterum hoc mali frequenter antecedit improbus labor, ue-
hemens ambulatio, equitatus creber, usus ueneris intempesti-
uus, insueta frigida potio, frigidorumque, uel multorum noxio-
rum uel ciborum esus, multus uini usus. Iam aliqui prolapsu,
uel deturbatione, uel propulsu, uel distorsione, uel id genus al-
ijs, prima morbi fundamenta iecerunt, & materia quidem præ-
cedente in corpore, quæ antea conquiescebat, nunc autem à
causa primaria est commota. Mœrores autem, curæ, peruigi-
lia, & reliqui animi affectus, non modò mouent, sed ipsi quo-
que noxios succos, siue primario, siue ex accidenti procreant.
Variæ igitur, ut à me dictum est, affectus causæ habentur. Sed
deprehendi tamen facile humorum noxam inferentium disci-
mina possunt, tum suis coloribus, tum ijs quæ superueniunt de-
notata. Siquidem biliosa defluxio præter colorem pallidum
& rubrum, caloris sensum doloremque acriorem efficit & pro-
tinus in cutem sine magno tumore erumpit, incandescitque
calidis

calidis impositis, sicut è contrario ijs quæ refrigerant remittitur. Hoc sanè cum aliis omnibus magna ex parte, tum maxime ijs qui à bilioso humore originem habent euenire consuevit. Subinde febris in ipso accessionum statu accedit, quando & litis conficit. Pari modo in melancholicis, color partis nigrior reddetur in pituitosis, exalbidus & aquæ subter cutem similis apparebit, ubi dolor altius delitescit, & tardius in tumorem sese attollit, quemadmodum si sanguineus humor redundet, cruentus color emergit. Verùm ut singula exactius dinoscas, superior uictus ratio reliquaq; consulenda tibi ueniunt.

† Rectior est hæc scriptura ueteris codicis προσληγμένης μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ τέως ἡρεμώσης τῆς ὕλης, id est, materia antè coaceruata in corpore, &c.

Curatio biliosæ defluxionis articulis concepta.

Initium curationis si flauabilis articulos exerceat, magisq; ipsius qualitas, uacuatione noxi humoris tentabitur per medicamenta purgantia. quale est maximè quod ex rhodomelite temperatur, tum quod malis coroniis constat, item antidotū ex hiera picra, & aloë catapotia. Per accessiones uerò à foris utendum rosaceo cū oui luteo, & uini momento, particulā sem infirmando, herbæ autem adiuuentur quæ refrigerant, ut solanū, portulaca, altercū, semperuium, palustris lenticula, feris, papauer, polygonium, rosarum folia, & consimilia: Et nunc per se illinuntur, nunc cum micis panis posca imbutis adhibentur, uel hordeacea farina cum rosaceo instar cataplasmatissuperaccommodatur. At in Erysipelacea inflammatione articulorū manifestò lenietur cucurbitæ recentis cortice imposito, aut peponis, aut cucumeris carne, & per se, & cū pane. Item perdicii foliis & hederæ cum pane uel tenuiore parte polentæ. Ad hæc psylliū farinæ hordiacæ incoctū, ardētes inflammationes mirandū in modū solatur. simili modo & rosaceū ceratū cū quibusdā refrigerantibus succis illitū, & quod ex fabarū lomēto cōponitur. habet aut hoc pacto: ceræ unciz quinque, chamemælini, rosacei, singulorū unciz duæ & S. fabacei lomēti semuncia, ouorū lutea quinque. **ALIVD.** cataplasma uirentes maluz coctæ toruntur, psyll ū priuatim in uiscū redactū, admisceet: † deinde ouorū luteis admixtis, oleoq; chamemælino applicant. Si uerò tantus urgeat dolor, ut laborās par esse ferendo nequeat, medica-

méto ex croco, glaucio & opio uti conueniet, quæ in posca trita sublinentur, uel cū micis forma cataplasmatibus obducuntur. Galenus autem, huius meminit, lachrymæ papaueris drachmas quatuor, croci drachmam cum bulo lacte, uel caprillo trita, uel panis micam iniicit, & emolliens rosaceo excipit, ac utitur cataplasmate, aut opium crocumque pariter trita in lacte, cerato rosaceo excipit: Contulerit etiam eadem parte in accessionibus ceratum ex turpene pisce confectum, item oleum ex eodem expressum. Persimilis est hoc efficaciam, micarum panis aqua, uel posca maceratarum & semperuiui, uel portulacæ, uel solani uel palmularum carnis & papaueris capitum seminis, pari portione, ouorum tostorum luteorum & rosacei quod sufficit, accommodato in cataplasmate. Verum his quæ membris torporem inducunt narcotica Græci uocant, diutius non erit insistendum, quàm ut doloris uehementiam solum lenierint, siquidem largior ipsorum usus, sic insertum constringit humorem, ut in tophaceam duritiem quos græci πύρεαι appellant occalescat, ac diuturnas motus difficultates pariat. Ab eorum igitur usu quæ dolorem arcent uel medicamento è succis herbarum factis, diachylon uocant, ex chamæmelino resolutum utendum erit, uel eo quod dialtheas appellant, uel huius generis alio. Posteaquàm uerò partem affectam quæ refrigerit recalfeceat, roboranda erit palmulato medicamine quod diaphanice dicunt, cum oxyrhodino, uel uino & rosaceo soluto. At si emplastra detrectent grauenturque, acaciæ succum ex posca, uel lycium adiecto croco & glaucio, & succo perditii ex posca, delinere conuenit. Victus autem ratio refrigerans humidæque erit, ut hordei cremor, ex chondro sorbitiones: ex oleribus, malua, lactuca, intybus: auium cohortalium maximè pulli, piscium saxatiles, erinacius pectines & eius notæ reliqui. Vitanda omnia calfacientia, & quæ pallidam, aut flauam bilem generant, uinum uetus, fuluum, & nigellum, & cibi repletio. balineis utendum aqua potulenta factis, si nihil prohibet, etiam cum defluxiones ipsæ infestant, & cum absunt quantum ad causam pertinet. Temperandum ab iracundia, inedia, acium esu, temulentia, immodico labore, & ueneris usu.

† Vetus codex, ἡ τὰ προμίσξας ὡς τὰ λελυκὰ, id est, deinde albo ouorum admixto, quæ lectio huic loco magis conuenit,

Curatio

Curatio si sanguis artus infestet.

IN quibus sanguineus humor redidat, protinus sanguis mit-
ti debet: ac non in his solum, sed etiam in pituitosioribus,
aut melancholicis. Siquidem in his quoq; succus uenis pluri-
ma parte continetur, qui copia sua potius quàm qualitate of-
fendit, statim igitur cum quis morbum experiri primum cepe-
rit, sanguinis missio erit tentanda: nam quos iam fluxio fre-
quenter infestaret, ij plus inde noxæ, quàm auxilij sentiunt. præ-
sertim quibus corpus est natura frigidius, aut etiã imbecillius.
Post sanguinem detractum, nisi solus ille superauerit, monien-
to temporis interposito, etiam purgationem ex hiera antido-
to moliemur, aut Iuliani oxymelite, quippe hæc magna com-
moditate purgant: qui uerò ab huiusmodi medicamentis ua-
cuantibus abhorrent, catapotia quæ sequuntur deuorabunt:
aloes, colocynthidis, id est, cucurbitæ sylvestris, ueratri nigri,
scammonia, singulorum unciam, euphorbii, nitri, singulorum
semunciam, succi brassicæ, quod ad ea capienda satis sit: Dantur
singulis pro uirium ratione: melius proficiet, si cotoniorum
succo excipiantur Aliud catapotium quod & in accessionibus, &
remissionibus exhibetur podagricis, qualiscunq; etiam humor
articulos affligat. Recipit aloes se libram, agarici, croci, singulorum
semunciam, costi, spicæ nardi, iunci odorati rotundi, floris, opo-
balsami, calicæ, singulorum unciam, scammonia sextantē, epi-
thymi quadrantē cum semisse. Modus mediocris instar duorum
scrupulorum, summus quaterni scrupuli. Iam uerò ex armenia-
co lapide catapotia, mirificè purgant, ac propriè articulariis do-
loribus cōgruunt, tū inter fluxionū principia, tum in decremē-
to, tum in remissionibus, sed quoniā nōnulli scammoniam seu
stomacho noxiam fugiunt, dabūtur ipsis præsertim cū pitui-
tosa subiuies torquet, hæc catapotia, colocynthidis medullæ,
ueratri nigri, bdelli, gummi, aloes, singulorum uncia, nitri ale-
xandri, euphorbii, singulorum semuncia, dantur quaternis scru-
pulis. Ego in uicem gummi epithimum adiciebam. Sunt qui
in omnibus articulariorum uiciorū accessionibus, purgatione
ex hermodactylis ipsis aluum sollicitauerint, sed attendendū
est, quoniam hermodactylus stomacho fecerit negotium: an-
xietatem & cibi fastidium mouet. Quapropter in his uti cōsi-
lium est, qui obeundarum actionum necessitatē habēt. etenim

breui post duos plurimum dies defluxionem ex toto finiunt, sic ut consuetis munijs obeundis sint idonei. Notus mihi est qui non hermodactyli substantiam, neq; aliquod ex ea compositum medicamentum, sed herbæ ipsius decoctum cum aliquo consueto medicamine, utpote aniso, uel apio decoquens ipsum, potui exhiberit, ac mirum est quàm resoluta sæpe aluo defluxionem sedaret: uerùm quia, ut nuper retuli, stomacho inimicum est, ijs postea quæ stomachum confirmant uiresque eius recolligunt, mediocri calfactione os uentriculi corrigere oportet, ijs autem quæ ex hermodactylis fiunt, multo laudatius esse medicamentum Alexander prodidit, quod ex coronopodio temperaretur, quod & eandem uacuationem præsteret, & dolores sopiat præterquàm quòd stomacho noxam non inferat. Cæterum loco inducentur cataplasmatibus modo in pituitosis, si mediocris dolor afficiat, uiridis brassica, apium, cunyla, uerbenaca recta, sin acris dolor affligat, farinæ fœnugræci partem treis, pollinis loliacei; farinæ cicerum, singulorum partem unam, ex aqua mulsâ, aut uino tenui cum modico cyprino, uel nardino conuenit applicare, maximè per hyemem, item cinis crematæ radicis brassicæ, eiusq; caulicorum cum axungia inductus, multis fuit præsidio. Sed sopiendis doloribus recens adhibenda axungia, discutiendo autem humori uetus salsa auxiliatur: bubulum etiam stercus cum hordeacea farina in aqua mulsâ coctam prodest: uel per se recens & liquidum, uel cum foliis brassicæ. Similiter caprillus finus per se, uel cum hordeacea farina coctus in posca. Quoniam uerò nonnulli ex ijs quæ contraria esse uidentur remedium senserunt (etenim diuersorum humorum mistura dignotionem postulat) commemoranda iam harum materia est promiscua, Itaque iuuat syluestris atriplex & satiuâ cum pane applicata, aut uerbasci folia cum bulbis & pane trita, uel cum polenta, uel cataplasma ex hordeacea farina cruda. At in quibus obscura morbi est origo, hæc semel experiri atundè fuerit, modò ad consimilia transgrediendum est: modò contrariis pugnandum. Neque tamen eisdem diutius immorari consilium est, si nullum ex eis solatium perceperint. Hæc quotidie in artis operibus fieri uidemus, ut idem medicamentum uni articulo profuerit, alteri in eodem ægrotante similiter inflammato non modò non opituletur eodem tem-

pore,

pore, sed aliquando (quod maximè est mirum) offenderit. Quippe unus idemq; sæpe articulus, ex eodem remedio nunc iuuabitur, paulo post eiusdem appositu, inflammationem concipiet. Nunquam igitur aliquis cum glutinosus crassusq; humor superat, calidioribus leuabitur auxiliis. Verùm cum acris aut feruida humoris qualitas præcellit, tum refrigerantibus solatium inflammationis paratur. Nec miraculum est si materies natura frigidior inflammationis tempore, & feruore æstuet & incandescat, ut bilis, si ita contingat, admisionem omittam. Porro tophos in artubus impedit coalescere lupinorum farina cum oxymelite, uel posca, uel laserpitio, aut brionix radice cum pane. Iam hoc quod sequitur citra noxam mitigat, & mediocriter discutit, lycii, ammoniaci, thymiamatis, singulæ uncix cum uino ueterrimo & oleo omphacino, tritæ coquuntur, & è lomento fabarum, quod sufficit, adiicitur, coctæ mediocriter modo cataplasmatibus applicantur. Post inflammationis statum, tumore relicto applicandi bulbi per se, uel cum polline polentæ, ad ruborem usque, hoc enim modo efficacem usum exhibent. Quod si nihil hisce cataplasmatibus leniuntur, fotibus & superfusionibus erit certandum, maximè si tumor extrema occupet, chamæmeli & meliloti, aut centaurei decoctis. Nonnullis etiam cappari decoctum abundè fuit auxilii, hoc tamen quod infra scribitur, omnibus præstat efficacia. Thymus, origanum, satureia, & calamintha, in aceto quàm acerrimo cocta: eiusdem aceti imbre affectæ partes, non semel, aut iterum, sed frequenter in die fouentur cum fiducia. Hoc præsidio permulti pristinam ualitudinem recuperarunt, quibus non pituita solum, sed flaua etiam bilis fuit intesta. Non desunt qui & subsequens medicamentum salutare sint experti, illicis glandes in farinam redigunt ac diu coquunt, hoc decocto extremos artus per fluxionû initia longo tempore aspergunt. At quæ interioribus partibus habentur, spongiis fouent & per hæc materix impetum repellunt. Idem & bile uitiosis artubus conuenit, quemadmodum ex calida aqua sine aliquo decocto superfusio. Porro doloribus qui intenso frigore, aut humoribus inter articularum ossa impactis contrahuntur, ualens hoc est remedium Olei ueteris sesquilibra, natri alexandrini, resinæ terebinthinæ singulorû libra, euphorbiæ uncia, ris sextas, fœnugræci farinæ sextarius unus & dimidius.

his autem ea quoq; quæ aduersos coxendicum cruciatus scripta sunt, pulchrè nimirum opitulantur. multi siquidem aduersus huiuscemodi perfrictiones cum morbus declinauerit, sinapi cum siccatis ficis usi sunt, tum aliis quæ extrinsecus ruborè excitant. Alii uerò medicamētum ex cintharidibus admouēt, uerum hæc in posterum efficiunt, nisi aliquo etiam moliente utantur, ut, diastyrtheon & pyxide, & basilio, aut diaclates, aut dia ægiru, aut bromio, aut lysiponio, aut ualentioribus acopis, in quibus etiam nerui consensus, potissimum & infarctus humorum eue niūt. At ex mulæ lotio, in morbo statu præsertim, & in frigidis defluxionibus fouere commodum est. Pariter cōuenit etiam ex utroq; ueratro pastillus cum mollis & fungosus tumor articulos implicat, & fomentum ex sale torrido, aut etiam aliter è marina calida per spongas artus perfudisse uincit, item emplastra ex sale præparata, uel ex lixiuia, & nitro, hisq; consimilia cataplasmata, post uigorè morbi auxilio sunt, uictus ratio siccior minimeq; excrementitia competit, item inedia, uel parciore cibi. frequentibus balneis abstinendum. At si lauent, nitro aliisq; pulueribus utentur deterforiis. Vbi dolor declinauerit, exercitiis se credent: & frictionibus maxime articulorum, in naturales balineas descendēt, aut èe arena cōtecti incalescēt. Vomitus à radícula cibisq; assumptis mouebitur. Qui ad hoc se cōmodè habent, etiā ueratro nigro uacuetur per uomitum, uel etiam per aluum inferiorem purgētur.

Quomodo sanguine infestati artus curentur.

Qui ex sanguine dolorem articularium conceperunt, post sanguinis initio morbi detractionem, remedia cōmemorata loco dolenti sunt inducenda, si biliosior quidem acriorq; sanguis redundet, eisdem quæ in flaua bile diximus, cettandum, si frigidior, pituitosiorq;, aut melancholicus humor coaluerit, iis quæ post illa subdidimus præter nimis acria, curationem tentabimus. at si uitium in uetustatem incidit, his quoq; locus erit. iam hoc cataplasma in principio proficiet. Mallicoria, & rhus cū polenta ex uino detrita obducuntur. **ALIUD.** Braslicæ folia cocta accuratè conteruntur, aceti floces cum duobus coëtorum ouorum luteis, & rosacei momento, adiciuntur, leuigataq; simul loco iniiciuntur subinde ea mutâdo. Cibi assumentur

assumentur qui extenuant & parum nutriunt : carne igitur & leguminibus & uino copiosiore nigro abstinendum, si autem fieri possit, etiam ex toto uinum circuncidendum. Plurimos siquidem noui, qui prorsus abstemii omnes sanitatem consecuti sint. Alii siquidem per morbi initia omnino liberati sunt. alii in posterum rarius & minori dolore accessiones perceperunt Quapropter nisi contrarium hinc accadat, aut futurum inde aliquid metuant, perpetuò uitam agent abstemiam. † Ac qui per imbecillitatem, aut perfrictionem aliquid subsecuturū opinentur, ad biennium usq; abstemii, inde ad pristinam cōsuetudinem reuersi, modicum dilutumq; continēter bibēt. Oportet autem abstemios in uicem uini decocto anisi, aut alicuius consimilis seminis uti : fructibus pomaceis reliquisq; refrigeratoriis abstinere, tum ueneris usu. Qui uerò per medicamenta, quæ per annum bibuntur, morbum prorsus tollere uoluerunt, multis sanè quibus pituitosus & excrementitius humor articulis incubuerit, opitulati sunt. uerū qui calidioribus siccioribusq; constarent naturis, hos in subitam mortem præcipitarunt, quòd materia ad intestinum, aut renes, aut costas, aut pulmonem, aut principem quandam partem se contulerit Satiustaq; est biliosiore præditi habitu, aut copioso sanguine refertis, uini usu interdicare : quod nullus ex eius abstinentia, in commemorata uitæ pericula inciderit : frigidiores autem & recrementis pleni, ex uiperis theriaca uti debent, hyeme frequentius, cōcoctione bene obita, per æstatem rarius, uel enim morbo liberabit, uel certè leuiorem reddet, nulli ex prædictis particulis officiens : quoniam uerò nonnulli nos etiam commemoratis uti antidotis cogunt, non te lateat id quod ex damafonio constat & quod ad Agapetum, refertur, item quod aracton & octoidon dicitur, & quod Proclo inscribitur, item quod ex scordio, aut corallio componi solitum est, alia pleraque non mediocriter proficere, omnium uerò securissimum est longoq; usu probatissimum, diacorallii, siquidem concretas iam in tophum duricias discurit. horum omnium uires & modum usus, & quid in his caueri debeat uolumine, quod compositis medicaminibus dicatum est, reperies similiter aduersus articulares dolores, medicaminum quæ pñlothra uocant misuram usumq; in eodem habitu, nèpe pituitosiore. Alii uerò qui à toto se morbo uindicare uolunt, integras uulpes oleo incoquant,

incoquunt, quo articulariis morbis medentur. Nō defunt qui niuas lebetibus magnis iniiciunt, alii tantum emortuas. Pari modo etiam hyenas percoquunt, oleum hinc conficientes, quod discutiendi uim habeat, deinde eo balnei solia complēt: in quæ postquam descenderunt, immorari ibidem diutius præcipiunt, unde sæpe factum, ut non modò artuum tumores, sed etiam uniuersum corpus euacuaretur.

† Vetus liber, τοῖς ἐπ' ἐκέναν, i. iis quæ in illis dicta sunt.

‡ Veteres libri habent hoc loco οἱ δὲ δι' αὐτὴν κατὰ-
 ἴσιν ὑποπύσσοντες τι φάλλοντο, ac qui per imbecillitatem,
 aut perfrictionem expuere aliquid uidentur.

De tophis, quos graeci poros uocant.

Quoniam & tophi subinde in articulis creantur modo ob humoris qui ad eos decubuit crassitiem, terrestrē-
 que duritiā, modo propter immoderatos discutientium resiccantiumq; medicinarum usus, siue earum mistura quæ emolliendi uirtute pollent, sciendum uenit ea esse conuenientiora, quæ mollientem simul & discutientem naturam sortiūtur. itaq; emolliunt adipes uetusti, medullæ, ammoniacum, bdellium, oleum bene uetustum & styrax. Discutunt autem & resiccant, nitrum, sal, lixiuium, adarce, euphorbium, & consimilia uerūm ad concretos in articulis tophos propriè facit uetustissimus accerrimusq; caseus cum suillæ carnis præpinguis ac ueteris decocto contritus & superimpositus siquidem sua sponte topho dehiscēte quotidie humor qui intus coierat, eructatur. Valet etiam medicamentum diapernes, usu probatum, quod duplici modo præparatur. item quæ dia stactes dicuntur, iam hoc peculiariter facit quod recipit spumæ nitri, resinæ terebinthinæ, lixiuii quod calcem adiectam habet, propolis, singulorū triens, ceræ bes, colophonix libra, olei fescuncia: mixtis utitur, tum in tophis, tum in abscessibus: iam quod ex cynabari temperatur, mirificum est ad tophaceos tumores, aliaque complura: sed ægrè paratur. Quod uerò dia leptocaryon dicitur, præterquam quod probatum, etiam facilè cōquiritur, non solum ualentioribus, sed teneris quoq; corporibus accommodatum, si assumat medicamenti ex melle, uel ex anemone confecti

confecti partes duas ad illius partem unam: quæ si desiderentur, et eius quod cerusa constat, subinde æqualis modus ipsi miscetur. ALIVD. Ad tophos, sandaracham contritam querneouisco excipito, & utitor. ALIVD. Proficit etiam ad fistulas, & ægilopas, olei sextarius, spumæ argenti uncie octo & semis, auripigmenti uncia. Argenti spuma, oleumq; tantisper incoquitur dum manus non inquinet, postea tritum auripigmentum aspergitur, & priusquam uestionem senserit medicamentum ab igne tollito, ac utitor. Ex alii lapidis flore confecta, ubi morbus intermiserit imponuntur, quæ ad omnium articulorum nodos concretos accommodata toto morbo liberare, nonnulli veterum testatum nobis reliquerunt. Et ex salis flore præparatum medicamē si in morbi declinatione similiter imponatur, tumorum reliquias discutere experimenta fidem fecerunt.

Quomodo quis à podagra se tueatur asseratq̃ue.

POdagram quæ iam constitit, articularium uel dolorem, sine prædicta medendi ratione aboleri longè difficillimum est. At eam quæ nondum creata est præcauere, facilius, si quis cibis demat, & eis utatur quæ promptè in membra digeruntur, excrementisq; uacant. item uino moderatiore & exercitationibus satis se committant. Quod ad præsidii partem attinet, sal minutim in oleo tritus & articulis affricus, omnes qui se ab hoc uitio uindicare uolunt, magnificè iuuat, nisi præter modum sicca intemperie sint præditi, eoq; illicito, & mane, & uespèri per totum uitæ curriculum, & ubi inflammationes inclinauerint, utendum est.

Ad portiones qui tum pedum plantas tum calces infestant. Cap. LXXIX.

Perniones ulcera sunt, quæ ex frigore hyberno in digitis manuum pedumq; cōtrahuntur, Græci chimethla nūcupāt. Itaq; tepidā aquā marinā superfundere oportet, uel betæ decoctū, uel lenticulæ, uel erni, uel hastulæ regię radice. A superfusione, lenticulæ coctæ uinoq; detrita admouetur, uel ficus ex oleo leuigata imponitur, uel alumē & farina pari modo, in uino pertrita applicantur, aut floces uini subaridæ, aut bulbus recēs uino tritus adglutinat, aut allia in oleo fricta, proiectaq; & cera oleo mediocri liquefacta imponit, aut malicoriū incoctū uino, & in tenuē redactū puluerē, cerato rosaceo exceptū inducito.

inducito, prius locum decocto lupinorū irrorans, aut mannā, sulphurq; ignem non expertum, cum melle cocto imponitur, at alterci succus continenter illitus, ab inflammatione & doloribus uindicat.

Marcellium ad perniones.

RApæ satiuæ radice excauata, conijcitur in capacitatem ipsius ceræ sextans, olei lentiscini quantum sufficit: cocta in duplici uase ex marina aqua, aut muria, aut lupinorum decocto, hoc quidem superfundito, ceratum uero in rapa liquefactū frigidum imposito. At in exulceratis pernionibus, thuris, aluminis scissi, minii, resinæ terebinthinæ singulorum par modus: adipe suillo diluta inducuntur. Verum si inflammatio exulceratos perniones malè habeat, medicamento utendum hexapharmaco quod recipit olei uncias nouem, taurini adipis & fellis, singulorum libram, argenti spumæ uncias sex, colophonæ, uncias quatuor, mellis uncias sex.

Ad digitorum rimas totorumq; pedum quæ rhagades dicuntur.

PIce liquida delinuntur, aut canero fluuiatili, aut marino super carbones cremato, testa abraditur, & cum oleo trita ut mellis spissitudo sit, absterfis prius scissuris instillatur. Proficiet etiā scillæ medulla oleo feruēfacta, item cū terebinthina leuigata, necnō cornu caprillum uisum, exceptumq; adipe caprillo, sed callos circumpurgare oportet, & sic medicamentis uti.

Ad scissuras calcaneorum & plani pedum, anthera.

Calcis uiuidæ drachmæ decem, cerusæ drachmæ uiginti, ceræ tantundem, aut triginta, porcinae pinguedinis recentis uncia septem, colophonæ uncia nouē, succi lini seminis cyathus, olei dulcis uncia quadraginta: teneram plantam efficit ut aliud nullum. **ALIUD.** Adipis caprilli, ceræ, olei singulorum pari mensura utitor. **ALIUD.** Malicorium aceto incoctum diebus quinq; applicatur, deinde loco undiquaq; purgato calx una cum oleo, aut sordibus imponitur. **ALIUD.** Scilla cocta oleo, ipsa quidem fricta projicitur, oleo uerò in quo tamen terebinthina liquefacta sit utitor.

Ad attritus calcanei ex longo decubitu.

Ceræ, olei, argenti spumæ, mellis, pares modi, proficiunt in omni

in omni exulceratione, plantæ pedū, calcanei, supernæ patris, & internæ digitorum, magisq; si ulcus ungui sit propinquum.

*Ad sordida plantæ ulcera emmoton, facit
etiam genitali exulcerato.*

A Murcæ cyathus, aceti cyathus, cocta uase æreo donec mel leam spissitudinem habeant, & trita separatim, prosunt. Item squamæ æris drachmas duas, mannæ tantundem, lanarū succidarum mollium, quantum manu comprehendi potest, in uolutarum tedæ, ustarumq; cinerem totum excipito, & uitor, in uulneribus quidem uino diluens. in naturalibus autem & pedum plantis passo. **ALVD.** Amurcæ, mellis dispumati, paria pondera, hoc etiam cicatrices tollit.

Ad intertrigines, ex calceamentis.

Plmo agninus, suillus & caprillus benefacit, uerum coria ex ueteribus calceamentis combusta, si inflāmatio urget, nihil quidem adferunt præsidii, sed illa finita, multum: uel cepa cum gallinæ adipe copiosior adiicitur, uel galla combusta inspergitur, uel acacia aceto diluta illinitur.

Ad clauos callosque. Cap. LXXX.

Claui prius undiquaq; purgatis, inducitur medicamentum quoddam ex edentibus, quæ septica Græci uocāt, aut ærugo rasis, aut sandaracha, aut syringiacus puluis aut collyrium syringiacū loco gummi, ammoniaco exceptū. Est autem clauus teres figura callus, candidus, clauorum capiti similis, qui in omnibus corporis partibus, sed pedum plantis, digitisq; præcipuè nascitur. Tollitur autem longiori tempore, etiam si quis excedentem clauī partem continuè abradat scalpello, aut pumice affricet, similiter etiam callos. Proficit lupinorum crudorum concrematorum cinis cum melle, aut misy, liquida pice exceptum, melanthion cum urina pueri uenerem non experti, uel oui luteum, fabarum lomento cum aceto incoctum. At hoc subinde expertum est, cantharidum, aramenti sutorii, castorei, par modus singulorum, excipitur rebinrhina, ut emplastri fiat spissitudo, clauoq; prius circumciso, imponitur. **ALVD.** Feculæ, calcis uiuæ, uisci, singulorum pares portiones, cum stillaticia lixiua, uel urina pueri uenerem non experti.

Ad

Ad unguinū uitia, et primū de reduuijs. Cap. LXXXI.

R Eduuiæ, Græci paronychiam appellāt, abscessū est quī ad radices unguium coit, cum parua adhuc est, & prima habet rudimenta, galla cum melle cā reprimat, & confirmari prohibet, uel Musæ pastillus, uel Heræ, ex aqua. At ubi caro iam præter naturam excreuerit, eò curatio dirigenda est, ut per rodentia medicamenta absumatur, rumpaturq; , ualet autem ad reduuias, tum aurium sordes, tum lycium suppuras autem reduuias, acu adacta humorem emittere, spongiamque aqua imbutā imponere oportet, uel lenticulam, applicare ex aqua tritam, aut palmulatū cum uino, uel rosas uirides, uel siccas, aqua maceratas tritasq; , uel polentā cum aqua: efficacē est reduuiis etiā lupinorum farina melle, uel mulso macerata. Exulceratis reduuijs opitulatur hoc medicamentum. Aeruginis, argenti spumæ singulorum drachmæ quatuor, sarcocollæ tantundem, super linamentum ex uino & spongia imponitur. Conuenit autem carnem undiquaque ab ungue diducere.

De pterygīs.

Pterygion carnis incrementum est, aliquam unguis partem operiens, ex reduuia, aut alia huiusmodi causa proueniens, aduersus quam auripigmentum & manna pari pondere inspargitur, super autē, linamentum ex uino & spongia imponitur. **ALIVD** Chalcitidis squamæ, malicorij æquales partes. Excipiuntur fico tosta & melle, parte affecta, lupinorum decocto prius aspersa. Quod autem siccum est in ungue circuncidito.

Ad digitorum pterygia putrida, item ad pudendorum ulcera.

Lachrimæ thuris drachma, squamæ drachma, æruginis rasæ drachmæ quatuor, mellis cyathus, teruntur in sole donec subfluescant. Et loco uino prius irrorato per splenium inducuntur.

Medicamentū quod subito pterygia desiccat persanatq;.

Soryos combusti drachmæ duæ, thuris tantundem, æruginis rasæ drachma cum melle contrita, ipsi pterygio inducuntur. Valet etiam ad reliqua maligna horum locorum ulcera, & nigritias & putredines. **ALIVD**. Squama æris, palmularum carne excepta, aut ficorum utitur. **ALIVD**. Columbæ stercore polentæ polline ex passo coctum pertritumq; calens imponitur,

tur, item squama per se inspersa, pterygia desiccant. Oportet autem crebro, angulum unguis pterygion pungentem, ne increseat, scalpello superimmissio, adimere.

Ad ungues contusos.

MYrti, & mali punici folijs teneris ungues obducito.

Ad cruentos ungues.

Farina pice mista imponitur.

Vt ungues qui laborauerunt abscedant.

Sulfur tritum adipe suillo exceptum iniicitur.

Vt scabri ungues abscedant.

VIsçi quercini, sandarachæ, fœnugræci singulorum pondus sextans, cantharidum, thapsiæ singulorum uncia, aceti quod satis est. **ALIVD.** Propolis atticæ, ceræ, bituminis, singulorum drachmæ duæ, sulfuris ignem non experti drachma, oleo non inquinat, in usu cal factum unguibus applicatur. **ALIVD.** Picis liquidæ, ceræ, colophonix, terebinthinæ, guttæ ammoniaci, sulfuris uiui, aphronitri pares portiones, ne manus inquinent. **ALIVD.** quod separat scabros ungues sine exulceratione. Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, sulfuris uiui singulorum drachmas quatuor, resina excipito, & utitor, dissolues per dies septenos. **ALIVD.** Erui farina, felle ouillo, uel urina ouilla imbuta utitor, uel calce uiua cum oleo, uel chia cum opobalsamo, uel uisco, atramentum sutorium, suffurq; uinum quod satis est, exceptum, pelli illitum superinducito, uel herba pedicularia, cum aceto trita utitor, uel resinæ terebinthinæ drachma, sandarachæ duplicata portio simul radici unguis imponitur, diligentique fascia illigatur. Cum autem unguis exciderit, ceratum myrteum cui medicamenti ex resina paululum adiectum sit, superaccommodatur.


FINIS LIBRI TERTII IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDICO INTERPRETE.





PAVLI AEGINETAE
 I IBER QVARTVS,
 IOANNE GVINTERIO
Andernaco Medico Interprete.



De elephantia .

Cap. I.



ECTE mea sententia † Cappadox
 Aetius memoriae prodidit , auxiliorū
 uim morbis fortiolem esse oportere,
 eoq; elephantiam nunquam curari,ut
 qua nulla potentior medicina reperi-
 tur. Si enim cancer ueluti elephantia
 sis quēdam uni obortus particulæ in-
 ter morbos insanabiles uel ab ipso
 Hippocrate relatus est,quanto magis
 elephantia, seu totius corporis cancer aliquis, ab omni abhor-
 rebit remedio. Cūm.n.atra bilis, ex qua huic affectui origo est,
 duplici modo generetur, (uel.n.ex melancholico sanguine, sꝫ
 culentiolemq; , & ueluti eius limo: uel bile flaua, utrisq; nimiū
 uistis, nascitur) subrubicundam quidē elephantiasim mitiorem
 quodammodo, ut autē uerius dixeris, minus malignam, prima
 ipsius differentia procreat, reliquam uero, & maligniorē in qua
 totum corpus sꝫdatur ulceribus, & extrema decidunt, altera
 flauæ bilis supra naturæ modū adustæ soboles, producit. Qua-
 propter morbo iam uictis manus admouenda nō est . At si re-
 cens adhuc malū est, ut nihil ex summis deciderit , nulla autē
 infestari exulceratio, neq; tamen eminentiæ tuberosæ pluri-
 mum exurgant, sola autē facies aspectu ingratior, deformiorq;
 sit quodāmodo, eaq; non admodū indecora appareat, curatio-
 nem experiemur. Nonnulli siquidem haud pauci, sola capitis
 aduisione

adustione multos qui hoc inceperat uitio corripere, ne uinceretur, inhibuerunt. Protinus ergo interinitia sanguis mitti debet, & magis uere, in quo potissimum hæc lues, & nascitur, & intenditur paucis diebus interpositis, nouem decemue, pulce diacolocynthidos ipsos purgabimus, non semel, uerum subinde, ex ratione uirium quantitate medicaminis adaucturi. Item ex hiera purgatio his est idonea. Rursus interpositis circiter decem diebus, lactis fissilis serum dabitur, neque minus tribus heminis, neque amplius quinq; Insequenti tempore non fisco, aut recens multo lacte nutriuntur. Ob quæ si morbus remittat, eodem ut cibo debent: si remanet, lacte abstinebunt: acribus autem alium ptis uomitus cietur, à radícula, aut cibis. Proficit & ex albo ueratro post hæc purgatio: bis quidē, si fieri potest, uere, semel per autumnum adhibita. Malo uictis neque sanguis mitti, neque ueratrum exhiberi debet, cum materia neque ex cute in altum deriuari, neque hinc etiamnum minui possit sed ea quidē ad uentrem, & intestina deducenda est. Medicamenti autē noxia euocantibus utendū, metasyneritica dicunt, & summam cutē desiccare, & astringere oportet. Leues igitur cucurbitulæ uentriculi ori & præcordijs agglutinabuntur, eadem membra etiā dropace delinentur. Modico temporis processu rursus ad superiora reuertendum est, à purgatione quam præstat hiera, incipiendo, prætermissa sanguinis detractione, ut quæ plus noxæ, quàm præsidij esset allatura. Atque hoc circuitu ad ternas uices quaternas uel per annum uti expedit, uere potissimum & autumno. potare his prodest aceti cyathum, cum cedrini liquoris cyatho, & brassicæ crudæ succi cyathis duobus. mista dantur manè & uesper. Vel syderitidis herbæ folia torrida denarij pondere in uini cyatho, uel cornu ceruini drachma, & scillitici aceti quantum cyathus implet, quotidie post matutinā obambulationē potui exhibetur. reliqua uerò pro ratione temporis his offeruntur, uel scillæ lotæ drachmæ quinq; in mulsu, uel melle eclegmatis modo: uel liquoris cyrenæici ad erui magnitudinem, melle & butyro subacti, uel eboris ramenti drachma semissis cum uini cyathis duobus, uel cumini æthiopici drachmæ tres cum melle, instar eclegmatis. His amplius iuuat theriacorum pastillorum drachma in uini primæ notæ cyatho leuigata epotaque. Similiter etiam scilliticorum pastillorum drachma bibitur. Et calaminthæ succum cum efficacissimum potu auxilium.

commendât. incipiendū dicunt à cyathis ternis adusq; senos : Cætetū omnibus his efficacior est theriace ex uiperis, tum potui data, tum extrinsecus illita. Cū autem uiperarū copia datur, nihil æque proficit, ac uiperarū carnes comestæ, albo iure ex copiosiore aqua, sale, porro, & anetho decoctæ, usq; dum spiritus dissoluantur, sed capitibus ipsorū caudisq; digitos quatuor prius amputatis, interaneisq; ipsorum ablatis & cute. Item theriaci sales eadem per se promittunt, cum obsoniis assumpti. Tali enim ipsorū usu accidit, nonnunquā in squamas, † uel ceu uulpis pellem quandam ex cute elephantiorum decidere.

† Aldinum exemplar habet καππαδοκιν ἀρετῶν, Cappadocem Aretæum. quæ lectio rector mihi uidetur.

† Vetus codex, συμβαίνει ποτὲ λεπίδας ἢ οἶόν τινα λοπὴν, quo loco legendum arbitror, ἢ οἶόν τινα λοπὴν: est autem λοπὴς τῆ κεφαλῆς ἐλέφαντος, id est, capæ tunica, ut sit sensus, ueluti capæ tunicam & tenuem illam pellem.

Victus ratio talis erit.

A Somno manu molliter permulceatur, aluoque deiecta gestetur, uocem exerceat: deinde perfricetur & uario exercitationum genere utatur, nunc saltu, nunc magis, alteribus, & folle. Postea sudore, quæ illinc cōtraxit, absterfo delinetur adipe ursina, aut uulpina, aut hircina, aut auis alicuius, aut butyro recenti. paxillo temporis interposito in lauacro perungetur succo scænuigræci, aut ptisanæ cremore, aut ammoniaci momēto, quod aceto subegeris. A balneo deterfus perungetur oleo lentiscino aut cœnanthino, aut myrteo. Vinoq; modico cum alumine, uel ammoniaco, ut sordium sit spissitudo. Rursus teneris panuiculis absterfus dimidia hora conquiescat. Inde potu aquæ ad uomitū sollecitetur, digitis in os, aut pinnis demissis, post uomitū detur potui uinum absinthites, aut organites. Cibus erit panis hordeaceus, uel maza ex polentis. Inter olea, beta, lactuca, raphanus, porra, brassica aquis binis edulcata, & capparis. Ex marinis ostrea sumuntur, pelorides, erinacei, petrænes, tellinæ simul cum betis incoctæ: salsamentum uetus ceu in medicamento uicem adhibetur. Vino autem per totum morbi curriculum & uenere similiter abstinendum. At cū uires ex purgationibus lacescitæ recreantur, paxillum duntaxat uini

uini tenuis & aquosi assumitur, quando & acia circuncidi debent, exceptis condimentis. Recteque ipsis datur ptisana, oua, chondrus elotus, lac, mel cum pane, malua, rumex & sisarum: piscis molli præditus carne: Ex ijs quæ uolatu fidunt, probis do nata succis: Inter fructus, ficus, uua, & uua passæ: ex dulciarijs mellitis conferunt, quæ pini nucleis, aut amygdalis frictis, & enico, constant, ijs qui bis quotidie cibum capere solent: graue autem his est molestumque, semel duntaxat eum assumere. Interiorum cura habita, smegmatis in balneo utendum ex decocto betæ, aut fœnugreci cum aphronitra, aut sapone, aut myrobolano: interini & psilothris. Abstergit itidem portulaca cum aceto detrita, tenue semperuium, rumicis radices aceto incoctæ, alumen cum sale. Item sandarachæ par modus ex uino, & oleo lentisci. Huc spectat medicamentum, ad utiliginis speciem quæ alphos dicitur, accōmodum, ex alcyonio, nitro, myrto, sulfure, fici agrestis folijs siccis, cum aceto tritum, illitumque. idem præstat quod ex sepia testa concremata fit pumice, nitro, terra cinio: lia extorrefacta, gummi, galla omphacitide pari pondere siccum inspersum, aut ex aceto infricatum. Hoc autem mirabiles habet effectus: rumicis radicum fasciculus qui manu comprehendi possit, netri drachmæ quadraginta, thuris uiginti quinque, sulfuris tantundem, ex aceto Aegypto illinitur. Similiter hoc efficax est, quod recipit auripigmenti drachmas decem, sulfuris ignem non experti drachmas octo, costi drachmas duodecim, calcis uiuæ drachmas quatuor, ceræ totidem, baccarum lauri aridarum drachmas duodecim. Hæc macerantur populi albæ foliorum succo, aut crasso decocto. Vbi mellis spissitudo est facta, illinuntur, A L I V D. Radicum rumicis fasciculi duo, aceto incoquantur, & in pilam coniecti conteruntur læuiganturque. Deinde alcyonii libra, aphronitri uncia octo, sulfuris ignem non experti libra, cochleæ testarum combustarum triens, & chamæleontis cum radice triens. Omnia simul læuigantur, donec sordium fiat crassitudo. Deinde illinuntur per æstatem in sole frequenter, hyeme in balneo usque ad desudationem. Item Aesculapij aridum smegma pulchre his conueniet, ac omnia quæ communiter dicuntur smegmata, imo etiam ea quæ alphos dicata sunt proprie huc pertinent quæadmodum & quæ nunc aduersus illa prodidimus. At tumidas eminentias si inflammatione tenentur, aut exulcerata sint, delinetur lycio indico, uel glaucio,

uel aloe, uel Andronij pastillo, aut polyidæ sphragide. Cata-
plasma iphis aptabitur ex chondro cum succo polygonij, uel
plantaginis, uel parietaria trita. Insuper melissæ herbæ uiridis
folia cum axungia tunsa, applicataque mirabiliter proficiunt.
Etenim rubor in partibus excitatur, sed ex facili remittitur pa-
ne applicato, aut cerato ex amygdalino atque color naturalis
redit. Exulceratis rectè accommodantur emplastra, tum ex di-
phryge præparatum, tum ex uino melinum. Adde Coracion,
quodq; constat ex oxymelite, & pastillum Andronij, pompho-
ligem, & cadmiam. indicium uerò est totum morbum mitesce-
re. si prima ulcera cicatricem recipiant. Ad spirandi uerò diffi-
cultatem eorum qui elephantia laborant, aselli sub aquarijs de-
gentes, quinque, aut sex, ex aquæ mulsæ cyathis tribus potan-
tur. Iam uerò quædam ex ijs quæ ad ægrè spirantes inscribun-
tur, ipsis quoque communiter competunt. Aquarum natura-
lium usus adhiberi debet, ceu maximè necessarius, præsertim
aluminosarum, ferrumque resipientium. & si fieri potest, fri-
gidarum. Conferunt ipsis si etiam bibantur, nec non mari-
næ arenæ usus. Eandem habent efficaciam omnia quæ de su-
dationes mouent. Quoniam uerò affectus hic, non minus ac
pestilentia contagiosus est, quàm longissimè ab urbibus remo-
ti ægri, in locis mediterraneis, frigidis & ubi sit hominum si fie-
ri possit, infrequentia habitabunt, inde uerò ad confinia migra-
bunt, tum ipsorum causa, tum illorum potius qui, ut uerò si-
mile est, ipsis incident. Quippe & aere fruuntur commodiore,
& alios hac lue non inficient.

† Vetus liber habet, χαμαιλέοντος μέλανος τῆς εἰζῆς, id est,
chamæleontis nigri radice uncie tres.

‡ Hic locus sic legitur in ueteribus libris. διὰ τε αὐτὰς καὶ
τὰς ὡς οἶκός ἐν τῷ ἐξομένῳ συχνότερον, id est, tum ipsorum cau-
sa, tum illorū potius qui (ut uero simile est) frequētius incidēt.

De lepra, & scabie, quæ psora dicitur. Cap. II.

VTerque affectus, cutis aspritudo est cum pruritu, in qua
corpus absūmitur colliquaturque: originem ex melan-
cholico humore trahens: sed lepra altam cutem orbic-
ulatim depascitur & pisciū modo squamulas ex se remittit.
Scabies uerò summa infestat potius uariè figurata, fursuracea-
que remittit: in quibus sanguinis dimissio adhibenda est, si cor-
pus

pus magis plethoricum uideatur. sin minus, purgatio certè ex
 his quæ atræ bili uacuandæ sunt. Extrinsicus autem utere com-
 munitè utroq; ueratro, calcemq; habe elotam & siccam: in
 ipso autem usu, aqua diluens ad sordium spissitudinem illinito.
 ALIVD. Saluix, oleæ æthiopicæ lachrymæ, singulorum drach-
 mæ octo, capparis radice corticis, gummi, singulorum drach-
 mæ quindecim. Inunguntur ex aceto ad solem, propriè uerò
 lepras disijciunt anemone applicatæ, item utis albæ radix. Cō-
 posita uerò hæc, lolij farinæ chœnix, cardamomi albi drachmæ
 quatuor, nitri spumæ drachma, atramēti sutorii drachmæ octo
 hastulæ regię radice mediæ drachmæ quatuor. Aceto pertri-
 ta, & in cerati spissitudinem coacta illinuntur, parti prius nitro
 detergæ: ubi solueris (solues autem tertia die) & frigida aqua
 elueris, rursus inunguntur. ALIVD. Hastulæ regię radice succi
 uncia sex, sulfuris ignem non experti, mannæ, singulorum dra-
 chmæ decem, nitri drachmæ octo, aceto subacta illinuntur. Ad
 scabiē peculiariter facit, ex simplicibus herba pedicularia, sta-
 phis agria dicitur, lupini amari, cardamomum cum aceto, lilii
 radix cum melle, resina terebinthina, sulfur, cicer, caprillū ster-
 cus Inter composita, misy & chalcitis pari modo ex uino humi-
 diores scabies delinuntur. ALIVD. Rhododaphnæ tenera folia
 in olei sextario simul incoquito, donec arescant. A c ubi proie-
 ceris, oleo adiunge ceræ dealbatæ uncias tres, postquàm solu-
 ta refrigerataq; fuerint, sulfuris uiui unciam inspergito. ad so-
 lem, uel in balneo perungito. nonnulli simul cum rhododaph-
 næ etiam scillam coquunt. A L I V D. Medicamenti διὰχυλῶν,
 hoc est ex succis herbarum confecti uncia duæ, ceræ tantundē
 rosacei uncia argenti spumæ uncia tres, cerusæ totidem, liqui-
 dæ picis uncia sex, stercoris argenti uncia duæ, sirici tantundē,
 aceti quod siccis læuigandis sufficit. ALIVD. Cerusæ semuncia,
 amyli tantundem, plumbi uncia, lotariorum rubrorum uel an-
 chusæ, uncia duæ, ceræ uncia sex. rosacei uncia nouem. An-
 chusa probè cum rosaceo coquitur, deinde reliqua adiiciuntur.
 ALIVD. Oua decem, uel quot ad usum opus est, aceto quam-
 acerrimo macerantur, quousq; putamen ipsorum tenerescat,
 lutea n eodem aceto coquuntur, læuiganturq; rosaceo, & re-
 liquo aceto etiam argenti spumæ modicum ad sordium spis-
 situd nē coactum illiunt. ALIVD. Quorum quæ in aceto coin-
 maluerint, lutea tria, rosacei uncia sex, sulfuris uiui uncia

tres, leuigatis prius cum aceto luteis & sulfure, ceratū adijcitur. Argenti spuma uerò oxyrodino detrita, ut emplastri crassitudo fiat, acriores scabies extemit. Iam uerò ex lapatho smegmata, & ex iis quæ elephantiscis faciūt, plura communiter tum ad lepras, tum ad psoras conueniunt.

De impetiginibus.

Cap. III.

Impetigines ex serosis tenuibus, acribusq; humoribus, crassioribus aliis mistis contrahuntur, celerrimè in scabiem, & lepram transeunt, quapropter remedia ualidè siccantia requirunt. Corpore igitur toto, si opus fuerit, euacuato, simplicia quidem ipsis cōferent, cicer, ueratrum, erinaceus saxatilis, pix cerato, resinaq; mista, crocodili terrestres stercus, atq; sturnorum, cum oryzam solam ederint. Pleriq; hoc solo impetigines mentum infestantes, aliā uē particulam, aboleuerunt. Tritici multum capitur, incudiq; ignitæ cuiusdam imponitur, & quicquid inde humoris defluit, calens adhuc impetiginibus illinitur. Puerorum impetigines, hominis salua continuè defricantur. His opitulantur pruni gummi illitum. In uetustatem incidentibus uiticis folia cū aceto detrita applicantur, uel capparis folia similiter. Composita uerò hæc sulfur cū thuris lachryma, aut cum ammoniaco, subactum aceto illinitur.

Pastillus ad impetigines.

Gaceti cyathi dimidium, aceto soluta illinuntur. ALIVD. Chalcitidis, gummi, singulorum drachmæ octo, sulfuris ignem non experti, misyos, singulorū drachmæ sex, squamæ æris, acacia, singulorum drachmæ duæ, aceto delinuntur. ALIVD. Sulfuris uiui, nitri spumæ, singulorū drachmæ quatuor, cachryos grana sexaginta, leuigantur ex aceto. Sola uerò pars uitiata inungitur, sed ita, ut quæ integra est, non coinquinetur: exarefacta, aqua frigida eluitur ALIVD. Veratri albi drachmæ octo, farina lupini, buccinorum cōbustorum, nitri, singulorum chenix. Arido medicamine defricent. Porro impetigines, quas *αγέλης*, id est, feras appellant, mediocriter siccantibus remedijs nō discurtiuntur, acrioribus autem irritantur. Adhibere igitur oportet medicamenta abundè quidem efficacia, sed quæ nō ualenter erodunt, quæ est istud, Glaucii, thuris, alcyonii, bituminis, sulfuris,

sulfuris, gummi, singulorum uncia, aceto inungitur. ALIVD. Picem aphricanam cū aceto coctā liquatamq; illinito. ALIVD ad impetigines & pruritum. Atramenti sutorii, sulfuris uiui, nitri, thuris pari modo, in impetiginibus quidem, aceto adiecto, in pruritu autem, uino utitor. ALIVD. Leichenicon, ab impetiginibus curandis nuncupatum. Guttae amoniaci, erui farinæ, lupini farinæ æquales portiones aceto illinuntur.

De Pruritu.

Cap. IIII.

PRURITUS qui senibus accidit, ex toto nunquam confanescit, uerum lenitur infra positis remedijs. in reliquis ætatibus, si ex prauo humore contrahitur, qui nimirum biliosus, aut pituitosus putris uel etiam salsus est, per ipsius uacuationem tollitur. Porro cognoscitur ab ætate, temperamento, uictus ratione, anni tempore, regione, & reliquis his consimilibus. Si igitur in uenis simul cum sanguine redundare uideatur, à sanguinis dimissione auspicandum est. Sin autem qualitate magis peccet, congruis eo medicamentis uacuato, ad externam curationem diuertemur. Lauandum itaq; prorsus ieiuno est, nonnunquam & modico cibo sumpto, iterum lauandum: quippe uitium uix inhumescit, derergitur autem fœnugræci decocto, aut betarum, aut surfurum, aut malux agrestis, & satiux, aut prisanæ. Præter hæc, farinæ etiam fabaceæ, uel lupini, uel myrobalani, uel sinigmati ex pepone præparati, quod *πεπωνατον* appellant, si inueterauerit, lauatio similiter quidem cōuenit. forus autem ex saluix decocto, myricæ, mercurialis, origani, pulegii, baccarum lauri, cucumis syluestris radicis, capparis, lixiui, & oxalme. Deinde respergunt arido nitro, uel cū fœcula aceti, uel quod recipit nitri spumæ sextariū, thuris, sulfuris uiui singulorū librā, cimolix libram semissem. Vel hoc, Aphronitri, sulfuris uiui, alcyonii combusti, pari modo. siccis utitor, uel cū quodam ex suprā dictis decocto. Si autē placeat, etiam ueratrum siccum inspergito, sine pingui addito. Illinitur autem cum oxelæo herba pedicularia contrita, uel sulfur, uel sandaracha, uel omnia, uel sinapi cum myrobalani expresso, & oxelæo, uel utere cochleis combustis leuigatisq; mellē, uel rumicis radicibus, uel sinigmati inde cōfectis, ut in capite de elephantia comprehensum est, aut quibuscūq; ad scabiē efficacibus. Si autē exulceratio partes excreuerit, parygro, uel

diapompholygos appellato medicamine utendum, uel ceræ uncia liquefacta in cyprini cyatho, cui sulfuris adiecta sit uncia. *ALIUD* ad pruritus. Nucum agnatum rauridarum uncia, sulfuris tantundem, apij succo leuigatis utitor in balneo, membra affatim defricans. Hoc solum multis tum scabiosis, tum alio pruritu retentis, abundè fuit. Item apium per se uiride tusum infricatumq; in balneo uehementer auxiliatur. Similis effectus est perdicion, & acerna resina cum rosaceo soluta, illitaq;. *ALIUD*. Oryzæ puræ & nimius candidæ, uncia res, tuxæ cretæq; aceto quàm acerrimo læuigantur, donec sordium fiat spissitudo, adijciaturq; priuatim sulfuris uiui detriti uncia. mixtis perbellè in balneo utitor, diucius defricâs. At in iis qui superfluitatibus magis redundant, pari portione illorum temperata, præstantius remedium reddetur.

De Leuca.

Cap. V.

Leuce, cutis quædam ad albidius mutatio est, quæ viscosa, glutinosaq; pituita contrahitur. Quoniam uerò non quælibet leuce curationem recipit, notas ipsius tales habeto. Acuper summa leucem pungito, sed cute non penitus: & siquidè sanguis emanauerit, sanabilis est: sin lactea humiditas, desperata est. Vel panniculo laneo asperiore infricata cutis, si quidem rubicundior euaserit, medicinæ locus est: sin idem color remanet, non confanescit. Et quæ plura corporis loca obsidet, leuce, difficilius tollitur, quàm quæ pauca deturparit, item uetustior, quàm recens minus in medicina spei habere cēsenda est. Nonnulli igitur adustionem quæ ferramento candente administratur, in leuca probarunt, sed ita, ut hæc uel sola ualetudini sufficeret. Alii uerò dolorem inde cicatricemq; secuturam ueriti, ut quæ non minus ac leuce indecora sit, medicamentis crustam inducentibus, qualia & cicatricem aiunt concolorem efficere, usi sunt. Alii, & horum inefficiam repudiantes, tincturis uti maluerunt, imposturæ potius quàm auxilii rationē habentes, quæ sanè omnium maximè uitari debent, q̃ affectus celeriter renascatur. Itaq; subiectis uti medicinis consiliū est, ad arcæ seminis roris marini, sulfuris uiui, singulorum parua pōdera, tuxa & in cerniculo priuatim creta, deinde simul cum aceto in puluerem sat multis diebus detrita, in sole illinuntur, nō cumulatè, ne cutis exulceretur. Procedente autem tempore

tuatrati.

ueratri & gallæ similiter momentum adicitur. A L I V D. Fici nigre sulculis, aceto maceratis, contritisq; misceto, aphronitri, sulfuris ignem non experti, myrica fructus, parem singulorum modum, ubi nitro cutem defricaueris, perungito: solique exposito, animum attendens ne exulcescatur. Archigenes autem fici foliis, calcis uis eo quod satis est mixto, similiter usus est, uel infricatas (inquit) leucas, albo ueratro, donec sudore diffuentes reliquo corpori concolores fiant, illinito synopide, uel mediade, uel acu transfixa punctas quoad cruor emanet, illinito synopide, cum aceto, uel prius absterfis, ut est comprehensum, perungito, fici liquore recenti, & folio eiusdem asfatim infricato.

† In ueteri lib. hæc est scriptura, λευκὴ ἑλλακίδου, ueratri albi.

De albo albo, & nigro. Cap. VI.

Alphi cognato leucis modo generantur, sed illæ quidem altius cutē mutant ut pilos quoq; sibi similes procreent. Alpha autē summam cutem infestant, quanquam & ipsi cum uetustatem sentiunt, penitius recedunt: ut etiam albos pilos producant, idq; humoris qui subest ratione. Etenim ex pituitoso humore albi ducunt originem, nigri autem ex melancholico, utrisq; igitur commune prodest auxilium, elota calx aqua soluta, aut dracūculi radix, cū aceto applicata, simili modo utrunq; ueratrum eisdem efficacē est, item lupinorum amarorum decoctio superfusa, eorumq; farina, ex aceto, uel oxyme lite inducta, iam capparis radice cortex cum aceto, liliq; radix cū melle, cæpa ex aceto in sole illita, crododili terrestres simus idem præstat, pari efficacia & sturni excrementū, cum oryzam duntaxat ederit, sepiaq; testa cōcremata. Compositum uerò hoc præstans est, Alcyonii, nitri, singulorum sextans, ueratri albi, sulfuris uiui, singulorum uncia. Nonnulli uero & floces uini combustas adiiciunt. A L I V D. Sulfuris ignē non experti, nitri spumæ, singulorum drachmæ quatuor, seminis roris marini grana septem, teruntur cum aceto. solum uerò alphum perungito, sed ita ut integram partem nō attingas, siccatum medicamen aqua frigida eluitur. A L I V D. Farinæ lupini, buccinorum, & nitri singulorum chœnix, ueratri albi, drachinæ octo. Arido pars defricatur. A L I V D. Erui farinæ librae duæ, erucæ seminis, anygdalarum amararum, cucumis syluestris

uestris radicis, singulorum libra : mulso simul leuigata delinuntur, & hora interposita per spongiam abluuntur. facit etiam ad ephelidas, uaros, & cutis sordes.

Ad Alphas albos experta.

Sulfuris ignem non experti, sextarii duo, calcis uiuæ candidæ, unciæ quatuor, albumina ouorum quinque, olei nardini, & aceti momentum. sulfur primum in puluere cogitur, mox oleum nardinum ei superinfunditur, tursusque leuigatur, deinde acetum instillatur, & iterum teritur, calcem uero priuatim lotam semel, bis, terties, sulfur adijcimus, una cum ouorum aquato, & denuo coterimus. collectus humor effunditur. pauxillum uero relinquens, ut unguentum queat illini, in hunc modum utimur. **ALIUD** probatum. Sulfure uiuo, fici foliis aridis, aphronitro, alcyonio, terra cimolia, myrto, ex aceto utitur. **ALIUD** Archigenis. Fici foliorum quæ in umbra exaruetur, sulfuris, aluminis singulorum æqua portio cum aceto inungitur, aut foliorum fici drachmæ quatuor, nitri drachmæ duæ, alcyonii combusti tantundem, aceto in balneis illinuntur. Priuatim nigros exterit efficaciter sandaracha, cum sulfuris dimidio, sed cute nitro prius defricata, in sole perungitur. albos uero tollit atramenti sutorii, æruginis, æqualis modus, nitri duplicatus, sine pingui infricatur, illiniturque, uel cachryos, sulfuris uiui adarcæ æquæ portiones, ex aceto pertritæ infricatur, illinunturque, cum inaruerint abluito, locum perfriçans. Idem facit & leucis.

Ad Stigmata, ex commentarijs Archigenis. Cap. VII.

Stigmata curabis, si quod matulæ adhærescit, cum aceto quam acerrimo illinas, uel calcis uiuæ partem unam, nitri rosti fului dimidiam, cum aqua in sole illinit. At ubi exulcerationem fuerint experta, cicatricem tanquam ulceri inducito. Crito uero iubet confricatæ nitro prius cuti terebinthinam illini resina, linamentisque ligatæ sex diebus relinqui, septima deinde solui, & acu pungi stigmata, & sanguinem qui fluereet spogia detergi, interiectoque breui temporis spatio, tenui sale confricare locum. Tum imponi, ad dies quinque, medicamentum quod recipit, thuris, nitri, calcis uiuæ, cærx singulorum drachmas quatuor, mellis octo. Quum. n. a parte medicamentum deposueris, nigrum in eo offendes **ALIUD** unguentum Piperis drach. duæ, rutæ drach. mæ qua-

ma quatuor, sandarachæ drach quatuor, auripigmenti drachma mellis quod satis est, cuti prius nitro infricatæ illinitur, itē aliis priori cōsimiliter peractis, per triduum soluitur, & nigritie absterfa, rursus inungit. Exterit. n (inquit) diebus uiginti, tam integre, ut nec exulcerationē, nec cicatricē relinquat. ALIVD. quod Criticon dicitur. Thuris drachmæ quatuor, nitri drachmæ duæ, atramenti sutorii drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, piperis drachmæ tres, calcis drachmæ tres, thapsiæ totidē, auripigmēti drachma una & semis, sandarachæ drachmæ tres, mellis quod sufficit, utere quemadmodū superiore Oribasius tradit ranunculū applicatum, uel capparis folia stigmata extere. At si altius fixa non discutiantur, modicam uero cutem attingant, crusta ferramento frigido excitata tolluntur.

*De exanthematis.**Cap. VIII.*

EXanthemata generantur, ex crassis in cute impactis humoribus, magisq; adhuc in superiore pellicula cū densa est. In quibus igitur, si ēt in alto humorū copia subfiterit, primū purgatio tentāda est. Nā si hoc neglecto, prius dīscutere aggrediaris, obstrues ipsos potius q̄ per cutē euacua-bis. Sin aut nullæ in alto deliteāt humorū colluies, p cutē ua-cuare oportet, nec procul attrahere, si aluo, aut uomitu uacuā-tionem moliri uelis, sed humorum qui curi impacti sunt, cura-tionē medicamētis experire, quæ exurūt, calfaciūtq; maximē quū lata sunt exanthemata, siquidē ex frigido admodū, crassoq; humore, talia sunt procreata. Lauri igitur tenerorū foliorum, rutæ & mannæ, æqualē singulorū portionē detritā, & lachry-mā thuris oleo subactā delinito, uel betā tenerā incoctā, tritā-que inducito, aut ceræ drachmas octo, sulfuris tantundem, salis drachmas sex. Arida in pollinē coacta, & olei cyatho dimidio superfusa, oīa simul incoquito, factoq; emplastro utitor. Sed co-ctioni sedulō assistendū est, uehementer bonū remediū existit.

*Ad epinyctidas.**Cap. IX.*

EPinyctides ulcuscula sunt, sua sponte erumpentia, pustula-rum specie, & subrubra, quibus disruptis, cruenta sanies defluit, per diemq; non magno pere excruciant: per no-ctem uero, graui magis quā pro ratione ulceris, dolore tor-quent. Itaq; liquor laseris aqua solutus imponitur. nam citra rosionem desiccatur, aut cicuta in leuorem detrita inducitur, aut brassica

brassica cruda cum aqua, aut apium cum polenta trita applicatur, aut alterci folia, cum melle pertrita admoventur, aut solanum per se, & cum coriandro uiridi, aut oliuæ foliis utitur cum aqua coctis: aut uuas acinis exemptis, leues, splenio illitas imposito, uel adianthū ex melle tritū. Vitari debet acriū, acidorum, & falsorum esus, fomenta, balneum & insolatus.

De pustulis, quæ Græcè phlyctænæ dicuntur. Cap. X.

Pustulæ quæ non sua sponte rumpuntur, sed graui dolore excruciant, acuta perforari acu debent, ut humoris colluies habeat emissariū. Deinde humore leuiter expresso cutis præposita finitur, donec impleatur. At si uulnus contineat, denuo pustula perforanda est similiter & exprimenda, tum cutis astricta, seruanda quandiu id quod sub ea exulceratum est, ad cicatricem peruenerit. Priusquàm igitur pustulæ aperiantur, cocta lenticula cum aqua leuigata inducitur, uel mali granati uirgulta, cinere calido tepesacta imponuntur, & loci attinguntur. Quod si ruptæ fuerint, & ulcus excitatum, adeps suillus liquefactus & argenti spumæ detritæ mistus, in lintheum, quæ illitus admouetur, uel lilij radix in aqua cocta tritaq; cum cerato imponitur.

Ad epinyctidas, & phlyctænās.

Argenti spuma & sulfur ignem non expertū pari portione cum aceto applicantur, item myrtus in læuorem redacta, sordium illitio cum oleo & uino, benefacit, tum his, tum calidis eruptionibus, & papulis feruentibus, gliscentibus capitis ulceribus, furunculis incipientibus & adustis medicamentum, & quod molybdena, & quod ouis præparatur.

Ad ambusta. Cap. XI.

Ambusta medicamentis indigent quæ modicè abstergāt, non euidenter calefaciant, aut refrigerent: Itaque terra chia, cimolia, cretica, omnisq; leuis terra illita cum aceto nō admodū acri, uel aqua, præclare facit, prohibetq; pustulas excitari. itē oui albumen crudū statim impositū, lana molli exceptū, etenim refrigerat leuiter & citra rōsionē desiccāt. idē efficitur aramentū scriptoriū illicum, uel lachryma thiuris aqua diluta, uel lenticula cocta tritaq; uel eruus applicatur. At ex aqua calēte uestiones priusquàm pustulæ oriātur, oliuarū salsarū
aqua

aqua cōtinuē superfunduntur, ipsæque oliuæ salæ cum polenta contritæ inducuntur, aut alumen scissile, pertritum cū aceto illinitur, aut fel taurinum cum aqua copiosiore liquatum inungitur, aut lixiuium superfunditur, garo, aut muria fauetur, aut bulbi liliorum, aut hyacinthi, aut narcissi cum rosaceo triti, & in sordium spissitudinē coacti delinuntur. Marcellus autē hoc compositū tradit. Panniculi melle imbuti & hordei farina inuoluti, cōbusti q; cineris mittuntur drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, butyri drachmæ octo, ceræ, seui caprilli, rosacei, singulorum drachmæ sedecim. At pustulis iam excitatis, rhus cum polenta tritum aceto applicatur, aut calcem uiuam cerato mixtam, illitamq; linteolo imponitur, iam quod spherion dicitur medicamentum, ambustis utile est, partes exulceratæ porris cōtritis obducuntur, aut portulaca contrita cum polentis, aut columbæ fimi linteolo inuoluti combusti q;, & oleo diluti cinere utitor: Mirificè proficit pini aut piceæ cortex, aut adianthum aridum, læuigatumq;: aut myrti, folia combusta, pertritaq; insparguntur. efficax autem unumquodq; horū est, & si cum cerato componitur, item quod rubræ anchusæ radicis siccæ, & in læuorem contusæ trientem, recipit, ceræ albæ drantem, rosacei uncias duodeuiginti, iam quod cerusæ constat cum modica cerui medulla, laudatum est remedium.

Ad eos qui flagris cæsi sunt. Cap. XII.

Cerusæ argenti spumæ æqualis portio, ceræ quadrupla cum fusino, aut rosaceo, emplastri modo inducitur, primo die priuatim fusino solo utitor, uel croci drachma, tragacanthi tantundem, ouum integrum, sine putamine, unita cælis imponuntur, item pellis ouis recens excoctæ calens, adhuc circūdata, quolibet efficacius die uno, & nocte per sanat.

Quo modo pili adustis renascantur. Cap. XIII.

Pili ambustis nascuntur, si fici folia in fictili tosta, cum cerato in emplastri modum imponas, aut caricæ drachmis octo, sampuci drachma, tritis cum oleo donec cerati fiat spissitudo, utitor, uel detrimenti lapidis drachmas centū, eris squamæ drachmas decem cum aqua subactas in pastillos cogito, in usu partem unam. cerati partibus octo diluito.

Ad abrasa, quæ aposyrmata Græci dicunt. Ca. XIII.

Abrasæ & superficië infestantia ulcera, primū aut uino, aut aceto, aut muria aceto mixta quæ oxalmæ dicitur astringes. Deinde medicamētis, ad cicatricē ducēdam utere, tum liparis, tū ex albis emplastris trypheris. Sūmē autē facit qđ cerusæ partē unā recipit, ammoniaci dimidiā, myrtei quod satis est. Ammoniaco ex aqua in læuorem trito cerusā miscetur, myrteumq̃ue superfunditur: utitor lapata. Vel lapidis detrimento, squamam æris admisceto, & myrteo in læuorem coactis utitor, aut cimolia, & argenti spuma, ex uino, reciminoq̃ue & myrteo tritis utitor.

Ad abrasa, intertrigines, inueterata ulcera, senilem teneramq̃ue cutem:

Argenti spumæ chrysidis drachmę quinquaginta, ceræ drachmæ uiginti, resinæ siccæ ex picea drachmæ duodecim olei sesquicyathus. Argenti spumæ oleo incoctæ reliqua adiiciuntur: rudicula agitatīs, uel etiam in pila emollitis utitor, sed cutem abrasam ab ulceribus non oportet amputare, sed medicamentum ei inducere: sicut enim glutinabitur, uel nigrescens, At ulceri, quod eroditur, sordidumq̃; est, si carne nudum hiat, uix cicatrix obducitur. Cæterum abrasa tueritur ab inflammatione, rhu rubrum, si illinatur læuigatum, cum melle, aut lentisici coma cremata, & cum melle imposita.

Ad abrasa, flagris casa, & articularum contusiones medicamētum, quod dolorem leuet anodynon appellatū.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū unciz decem, ceræ unciz sex, olei puri, aut rosacei sesquilibra, amyli unciz duæ. Ad eadem ualet Pelarion quoq; ex helcysmate, id est, recremento argenti paratur, item medicamentum quod ouis constet.

De formica & uerruca.

Cap. XV.

VTrunque uicium, cutis excreſcentia est exigua, callosa, & plerunq; figura teres: sed formica, quæ Græcē myrmecion dicitur, latiore basi, † similem si quis non trectet mordētis formicę sensum inducit. Verruca autem, quæ Græcis uocatur acrochordon, angustiore, ut chordæ summo assimilata, pēdere uideatur. Hos igitur tumores, elateriū cum sale infriatum tollit, thuris lachryma cū aceto, grossi cū aceto, farina, & nitro,

& nitro, liquor fici illitus similiter facit: rithymalli, smaridis caput falsum concrematum, ærugo cum sulfure ignem non experto combusta, ocymi folia cum atramento sutorio, sarmentorum adhuc uiridium ustorum quod distillat, simus ouillus cum aceto, hircinum fel illitum, heliotropii magni semen, cum uino applicatum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum urina pueri uenerem non experti, sterlus bouis gregarii in aceto.

† Huius loci duplex est scriptura, una in uulgatis codicibus, καὶ πρὸς τὰς ἀποφύξεις ἐμβόαν διδόνειν, id est, si quis deradat sensum mordentis formice similem inducit: altera est, πρὸς τὰς ἀποφύξεις, id est, si quis constringat.

De Ganglio.

Cap. XVI.

Ganglium neruorum concretio est, ex ictu, aut lassitudine oboriens, in pluribus quidem corporis partibus, præcipue uero motui dicatis, nempe manu summa, & pedibus. Quo in uitio Archigenes calcem uuam unam cum adipe anserino, & terebinthina, imponendam censet. Doles uero medicamento, quod lapide achatæ recipit, utitur. At Oribasius, eo quod subsequitur, cerusæ, resinæ, è pinu, olei ueteris, singulorum uncia, amoniaci suffiminis, galbani, singulorum tantundem, ceræ uncia quatuor, aut pilam plumbeam (inquit) crassiorē uertebrae modo ganglio ampliore imponito, deligatoque pondere siquidem longiori temporis spatio ipsum dissoluit, atque hoc nos utimur.

De inflammatione.

Cap. XVII.

Omnes ex æquo tumores calidos, quibus dolor, feruorque adest, nostri inflammationes, Græci phlegmonas appellare consueuerunt. Verum pro diuersa quæ ipsos facit, materia, hi quoque euariant. Cum enim sanguis probus, & crassitie mediocris, in particulam aliquam subito confluerit, ac propter copiam impactus inhæserit, inflammatio proprie appellata nascitur. Cum uero flaua bilis in parte aliqua subliterit, herpetes: ubi & sanguis, & bilis flaua simul incubuerint, erysipelas excitatur. At cum sanguis, qui influit, calidus impense, & crassus fuerit, carbunculos mouere solet. Itaque ab inflammatione quæ peculiariter phlegmone dicitur, & multis semper accidit, incipiendum esse iudico. Tumor rubens, dolorificus tantum genti uenitens, & calidus ex sanguine, ut à me dictum, est probò originem trahit: qui, sanguinem dico, nunc ex toto fer-

tur corpore, nunc in aliquam particulam copiosius incumbit, sic ut à uasis nequeat contineri, exciditque aliquid roris modo in ampla partium quæ intercedunt, spatia. Sæpe uero uirium hoc uulneribus, fracturis, ulceribus, alijsque pluribus externis causis superuenit. Cum itaque inflammatio repente euestigio particulam quampiam sine manifesta causa præcedente obsiderit, totum uerò corpus, parti contagium transmittat, uniuersum quidem id, sanguinis dimissione, uacuari oportet. quod autem inflammationem experitur, superfundere ac obducere medicamentis, quæ non calefaciant, humectentque, sed illuuiem humoris repellere sint idonea. At quod iam in affectam partem se receperit, euacuatur. Itaque illinitur cataplasma quod constat semper uiuo, mali punici corticibus, uino incoctis, rhu & polenta. hoc & similibus cum dolor uehemens non urget utendum est. Vbi uero particula fluxionem cum dolore ampliore senserit, ne sic quidem calens aqua oleum uel adhiberi debet, aut ex farinis cataplasmata, ut quæ fluxionum uitiiis omnia sint inimica, doloris tamen uehementia leniri eo quod constat passo, rosaceo, ceraque modica, & lanis sordidis quæ æsypi multum contineant. Per æstatem quidem frigida, hyeme repida excipiuntur, applicanturque, sed ita ut superiores quoque affectis partibus loci, spongia uino austero imbuta, aut posca frigida comprehendantur. cæterum miscentur cum cataplasmatibus utiliter etiam herbe. Parietaria igitur ad omnem inflammationem accommodata est, tum per initia, tum in augmento, consimiliter glaucium, atripleæ, malua, lactuca, cucurbita, calidis illitæ, benefaciunt & tribuli utrique inflammationibus ex influxu concitatis. brassica uero durescentibus ualet. At ubi immutatio his oboritur, nec pus subsidet, curationem tentabis emplastro, quod ex chalcitide conficitur, aut quodam persimili fluxionibus dicato, lanam uerò putam uino austero imbutam extrinsecus medicamento superaccommodabis. Atque hac ratione inflammationibus ex humoris defluxu contractis medeberis. Eas autem quæ occasione cuidam feruntur acceptæ, si calefacias, humectesque, non offenderis, ac si usus quandoque postulauerit, scarificare ipsas, conueniens erit. At si ob defluxionem ortas inflammationes scarificatione diuiseris, præsertim per initia, malum quoddam haud mediocre ægro-ranti accerces.

De extertoribus corporis abscessibus. Cap. XVIII.

QUod si fieri non posse tibi uideatur, ut suppurationem impedias, panem hydrelæo incoctum delines, aut farinam hordeaceam consimili præparatam modo. particulâ iure radicis althææ incoctæ fouebis. At si tumor ad suppurationem contumax est, aut egrè discutitur, cataplasmate ex ficis siccatis utere: oportet autem ficus dulces pinguesque incoctas aqua eliquescere, ac ius ipsarû in tenuis mellis speciem cogi, farinamque hordeaceam adijci, & si quidem tumor discutitur minus autem ac conuenit, cû ficis siccatis incoques hyssopum, oryganumue: si uoles magis intendere, salê decocto iniicies, diligenter animum aduertens, ne siccando nimium pars in scirrhum occalescat. Tale si quando uideris, cucumis syluestris radicem, aut althææ, aut bryoniæ aqua simul decoques, ualentior autem & discutiendo promptior, dracunculi radix est, ipsumque medicamentum, quod dracunculo constat, ualidè huiusmodi uicia disijcit. Nonnunquam igitur solum hunc, decoques, nonnunquam & ficus siccatas admiscebis, farinamque simul cum adipe. Iam anethinum oleum crudos humores, incoctosque tumores, & concoquit, & discutit. Item pix duros ac crudos tumores uniuersos cataplasmatibus indita concoquit, magisque liquida. **MEDICAMENTVM** compositum quod abscessus iam coctos expellit. ut subinde pus in splenio repariatur. nondum uerò coctos in totum discutit. Lapidis pyritidis drachmæ duodecim, ammoniaci triti tantundem, lomenti drachmæ sex, exceptum pice, liquida, pelli que illitum imponitur. Splenium uerò non prius auferitur quam sua sponte deciderit sed medicamentum non multo antè præparari debet, ut quod confestim sicescat. In his autem si tumor non dissipatus fuerit, & pus sub eo delitescat, parte scalpello diuisa, id ipsum uacuabitur, cura deinceps adhibita ne oleum, aut aqua ad moueatur, uerum si uulnus abluere interim oportet, aqua mulsa, posca, uino & mulso utendum est. Si uerò inflammatione conficetur, ex lenticula cataplasma inducitur. ubi inflammatio abest, alio quodam emplastro medicamento in huiusmodi sectionibus utemur quinetiam eo quod constat chalcitide. Cæterum super ipsis iniicitur spongia lanæ uino austero imbuta, uulnere autem nullum pingue medicamentum accom-

modatur, quale est tetrapharmacum. nam uehementer postulat successore.

† Hic locus est expressus in ueteribus lib. τὰ μὲν ἴδιαι πεπεμεμένα τῶν ἀποδιδυμῶν ἀπόνως ἐξήτης δύναται, id est, quod abscessus iam coctus nullo negotio expellit.

Quæ abscessus rumpant.

Quoniam nonnulli abscessus ferramento diuidi non sustinent, tentanda sunt & medicamenta, quæ ab extrahendo dicta sunt epispastica: narcisci radix in pollinē detrita, ex mulla cū irino cocta applicatur, uel tenera arundinis radix, minutim detrita cum melle. quod si dura fuerit, mullæ prius incoquetur: uel aristolochiam cū melle applicato, rumpit autem picis aridæ & propolis creticæ par modus, cicatricemq; inducit.

Dyonisia ad abscessus mirabilis, item ad mammas & inguina, epispastice, quæ per latētes meatus discutit.

Olei ueteris, aquæ singulorum libra, hydrelæum incoquitur paulatim. mox, aphronitri uncia sex adiunguntur, misyos uncia una uel duæ, incoquantur donec manus non inquinent. Deinde miscentur mannæ thuris, ceræ, terebinthinæ, singulorum uncia sex.

Ad nernicos abscessus.

Ceræ, colophonix, butyri singulorum libra, picis aridæ, mellis, singulorum libræ duæ, uncia sex, eruginis uncia tres, uisci quod satis est. A L I V D. epispasticum. Suffiminis ammoniaci selibra, ceræ, terebinthinæ, singulorum triens, sulphuris uiui quadrans: nicti quadrans. Similium autem medicamen appellatum, & quod porris constat, ualidè tumores iam mutatos rumpit. Quod lini seminis succum recipit, per cōmodè discutit, mutat, rumpitq; . At mitioribus abscessibus medicamenta congruent etiā ad parotidas inscripta. Atq; hæc de abscessu, qui ab inflammatione emanat. Galenus autē memoriæ tradidit abscessum nullā præcedente inflammatione constitui, quæ ex probo sanguine habet originem. Statim siquidem ab initio (inquit) humor aliquis aliàs specie alius, in parte quadā collectus, uicina illi corpora excoriat tēpore, & à subiectis dirimit. Sanè inueniuntur in huiusmodi abscessibus cum scalpello sunt diuisi, omnigenæ, tum humorū, tum solidorum quorundā corporum

porum species. Etenim stercore, urina, grumo, humori mel re-
ferenti; mucosq; : ad hæc ossibus, unguibus & pilis, consimilia
corpora reperiuntur, imò & animalcula subinde inuenta omni-
bus propè quæ ex putredine subnascuntur simillima. Præte-
rea in abscessibus potissimum inueteratis, qui humorum ex lo-
co in locum decubitu prouenerint, colligi tradit, quæ lapides,
arenas, testas, ligna, carbones, lutum, sordes, amurcam & fecem
repræsentent. Quare absolutior exteriorum maximè corpo-
ris abscessum significatio compendiosè tradenda est, tum eorū
qui medicamentis discuti non possunt. Abscessus itaq; est car-
nium seu partium carnosorum, nempe musculorum, uenarū,
arteriarum corruptio, mutatioq;. In genere abscessuum non-
nulli tunica comprehenduntur, ut atheromata, stratomata, me-
licerides. Alij sine tunica constituuntur, quæ generis uocabu-
lum usurpant, unde sermo hic noster procedit. Porro absces-
sum generationem plurima parte inflammatio præcedit, de
qua disceptatum est. Interim protinus ab initio, quemadmo-
dum nuper dicebamus enascuntur. Comites abscessuum sunt,
igneus loci seruator, tumor eminens, ruberq; magis ac antea, du-
rusq; cum dolore punctorio, pulsu & grauitate, ut aliquid ex
particula suspensum esse uideatur. Quòd si uerò locus in si-
gnis extiterit, febris accedit & rigor inordinatus. noctu potissi-
mum dolor fatigat, & febricula. Est cū inguinis inflammatio,
proximis in glandulis excitetur. Vbi uerò abscessus in totū fue-
rit absolutus, magna parte decrescit, punctus obueniunt pruri-
ginosi, & leuiter stupidi, tumor in mucionem acutū magis fasti-
giatur, tactu lenis, cedensq;, superficies in uertice auellitur. Di-
co autē hæc de his qui foras rūpuntur. Si igitur uel medicamē-
tis, uel sua spōte rupti fuerint emmoto medicamine, curatio-
nem tētabis, parte iam purē uacuata: sin aliter accidat, aperire
ipsum in eū modū oportet, quē in chirurgica explicabimus.

De Gangræna, & Sphacello. Cap. XIX.

Cum inflammatio, neq; discutitur, neq; in pus mutatur,
sepæ in gangrænam, & siderationem, quæ Græcis dici-
tur sphacellos, incidit, de quibus iam sermonem insti-
tuimus. Gangrænas, enim appellant, cū membrū aliquod ob
inflammationis, qua cōflicatur, magnitudinē emoritur: neq;
iam confirmatas sic dicunt, sed quæ etiam nū sunt. Eius mali-

uis est, ut nisi celestimè succurras, facilè affecta pars, quatenus uicina comprehendit, mortis habitum repræsentet, & hominè iugulet. Vbi uerò membra sic uitiata in totum sensu fuerint destituta, affectum non amplius gangrænâ, sed iam sphacelum nuncupant. Quin & ossibus hoc mali accidit, cum caro ipsis circumdata, praua scatens sanie, ipsa hac imbuerit, ac putredine consumpserit. Cum itaq; membrum ex toto, uita, sensu motuq; priuatum est, confestim præcidi oportet quàm proximè sanæ parti. Gangrænâ uerò curamus, sanguine ex parte uitiata affatim emisso, uel enim uena incisa sanguis corruptus, cum uena amplior in ipso membro appareat, detrahendus, uel cute totius corporis diuisa, multis altisq; plagis. ubi uerò sanguinem emanare permiserimus, medicamentum aliquod putridis consecratum induci debet, quale est, farina erui, aut lolij aut lomentum, ex oxymelite. Quod si ualentius imponere cogites, salè adijcito, aut pastillū Andronis, aut eius generis aliquem. Faciunt ad gangrænâs, & uetustæ nuces: cortex autem ipsas expurgat: item liquor rithymalli tempestiuè & mediocriter adhibitus. Opitulatur ipsis & lupinorū amarorum decoctius superfusum. Nonnulli uerò ubi putridam partem præciderint, quo securius mali radicè euellant, candens ferramentum adigunt. in quibus sale cū porro utendū est. Vt autē crustæ citius decidant, cataplasma deinde accommodatur ex pane, uel hordeacea farina, uel triticea ex hydrelæo incocta. Idē medicamenti cephalici puluis ex melle, tetrapharmacū, & Macedonī cum ut appellāt, utiliter imponitur. Iam panis cū apio tritus, aut ocymo, sic iris uel panax, uel aristolochia, uel acorū cum melle, uel thus, crustas probè separat. Idē præstat Macherionis medicamentum, & Isis linamento illita ex melle. In teneris autem corporibus abundè est etiam erui farina ex melle.

Ex Oribasii commentarijs ad Gangrænâs.

A Eruginis rase, minij, aluminis scissilis, singulorum par modus, aqua detritus gangrænâs illinitur, scalpello undique exasperatis. Item lolij farina cum raphano & sale, nonnunquam etiam aceto. uua passa acinis uacuata, cum cortice ex sale & oxymelite. Ad hæc nucum iuglandium medullâ, myrti folia uino incocta, tritaq; ex melle: raphanus cum aceto, crustas etiam ad ossa usque rumpit.

De Herpete.

Cap. XX.

CUm bilis flaua nullo mista humori excreta in particulam quampiam decumbit, malum herpes nuncupatur. Si quidem substantia crassior sit, acriorq; totam cutem adusq; carnem subiectam exulcerat, uocaturq; herpes exedēs. Si uerò tenuior & minus acris calidaque, pustulas exiguas, per summam cutem milio similes excitat, ob quam similitudinē, herpes miliaris dicitur. At Oribasio authore, pituita cum flaua bile mista, miliarē herpetem creat. Corpore igitur toto medicamine quod ducendæ bili est, euacuato, loco affecto refrigerantia siccantiaq; inducuntur, principio capreoli uitis, rubi, & plantaginis applicantur. postea uerò, lēricula his miscetur, interim & mel & polenta. Item cataplasma, quod ad inflammationes ex confluxu inscriptū est exempto semper uiuo. Verū exulcerata pastillis inunguntur, passō, aut uino tenui & austero non ueteri, aut posca aquosa solutis inducitur & glaucium, eiq; con similia ex aqua. Cum autem nihil proficit acetum admiscetur. T succo autē plantaginis, aut solani, aut uino diluta magnificē auxiliantur: aut lini semen torridū oleo uinoq; incoctum, inq; lauorem redactum imponitur: aut terra cimolia, solani subacta succo perungitur, & argēti spumæ uncia quatuor, porri succi cyathi dimidiū, betæ succi tantundē, laugata illinuntur: at in ueteratis iam hmōi ulceribus, Musæ pastillus & Andronius efficax est. **ALIUD** ad herpetem pustulosum. Recrementū plumbi ex uino austero laugatū illinitur, superiniiciuntur betæ folia uino incocta, uel ceræ triens, myrtei uncia sex, stercoreis plūbi triens, uino diluta illinūtur: at ubi id quod serpit repressum fuerit, cerato ex recremēto utitor, aut lente cocta cum melle partem obducito. Ad herpetem uerò qui sub cute affligit, recrementum plumbi, rutæ laugatæ succo excipitur, aut ceratum myrteum in uicem rutæ. **ALIUD** Lanæ ueteris illotæ, circa tedam combustæ drachmæ duodecim & semissis, ceræ drachmæ uiginti quinque, recrementi plumbi uncia una. S. seui caprilli curati lotiq; ex aqua drachmæ uiginti quinque, myrtei uncie quinque. **ALIUD** ad herpetas acutē depascentes, corii mali punici dulcis drachmæ sex, argenti spumæ tantundem, lanæ illotæ circa tedam combustæ drachmæ tres, ceræ drachmæ duodecim, cerusæ drachmæ octo, thuris, aluminis scissi, singulorum drachma, uino aut myrteo excipiuntur.

†Hic locus sic legitur in ueteribus καὶ χυλῶν δὲ ἀριολάσσῃ
 ἢ στεύχων διείδῃ, καὶ ἐφ' ἧσας δίνω μεγάλως ὀνήσεις, id est, & succo
 plantaginis aut solani, & ubi ex uino coxeris multum iuuabis.

De erysipelate.

Cap. XXI.

C Alenus tumorē ex feruente & tenui sanguine conflātū
 priuatim quidē & propriē erysipelas, appellauit: cū ue-
 rò ex ambobus, sanguine & bile constat. utiq; ab eo qđ
 in mistura superat nomen uitio indidit. Etenim ubi sanguis
 excelebat, inflāmationē erysipelaceā, ubi bilis flaua præpol-
 let, erysipelas inflammatoriū dixit. Verūm cōmunius tumorē
 ex sanguine & bile calidioribus factis conflātū. Erysipelas ap-
 pellauit. Vtro autem modo dicas, nihil adeò ad præsidiorum
 usum interest. id uerò scire oportet erysipelata quæ capiti po-
 tissimū oboriūtur, plus facessere negotiū, adeoq; esse periculo-
 sa, ut nisi efficax cōsequantur auxilium, interim quoq; affectos
 strangulent. Quod simul ac fuerit deprehensum, protinus ab
 initio uena in cubito præsertim humeraria debet incidi. sin au-
 tem hæc non appareat, eā quæ se conspectui obiecit. At si quid
 sanguinis dimissionē impediat, purgatione utendū ex medica-
 mento quod bili ducendū est. Hac sanē & in aliarū partiū erysi-
 pelatis uti, uel clysterijs efficacioribus oportet, tū ipsis illinere
 quæ influentē materiā refrigerātium uirtute repellunt, colle-
 ctam uerò, calefacientiū mediocriter & humectantiū discutiāe
 prius, quā particula liueat, aut nigrescat, adhibita semper cura
 ut perliquida inungantur, ita ut frequētius immutētur, primis
 per spongiās molles ablotis, siquidē multus particulæ feruor
 celeriter in uaporē erūpens, hæc desiccet. Cæterum requirūt
 erysipelata per initia, ut dixi, quæ refrigerent cū humiditate,
 nō astringant: quale est semper uiuum, portulaca, psyllion, len-
 ticula palustris, seris, cucurbita, solauum, altercū; lactuca, glau-
 cium, item apiū, & rhamni folia per se uel cū pane induc̃ta, itē
 ceratum ex aqua admodū frigida. His miscetur. ēt opii aliquid,
 lachrymæ papaueris, cicutæ & mandragoræ. Iam cōposita me-
 dicamenta inducūtur, fierq; ceratū, cera dealbata rosacei qua-
 druplo admixto ex oleo omphacino sine sale confecto: his in
 pila emollitis, aquæ frigidæ superfunditur, quantū potest re-
 cipi. Si uerò aceti tenuis & pellucidi momentū temperes, præ-
 stantius

stantius medicamentū habiturus es. Item polenta cum herba quadam frigidior ex iis quas enumerauimus affatim membrum refrigerat. Idē efficiūt palmulæ pingues cū horū aliquo mixtæ. Ad hæc pars ēt delinetur cerusa, uel terra cimolia, aut figulari cū solano, aut argenti spuma cū rosaceo, aut chalcitide cū oleo passōq; aut cerusa cū aceto & lycio, uel acacia cum aceto. Cū feruor remittit utendū simplicibus quidem, sulfure uiuo & menta cū oxyrhodino, aut ruta cū ablinthio, aceto & oleo, aut argēti spuma cū porri & betæ succo, cōpositis aut, priuatim in capite hoc pastillo. Argēti spuma, cerusa, croco, sulfure ignē nō experto, opioq; cū passo. Cōiter aut omnibus, minio sinopico, chalcitide, misy tosto, erugine rasa, atramēto sutōrio, alumine scillili pari pondere ex aceto utitor. ALIUD. Sulfuris uiui, cerusæ, opii, acaciæ paribus singulorū portionibus ex aceto. Cataplasma ad erysipelata, herpetas, abscessus, parotidas & ambusta. Altheæ nouellæ soliorū tenerorū libra. cocta in hydrelæo perbellē teruntur. adiectoq; rosacei triētē, argenti spumæ, cerusæ singulorū uncijis duabus & semisse, iterū læuigātur cū succo coriandri, aut semperuiui, aut solani deinde micis panis adiunctis ut emplastri formā induat, illinitur. Hoc autē emplastro utitor quod recipit recinini pondo, myrtei pondo, unguēti quincuncē, argenti spumæ trientē, æruginis rasæ sextantē. Aerugo & argenti spuma aceto læuigātur. Ceratū ad erysipelata & ambusta. Ceræ albæ triens, rosacei quadrans, oua sex, perdicij herbæ triens. Vbi uero inflammatio mēbri conqueuerit, aut uetustatē experiatur, cataplasma illi, priusquā liueat, ex cruda farina ordeī est imponendū. Quod si liuor iam occuparit, cute scarificatu incisa, cataplasma induci, locusq; perfundi ex aqua calida dulci debet, sed & marina & muria interim conducet, quinetiā ipsi cataplasmati talis aqua, uel acetum, uel muria cum aceto misceatur. Deinde cōmemoratis medicamentis cōpositis cura adhibita uti licet. Nam si inflammatio remaneat, aut in pus, aut in putredinem conuertitur.

De phymate, bubone & phygethlo.

Cap.

XXII.

A Vtore Galeno, bubo, phyma, & phygethlon, glandularum affectus sunt: bubo quidem inflammatio, t phyma

autem glandulae inflammatio ad suppurationem spectat. Aliorum uero quorundam sententia cõter omnes, qui à natura abhorrent, ceu abscessorii tumores quacumq; corporis partem obfideant, phymata appellantur. Siquidem Hippocrates in hunc modum scribit. Quibus phymata urinarium meatum exercet, hi abscessum in uomicam erumpente liberantur. At bubones qui prolapsu, aut aliis ulceribus, aut doloribus contrahuntur, periculo uacant: febribus aut superuenientes, qui plurima parte ex pestilentiali lue solent incidere, deterrimi sunt siue femora, siue alas, aut ceruicem inuaserint. Verum priores initio, quemadmodum inflammatio, quaelibet, auxiliis repelluntur, quae refrigerant astringuntq; uel spongiis ex posca impoſitis, uel lanis oleo crudo uinoq; imbutis, uel rosaceo, uel melino, uel lentiscino, uel myrtheo, deinde iis quae digerunt utendum. At si corpus uniuersum succis æquabiliter redundet, prius ipsum uacuari conuenit. ubi iam inanitum est, ulceris in quo id prouenerit, cura haberi debet, sicuti in capite de ulceribus explicabitur. Glandula si inflammatione tentetur, lanis oleo quodam laxante, irriguis, recte lenitur, totumq; ipsis membrum inuoluitur. Cum tumor ad suppurationem spectauerit, non promptè diuidere, sed medicamentis quae cerati specie referunt, discutere nitemur, cuiusmodi potissimum est ex perano confectum. Item quod ab herbis dicitur botanicon, si per hæc non discutitur rumpere adgrediemur, aliorum abscessuum modo, similiterq; illis mederi. In iis autem qui ob febres aut omnino humorum abundantiam procreantur, caueri debent repellentia, ne materies penitus detrusa cursum repetat, sed ab iis quae discutiunt, statim curationem incipere consilium est. Si aurem nihil prohibet, nempe aut ætas aut uirtus, sanguis prius è cubito dimittetur. deinde loco fomenta inducentur ex decocto chamæmeli aut anethi, aut eius generis alicuius. Reliqua medicamentorum sylua, maximè ex iis quae tertio uolumine ad parotidas dicta sunt, transferenda est. Item ex illis quae nuper contra inflammationes prodidimus, quemadmodum etiam phygethli curatio, tum hinc tum ex remediis erysipelati accommodatis petetur. Aster atticus herba quam & bubonion, quasi dicas inguinariam, ea ipsa de causa uocant, non solum illitus, sed etiam contactus, bubonibus auxiliari creditur. Phymata autem priuatim discutit adianthum si illinatur, atriplex, parietaria, altheæ radix uino incocta, ammoniacum

cum melle emollitum inductumq; uiscus cum resina, cerator
que. Rumpit autem abscessum propolis, lupini amari ex aceto
illiti, cucumis sylvestris radix, terebinthina excepta, capparis
radix similiter, nitrum cum fermento, aut ficis.

† In antiq. codicibus quædam leguntur quæ in uulgatis exē
plaribus desunt. Phygethlon enim ita describitur, φήγεθλον δὲ
τὸ φλεγμονώδες ἐν τῇ ἰνδῶ, ἢ ἐν τῇ πελαγονίᾳ φλεγμονὴ τῆς
ἀδένος i. Phygethlon autem est erysipelas phlegmonodes, uel
erysipelatodes phlegmone glandulæ.

De furunculo, qui dothien appellatur.

Cap. XXXIII.

Furunculus, tumor est abscessum præ se ferens, qui ex
crassis humoribus in carnosis plerunq; partibus conci-
pitur, mitis quidem, cum in sola cute coijt: perucax au-
tem, malignusq; ubi subter actis radicibus in superficiem erū-
pit. Dissipat autem furunculū, triticum mansum & imposi-
tum: mastichæ ægyptia, uux passæ quibus acini sint exempti
cum sale tritæ, ac admotæ hunc aut disijciunt aut rumpunt, uel
siccæ fici hydromelite incoctæ imponuntur, uel resina ficis mi-
sta inducitur, uel ipsæ ficus siccata cum fuerint pingues disse-
ctæ, uel fermentum cum nitro, uel lini semen cum melle, uel
alterci folia, trita cum butyro. Composita uero hæc proficiūt,
quod ex fermento, quod polline farinaceo constat, & quod pri-
uatim à furunculo græcè dicitur dothienicon, fomenta autem in
adhibentur ex spongiis mollibus continuè calenti aquæ intin-
ctis, deinde sic medicamenta iniiciuntur.

De terebintho.

Cap. XXXIII.

Oribasius terebinthum sanè phymatis speciem esse af-
firmat, in cuius extima parte pustula nigra incumbit:
hac supra id quod subiacet abraso simile apparet. ubi
scalpello diu seris, pus inuenitur. Dioscorides autem Alexan-
dræus literis mandauit terebinthos cutis esse excrescentias, ro-
tundas, nigrouirides, terebinthi fructum referentes, atque has
aliis phymatum tumoribus similiter curari censet: auxilia ex
supra comprehensis huc transferenda.

De carbunculo.

Cap. XXXV.

Cum sanguis magis melancholicus effectus inferuescēt
que aliqua se parte receperit, carbunculus fieri solet,
quod

quod ulcus est crustaceum plerumq; à pustula ambustis confis-
 mili, interim uerò & sine hac incipiens. Cæterum inter initia,
 quibus hoc malum instat, in particula omnino pruritum sen-
 tiunt, deinde pustula, nunc una, nunc plures tenues exoriuntur,
 miliorum quorundam instar: quibus perruptis, similiter cru-
 staceum ulcus prouenit, quale ferramenta candentia excitant,
 modò crusta ipsa cinereum colorem, modò nigrum præferere,
 sicut inferiori carni cõtinau adhærescat, & quodam modo af-
 fixa sit depascaturq; Reliqua autem caro circumposita, feruili-
 dam refert inflammationem, quam Græci phlogosim appel-
 lant, & colore nigrescit, splendetq; bituminis & picis modo.
 talis autē est bilis exactē atra. Verum carbunculi, qui carnem
 inuasent, confestim circūscribuntur: qui mēbranas, neruosq;
 occupant, diutius remanent, luemq; subiectis corporibus im-
 partiunt, ut etiā inflammationes quæ erysipelatis naturā reli-
 ppiant, in ipsis excitentur, plerisq; itidem in suppurationem cō-
 uersi sunt. multis febres simul accedunt. Iam uerò carbunculi
 ex causis populatum grassantibus excitantur. Curatio ipso-
 rum, nisi admodum fuerint exigui, à uacuatione sanguinis è uena
 ad animæ defectionē usq; dimissi, tentanda est: mox scarifica-
 tus rectē accommodatur, plagis ob succi crassitiem altioribus:
 particulæ laboranti inducuntur, quæ modicē reprimunt dissi-
 pantq; tale est cataplasma, quod ex plantagine & cocta lente
 cōstat, quod recipit panis furnacei micam. Est autē panis, nec
 omnino à furfure purus, nec nimium eius habens, super ipsum
 uerò ulcus ualens aliquod medicamentum imponitur, cuius-
 modi est Andronis, Pasonis, & Polyidæ, diluiq; id uino aliquo
 dulci, ad sordium spissitudinē debeat. Item massalioticum ari-
 dum, uel & ipsum similiter dilutum. Item radix dracunculi,
 uel aristolochiæ, uel liquor silphij, uel cirenaici, singula ex ace-
 to probè delinentur. At quæ erysipelatis naturam referunt, su-
 præcomprehensis ad id uitii remediis perungentur. Quæ ue-
 rò partes confortii lege affici putantur, succidis lanis ex cene-
 læo madefaciendæ sunt. Vbi iam ardor acquirerit, carbuncu-
 lis iniiciuntur cerata cephalica, diluta, illitaq; in linteolis. genē-
 rosissimum est quod herbis, tum illud quod nitro constat, item
 arida ulceribus depascentibus dicata, per se, & cum rosaceo.
 Cum autem durities remanet, utemur melino Serapionis, ope-
 ram adhibentes, ut quàm celerrimè carbunculi suppurent.

Quod

Quod quidem fiet, si die bis noctu semel tum cataplasmata tū
medicamenta mutes. At quò radicitus carbunculos diuellas,
dirimasq; ab adiacentium commercio, malum punicum acidū,
minutatim concisum in aceto coques: ubi intabuerit, in læ-
uorem deteres, linteoq; illitum induces: cum successit, aceto
humectabis. Item nucis auellanae ueteris uel etiam non uere-
ris medulla carbunculos maturat rumpitq;. Hoc præstant &
cupressi folia, tum germina, nouelli & molles galbuli cum po-
lenta, uua acinis uacua, ficus siccatae uino incoctæ, papaueris
ceratidis flores, liquor silphij, cum ruta & mellis momento,
pix liquida cum uuis passis, & suilio adipe.

Ad carbunculos uehementer efficax.

Argenti spumæ libra, olei ueteris libra & semissis, auripig-
menti uncia. Oleo cum argenti spumadum manus nō in-
quinet incocto, sublatoque ab igne, auripigmentum adiicitur,
rursusq; medicamentū coquitur donec nigrescat, tritis in pila
utitor in linamenta filatim carpta illitis.

*Ad gangrænas, ulcera uetera; chironia, strumas, po-
dagram: priuatim uerò ad carbunculos,
præsertim eos qui palpebras
infestant.*

Olij, acaciæ, misyos tosti, squamæ æris, singulorū drachmæ
duæ, atramenti futorij drachma, alterci seminis drachma,
tritīs ex aqua utitor, probè facit & tetrapharmacū quod quin-
tam thuris partem contineat. Aduersus naturalium carbuncu-
los, chalcitidis, atramenti futorij, singulorum drachmis octo,
aphronitri drachmis duabus, ex aqua tritis utitor. Valet stercus
quoq; ouillum, torridum cum melle. In Alexandria Serapiade
quæ orchis & triorchis dicitur uiridi, cum micis panis, cataplas-
matis modo utuntur ad carbunculos, omniaq; crustosa. Vbi ue-
rò crusta exciderit, communis ulceris modo curabis.

De cancro.

Cap. XXVI.

Cancer in qualibet corporis parte oriri consueuit, liqui-
dem in oculis, & uulua, quemadmodum in ipsorum ca-
pitibus expositū est, aliisq; pluribus particulis, sed præ-
cipuè in feminarū mammis accidit, quoniā natura fungosæ &
inanes, crassissimam atq; bilis, unde hoc uitii cōtrahit, materiā
promptè

promptè possunt excipere. ex eo. n. humore cū referbuit, cācri proueniūt, atq; si acrior illa fuerit, cū exulceratione. Quapropter colore magis q̄ inflāmatione nigricāt, sed ita ut tantam caliditatē nō experiātur. Venæ aut̄ quæ circa sunt intumescūt, intēdunturq; , cancri animātis pedū modo, unde & appellatiōnem hanc uitū est sortitum. Nonnulli uerō inde sic nuncuparunt, q̄ difficillimē ab his partibus quas obsēderit, euellatur, quemadmodū cancer aquaticus animās. Hoc malū planē propter succi crassitiē nō conſanescit, utpote quod nec repelli, nec discuti queat, nec totius corporis purgatione cedat, uel quod etiam mitiora negligat remedia, uehementioribus autē irritetur, excandescatq; . Prima sanē cancri initia prohibere, ne augeſcant, licet si melācholicus humor prius uacuetur, quā in affecta particula radices subter egerit, impactusq; sit, uacuatio quidem primum tentāda est, sanguinis dimissione, si nihil prohibet, mox purgatione, per initia quidē ex simplicioribus petita, quale est epithymon, quatuor drachmis, & S. in sero lactis, aut mulsā exhibitum. Deinde ex hiera, quæ nigrum ueratrum recipit. Loco autem dolenti inductum subsequens remedium, sine dolore facit exulceratis: solani succus linteo molli duplici in eum tincto imponitur. Extrinsecus autem lana molliuscula, & ipsa succo imbuta circumdatur, cura adhibita, ne hæc siccescant secco, cōtinentius superfuso. Iam uti diutius poteris in cācristis exulceratis medicamento quod pōpholyge cōstat. Nec inepta sūt, q̄ tertio uolumine de uuln̄ cācristis p̄didimus.

Ad carcinode, malignaq; tum ad sedis tuberosa ulcera, item ad naturalium uel testiculorum, uel mammarum inflammationes.

IN plumbea pila pistillo plumbeo lemniam sphragidem ex posca, & mulsā, uel lacte conterito, ut nigrescat: uel rosaceo, uel immaturo oleo, succūe semper uiui, uel cotyledonis, uel lactucæ, uel psyllii, uel uinz acerbæ tritam similiter inungito. Crebrior uictus ægro dabitur, ptisanæ cremor, lactisq; serum, ex oleribus malua, atriplex, bletum, cucurbita, piscium saxatiles, omnis generis aues præterquam palustres.

Archigenis ad carcinode, & maligna ulcera.

CANCROrum fluuiatilium crematorum, & cadmiæ par modus in pollinem coactus inspergitur, aut cancrorum cinis unā cum

unà cum cerato inducitur, item erysimi semen detritum cum melle accommodatur.

De molli & laxo tumore, qui œdema Græcis dicitur. Cap. XXXVII.

CVM de tumoribus qui succis calidioribus contrahuntur, disputatū sit, iterū de cōtrarijs agemus, ab eo quod Græcis œdema dicitur, exorſi. Quemadmodum. n. ex biliosa fluxione, erysipelas, ita ex pituitosa, œdema laxus quidam atq; indolens tumor excitatur. Equidē scimus aliter quoque œdemata prouenire, nempe in pedibus, in aquæ subter cutem affectibus, habitu corporis contabescēte, qui phthoe Græcè dicitur, & malo, qui cachexia. Atq; in illis quidē tumor hic affectus qui hominem premit accidens est, nullā seorsum, curationem propriā postulans. Satis. n. est, si quidem curatione egebit ipsa tum crura perfricare oleo cum sale, aut etiam oxyrodino sal habente. At si ex pituitoso humore in particulam influente œdema constitit, abundē quandoq; est spongia posca imbuta, cum ligamento leuiter stringente imposita, quæ ab inferiori parte incipiens, suprà finiat. Esto autem spongia, modò conductura sit, recens, si huius copia non est, eam, cuius erit facultas, detergebis, expurgabisq; nitro, magisq; aphronitro, & lixiuio. Quod si per hæc tumor non subsideat, paululū aluminis iniicies, commodum autē est tenerimū ellychnion, posca madens impositum: bonū est, & glaucium. Quod si in uerustatē œdema inciderit, parti oleo prius inunctæ spongia ex lixiuio imponitur, eiusq; uiolentiorē cōstrictione curatur. discutit autem, ac comprimit tumores laxos cedentesq; quælibet terra illita, magisq; Aegyptia, tum isatis domestica.

De inflatione.

Cap. XXXVIII.

INFLATIO ex flatuoso spiritu nunc sub cute, nunc sub membranis, quæ ossibus circundantur, & musculis, collecto, nascitur. Porro is colligitur aliquando in uentre & intestinis, itemque in medio horum spatio & membranz; quæ peritonæos dicitur, ut in aquæ subter cutem genere, cui nomen est tympanias. Differt quoque hæc ab œdemate, quod pressa digitis, fossulam nō repræsentet, & sonitum tympani modò ædat, Membretum autem densitas, tum spiritus simul crassities efficit, ut idem spiritus non dissipetur. Vnde curandi ratio huic dirigenda

rigenda est, ut membra rarefacias, crassiorémq; spiritum extenues, quod medicamenta tenuissima & potestate calida praestant; atq; in uentre quidem & uisceribus oleum tenuis quod ruram habet incoctam, aut aliquod ex calidis seminibus, qualia sunt, cumini, apij. Interim uero & cucurbita iustae magnitudinis citra curis incisionem umbilico bis, ter uel defixa, inflatio nem discussit. Masculis autem ex contusione, quemadmodum propulsu inflatis particulas calidis nimium, & acris ex candescere contingit. Quare per initia medicamenta quae magis leniant adhibenda. Vbi facta est inclinatio, ea quae discutiant, Utendum igitur sapa, cum olei momento, ac ex lanis succidis calida excipiantur, uel etiam ceratum ex œsypo admiscetur, cura adhibita ut caliditas permaneat, frigus enim non conducit. Vbi iam æger lenitus, sopitusque est, acetum admiscetur, & nitrum, aut aphronitrum, deinde & lixium. Postremo emplastris utendum quæ discutiendi uim habet, quo inflatio subfidat, quale est quod sequitur. Sordes balnearum subseruefactæ percolantur primum, ut puræ euadant, & rursus lebeci iniiciuntur, tritaq; calx restincta farinae modo etiam inspergitur, dum luti fiat spissitudo, ac utor. Hoc efficacius est medicamentum ex lycomoro compositum.

De intortis & contusis.

Cap. XXIX.

Articulis intortis, contusisque faciunt lanæ succidæ, aut sponsia oxelæo imbuta impositaq; ite bulborum elixorum pars tenerior cum melle, uiticisq; folia, sal nitrû tostû, læuigata cû cerato inducuntur. Iâ superfusio aque dulcis, aut marinæ calentis utiliter adhibetur. Vbi uero inflammatio, & dolores cōquierint, intortæ partes etiâ rectè perfricantur.

De carne contusa, & sanguinis subter cutem coitu quod

Græce ecchymoma dicitur.

Cap. XXX.

Carne à graui quodam corpore, quod extrinsecus super inciderit contusa, uenisq; exiguis indidem diuortium expertis. sanguis profunditur per subsultum, quod Græci κατὰ διαπύδριον appellant, unde sub cute collectus, chymoma dictum efficit. Cute inquam, non diuisa, tanquam tumor tactu mollis & cedens, comitatur, liuidus, & magna ex parte indolens. Eò igitur animum tendimus ut sanguinem qui continetur dissipemus, idque confestim priusquam nigrescit.

rit. Per initia sanè nonnihil ex astringentibus, iis quæ discut-
tiunt, admiscere oportet, eò quòd tunicæ uenularum contusa
densationem requirant: inde etiã solis discutientibus sine altri-
cione utemur, ac scarificatis initio ecchymomatis, ita subse-
quentem curationem accommodabimus. Ad inueterata autẽ
ecchymomata, raphanus applicatus prodest. Quippe discutit
ea ubi erodere inceperit, aut raphani succus, cum micis panis
inductus. Cæterum ecchymomatis species sunt, suggillata, &
liuores ex ictu, hypophagmata dicuntur. Item sanguinis in-
ter ungues concursus ex percussu proueniens, de quibus priu-
tim tertio uolumine dictum est. Verum de unguum uitiis, in
parte chirurgica disseremus.

De ruptis & auulsis.

Cap. XXXI.

Ruptio cum ecchymomate prorsus accedit: curantur autẽ
medicamentis mediocriter calefacientibus, quale est ex
nigris populis acopon, aliãq; huic cõsimilia. At altiori-
bus rupturis magis acria, magisq; incidẽtia accomodantur. Ta-
libus sanè & cucurbitulæ usus proficit. Ergo si euocatũ celeri-
ter per halitũ ecchymoma torum est, faciliẽ dehiscens ipsa ca-
ro coalescat. Sin longiore spatio sordes copiosa succreuerit, ru-
ptum deinceps coire nõ potest, sed tantũ propè ipsius labra ad-
mouentur. quo fit ut leui momento ea faciliẽ separentur, &
medius inter ipsa locus superuacuo humore repleatur, nihilq;
aliud, quàm assidue nouũ quodãmodo ecchymoma creetur, pri-
mo persimile, nisi quòd citius quàm illud dissipetur, utpote ex-
tenui magis sanie nunc cõstans, cũ per initia è sanguine ecchy-
moma esset. Conuulsum autẽ fibris quibusdã laceratis distra-
ctisq; leniri tantũ desiderat, quoad dolor sopiatur, quippe con-
g'utinari nequeunt. Itaq; Aristolochia rotunda ruptis conuul-
siq;ue, si quid aliud, idonea est: similiter centaurei maioris radix
cũque succus, rheum, costus, bdelliũ cum oxymelite pota.

De scirrhus.

Cap. XXXII.

Exactus quidem scirrhus, tumor est præter naturam sen-
sus expers, & durus: non exactus autem uix sensibilis est.
ac qui sensu uacat sanari non potest. qui ægrè sentitur,
uix sanescit, si quidem humor unde huiusmodi uitium contra-
hitur glutinosus crassiusq; est, qui particulis quæ scirrho ob-
ducuntur impactus solui consumaciter repugnat. Est cum
statim

statim ab initio constituitur, augeturq; , plerunq; uero à medicis qui erysipelata & inflammationes uehementer refrigerauerint; astrinxerintq; , originem sortitur . Quòd si quis ea quæ uelenter discutiunt medicamenta , partibus scirrho obductis admoueat, huic paucis primis diebus, manifestò scirrhus decreuisset uidebitur . Cæterum quod de affectu restat, id reddit insaniabile. siquidem toto quod in eo subtilissimum erat dissipatum, quod reliquum est desiccatum , ceu lapidosa concretio relinquetur . Quapropter conuenit discussorium aliquod medicamentum, & emolliens habere, quod non ualide calefaciat atque desiccet . Huius autem generis sunt medullæ omnes, magisq; ceruina, & uitulina . Ex adipibus commendatur, leonina, pardalis, ursina, deinde taurina. Inter aues anserina, & gallinacea & phasianica, sicciorq; caprilla, & hircina. Ad hæc ammoniacum suffimen, bdellium maximè scythicum, styrax qui humentior est & pinguis : ac Aegyptiaca mastiche . In aliis sanè particulis scirrhum expertis his seorsum utendum est, tum iis quæ inde componuntur . uerum in tendonibus & ligamentis, lapis ignis candens , aceto acerrimo extinguitur , & siquidem haberi potest, pyrites: sin eius copia non est , molaris , in quo pars affecta commoueri debet, ut uaporem ascendentem recipiat, atq; inde rursus medicamen quod emolliat imponitur, oleo tamen tenui non aqua quotidie ab initio per totum morbi curriculum pars affecta perfunditur: interim oleo in quo althææ radix ac syluestris cucumeris sit incocta . A balneo autem in totum ægri abstinebunt, uel certe frequenter, sed posteaquàm scirrhus emollitus fuerit, ammoniacum pinguißimum aceto quàm acerrimo maceratum, particulæ sat multis diebus inungitur. Deinde rursus emollienti medicamine utendum, quod receperit galbanum, & opopanaxem , eaque pinguißima eiusmodi uero sunt potissimum, ex petasone confectum, & quod ad Amythaonem refertur, & strumus dicata medicamenta.

De strumis .

Cap. XXXIII.

Strumæ glandulæ sunt scirrho induratæ ; quæ in ceruice, alis & inguinibus maximè nascuntur . Curatio earum, eum illa quam in scirrhis tradidimus cõmunis est . Priuatim uero lupinorû amarorû farina ex oxymelite cocta applicatur, ea quoque phymatis p̄oficit : uel bouillû sterqus aceto inco-

incoctum inducito, id etiam tumores scirrosos omnes dissipat probè autem discutit strumax calx uiua melle, uel gymnasiarum sordibus excepta, uel oleo, uel adipe suillo: aut calcis nitrique par modus, nasturtij, & scœnugræci quadruplum cum melle, malagmatis modo imposita duritias dissipant, in pus conuersas rumpit loliacea farina cum fimo columbæ & semine lini uino incocta, grossi syluestres, & satiui, aut nasturtium album detrutum cum pice liquida malagmatis forma applicatur, aut cucumeris syluestris radices siccæ, lauri foliorum siccorum cōcrematorum cinis cum terebinthina inducitur, aut pediculariæ herbæ, & nitri æquale pondus, erucæ duplum cum resina iniicitur, aut sterus caprillum bouillumve aceto incoctum, aut erui farina in urina pueri uenerem non experti macerata excepta; pice, cera, & oleo liquefactis, aut anguem mortuum in ollam coniectum gypsosq; oblitam in fornacem mittito, concremati cinerem æquali scœnugræci pondere misceto, melle excepto utitor, item quod aspidibus constat medicamentum, mirificæ uirtutis est, tum quod ex struthio conficitur, tum quod cucumeri syluestri, tum quod cedrio liquore confit: strumas ad suppurationem perducit, aut diffundit hoc, myrrhæ drachmæ decē, ammoniaci thymi amatis drachmæ septē, uisci quercini drachmæ octo, galbani drachmæ quatuor, propolis drachma, in pila contunduntur. Ad strumas mammæ duritiasque proficit subscriptum medicamentum, uisci elaborati, resinæ siccæ, ceræ, singulorum pondo, galbani quadrans.

Ad strumas exulceratas, & sine ulcere.

Ceræ, resinæ pityinæ, adipis suilli insulsi, marrubij, æruginis rasæ, singulorum selibra.

Medicamentum ad strumas, quod dicitur cheradicum.

Olei ueteris pondo dua, ceræ pondo, colophoniz triens, nitri, tantundē, alia duodecim membranis detractis in oleo per triduum macerantur. deinde cocta cum fricta fuerit, projiciuntur, eliquatis oleo postquam ab igne amoueris, nitrum tenuissimum inspergitur: rumpit etiam abscessus. **A L I V D.** Cineris è ficu unciz duæ, aluminis scissi uncia, aphronitri tantundem, picis liquidæ unciz septem.

Exedens cheradicum.

Aluminis scissilis, sandarachæ, singulorum drachmæ quatuor

tuor, squamæ cr̄is drachma, auripigmenti tantundem, arido strumas conspergito, at si canceri naturam induerint, rosaceo maceratis bis d̄e uritor.

De stratomate, atheromate, & meliceride.

Cap.

XXXIII.

CVM hæc quoq; inter abscessus, que admodū in illis dicebamus, habeantur, singula propriam appellationem à similitudine rerū quę in tumoribus cōtinentur, sortita sunt. Alij siquidē ipsoꝝ ueluti pingue quiddā seu adeps subest, alij melli simile quippiā, alij quasi tenuis pulcicula. Consilium igitur curationis est cōmune, ut quod tunica illa contineat, discutiatur, aut medicamētis totū exedatur, aut sectione auferatur. Quidā. n. ex iis tumoribus triplici hac ratione curantur, ij nimirū qui liquidiorē humorē continent, qualis est meliceris: aliqui duplici tantum ut atheroma, quod & sectione auferitur, & medicamentis exeditur, stratoma uerō nec discuti, nec exedi potest, sed manu duntaxat curatur. Quomodo autem unumquodq; horū agnoscas, in parte chirurgica edocebere. At medicaminū, quę dissipādū uim habēt, materiā, ubi actū est de strumis, reperies. Priuatim uerō meliceridas hoc dissipat uix passæ acinis exemptis octo, squamæ drachmæ tres, parte fomentis prius lenita imponitur. **ALIVD.** Ladani, bdellii, galbani, ammoniac: thymamatis, propolis, terebinthinæ, singulorum æqualis portio in pila contonditur: facit etiā strumis, parotidibus, furunculis, phymatis. Ad Archigenes contra meliceridas cōmendat aphronitrū & ueratri partē duplam, cū cera to duriore impositā, exedentibus autem in cute circūdata, uti non licet. Hac igitur prius meliceridas, atheromata, uel etiam strumas medicamentis adurentibus detegere oportet, simplicius illorū est quod recipit calcē uiuam, saponem & lixiuiū, Variū autē magis, quodq; reconditū seruari potest, capit calcis uiuæ drachmas quatuor, sæculæ quæ est sex uini combusta, nitri liquidi tostī singulorum drachmas duas, minij drachma, lixiuiō teruntur: ubi mellis liquidioris crassitudo facta est, ter uesfacito, ut mediocrem spissitudinem habeat, pixide plumbea reposito, lixiuiā super distillans ne subito exarescat. ualet quoque ad uerrucas, myrmecias, pterygia, clauos, callos, cicatrices supercrescentes, sæcula bimestri non ueustiore cutem delinito: ubi

to: ubi arescere inceperit, spongia elorā rursū perungito: ubi nigruerit denuō ablues medicamentis crustam inducentibus: postquam autem crusta deciderit, exedentia adhibentur. Medicamentum exedens ualidē citra rosionem, squamæ æris drachmæ quatuor, sandarachæ drachmæ duæ, ueratri nigri tantundem, cum rosaceo utitor. *ALIVD.* Squamæ, sandarachæ, urticæ seminis torrefacti pari mensura cū rosaceo utitor. *ALIVD.* Erynaceorum combustorum, sepiæ testæ, auripigmenti equale pondus ex rosaceo: quæ ambiunt partes orbiculatim omnes prius delinito cerusa cum oleo. Item efficax est compositio ex calcis uiuæ partibus duabus, chalcitis parte una, auripigmenti parte una.

De fauis.

Cap. XXXV.

FAUUS qui Græcis cerion dicitur, tumor est, qui in cute foramina habet, per quæ humor crassitudinem mellis referens excernitur: rectē igitur ipsi imponūtur uuæ passæ cū ruta, aut fici folia mollissima cū melle, aut nasturtium cū linī semine ex melle, aut cucumis domestici radix cum melle, aut sulfur uinū cū cerato, uel terebinthina. Cæterū uariam magis fauorum curationē molire, si quæ tertio uolumine de manantibus capitis ulceribus dicta sunt, in hunc locum transferas.

De simplici ulcere.

Cap. XXXVI.

QUONIAM simplex ulceris cōtinui solū est diuisio, si quis partes diductas fascia orbiculatim circumdata cōmittat, utiq; citra aliquam aliam molitionem coalescēt. Cum uerō alterum ulceris os in obliquū spectauerit, inde deligaturam tentare & in contrariū ducere oportet: cum utraq; illius labra eō uergant, à duobus principijs incipiendum est, & ora sic adducenda. Nam cū nihil intra oras inciderit, nempe pilus aut arena, aut oleum, aut sordes, aut id genus aliud, omnino ulcus concresecet. quod si magnum sit, adeo ut diductæ partes in totum prædicta deligatura cōmitti nequeant, futuris ipsæ prius adducentur, deinde sic deligatæ, glutinatoriis, ut uocant, præfidijs utemur, quæ collectam humorum subluuiem desiccare & consumere queant: aliam, ne influat, prohibere.

Quæ ulcera glutinare possint. Cap. XXXVII.

QUÆCUNQUE folia applicata ulceribus glutinādis sunt. Itē salicis, brassicæ, oleaginis fruticis quæ chamælaea di-

citur & fructus & folia & cortex, succusq; austerioris plantaginis papyrus, posca aut uino imbuta & in orbē circumdata. Recens ulcera glutinant pini & piceae folia, cortexq; recens ligamenti modo circumdatus cū aqua aut posca, aut uino caseus recens laeuigatus: extrinsecus imponuntur, folia rumicis aut uitis aut betae, aut lactucæ. At ex acido lacte caseus qui oxygalactinus dicitur, uulnera quoq; ampliora committit pira syluestria quæ achrades dicuntur, fluxionem reprimunt. equisetum si applicetur, etiam si nerui fuerint præcis, isatis satiuæ in duris corporibus ulcera etiam si musculorum capita affligant, idem præstat, cupressi folia, germinaq; & nouelli galbuli mollesq; etiam duris corporibus proficiunt, sed miscendus est pollen farinæ, qui à pariete propinquo molæ assumitur, myrrha cū aqua illita, uel lachryma thuris, terræq; lumbrici etiam neruorū præcisiones glutinant, pentaphylli folia cū melle, alia cōbusta applicata. In ueteratis ulceribus anagallis prodest cū cerato. hordeū combustū, & cerusa cū myrtei cerati triplicato pondere. Ad capitis ulcera ualet, myrrham aridā inspergere non madefactā, quippe celeriter contrahit, uel aloen aridā, uel aristolochiam tritam & melli ex uino incoctam dum mediocris fuerit spissitudo, in linteam illinens applicato. Composita autē ad glutinandum sunt Barbara, Chryse, Nicblai. item dia iteon quod salicibus, diadictamni quod dictamno constat, atq; alia his consimilia quæ magnis potissimum uulneribus glutinandis sunt.

Si dolor & inflammatio ulcera exerceat.

Cap.

XXXVIIII.

SI dolor & inflammatio uulnera obsideat, usus est medicamentorum quæ desiccant, atque inflammationem arcēt. Ex liquidis igitur laudatissimum est uinum, deinde posca. Si uerò etiam cum sordibus inflammatio infestet, mulsa aquosa conuenit. Ex ijs autem medicamentis quæ siccandi potestate prædita sunt, communiter quidem conferent, inflammationibus dicata, si oleosa acriaque excipias: priuatim hoc proficit, malum punicum dulce uino incoctum tritumque applicatur, mirabile nimirum & multiplici usu commendatum est remedium, facit enim tum ad capitis, tum naturalium ulcera, tum ea quæ toto corpore excruciant, oculorumque inflammationes. At si erysipelas, aut eiusmodi quippiam ulceri accesserit,

rit, ijs utendum præfidiis, quæ aduersus illa inscripta sunt.

*Si maturari, & ad suppurationem perducı ne-
queant. Cap. XXXIX.*

Recentia quidem ulcera, & ꝑ inflammatione adhuc occupentur, nõ suppurantia, cõcoquit maturatq; ex simplicibus, aqua temperata superfusa, farina triticea, uel chondrus, uel panis, uel glutinũ librariũ, cũ terebinthina obducta, item cera, crocus, lachryma thuris, uix, rosaceũ, adeps suillus, uitulinusq;. Inter cõposita uerò tetrapharmacũ quod lintheolis illinitur, rosaceo subactum. Vetera aut̃ & callosa maturant, simplicia quidem uua passa domestica, styrax, galbanum, myrrha, ladanum, pix, resina, butyrum, mastiche, ægyptiaca, & æsypum. Composita uerò ex resinino, dictum aceroni, absq; cera, quod ad Galenum authorẽ refertur, si lintheolis illinitur, oleo ueteri aut resinino solutum. item quod à duplici colore dichromon dicitur, pari modo & basilicum, similiaq;.

De causis ulceribus. Cap. XL.

Cauum ulcus carnẽ quæ periijt restitui postulat. cuius generandæ materies sanguis moderatus est, & probus. Huius igitur mediocritatẽ ex alimẽto sufficienti cõtuliabimus, tẽperie uerò probam ex bonis ciborũ succis, & proba particulæ in quo ulcus est tẽperatura. At in recremento quod euacuetur, tenuẽ quidẽ, humidũ ulcus reddit: crassum uerò, sordes, circum ipsum coalescentes, eoq; medica mẽtis æger quæ modicẽ siccãt purgantq;. Eiusmodi sunt lachryma thuris, hordeacea farina, eriorumq;, fabarũ lomentum, iris, aristolochia, cadmia, panax, & pompholyx. Quod si nihil medicamentum ad creandã carnẽ inductũ proficit, ad aliud sic digrediendũ est. At si plusculũ sordis sit, humidiusq; ulcus, sciendũ uenit medicamentum intra modum desiccasse, intendendumq; esse ipsũ mellis mixtura: sin purũ & absq; humore cernitur, ultra, ac conuenit desiccauit, ac oleo pleniore dilutũ ceratum inducere oportet. Accidit nõnunquã carnẽ à medicamento ualẽtiore colliquari, ut sordidũ humidumq; ulcus appareat, quemadmodum ab ijs quæ minus ac par est, desiccant. Verũ hoc ulcus dum consumitur, cauũ magis euadet, labris prætumidum, rubens præterea & inflammationis particeps sæpe uerò æger manifestã erosionẽ percipit. Alterũ illud quod à parũ siccantibus remedijs hume-

scit, nihil horū succidaneum habet. Putrilago igitur lignorum, & potissimum eorum quæ moderata astringendi abstergendique uirtute donata sunt, quemadmodum & ulmus, purgāt ulcera, puraq; iam facta carne replent, uel anemonæ appositæ, itē piceæ cortex deraſus, tritusq; cū cerato & linteolis illitus cauis ulceribus auxiliatur, & præſertim recentibus, ut quæ carne deſtituta reſiciat, repleatq;. Cōpoſita uerò, ubi pura quidē sunt ulcera, accommodantur, quod oſtreis conſtat, quod Manathoni adſcribitur ex uini ſæcula, & quod ex aloë conſcitur, quod Melitera appellatur aridum, & quod amyli, mannæ, thuris, alicæ, erui, pares portiones recipit. ſimiliter quod ē thure conſit, & aphroditarium. Sin autem ſordibus magis ſcateāt, cephalica appellata arida conueniunt, & quæ linteis illinūtur, ut Trophos dictum, Iſis Athene, ex atractilide præparatum, Italicumq;, & quæ experientia comprobauit.

Quæ ſordida ulcera purgent. Cap. XLI.

Sordida ulcera ſiue caua, ſiue plana fuerint, probè purgāt ariſtolochia cum melle, terebinthina cum pari roſaceo & melle, uel loco roſacei butyro, iris illyrica ex melle, oliuæ colymbades applicatæ. Ad ea uerò quæ neruoſis obueniunt, terebinthina cū butyro liquefacta: ſordidis nimium & depaſcētibus benefacit marrubiū cum melle. hoc etiā cruſtas deiicit. Cōpoſita autē remedia hæc ſunt, amurcæ coctæ, mellis deſpumati, aluminis phorimi, hoc eſt liquidi, paria pondera ALIVD. Serapiadis herbæ, quæ & triorchis dicitur, ſiccæ, iridis illyricæ, marubij ſicci, ariſtolochiæ, ſingulorum drachmæ octo, erui farinæ drachmæ decē, arido utitor & cū melle. Inſuper ad ſordida ulcera facit tum Aegyptia, tum ex ſale cerata liquefacta, tū Indice, tum Athene, tum uiridia diluta. Ad hæc, quod pumice conſitet, & ex eruo, ſicca, paſtillusq; melanchlorus, hoc eſt, nigro uiridis, ſimiliter etiam Criogenes appellatus.

Ad ulcerum uermes. Cap. XLII.

AD uermes qui in ulceribus procreantur arcendos, primum quidem eſt, ut humiditatem putredinemq; eorū opificem tollas. Cæterum necant uermes communiter quidem omnia quæ ad aurium uermes inſcripta ſunt. Ad eos autem qui ulcera infeſtant, Archigenes commendat ceruſam, pollumq;e, pari modo cum pice liquida illitum.

Quomodo

Quomodo caro ulceribus supercrescens exedatur. Cap. XLIII.

Supercrescens ulceribus caro medicamentis quæ ualenter exiccât tollitur, cuiusmodi est diphryges inspersum squama æris, omniaq; testacea cōbusta, & erinacei cōcremati utriq; cū toto corpore. Verū hæc modicè purgant, & supercrescentia cōtinent. Asæ uero petræ flos, ualidior est, hoc magis foris, chrysocolle, chalcitis, misy: cōbusta minus rodunt: item æris flos: similiter ærugo oībus est ualentior, sales aut cōcremati, humentes, & flaccidas carnes cōsumunt, sic ēt linamenta carpta ē panniculo, muria acriori imbuta & reficata, quæ si imponâtur, mediocres carnū supercrescentias exedunt. Aerugo, cum æris squama interea refertur quæ ualidè excresecētia supprimunt. Cōposita Rhoda (ut dicitur) arida, psaron, ad hæc, xanthon, sine morfu retinēt. At maximas carnū excresecēcias, adusq; penitiora crustis obducūt, pastilli Faustiani, triti inspersiq;, & medicamētū, quod à solis æstu heliocaes dicitur, aridū. Adde his quod recipit calcis uiuæ, squamæ æris, & mannæ thuris, pares modos. Idem ea quæ nimium excreuerunt, fungisq; respondent, cum melle, purgat: cum cerato, carne replet.

Arida compositio ad carnem compescendam.

Argenti spumæ, chalcitidis, æruginis, plumbaginis, singulorum æqualis portio. ALIUD uehementer reprimens citra rosionem, ualet quoq; ad pascentia ulcera, & præsertim gingiuarum uicia, quas epulidas uocant, necnon ad dentium candomem. Calcis uiuæ pondo, auripigmenti selibra, hoc auripigmentum siccū, inquā, ex aqua detriticū calci uiuæ, cadmiæ modo lotæ adiicitur: in puluerē radaetis siccis utitor, ex pastillis autē, tum qui Pantolmius dicitur, tum qui ad polypū inscripti sunt, pulchrè coercent, sic emplastra uiridia & præcipuè id quod ex sale Cappadocico præparatur, similiter, & isis summè carnem supercrescentem in ulceribus continet.

De ulceribus serpentibus, & putridis, & phagedæna. Cap. XLIIII.

Superfusiones utiles sunt ulceribus depastis, putridisq;, ex aceto, poscæ, aut uino astringente, aut aqua frigida, aut marina, aut decocto lenticulæ, malicorij, balaustij, lentisci,

myrti, spinæ ægyptiæ, aut aliquo ex ijs quæ astringunt, & sic-
cant. Cataplasma his ipsis exhibetur ex farina erui, alumine li-
quido, panis filiginei mica, gobio ueteri, aut alio fassamento
ueteri carnis illotæ, terebinthina liquida pari pondere detritū,
uel aristolochia, uel reciniorū foliorū succus æqualis, ærugi-
nis pars dimidia, ex aqua ut mellis sit spissitudo illinitur: si cru-
sta nō deciderit, elaterii parē modū ærugini admisceto putri-
dis efficax est fori si tritū insperga. Et sup linamēta carpta ari-
da, uel aristolochia rotūda, uel gallæ, æquo pōdere cū oleo illi-
nuntur, uel cucumis syluestris radix, uel brassicæ, uel betæ, uel
cucumeris folia, illigata calidis cineribus recōdūtur. Vbi uerō
emollita fuerint, cū sale trita imponūtur, ualēterq; repurgant:
uel oleæ summitates in uino decōctæ cū melle inducūtur: uel
chalcitis applicat, uel apii semē cōtritū, uel lini semē læuiga-
tum, cū atramēto sutorio inducit, uel thymū, uua passa, & ficus
incoctæ applicātur, aut fici folia in læuorē trita cū melle, aut
nitrū, cuminū & farina ex melle, aut cucumeris syluestis radix
aut scilla cocta ex melle, aut soreos drachmæ duodecim, chal-
citis drachmæ decē, misyos drachmæ quatuor, cum dimidia
aceri acerrimi hemina, læuigātur donec arefiant: exceptis ute-
ris, specillū intingens, ac ulceri circūadigens, superq; duplex lin-
teolum ex œnelæo imponis: sin inflammatione sint occupa-
ta, altercum cum polenta. aut brassicam cum melle obducito.

*Ad putredines quamlibet partem occupantes,
& ulcera quæ depascunt.*

CAlcis uiuæ, chalcitidis, singulorū drach. duæ, auripigmenti
drachmæ: hoc quoq; ad digitorū pterygia & phagedænas
efficax est. Itē naturalīū carbūculis cū melle utiliter adhibet.
In reliquis uitiis arido utitor, su p spleniū ex resina inducito.

*Ad omnia quæ depascunt ulcera, quæque os infestant,
item ad sanguinis profluuium, & carnem excrescen-
tem, aridum, compescens, longè utilissimum.*

Chalcitidis, misyos, utriusq; crudi, drachmæ uiginti, squamæ
ferri drachmæ sex, gallæ omphacitidis drachmæ octo:

Ad serpentia ulcera & putredines.

SAlis drachmæ duodecim, aluminis qualiscunq; combusti
drachma, squammæ, pumicis combusti, singulorum par mo-
dus:

dus: ualet & ærugo rasa cum misy combusso, pice liquida ex-
cepta, squamaq; ferri cum oleo.

Ad ulcera pudendorum depascentia.

HAec & meleterion dictum nomis proficiet. Item dia oxy-
myrsines, hoc est ex acuta myrto, item ex charta medica-
men aridum omnibus nomis efficax est. Accedit huc eoracion
ex oxymelite, pastillus Andronis, & qui huic respondent. Eadē
uero hæc medicamenta phagedænis quoq; congruunt, nam &
ipsa ulcera sunt quæ depascunt, exeduntq;.

Ad flaccida humiditate ulcera fatidaque.

LEmnia sphragis ex aceto, uel oxymelite, uel posca, uel ui-
no subacta, ad luti spissitudinē illita benefacit, aut cupressi
folia, germina & galbuli teneri, aut cucurbitæ aridæ concrema-
tæ cinis, aut platani corticis cōbusti, aut anethi cremati simi-
liter, aut lanarum sordidarum uistarum, aut plantago, aut isatis
per se, uel cum polenta, uel peucedani radix arida.

Quomodo cicatrix ulceri inducenda sit. Cap. XLV.

SI carnē ulcerum quæ cicatrice indigēt, siccemus, astringa-
musq; adeo, ut nō modo id quod præter naturæ modū super-
fluum est, discutiamus, sed et illud quod naturale est, attinga-
mus, superficiē ulceris cuti similē reddemus. Ad hoc autē sunt
idonea, galla acerba, & mali punici cortices modicē siccantes.
Quæ uero præter astringentiæ sine morfu exicāt, ea quoq; cica-
tricē inducūt, ueluti myrrha, argēti spuma, ostreaq; cōcremata.
Nā hæc quoq; si inspergātur, arida, sæpe cicatricē inducūt: pini
cortex cū cerato myrteo, hederæ flos cū cerato, lilij radix cum
rosaceo, resina ex pinu arida, pumex tostus, squama æris pari
portione, siccis utitor, idem et reprimat, uel punici trito, man-
næ thuris & diphrygis singulorū miscens paululū, utitor, uel æ-
genti spumæ partē unā, diphrygis dimidiā cū cerato instar sple-
nij impones. Vetera autē ad cicatricē ducit uiscus, cū lachrymā
thuris, ærugo cū diphryge æquali, ceratoq; myrteo: uel cetau-
reū minus recēs applicatū. At humidiora cyperi radice obdu-
cito: sedis aut naturaliumq; ulcera, præsertim si inflātionem
experiātur, aloë persanat læuigata, arida, uel ex aqua aut squa-
ma æris, aut chryfocolla in sole cū cera emollita inducitur.

Aridum ad cicatricem inducendam.

OStreorum drachmæ duodecim, pollinis thuris drachmæ
sex,

sex, cadmiæ drachmæ quatuor: facit & Nomis. ALIVD. Aristolochiæ, drachmæ sex, pini corticis drachmæ sex, pollinis thuris tantundem, pumicis, colophonæ, iridis, singulorum drachmæ quatuor. ALIVD. Cornus cervini combusti drachmæ quatuor, pini corticis uncia sex, cerusæ uncia quatuor, æruginis rase uncia nouem, cadmiæ drachmæ octodecim. ALIVD. Cytinorum, atramenti sutorii, singulorum drachmæ sedecim, squamæ æris, aluminis scissilis singulorū drach. octo, gallæ drachma. ALIVD. Cerusæ, argenti spumæ, singulorū drachmæ octo, recrementi plumbi, gallæ, myrrhæ aridæ singulorū, drach. quatuor.

Ad cicatricem inducendam.

A Luminis scissilis uncia, trita in aquæ sextario maceratur: ubi solueris, aqua linamenta ambuis, & siccatis uteris.

Emplastrum ad cicatricem inducendam

ex simplicioribus.

C Eræ drachmæ quadraginta, argēti spumæ drachmæ triginta quinque, diphrygis drachmæ octo, myrtei heminæ dimidium: efficax est his quoque Palmulatu, quod plicenicine dicitur, item ex cadmia, tum myrrinatū, & consimilia. Ad ea uero quæ cicatricem uix recipiunt, ceræ myrtei singulorū drachmæ sex, cadmiæ drachmæ sex, plumbi, thuris, singulorū drachmæ duæ, aluminis scissilis, æris combusti singulorum drachma, æruginis rase drachmæ duæ: die interposito soluitur.

Diu inueteratis & ægrè ad cicatricem uenientibus.

C Admiæ, chrysocollæ, aluminis scissilis, singulorū drachmæ octo, æruginis, squamæ æris, singulorū drachma, resinæ pityinæ drachmæ quadraginta, ceræ drachmæ centum, myrtei quod satis est. ALIVD. Ceræ resinæ pityinæ, singulorum uncia sex, cadmiæ tantundem, chalcitidis crudæ uncia tres, myrtei quantum satis est: uino læuigatur cadmia cū chalcitide, quando caniculæ sidus oritur: latiore utere splenio, quod platysma dicitur: super id linamentū carptū & spongiā ex uino inducit. ALIVD. Aeris combusti, aluminis scissilis, singulorū uncia duæ, salis ammoniaci drachmæ duæ, ceræ uncia sex, colophonæ tantundem, myrtei uncia duæ, arida in sole diebus uiginti ex aceto læuigantur, ubi mellis facta fuerit spissitudo, cera eliquata refrigerataque emolliendo miscetur. Valet etiam ad hæc medicamentum ex pumice, item Isis, & id genus alia.

De maleficis ulceribus dolosisq; cacoethe Græci uocant, aliàs chironia & telephia. Cap. XLVI.

INueterata & quæ uix cicatricē recipiunt ulcera, alii chironia appellantur, ceu Chironiæ medicinæ peritissimo indigentia: alij telephia, q̄ in tali ulcere Telephus consenuerit. Inspiciendum igitur uenit, num & totum corpus uitioso redundans sicco huiusmodi fluorem ulcere transmittat, ac qui superat humor, cōuenientibus uacuari debet remediis. Si uerò uarix cruribus ulcere infestatis illum impertiat, etiam hic auferri debet, sicut in parte chirurgica explicabitur: aut uenæ sectione ipsos uacuabimus, abunde sanguinis detrahentes. deinde loco inducemus auxilia quæ sine morsu reficiendi uim habent, simplicia igitur ex pumice, diphryge, squama, ærugine, calce mediocriter lota: alunien scissile tritum inspergitur: hysfopi drachmæ quatuor, uuæ passæ tantundem, nitri drachmæ duæ, loco prius melle illito applicantur: squamæ gris drachmæ decem, aluminis drachmæ duæ, cum ceræ drachmis decem emollitis in sole, imponuntur.

Composita hæc sunt, emplastrum ad chironia.

CERUSÆ uncie octo, aluminis scissilis uncie duæ, squamæ gris drachmæ duæ, salis ammoniaci, thuris, æruginis rasæ, malicorii, singulorum uncie duæ, calcis uiuæ uncia, ceræ libra, myrtei lidra una & semis, arida uino teruntur. hoc medicamentum protinus ab initio callum excindit, & reconditum seruatur, postremo autem in usu emollitum myrteo, cicatricem inducit.

ALIUD. Argenti spumæ libra, olei libræ duæ, chamæleontis nigri, radicis aristolochiæ, gallæ omphacitidis, singulorum uncia, galbani, guttæ ammoniaci, lachrymæ thuris, singulorum uncie duæ, præparato radicibus uiridium arundinum agitans. Archigenis ad chironia, tum malefica ulcera quæ tibias mammasq; obsident, item strumas & parotidas. Adipis bouilli libræ tres, terebinthinæ quincunx, pollinis thuris septunx, terræ sardæ dictæ, qua scriptores utuntur quincunx, his quæ liquari possunt in arida coniectis unitisq; utitor. **ALIVD.** Archigenis, ceræ triens, olei omphacini, pollinis thuris, uel eius lachrymæ, diphrygis, squamæ singulorum drachmæ quatuor, arida cū aceto læuigas, ubi mellis spissitudo facta, cerato misces, & uteris diluto quod linteolis possit illini. **ALIVD** ad mulierum dolosa ulcera,

ulcera, & aliorum qui tenera carne præditi sunt, Ceræ tyrrenicæ drachmæ octo, adipis taurini, terebinthinæ, plumbi combusti, loriq; singulorum drachma: utitor per linamenta ex rosaceo uel myrteo diluens.

Ad cicatrices nigricantes.

Cap. XLVII.

Cicatrices nigras tollit oleū in quo bryoniæ radix candidæ & nigræ incocta sit, dum succum reddat, impostum: calamintha ex uino cocta, argenti spuma cū rosaceo albo lora: ex imperiginibus cicatrices, tū alias, & cōcolores efficit asini adeps illitus: ærucæ semē ex felle caprillo, bubulo, & ouillo, perunctū cū argenti spuma, ouillus talus combustus, ex uino austero tritus, gutta ammoniaci cū suillo felle illita. Cōposita uero, argenti spuma, mētæ, lachrymæ thuris, pares portiones cū melle. **ALIVD.** Nitri, suffiminis ammoniaci, sulfuris uiui, myrrhæ, paria pondera, ex aceto albo, aut uino, aut aqua, minutim detrita modicè illinūtur, ne exulcerationē excitent. **ALIVD.** Cimoliæ cretæ, columbarum fimi, saponis, thuris, æquales modi ex aceto. **SMEGMA** ad cicatrices nigras, Cimoliæ cretæ drachmæ octo, aphronitri drachmæ quinque, ueratri albi drachmæ quinque, glandis unguentariæ expressi drachmæ quatuor: in balneo cicatrices abstergito.

De sinibus.

Cap. XLVIII.

Cum adiacens ulceribus cutis, diutius subiectis corporibus non coalescit glutinaturq; nostri sinū, Græci colpon nomināt. Si igitur ad superiorē partē porrectus sit, facilè sanies per os emanat, atq; ideo prōptè cōglutinatur. Si inferius ipse spectet, sanies uicinā aliquā partē intus erodit, ac nisi emissarium quoddā collectionis scalpello prius feceris, nihil promouebis, neq; carne ipsum replendo, neq; conglutinando. Quod si artus aliquos nēpe cubitū, aut femur sinus occupet, poterit utiq; decliuus figuratus citra diuisionē ex aduerso factā coalescere. Etenim in cubito cum ore flexuræ ipsius uelcinæ sunt, summam manum elatius protendens, sinum ad effluxum conuertis. At in femore si propter genu sinus designat, decliui figura posito, iuxta poplitem mollem puluinum subiicis, quod inguina genu humilia sint. Si igitur sinus carne impleri non desideret, statim fistula quadam recto peruia foramine cui uesica illigata sit, ad saniem quidem quæ sinui inhaeret

inhæret abstergendam aquosa mulsâ potabili, elui debet: uerum ut coalescat, uino aut mulso: deinde ad glutinans medicamentum transeundum. Sin cauus sinus carnem requirat, primum medicamenti, quod charra constat, aridi paululum cum multo rosaceo infeti cōuenit. deinde carpto linamento os obturari. Inde emplastrum Isis aut Machætionis, aut simile quoddam unâ cum rosaceo cerato liquidiores solutum inijcitur. Vbi uero carne mediocriter sinus fuerit repletus, conglutinans quoddam medicamentum impones, quemadmodum & recens cruentum uulnus curabas. Huius autem generis sunt, Barbara, Dichroma, & scirrha, id est, fulua appellata. Maximè uerò omnium quod ex resinino, & metallicis sine cera præparatur fuluum Galeni emplastrum conueniet. Post medicamentum, sponsia recens ex mulso, aut uino circumponitur, & quàm fieri potest mollissimè, deligatura à sinus fundo incipiens in ipsius os desinet, linteolum uerò circumductus fundum sinus sine dolore constringat, paulatim uero soluatur usque ad sinus oras, emplastro extrinsecus sinui circumdato, sed ita iuxta oras descisso, ut sanies queat excerni: quod fiet paruo quodam alio emplastro superimposito ex eodem medicamento ob effluxum laxo: fines id adusque solutionem, qua tertio quoque die facta id ipsum auferes mutabisque: quod toti sinui circumdatum est relinquens. Nota uerò erit an sinus ima coaluerint, si sanies probè emanet pauca, & concocta, aut si nequaquam effluat: insuper eodem in sinu si neque dolor aliquis sensibilis, neque tumor, sed tota ratio contracta, sicca, & doloris expers appareat. At si pus etiam maturum in ore modicum conspicias, multo magis de sinu conglutinando sperandum est. At si primo altero uel die sanies quædam tenuis è sinu excernatur, nihil adeò de glutinatione despera, quippe medicamenti uirtus humorem tenuem † ex subiectis partibus frequenter extundit, unde partes siccæ mediocriter factæ coeunt, & glutinantur. Tertio uerò die, aut quarto ab initio si cruda per os sanies eualerit, scito sinum non coisse, eodemque medicamento non insiste, nam cum propter humiditatem quampiam, ut ueri simile est, à parte decidat, non alienum fuerit etiam mutare.

† Antiquus codex habet, ἐκ τῶν ὑπερχημένων, id est, ex superpositis partibus.

De sinibus laceris detritisque.

Vbi abscessus tardè sectus fuerit, uel medici imperitia, uel eius qui curatur timore, & cutis sinui obducta tenuis, diruptaque, quod Græci ab attritis uestium laciniiis rhacodes dicunt: nec fieri potest, ut prædictis collutionibus adimatur, glutinante utendum medicamine, temperatura liquido, uiribus autem sicco. tale est palmulatum dictum ex chalcitide, ueteri dilutum oleo, ut neque admodum sit durū, neque manus intinctas inquinare desierit, deinde uino mediocriter uetusto maceratum, postea orbiculatim cum decenti deligatura impositum. Conuenit autem laceræ ut comprehensum est, cuti, potissimum mel, quoad emplastris spissitudinem habet coctum impositumque: Præstiterit autem post illi uisionem lacero in sinu factam, myrrham in pollinem coactam, cribro suspenso ei inspergere, uel aloen, uel thus, uel simul omnia. Expertus autem sum, tenue centaurium in hunc usum mirabile esse medicamentum. succedit huic symphytum, deinde iridis illyricæ radix, postremo erui farina. Nonnunquam uero inter coquendum ea melli insperguntur, cum cacabus ab igne tollitur. Melius autem fuerit, si lebetes iam à flamma amoto hæc fiant, deinde diligenter agitemus: ubi medicamentum tepidum euaserit, sinui imponatur, illigeturque; sicut expositum est.

De fistula.

Cap. XLIX.

Fistula sinus est callosus, qui magna parte ex abscessibus nascens, ab arundinearum fistularum translatione appellatur. Si itaque in os desinat, curari sine manu haud potest, nisi temporis spatios, squama ultro uel os deciderit. Si uero in os non finiat, medicamentis quæ callos elidunt & conglutinant perfanabitur. Itaque callos excidunt hæc quæ subiungam: Spondylii radix circumrasa impositaque; fistularum callos eximit, item ueratrum nigrum duobus tribus uel diebus insertum idem præstat. Ad hæc amurca cocta & in collutione adhibita. Iam sory erudum uel concrematum cum uini diluti momento ad collutionem iniectum: item sory & drocomagma cum hydromeli, uel elaterium terebinthina exceptum in penicilla cogito, imponitoque, uel laferpitii radice succum infundito. Id quod sequitur callos consumit: æruginis drachma duodecim, ammoniaci drachmæ duæ, excepte aceto in longum inducuntur.

Collyrium

Collyrium quo fistulis exterendis utor.

GUttæ ammoniaci, atramenti futorii, æruginis, misyos, chalcitidis, gūmi pari modo excipiuntur aceto. **ALIVD.** ex his quæ Heliodori chirurgica scribuntur. Cadmię, misyos, atramenti futorii, çris combusti, gummi, singulorū drach. quatuor, chalcitidis crudæ drachmæ tres, excipiuntur pueri ueneris non experti urina & singuntur collyria, ex quibus uno fistulę imposito, panis mica aqua madens ext rinfecus superacommodatur, mutaturque sæpius donec inflammatio conquierit & crusta exciderit. **ALIVD.** quod in Alexandria accepi, Anchusæ radicuni, misyos tosti, chalcitidis, æruginis, aluminis scissi, atramenti futorii, aloes, singulæ unciz, cantharides quinque, aceto trita in collyria coguntur. **ALIVD.** Atramenti futorii drachmæ duæ, chalcitidis, æruginis, singulæ drachmæ, excipit ammoniaco & utor. Cum autem callus fuerit extricatus, ærugine cocta cū mulsâ purissima octupla in collyrii formam redacta, repurgatur. Vbi uero callum eliseris, iis quæ carnem procreant uti opportunum est.

Collyrium ad carnem generandam.

ALoes, myrrhæ, ammoniaci, ouorū putaminū combustorum cineris, æquale pōdus, aqua detritis omnibus collyria formantur, imponunturq;. **ALIVD.** Myrrhæ, aloes, & thuris, malicorii, æqualis modus aqua excipitur, quidā uerò taurino felle, carnes etiā oleo quod in maturis uuis expressum est eluuntur. Notus mihi est, qui cedrino liquore fistulas collueret, ac mirū quanta res felicitate successerit. Postquā uero carnes produxeris, glutinatorio utendū medicamine, quomodo in aliis sinibus præcipitur. At cū fistula arctior, longaq; fuerit, Galenus ait, neq; callū adhuc, sed fordiciē tantūmodo contraxerit, primum lixiuiā demisi, deinde eandem tantisper inibi permittēs dū sordes excidisse sperassem, medicamentū applicaui. Est autem id quod recinino oleo constet superius cōmemoratum.

*De ulceribus diruptis.**Cap. L.*

NOnnulla ulcerū cicatrice obducta, frequēter haud magno temporis interuallo, iterū inflāmatione tētantur rūpunturq;: siquidē esse quodā affecto, interdū caro circundata ex facili cicatricē recipit, ac sana ex toto esse uidetur: uerum cursu humoris ualido paulatim ex ossē in alto contabe

scēte

scente, tum inflammatio, tū pus oboritur, quod cicatricē deradit. Curatio igitur eiusmodi ulcerum tantam requirit siccitatem, ut os affectum decidat. Huius autem sinus concavos promptē replebunt papaveris sylvestris ficiq; folia cū polentæ subtiliore parte læuigata, atq; ex uino applicabis, uel alterci semen & atramentum sutorium pari pondere contrita imponentur, uel peucedani radix de subito squamas ossium separat.

De articulorum ulceribus. Cap. LI.

CVM articuli carnosus partibus sicciores existant, ex ulcerati sicciora medicamenta requirunt. Probe igitur facit pastillus Polydæ ex uino subactus donec sordium fiat spissitudo. Item quæ similiter huic desiccant medicamina. Item marina, mûriaque frequenter irroratos, melius affici conspeximus. Quare in articulis ijs utendum est quæ maiori etiam siccandi uirtute pollent.

Quæ spicula, aculeos, spinas, & consimilia educunt.

Cap. LII.

ACULEOS, arundines, insuper spicula & spinas extrahit utrunque anagallidis genus, aristolochia rotunda, amoniacum cum melle, alterci semen læuigatū inspergitur, arundinis radix contusa melliq; mista in linteolum largum illinitur, imposita de subito educit.

Si ex uena, arteria ue, & naribus sanguis profluet. Cap. LIII.

PARTICULIS sanguinē fundentibus, figura ei quā in sinibus exposui contraria, rectē adhibebitur, nempe quæ sursum uergat, neq; id tamen immodicē, nā periculum est, ne dolore oborto, uas rursus sanguinē profundat: cū nihil æquē sanguinis profluuiū excitet, inflammationesq; augeat, ac dolor. Cum itaq; sanguis erumpit, statim digitum ori ulceris uasculi iniecit, innitens leniter premensq; citra dolorem, nam simul & sanguinē continebis, & grumū uulneri induces. Quinetiam si altius deliteas uas quod sanguinem emittit, diligentius perdisces, & situm ipsius, & magnitudinē, item uena sit, an arteria: deinde si exiguū uas existat, aliquo ex his quæ sanguinem reprimunt utendum est. Optima uero eius generis sunt, quæ obstruendū uim obtinent, unde Græcis emplastica dicuntur, ex resina fricta, farinæ triticæ polline, gypso composita, similiaq;

oui candido macerata, & cū leporinis pilis imposita: at si amplum uas existat, hamo ipsum attollere conaberis, & mediocriter circumages, sanguine represso: siquidem uena extiterit sine funiculo sanguinē his ipsis medicaminibus sistere tentabis: si arteria, alterum ē duobus facies, aut funiculo circumposito, aut toto uase præciso sanguinem coercebis. Est, cū magnis quoque uenis funiculos circumdare cogimur, queniadmodū nonnunquam easdem totas transuerſim nimirum amputare, in cuius rei necessitatem uenitur, in uenis quæ à penitioribus rectē sursum feruntur, præsertim per actū quoddā spatiū, aut principes particulas, sic. n. utraq; pars utrobique, & reflectitur: & uulnus à vicinis corporibus premitur contegiturque: tutius autem fuerit utrumque facere, funem quidē radici uasis circumdare, quod autē inde procedit abscindere. his sic peractis, uulneri celerimē carnem inducere, priusquam funiculus à uase decidat, si. n. subito carnē contraxerit, & locus alibi inanis reperiatur, id quod græcè uocatur aneurysma sequitur. Dignosces autē num uena an arteria sanguinem profundat inde, quòd huius flauior tenuior quæ sanguis existat, & cū pulsū uacuetur, illius autē nigrior, & sine pulsū. Subsequens igitur est omnium optimū quæ nouimus ad carnem inducendā medicamentorum, quo etiā ad cerebri membranarū hæmorrhagias uti securissimū est, itē ad colli uulnera, ipsarūque uenarum iugulariū quas sphagitidas Græci uocant, etenim & harū sanguinē citra uinculū cohibet, Recipit autē thuris lachrymæ pinguiſsimæ partem unam, aloes in mollioribus quidem corporibus partē diuidiatā, in durioribus æqualem, ac in uicē lachrymæ thuris, tenuissimæ eiūsdē partis tantundem, cū oui albo subigitur, dū mellis fiat spissitudo. deinde leporis pilo mollissimo excipitur, mox uasi ipsi, tum ulceri uniuerso copiosissimē imponitur. Deligandum uerò extrinsecus est fascia ex tenui linteo, cuius fasciæ primi quatuor aut quinque amplexus super ipsum uas quòd profluit, iniiciuntur: hinc ad radicē ipsius distribuuntur, postea ubi tertio solueris die si tutò adhuc medicamentum ulceri adhæreat, aliud rursus orbiculatim circumdabis ac ueluti contegens iterum, deligabis quemadmodū prius. at si sponte sua primū reiecerit linamentum, uasis radicē digito leniter comprimens, ne uidelicet quipiam confluat, hoc quidē sensim auferes, alterum uero impones, atque hoc modo quoad carne obducatur uas, curabis, ita ut

resinæ frictæ, gypsi, combusti, singulorū drachmæ octo. ALIVD.
crustas inducens sanguinemque reprimens. Chalcitidis, æris.
combusti, atramenti lutorii, misyos tosti paria pondera, item
Rhodia dictæ, & Xanthe probè sanguinem cohibent.

† Hic locus sic rectius legitur in vet. τῇ δὲ φλεβὸς μελάντερον τε καὶ παχύτερον, &c. uenæ autem nigrior & crassior sine pulsu.

† Rectior est scriptura in ueteribus lib. ὄνωις ξηρὰ ἢ ὑγρὰ. id est, Ononis sicca uel humida. Quid autem sit Ononis, Dio scorides & Galenus docent.

De nervis conuulneratis.

Cap. LIIII.

Neruis uulneratis aut punctis, ex sentiendi quod obtinent, acumine, inflammatio & dolor immodicus accidit. Quare & febres & conuulsiones his oboriuntur, quibusdam & delirium ob commercium quod nervi cum cerebro obtinent. Interim uerò in aliis quoque ambientibus particulam uulneratam locis inflammationes, & abscessus ex ipso nervo uulnerato ob coherentiam solet accidere. Ratio igitur est, cutis uulnus apertum inglutinatumque relinquere, quod per id sanies effluat. At si punctus in conspectum non ueniant, etiam duabus lineis sibi continuis incidere præterea oportet. Remedio autem est, si corpus plethoricum sit & magna urit inflammatio, primum à sanguinis demissione auspicari: si uerò uictiosis repletum sit humoribus, etiam purgatione utendum est. Medicamenta uerò uulneri applicentur quæ dolorem leniāt, & effluxum saniei patefaciant, non facta præsertim diuisione. Itaque aqua calida, quanquam reliquis inflammationibus sit accommodatissima, uulneratis tamen nervis est inimica, ac præstiterit eos oleo subtili, quod astrictionis sit expertus, ad sensum calido irrorare, neque enim frigida neque tepida admodum tutò adhibetur. Verùm ex medicamentis idonea est terebinthina resina, per se quidem, in pueris & mulieribus & ijs qui molli sunt carne, cum euphorbio autem emollita, in duris corporibus: & si nonnunquam duriora contigerint, cum oleo quodam subtiliore. Cataplasmata uerò in nervis, qui inflammatione tentantur & putrescunt, adhibebis hordeaceam farinam, aut fabaceam, aut eruinam,

in lixiuio , cum oxymelite coctum . Si putredine careant puncturæ neruorū, rectè cerato uteris, quod recipit ceræ quadrantem, euphorbij unciam, aut columbini fimi in duriusculis corporibus, olei sextantem, interdum etiam terebinthinæ uncia : ut autem emplastri figuram induat medicamentum, uncia uni euphorbij, sex uncias singulorum sequentium, ceræ, resine frictæ, olei, picis liquidæ iniicies . At si in uicem resinæ propolim pinguisimam indideris, multo id reddes præstantius : atq; hoc ad neruos punctos laudatum est remedium : idem & à rabioso cane morsus efficax est . Aceti sextarius, picis pinguis libra, opopanax quadrans : opopanax aceto solutus magis læuigatur , pix liquefacta mixtaque coquitur : medicamentum compunctis neruis idoneum est, ut quod os puncturæ non sinat conuiuere, quemadmodum nec in his qui à rabido cane morsus sunt, ulcus in cicatricem coalescere : sed efficax solis duris corporibus sin autem in pueris, aut molli carne præditis, punctura affectis, uti cogites, licet ipsum ex digerente quodam amaracino, aut obo balsamo, aut oleo ueteri liquefacere . Conuenit etiam medicamentum basilicum quod nitrum recipit, aut calcem uiuam, aut euphorbium, aut sulfur uiuum, aut syluestris columbæ finum, aut opopanaxem, aut sagapenum, aut liquorem cytenaicum, aut castoreum, ac in medicamenti libram, dictorum alicuius uncia debet iniici . Facit autem bene neruorum uulneribus & præsertim puncturis : quin & in agro ubi nullius copia datur propolim recentem pinguemque uulneri poteris inducere, aut fermentum maximè uetustum, per se aut cum propoli minus, uel cum liquore trithymalli : cataplasmatibus utendum ex oxymelite factis, aut lixiuio cum lomento fabarum, aut eruorum farina, aut cicerum, aut lupinorum amarorum, aut hordeacea, aut subtiliore polenta, idque non solum duai inflammatione tentati sunt, sed iam inde ab initio protinus . Cæterum quæ relaxant cataplasma in neruorum uulneribus semper uitare oportet . At si neruus non punctum, sed planè cesum uulneratus fuerit, cure etiam quæ interueniebat diuisa, ut nudus appareat rectus, non transversim dissectus, commemoratis ex euphorbio & tam acribus nullis utere, quippe nudus cum sit neruus, uehementem ipsorum uim ferre nequit . Quare calcem quæ sæpius æstiuo tempore lora sit, & oleo liberaliore intincta, assumes . Proficiunt hic & quæ

ex pompholyge confecta sunt, item quod melle constat, rosa
 ceo largiore liquefactum. Sed ea adhibenda cura est, ne quid ex
 ijs uulnus contingat, quandoquidem nervus ipse & sensibilis ma-
 xime est, & temperamento suo frigidus, & principum corpora
 partium primati continuus, imò ne oleo quidem eiusmodi ul-
 cus irrorare conuenit, hinc enim sordidum redditur. Abluenda
 igitur à uulnere sanies est molli lana specillo subunctorio cir-
 cumuoluta. Quòd si omnia ex animi sententia processerint, èt
 uino dulci madefacere citra periculum licebit, sed in robustio-
 ribus Polyidæ pastillo in linamentum illito cum sapa calida
 uti postquam neruum denudatum contexeris, linamenta ex-
 trinsecus circumducere oportet ex medicamento quod angu-
 gis uulneribus faciat, nempe eo quod euphorbio praparatur,
 aut simo columbarum: sed ita ut etiam sanas partes ampliter
 comprehendat. Quum uerò transuersum nerui uulnus est, ma-
 ior conuulsionis metus impendet, ac quæ ad curationem uul-
 neris spectant. hic quoq; sunt eadem, quanquam nonnulli in
 uulnere adhuc recenti suturis usi sunt, ac medicamento aliquo
 conglutinatorio: uerum suturas non summæ nimium cuti, sed
 altius moliri conuenit, ne quæ in imo sunt inconglutinata de-
 hiscant: rursus cura adhibenda est, ne ab acu neruus compun-
 gatur. Cæterum in summa sciendum erit, in neruorum uulne-
 ribus medicamentum natura calidius quod puncturis mede-
 tur, diuisionem nerui non posse curare, ut qui rosionem ipsorū
 feruoremq; sustinere nequeat: neq; quod diuisionibus mede-
 tur, puncturis conuenire: non enim uirtus ipsius altè quā au-
 gusta est cutis diuisio, penetrat. Victus itaq; adhibebit tenuior,
 lectus mollis, oleumq; calidum alis, capiti & ceruici superfun-
 ditur, at si in crure neruus uulneratus sit, inguinibus, inferiori-
 bus uentris partibus, & locis uicinis: balneo in totum donec
 inflammatio inclinauerit, abstinendum est, quum aquæ conta-
 ctus nequaquam, ut dixi, ipsis conueniat. Quoniam uerò non-
 nulli citra id manere consuetudinis gratia non sustinent, siqui-
 dem læsa particula in manu fuerit, conādum est quatenus fieri
 potest, ipsam aqua seu calida, seu multo magis frigida nō made-
 facere. Si pes uulnus acceperit, quoniam fieri nequit ut nō ma-
 descat, ubi lauacrum ingressuri sunt, emplasticum aliquod me-
 dicamentum uulneratę parti superaccommodabis, iterum ex-
 trinsecus linteolos multiplicatos plures oleo imbutos iniicies,

iterum fasciam ex linteo à foris deligabis, deinde rursus in ipso balneo fasciam oleo prius superfundes, cum æger in solium descendet: ubi lauerit, omnia quæ imposita sunt abicies, ac prædicta totius curationis ratione uteris. Contusi uerò nerui ubi simul cum his cutis contusa exulcerataq; fuerit, cataplasma ex fabarum lomento & oxymelite postulant, nonnunquã adicitur erui farina & iris. At si dolor contusioni adest, picem liquidam admisce: sin autem citra cutis contusionem euenerit, magis discutient adhibebitur, nempe oleum calens, anethinum dico, superfusum continuè, aut rutaceum, aut irinum, aut amaracinum. Quòd si totus neruus præcisus sit, periculi quidem nullum sequetur, uerum particula debilis manebit. Curationis autem eius communis est cum ea quæ aliis ulceribus accommodatur, hæc quidem ex simplicioribus remediis in neruis conuulneratis curatio abundè est. quidam uerò compositis uti consueuerunt, cuiusmodi sunt, ex metallicis confecta, Barbara appellata, Cissinum, ex senecione præparatum, melan chloron, Indice, Harmonia, & Athene, quorum & compositiorem, & utendi modum septimo libro reperies. Sed quia nonnulli præpotentium etiam sumptuosius ad neruorum uulnera remediis uti uolunt, Galenus literis prodidit, ad puncturas neruorum, hæc, cinamomi, dictamni, fœniculi, singulorum uncia, amaraci sextans, ceræ bes, opobalsami dextans, terebinthinæ uncia. ALIUD. Liquoris cyrenaici uncia, ceræ quadrans, opobalsami libra. Ad denudatos neruos hoc ualeat. Ceræ unguentariæ quadrans, unguenti spicati, aut foliati, aut nardini libra, rompholygis, spicæ nardi, amomi, phylli, singulorum uncia, atq; hæc supra spem re spondere Galenus pronuntiauit.

De articulorum contractione seu ligatione, quæ ancylosis dicitur. Cap. LV.

Articulos ex humidioribus infarctis, ac neruea quadam tensione contractos, detentosq; ancylos, & ancyloses appellare cōsueuerunt. In quibus remedio opus erit quod emolliat relaxetq;. Communiora igitur his remedia conueniunt, quæ in particulis scirrhis induratis, ac adeò quæ in resolutis commemorata sunt, propria uerò magis, irroratio ex hydrelæo, in quo decoctum sit lini semen, fœnugræcum, althea, auris, cucumeris agrestis radix, ipsumq; oleum licyonium. Vbi

his artus irrorati fuerint, accommodatur primum acopa simpliciora, cuiusmodi ex nigra populo, ex abiete, Bromiū, quod ad Basileum refertur, Pyxis, deinde Aristophaneū, & quod Afanito attribuitur. Validissima, Lifoponium appellatū, & Pœcilū: emplastra, quod Amythaoni adscribitur & Anicetum. Laudatissimum uerò quod recipit bdellij, ad pis uiculini, suffiminis ammoniaci, iris illyricæ singulorū drachmas sedecim, opoponacis, galbani cachryos, styracis, thuris singulorum drachmas octo, piperis grana centum sexaginta, ceræ libram sensissimæ, resinæ terebinthinæ tantundem, irini sedimenti quod satis est, & uini quantum sufficit: tunditur hoc medicamentū Est & acopon non inefficax dissolutum irino, aut cyprino, aut laurino. Inter acopa uero & emplastra, medicamentū medium est diapternes uariis confectum misturis Verūm acoporū usus molli adhibebitur & continua frictione, ita ut simul affectum articulum experire, an flecti possit, & extendi.

*De articulis relaxatis.**Cap. LVI.*

LAxantur subinde articuli ob longos febrium morbos, colicos & resolutorios, præsertim ubi calidior ipsos humidiorq; intēperies occupauerit: atq; motus inde impeditur. Succurrit his acaciæ succus aqua dilutus & partī superfusus: aut rubi, aut myrti, aut lētisci, uel ulmi radicū corticis decoctū cōgruet, aut malicoriū applicatū, aut myrti folia, cū cerato myrteo imposita. Nā colligātes nerui firmari desiderant facultate quæ astringat desiccetq; huiusmodi igit medicamenta articulis imponi debēt, cuiusmodi ex salicibus est & oxyra, & palmulatū quod uinum astringens, aut acetum assumpserit. Multi uero eiusmodi impotentia m à frigore fieri putātes, deinde calidioribus usi præidiis, maiorem noxam intulerunt.

*De lumbricis.**Cap. LVII.*

TRes sunt uniuersæ lumbricorum differentię: prima terretum secundum crassitiem, altera latorum, tertia eorum quos ascaridas nuncupant. Origo omnium generum est ex cruda, crassa, pituitolaque materia & putredini accommoda, qualis in pueris aliisq; uoracibus colligitur: non autem ex calida, acra, aut melancholica substantia. Hæ siquidem alimenti naturam egressæ, lumbricis procreandis inepiæ redduntur econtrario autem, biliosa potissimum recrementa

etiam hos perinunt. At si quando flaua bilis una cum lumbricis infra, aut etiam uomitu eruperit, ipsos quod de intestina obsidere, humorem uero biliosum uentriculos aut aliam quampiam particulam occupare scito. Cuiusque igitur ipsorum differentiae speciem, generationem, locum, notas, curationemque exequemur, à rotundis exorsus.

De rotundo lumbricis.

Teretes igitur lumbrici speciem habent omnibus perspicuam, quod sane aliis frequentiores sunt in gracilibus plerumque intestinis consistunt, & superiorem uentriculum subeunt, ideoque frequenter per os reijciuntur. quibusdam & è naribus redditi sunt: atque hoc genus infantibus peculiare & plurima parte cum febricula: sed per febrium initia orti, substantiam ex subiecta corruptione retinent: in statu, ex malitia morbi: in declinatione, toto ad melius mutato. Etenim Hippocrates memoriae mandauit bonum esse indicium teretes lumbricos prodire cum morbus ad iudicationem tendit, qui subito etiam intereunt. Sequitur autem eos qui rotundos lumbricos continent, rosio intestinorum & uentris, tussis exigua cum siccitate irritantes: nonnullos comitatur singultus quoque, & somnus cum palpitacione, iique sine ratione expergiscuntur, nonnulli & cum clamore expurguntur, & iterum sopiuntur pulsus inaequales & febres augescunt inordinatè, quae cum extremorum perfrictione, tertiam, interim quartam, die uel nocte accessionem sine rationem habent. Infantes autem etiam mandant lingua inaniter exerta, & dentibus strident, oculis conuiuent, uoluntque conuiescere, excitantibus ipsos indignantur, oculi apparent, genaeque rubescunt, ac rursus liuent: atque haec paulatim & ex interuallo. Quibusdam nauſeae & rosionis causae stonacho peculiare creatur, atque aegri cibum respuunt, compulsi autem ad cibum nauſeabundi uix quod assumitur deglutiunt, uel etiam assumptum reuomunt, plerisque uero alius descendit corruptos cibos egerens, & tympani modo inflatur. Reliquum corpus sine ratione contabescit, neque e surie, neque euacuatione modica suborta. At qui non in omnibus omnia quae iam commemorauimus signa inquirere oportet. sed nonnulla ex eo quod praepollet in erini & plurima. Haec autem eueniunt, dum animalia per intestina serpunt totumque, febris autem calor uapores sursum, cerebro

cerebro transmittit prauos, ex putrida in uentriculo collecta humiditate exhalantes, in quibus amborum partim similiter curam habere conuenit & febris & lumbricorum, partim de febre parum solliciti, lumbricos de corpore eximere cōitemur. Multi siquidem nulla lumbricorum cura habita, exesi ab ipsis sunt, & conuulsi interierunt. Alii produnt se lumbricos uidisse, qui ex inguinibus ægri eruperint. Cæterū occisos hos omnes prius educes: occides autem, amaris potissimū usus remedii. Cum igitur febris & lumbricorum communis sit curatio, conuenient auxilia simpliciora: potui igitur dabitur chamæmelorum decoctum uel myxariorum, ut appellant, uel ipsa myxaria decocta esui dantur: item fereos succus, aut coriandri semen cum aqua calida uel cum posca, uel myosotidis herbæ decoctum, uel cornus ceruini ramentum, uel minium synopicum tenuissimum, & olei immaturi amarissimi paulatim cochlearia duo absorbeant, qua enim amarum est, lumbricos occidit: quā lubricum, detrahens ipsos cum stercore reddit. At si inflammationem distentionemq; uiscera experiantur, cataplasmate urendum est, quod lini semine, farina loloacea, absinthio & bryoniæ radice constat, ex hydromelite uel etiam humido fotu ex oleo chamæmelino, uino, absinthii semine, & aloe, præcordiis accommodato. Vbi uero non uehementer febres molestant, miscenda est myxariis mentha & exhibenda est. Cum ad integritatem uentū est, efficaciora quoq; usurpantur, quale est decoctum seriphii uel calaminthæ, uel filicis, uel cardamomi semen, uel mali punici acidi radice ius ad tertias redactū, uel fricti cumini, uel nitri fului, singulorū scrupula tria, uel sandonicum uel abrotanum, uel etiam ambo simul, cum melle in catapocia coacta, uel lupinorum amarorum scrupuli terni uel brassicæ, uel erucæ semen læuigatum, uel absinthinum, quod etiam solum frequenter abundè fuit. Dantur autem & terna lotæ aloes scrupulæ quod remedium est laudatissimum: in ualidioribus illota quoq; aloe utimur, quia uerò infantes aloem cochleari non admittūt, supinis fasciola ipsis detentis, ore aperto per clysterium quoddam ualido munirum canali, inuitis aloes quā penitissimè transmissam iniicimus. Atque hæc mirifica medendi ratio in pueris est, qui difficulter possunt tractari: quibus etiam cibos subinde sobiles, quemadmodum iis qui cibum auersantur, infundimus. Cæterū & cyphi & masuaphium

phium rectè dabitur, item cornu ceruinum combustum cū pipere & melle uel oxymelite, reliquaq; ex oxymelite ipsis dare conabimur: præstiterit autem si acetum scillinum fuerit, præsertim ætate prouectioribus, aut sinapicū oleo & aceto ad cochlearis magnitudinem. At qui lumbricis, cum alui profluuiio infestantur, præbent plantaginis succum, ipsamq; plantaginem aridam assument, ex quo enim utriq; & fluori & lumbricis efficax est. Cataplasma his accommodabitur ex farina ordeï cruda, filici, absinthio, farina lupini, sandonico & abrotano. Iam uero & malicorium acacia, galla, uel balauitium admiscebitur. Quoniam uero nonnulli subinde amaras portiones ceu ingratas respuunt, ex iis quæ modò comprehensæ sunt, dantur non manifestò amara. His accedent insuper chamæotys, marrubium, helenium, baccæ lauri, acacia, thymus, pulegium, carpesium, iuncus odoratus angulosus, polypodium, iris, cnicon, erythrodanon, spina ægyptia cum pipere, singula sex scrupulorum instar: item decoctum menthæ, mori radicis succus decoctum uic, petroselinum reliquaq; odorata semina, ex trinfecus autem inducitur aloe cum melino & uino. hoc & appetentiam excitat, quæ uix maguo negotio recipitur. miscetur autem sæpius aloe ablinthium: aut felle taurino, cum amaris quibusdam prædictis umbilicum impleto: aut oleum ex rhodaphne factum sæpe delinetur, aut liquor cedrinus & solus cum cærato, toti uentri imponitur, aut pix arida trita inspergitur, uel mentha, uel melanthium cum rosæceo, uel etiam feriphij decoctum ipsis admiscebitur, uel fraxini perficæ folia in pollinē detrita applicamus. Utendū uerò est & medulla cerui, unguinis modo, in umbilico, inferiore uentre & lumbi: ceratūque adiūgetur, si res postulet hoc, Aloes, absinthij, farinæ lupini, seripii, melanthij, singulorū scrupula sex, ceræ uncia & semissis, chamæmelini quod satis est, felle taurino arida læuigantur. Porro ab inferioribus partibus mulsam iniicere sæpius expedit, quo lumbrici mellis dulcedine illecti deorsum descendant: si autem putrefacti in alto corporis non excernantur, sed potius uapores sursum mittant, educendi sunt, aut aloes, aut medicamenti amari ex ea confecti portione, quandoquidem etiam in aliis mediocris alui uacuatio, non expers est præsidij.

† Integra huius loci scriptura est in antiq. codice *ὁ φθάλμιος καὶ οἱ φάλαγγες*, oculi caui apparent.

De latis

De latis lumbricis.

Latus lumbricus mutatio est (ut ita dicam) adnatæ in interiori intestino membranæ in materiâ animalis modo mobiliem, quæ sæpe tota redditur longitudine incredibili, uel pars ipsius excernitur: dissolutus uero, non coalescit: & nunc in iis etiam qui febre carent, abundat: nunc febricitantibus accidit, ex longo morbo continuas stomachi rosiones inferens, ac impotentem ciborum appetentiam. Nam quod animatum euasit, in intestinis obiectum rapit alimentum, ut alio statim opus sit, & nisi assumpserit, intestina rodantur, His occupatos comitatur corporis gracilitas & pulsus inæqualitas, cum inæqualitate: ac quod certissimum est indicium, cum recrementis nonnulla semini cucurbitæ similia excernuntur. Curatio concordat, potio enim ex acris petita, & alliorum esus, tum filicis, uel centaurei decoctum, & potum & ab inferioribus partibus inditum, uel calaminthæ uel dictamni, uel pulegii: dabitur autem in aluum & muria. Præbire uero hoc medicamentum quod sequitur, neq; ijs qui aliis lumbricis infestantur, inutile est, si febre potissimum uacuerint. Nitri rubri, piperis, cardamomi pares portiones: dantur terni scrupuli cum uino aut aqua calente. **ALIVD** eclegma. Piperis, baccarum lauri purarum, cumini Aethiopici, mastiches, pares modi, mellis quod satis est: datur cochleare unum mane, & dormituro. At si efficacius id fieri desideres, nitri quoq; rubri parē portionē adicies. **ALIVD**. helenij, suffiminis ammoniaci, piperis in alio filicis, singulorū drachmæ quinq; cum oxymelite calido: tempore interposito dabit euphorbii drachma, uel duæ prouectioribus potui. **ALIVD** Filicis acetabulum, nitri drachmæ duæ, datur uinum cochleare aquæ euacuatione prius facta: satius aut erit si etiam scammoni momentum assumat. **ALIVD**. Mali punici acidi radicū corticis in summo decorticati drachmæ quatuor, piperis tantundem, cardamomi drachmæ sex, marrubii drachmæ duæ, melle dantur, porro prius assumpto. Verū ut ex toto affectus discutitur, theriacem quoq; exhibebis, si ualida febris non prohibet.

*De ascaridibus.**Cap. LVIII.*

Ascarides, ut modò etiam diximus, specie lumbricorum cōtinent, uermibus similes quæ in extremo lōganone
& mu-

& musculi anum stringentis *σφιγγης* Græcis dicitur, initio reperiuntur, uehementem locorum horum pruritus excitâtes: generant speciem hanc praua alimenta, perfrictio, & ciborum corruptio. Vacuari igitur debent in infantibus, glandibus ex melle, cum salis momêto, uel nitri: in prouectioribus, acri muria, aut decocto centaurei, cum nitro & melle, aut cucubita syluestris, aut absinthij, aut chamæleontis, aut anchusæ, aut cnici, aut hyssopi, aut pulegij, aut calaminthæ, aut lupinorum: secundum clysteres sublinetur longanum, simplicibus quædam, acacia, aut hypocistide cū nitro, aut rhusiaco cum alumine liquido: at quibus aluus astricta est, lemnia sphragide, cum uino: compositis autem Andronis pastillo, similibusq;. Cedrinus autem liquor ipsis iniicietur per clysterem multis perurū foraminibus, quales ab utero metrenchytæ appellantur: aut carnem falsam commodè impositam deligamus, quamdiu sustineri possit, eamq; frequenter mutare oportet. Cæterum cōmuniter omnes quos lumbrici male habent, pellichneumonis iuuant, suffiri. Cibi præscribentur ipsis probi succi, & qui faciè in membra digeruntur, nec lumbricorum effectricem causam adaugent, nec uires superari permittunt, propter quas & uinū aquosum exhibebimus: frequentius autē nutrire ipsos ob hoc ipsum oportet, ne alimenti expertes lumbrici rosiones pariāt. dabitur autem cibus, tum præcipuè quum potissimum nutriti magis fuerint. At si alui profluuium fuerit, sciendum est lumbricos magis abundare, cibo non distributo, ac iam sorbiles agris cibi dantur, admixtis quibusdam etiam astringentibus, ut bi gratia, pyris, aut malo cotonio, aut malis punicis, præcipuè acidis, à foris autem uentri remedia continentia inducuntur, de quibus suprà dictum est.

De dracunculis.

Cap. LIX.

IN India & superioribus Aegypto locis dracunculi generantur, ceu animalia quædam lumbricos imitâtia, in partibus musculosis, puta brachio, femore, tibia: in pueris etiam latera sub cute perreptant & palam mouentur, deinde cum diu extremum aliquod dracunculi remanserit locus suppurat, & cute ipsius adaperita, initium ipsius progreditur: cum trahitur, dolores mouet, præcipuè abrutus. Quapropter nonnulli dicunt plumbeam molam ex dracunculo suspendendam ne uerfina,

uerſum, ſed particulatim molis pondere decadat. Alij uerò hos damnant quòd nihilo magis pondere molis plumbeæ dracunculus abrompatur, & dolores uarios concitet. iubent partem in aquam dimitti calidam, quò dracunculus tepefactus foras prorepat, deinde digitis ipſum membratim extrahere. At Soranus neque animal proſus, ſed neruoſi cuiuſdam ſubſtantiam eſſe putat, quòd opinionem motus ſolum præbeat, ſiue autem hoc ſit, ſiue quod prius dictum eſt, Sorano & Leonidæ, alijsq; uiſum eſt, calida ſuperfuſione & cataplaſmatis concoquentibus in his uti ex mulſa, farina triticea, aut hordeacea. Eſt cum emplatri uſum eiſdem potentiæ probant. Conuenit autem & quod ex baccis lauri & quod ex melle conſtat: emortui ſiquidem horum uſu dracunculi, nimirum quod continetur corpuſculum excidit. Suppuratione autem facta, niſi exiderit, cutis diuidenda eſt: ubi denudaueris, quod continetur auferes, & cutem linamento penetrabis, ac deinceps eam curandi rationem adhibebis quæ puri ſit maturando.

FINIS LIBRI QVARTI IOANNB
GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.






PAULI AEGINETAE LIBER QUINTVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.



Quomodo quis ab omnibus communiter
uirulentis bestijs se tueatur. Cap. I.



DE VIRVLENTIS bestijs præcipientes, ab ijs quæ in omnibus huiusmodi cõmuniter proficiũt, ex ordiemur, ita, ut quomodo quis ab illarũ iniuria se tueatur, prius expediamus. Si igitur aliquis necessitate quapiã coactus, loco feris frequenti obdormiat, ubi potissimũ salmandræ aut phalangia, aut serpẽtes aliqui abundẽt, horũ cauas latebras alio in aqua detricto, aut aliqua ex herbis quas expone-
mus, obturare conuenit Suffitus autẽ rectẽ excitantur ex cornu ceruino, caprarum ungulis pilisve, lapide gagate, bitumine, bdellio, galbano, cupressi aut cedri rasura, melanthio, peucedano, uiticis foliis, nepita, sagapeno, castorio, cachryos radice, cunila, aut ex reliquis grauitè olentibus aliquo. Culces autem propriè persequitur suffitus ex atramenti sutorij, melanthij syluestris, seminis cumini, paribus modis, item finus bubulus eosdem fugat. Ad hæc etiam ignes incendere crebriores uincit, sciunt enim magna parte feræ eorũ splendorẽ. Cæterum totũ substernere ex hastula regia, nepita, uitice, pulegio, polio, cunila bubula, abrotano, expedit. At si toto huiusmodi toto uti

non

non datur, † stratis saltē imponenda sunt. Iam uero animum adhibere oportet ijs quæ coquuntur, aquæ & uinorū cadis, ut exactē sint operculati. Focus autē non sub arboribus quibusdam excitabitur, præsertim pinu aut picea. in his n. salaman-dra, & crucæ lethales crebræ uersantur, quæ ab ignis tempore calefactæ, decidunt in obsonia aut alia uasa, si nō fuerint oper-ta. Qui uero tutiores esse uolunt, iis conuenit etiam ceratum corpori oblinere liquidius, ex cera, rosaceo, galbano modico, scobe ceruini cornus exigua, uel etiam æthiopico cumino: pe-culiariter autem maluæ folia cum oleo detrita si illinantur, ab apum & uesparum morfu præseruant.

† Hæc ita leguntur in antiquo libro, περιεξ γυν τῆς αἰσώμης ἀντὰ τὴν δέναν, id est, circum lectū saltē ipsa ponere oportet.

*Communis omnium qui à uirulento quopiam morfi
uel iccū sunt curatio. Cap. II.*

Quod si feriri aliquē aut morderi à uenenato animali contigerit, homo adhibendus est qui uulnus exugat. nō tamen eum ieiunū esse oportet. uerū etiā uino os col-luisse, & oleū in eo continere. Deinde particulæ cōmorsæ, si ad mittit, cucurbitulā cū multa flāma adhibere oportet, sicut uici-næ etiā partes scarificentur. Nā uirus unā cū sanguine, & spiri-tu rursus ita extrahitur. Itē exulcerata adurere ac crusta obdu-cere, adeoq; præcidere cōueniet, si fera quæ momordit, lethalis fuerit, quales aspis, cerastes, uipera, similesq; aliæ sunt quæ ad-modū Galenus memoriæ prōdit, uinictorem quendam à uipera morsum ubi ferā cognosceret, falce læsum digītū statim absci-disse, atq; in totū periculo liberatū. At si uenenum per corpus fuerit dispersum, sanguis statim de mittendus est, præcipuē si i s qui perculsus est, plethoricus existat exhibere cum cibis eden-dum piper aut allium conducit: potui, uinum ualidum: recentibus uaporibus, & cōuenienti naturæ caliditate, corporis tem-peramentum replere, deinde iis oblinere, quæ cōmorsam par-tem possunt calefacere, & uellicare. Imponetur itaq; cinis bras-sicæ aut fici aceto mistus, aut lixiuia, aut garum, & cæpe cum polenta aut panis: item porra abunde cum sale, aut pix liqui-da cum sale, calida: aut cedrus, aut simus caprillus. Conuenit autē ipsis acētū calidum quoq; superfundere, in quo nepira sit incocta:

incocta: aut acetum & aquam marinā aut acetum cum muria. Cæterum locis effectis gallinæ, & magis galli gallinacei, aliæ uer animantia per medium dissecta, calida imponi debent. Nam uirus transsumunt euocantq; & dolores mitigant. Emplastra quoque utiliter applicantur, tum hoc quod sale, tum illud quod cachry & adarce constant: in totum, quæ acrioris sunt potentia. Omnes uero communiter & morsu, & isti à quocunq; tandem uirulento animali, præterquam si interiora omnino offensa non sint, potabunt serin, aut ericen, aut astragalon herbā cum aceto, aut bitumen, aut paliurū similiter, aut ueteris rhu decoctum, aut mustelę inueteratę drachmæ duæ ex uino sumptę, præsentī sunt remedio, uel marinæ testudinis sanguis, aut castorei drachma cum diluta uini potione, aut roris marini tantundem, aut sicyonis radicis aut porri succus, aut chamæpitys, aut smyrnium, aut cinamomum, aut aristolochia, aut uicicis semen, aut cupressi pilulę, aut seseli, aut piper, aut trifolij semen, aut bacce lauri, aut cancer fluuiatilis tostus aut elixus: item composita hæc Theriace utilis est.

Theriacē aduersus uirulenta & lethalia uenena, uiperæ morsus, & scorpionis ictus.

BRyonia, opopanacis, iridis illyricæ, roris marini radicis, zingiberis, singulorū drachmæ quatuor, aristolochiæ drachmæ quinque, lachrymæ thuris, rutæ syluestris, singulorū drachmæ tres, farinæ erui drachmæ duo: singuntur pastilli uino, danturq; singuli qui treis obolos pendeant, ex eodem uino. Cæterum purgatio omnibus conueniet, desudationes, & theriace ea uiperis assumpta.

De rabiosi canis morsu, & metu aquæ, quæ hydrophobia dicitur. Cap. III.

EXordium sermonis à rabiosi canis morsu capere, quàm ab alijs muluimus, quod animal & sæcundū prouentu, & contubernale homini exultat, rabieq; sæpius corripitur, & ægrè caueri possit, ac periculū ab eo sit inuitabile, nisi multis aliquis & conuenientibus usus fuerit præsidij. Rabiunt canes plerunq; in æstu uehementiore: autem Lycus memoriz mandat, interim etiam per frigora maxima: rabidi autem & pocum & cibum auersantur, siti premuntur, neq; tamen bibunt: anhelant præterea non parum, aures inclinant, saluam & copiosam

piofam & spumantem ædunt, & muti in totū sunt, & ueluti infani, ut ne domesticos quidem agnoscant: insiliunt itaq; sine laetitia omnibus pariter & bestiis, & hominibus, mordentque. ubi momorderint, statim quidem nihil molestię adferunt, præterquam ex uulnere dolorē: postea uerò aquæ metum, hydrophobiam Græci appellant, faciunt, qui cū conuulsione, totius corporis rubore, præsertim faciei sudore, & anxietate accidit, aquā fugiunt, & dum uident, & dum admouentur: nonnulli etiā omnem humorē. alij canum ritu delatrant, & obuiū quemq; dentibus appetunt, morsuq; suo in alios eandē affectionē transferunt. Porro accidentiū, aliorū quidem causa manifesta est, occupatis. Si ueneno partibus uniuersis: metum uerò aquæ nonnulli ex immodica fieri siccitate dixerunt, quasi humida ipsorum substantia in contrarium penitus habitū mutata. uerum Rufus talem melancholiæ speciem ipsis oboriri pronuntiavit, ueneno humorem illum imitato: quemadmodū alios melancholicos nouimus alia timere, quæ causa superuenit etiā ijs qui dicunt canis qui momorderit imaginē in aquis opinari se uidere. At ex ijs qui hoc uitio sunt occupati, nullum, præterquam unum aut alterū, superuixisse, ex historia didicimus, eosq; non à rabioso cane morsos, sed ab homine quodā morsu uitium adeptos. At ante affectus huius occupationē multi etiā quos canis momordit, seruati sunt hinc igitur curatio auspicanda est. Quoniam uerò subinde, eo quod tunc aquæ metus non inuadat, (magna. n. ex parte circa quadragesimū ferè à morsu diē solet ingruere, quibusclā & post sex menses, proditū est nonnullis post septem quoq; obuensis) nonnulli canem qui momorderat non rabire arbitrati sunt, properarunt uulneri cicatricē inducere: unde ipsi causam huic affectioni dederunt, hac autē probatione usus deprehendes, morsu rabiosi ne canis fuerit, an non. Iuglandibus nucibus concisis vulnus diligenter obstruitur, sequenti die ablata, gallinaceo, aut gallinæ in cibo apponuntur: ac primum sanē non attingent, fame autem urgente si edant, rem considerato. Nā canis qui momordit si nō fuerit rabiosus, uiuent: si rabidus, sequenti die peribunt, atq; tunc ad uulneris dilatationē properandū est, iterumq; post paucos dies eadē probationē tendū, & si non perierint gallinacei, tunc uelut ad cicatricē perduces, nullū ueritus periculum. Hanc itaq; probationem Oribasius tradit. Quod si ex cōmemoratis indi-

cijs accuratè canem rabire cognouerimus, statim iis medicamentis quæ aperiundi uim habent, utemur. Primum igitur ex aperiuntibus est, quod pice, aceto quod acerrimo, & opopanace cõ fiat, in capite de neruorũ uulneribus explicatũ: at si qui mortuum accepit, delicatiorẽ cutem habeat dilui ipsum irino debet aut balsamo, aut eiusmodi aliquo: uel ulcera prius fomētis ad iura, allio obduces. hoc quod sequitur etiam crustam facit.

Aridum ad crustam in canis rabiosi morsu excitadum.

Salis fossitij drachmæ octo, chalcitidis drachmæ sedecim, scilicet tantundem, rutæ uiridis drachmæ quatuor, æruginis rasæ rotidem, marrubij seminis drachma: utitor primũ arido ut crustam inducat, deinde cum rosaceo, ut crustæ excidant. Cæterum partes affectæ ad dies quadraginta duos, ut minimum, sine cicatrice seruentur.

Cataplasmata quod oras uulneris latas in rabidi canis morsu seruat.

CEpæ cum sale & ruta inducuntur, aut laserpitiũ cũ sale, aut salsamentũ uetus, aut cinis sarmentaceus cum oleo, aut alia, aut sambuci folia, aut mentha, aut apiastrũ, singulatim, aut eũ sale: aut iuglandes nuces, cũ allio, sale & melle, aut cinis fici, cerato exceptus, uulnus autem aqua, abluetur, in qua decocto sit chamæmelum, & syluestris lapathi radix. Nonnulli & fetrocandenti ulcus adurunt. Cæterũ potui assument cõmorsũ, simplicia quidẽ, lycium, absinthiũ, liquorẽ silphij, chamædriũ, scordiũ & poliũ: composita autẽ hæc, cancerorũ fluuiatiliũ, sarmætorum uitis albæ, in cyprio uase, aut æreo cõbustorũ, cochlearia duo, gentianæ radice læuigatæ cochlear unũ, cum uini meri ueteris cyathis duobus, ad dies quatuor potui dato, aliqui uerò & perdicis sanguinis duo cochlearia addunt. Capies autem canceros dũ lina increfcit, priusquàm sol exoriatur. iis autẽ qui eodem die non biberunt, duplicẽ portionẽ exhibeto, interim & triplicem. Iam theriaca ex uiperis rectè datur. Purgare expedit medicamẽto ex cucurbita syluestri, ita ut quotidie, id exhibeas, cum decocto elelisphaci, aut sideritidis heraclis, quam & dialyson appellant: nonnulli uerò & iecur canis qui momordit edendum dederũt. Cæterũ uictus ratio talis adhibenda est, quæ simul ueneni uireis haberet extinguatq; , simul & descensum ad interiora prohibeat: quæ duo præstare potest, uini dulcioris uetusti

uetusti & meraci, lactisq; portio idem efficiunt allia, porri & cepæ in cibo sumpta. At si per initia ob impedimentum aliquod non præsumpta quæ retulimus remedia fuerint, carnis præscissio uel cucurbitulæ, uel ustio non adhibenda est, ut quum iam uenenum penitus secesserit: medicamentis autem quæ euocent, Græci metasyncretica uocant, uti consilium est, aquæ metu uidelicet non oborto. purgatio ex hiera & scissili lacte petetur. item sudoris euocatio, dropacismus & sinapismus, toto corpore particulatim adhibebitur. omnium tamen efficacissima deprehensa est purgatio quæ fit per ueratrum.

Ad morsus canis non rabiosi. Cap. IIII.

Canis non rabiosi morsus, quum & ipsi uirulentæ cuiusdam substantiæ sint participes, statim aceto irrorans, laeta manu morsum ferito. insuper nitrum cum aceto tritum ex alto in patrem fundito, deinde spongiâ recentem aceto, aut ipso nitroso aceto madidam inponito, triduo id ipsum superfundens, tandem enim consanescet: uel erui farinam oleo maceratam inponito: aut spongiam recentem, aut lanam succidam aceto & oleo imbutam accommodato, aut rubi folia cū aceto tunsa inducito, aut cepam tritam cum melle, ut origani comæ, salis, cepæ, pares singulorum modos cum melle: uel mar rubium nigrum, quod & balloten dicunt, cum sale ad feruidos autem iam morsus, erui farina melle macerata admouetur. peculiariter enim his efficax est: inflammatione consistantes, argenti spuma trita ex aqua oblinito.

De uestis & apibus. Cap. V.

Apium ictu dolor sentitur. locus rubescit, propinquæ partes tument increscuntq;, aculeus, in uulnere relinquitur. In uestis autem similia quidē, sed intensiora omnia sunt, nec aculeus relinquitur. Remedio sunt aduersus utraq; lutum, & bubulus simus, illita: & lac ficulneum, aut læuigata mori arboris folia, aut malux: aut farina ordeacea ex aceto inponitur. quinetiā mutia aut marina aqua fouere cōducit.

De phalangijs. Cap. VI.

Phalangiorū morsu, locus ipse quidem rubescit, & ueluti punctus per ambitū apparet, non autem tumet neq; inflamescit, sed leniter rubidus frigore & pruritu uexatur.

Comites notæ percussorum sunt perfrictio, tremor, corporis grauitas, sudor frigidus, dolor ualidus, pallor, cōtinua urinæ excernendæ incitatio: quibusdā & urinæ difficultas, colis intensio, oculi hument: inguina & poplites intenduntur rigentq; cōuulso modo, ualida stomachi rosio urget, lingua sermonem manifestò non explicat, uomitus aquæ uel aranearum textis si milium erumpit. sunt etiā quibus per urinas, & aluum eadē descendūt demissi igitur in aquā calidā dolore liberantur, ac rursus ualidè indolent. Auxilio est, si extrinsecus cinerē ficulneū cum sale læui ex uino maceratum, imponas: aut radicem syluestris punicæ tritam, aut aristolochiam, cum farina ordeacea aceto madefactam. Iam & ulcera funere marina aqua calidiorē, aut apiaſtri decocto, conducit, eiusdemq; folia imponere, ad hæc balneum frequentius utile est, atq; his potionibus medicis ut: uti abrotani semine, anetho, aristolochia, agreſti cicere, cumino æthiopico, cedri baccis læuigatis, platani cortice, trifolii herbæ seminæ, myrticæ semine, singulorum drachmis duabus cum uini cyatho & uiridium cupressi foliorum aut pilularum decocto, uino temperato. Ferunt nonnulli & cancrorum fluuiatilium succum cum lacte & apij semine datum, periculo subtrahere.

De araneæ ictu.

Cap. VII.

Est quoddā etiā aranearum genus quod percussu ualidos dolores circa media præcordia excitet, item ruborem, & urinæ difficultatem, nonnunquā & suffocationē. Leuantur autē ictu hisce remediis: cumini syluestris thebaici, aut uiticis seminis, aut albæ populi foliorum potio, uel alijs solis assumptis & uino meraciore superbibito iuuantur.

De scorpionis ictu.

Cap. VIII.

A Scorpione ictis locus quā primum inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nūc feruor, nunc frigus uicissim inuadit, acceditque dolor qui itidem modo decreſcit, modo intenditur, comitatur ipsos sudor, horroris sensus, tremor, extremorum perfrictio, inguina his attolluntur, particula intenditur, sæpe etiam flatus cum sonitu per sedem erumpunt, pili rigent, cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excipit. His auxiliantur protinus, lac ficulneum instillatum uulneribus,

neribus, ipsæq; scorpio qui percussit minutim contritus, uul-
neriq; impositus, sibi remedium est. post hæc est sal tritus cū li-
ni semine salutariter imponitur, itē altheæ herbæ semen: suc-
currit & sulfur uiuū resina terebinthina exceptū: similiter ēē
galbanum splenii modo dilatatū impositumq; nepitaq; læui-
gata & applicata, & ordeacea farina in uiño parata & in ruta
decocto exhibita. auxiliatur his ēē trifolii herbæ semen læuigā-
tum iniectumq;. Ad hæc, portiones hæc cōueniunt: aristolochiæ
drachmæ duæ, præsertim corticis cum uiño, gentiana tusa, pu-
legiumq; abundē decoctū, itē bacca lauri numero decem le-
uigatæ, nepita cū posca largiter incocta, cyperis cū uiño, ruta
similiter, lac siculneum & laserpitiū, si adsit, si desideretur, par-
thico liquore utendū erit. benefacit ēē trifolij ocimiq; semen
eporū. Idem præstat argenti spuma subito ictui præter opinio-
nem imposita omniū aut hōrum uicem præstat balnei conti-
nuus cum multo sudore usus, uini potio plenius diluta. Porro
composita hæc potari debent: sulfuris uiui fabæ Aegyptiæ in-
star cum piperis granis octo, in dimidia uini hemina: uel liquor
laserpitii cum cancro detrito in uiño: aut melanthii, cumini
æthiopici, uiciis seminis, pares portiones cum uiño.

*Ad scorpionum periculorum & pha-
langiorum ictus.*

FECIS drachmæ sedecim, pyrethri drachmæ quatuor, ruta syl-
uestris seminis drachmæ tres, castorii, erucæ seminis, singu-
lorum drachmæ duæ: excipiuntur sanguine hirudinis marinae.
dantur quaterni oboli cum uini meraci uel aceti cyathis tri-
bus. **A. T. I. V. D.** Pyrethri, aristolochiæ, singuli trientes, piperis
drachmæ duæ, liquoris laserpitii drachmā: exhibetur ad fabæ
Aegyptiæ magnitudinem.

Descolopendra terrestri & marina. Cap. I X.

AT si scolopendra momordit, communiter quidem locus
affectus in orbem liuescit attolliturq; aliquando feci si-
milis, rarius autem ruber apparet, exulceraturq; statim
ab ipso morsu adeo ut uix magno labore curari queat. præter
hæc etiam toto corpore pruriginis sensus percipitur peculia-
liter autem iis qui à marina scolopendra imperiti sunt, aquo-
sus pellucidusq; tumor interim efficitur: à terrestri, rubens. Pla-
gæ igitur imponi debet sal bene tritus uel ruta leuigata, aut cinis

aceto maceratus, aut scilla. Fouendus locus est muria cū aceto. Arigenes aut oleo calido liberaliore fieri id iubet & prædicta sic imponi. Potui dabitur aristolochia cum uino, aut serpillum, aut calamintha, aut syluestris ruta, aut trifolium aut succus radicis hastulæ regiz dimidiæ heminæ mensura cum uino.

S Ad stellionis transmarini morsum. Cap. X.
Esamo trito cataplasmatibus modò obducito.

De fele. Cap. XI.

Q Vi à fele mordentur, ualide quidem dolent, & locum affectum liuidum habent, sed statim cepæ & allia ictui applicata, auxiliantur. insuper eorundem esus, uino meraco superassumpto, remedio est.

De mure araneo. Cap. XII.

V Bi uerò mus araneus nocuit, sequuntur dolores pulsátiles, & in singulis detiū eius animalis ictibus, rubores: pustula insurgit sanioso humore plena, propinquæ partes oēs liuent: cute pustulæ dirupta, albū ulcus apparet. nā ad mēbranas neruofas deraditur. ad hæc, excidunt et partes exese depastione oborta, his quæ serpunt simili: præter ea et intestinorū tormina comitatur, urinæ difficultas, & frigidi madoris undiq; eruptio. Auxiliatur ipsis galbani spleniū per se impostum, uel tritū cū aceto, uel ordeacea farina, cū oxymelite applicata, ipsèq; mus araneus qui momordit dissectus admotusq; sibi est remedio. aduersatur et pyrethrū illitum, uel mali punici dulcis corium incoctū, uel malua syluestris, uel allia contrita, uel sinapi læuigatū cū aceto: itē ex calida muria fatus conducit, deinde ordeū ustū ex aceto applicatū. Potui propinabitur abrotanū ex uino coctū, aut sisymbriū, aut serpillum, aut eruca, aut galbanum, aut elelisphacum, aut teneræ cupressi pilulæ cū oxymelite, aut pyrethrū cum uino, aut chamæleonis radix, aut hœdi agniū coagulū, aut gentianæ radix, aut uerbenaca, quæ etiam imponitur cataplasmatibus modo: ipsumq; murem qui momorderit, exactè detritum cum uino bibunt. Efficax hoc etiā quod sequitur: myrrhæ drachmæ sex, aristolochiæ corticis drachmæ quatuor. porrò ad muris aranei & scolopendræ morsum. sal cum liquida pice rectè applicatur, aut cedria cum melle, aut allium cum fici foliis & cumino, aut calaminthæ folia, uel ordeum etiam cum aceto.

De uiperatum mare tum fœmina. Cap. XIII.

IN uiperæ tū maris tū fœminæ morſu ſimiliumûe animailium uirus iaculantium, dolor loci ſtatim ab initio ſequit̃, mox totius corporis: apparent et̃ in morſu duo foramina paruo inuicẽ ſpatio diſcreta, ſluitq̃; ex his ſanguis humorq̃; ſanioſus, deinde oleoſus, poſtremo et̃ æruginofus, quẽ nonnulli uirtus uiperarũ eſſe dicunt, præter hæc tumores iuxta morſum ſubrubri liuidiq̃; aſurgũt, corporis color perit: uertigines oculorum, ſtomachi reſolutio, & animę defectus oboritur, quibusdam et̃ uomitiones bilioſæ, urinæ anguſtia: inſuper puſtulæ in cõmorſa parte erũpunt, ueluti in ambuſtis: itẽ depaſſio ipſam inuadit, ad uicinia procedens, gingiuarũ his eruentantur, accedit etiam tremor, ſopor, & frigidi ſudores. minori aut̃ cum periculo liberari, quos uipera mas, quàm quos fœmina momordit, uidentur: ex his ipſis minus periclitantur qui cibum præſumpſerunt. In curatione autem præſtantiffimum remedium eſt, alii eſus, & uini meraci potio, adeo, ut ſi aliquis uti ſuſtineat, nullum præterea remedium deſideret. edũtur etiam utiliter & porra & cepæ & ſaſſamẽcum quàm acerrimum. Sunt qui & ranas in cibo elixas dederunt, benefaciunt & hæc quæ ſequuntur cum uino ſingulatim pota: teſtudinis marinæ ſanguis reſiccatus cum cumino ſylueſtri, coagulũ leporis, aut hinuli tribus obolis, ceruini genitalis ſicci, anchuſa tenui folia tota, hæc autẽ nonnulli et̃ collo ſuspendunt, porri ſuccus dimidiæ hemina mensura ex mulſa, apiaſtri foliorum ſuccus, ſylueſtris ruta, gallinarum cerebrum, panacis radix cum uino incocta, agarici drachma, iuniperi baccæ, haſtulæ regiæ radix, piſtacia trita, uitiſcis ſemen, multellæ inueteratæ ſiccataq̃; drachmæ duæ: echini radix ſuccusq̃; canceri fluuiatiles aut per ſe, cumq̃; herba pedicularia, ſale & polio: ariſtolochiæ radix cum myrrha, gentiana, baccis lauri, æquali modo melle excepta, atq̃; hoc quod ſubiungam mirificẽ efficax eſt.

Oribasii ad uiperarum morſus.

ANiſi acetabulum, piperis, drachmæ quatuor, ariſtolochiæ corticis, opij, caſtorij, myrrhæ, ſingulorum drachma: paſſo læuigata in paſtillos inſtar fabæ Græcæ cogiro, & pro uiribus cuiuſque exhibeto, cum ternis diluti uini cyathis.

ALIUD, ex Lyci commentariis medicamentũ uiperæ morſibus

praesentaneum, Myrrhae castorij, piperis, sandarachae, singulorum drachma, anethi seminis acerabulum: laeuigata ex passio dantur. ALIVD. Ex Archigenis commentarijs. Cancros uiginti cum farina triticea quod satis est, in pila diligenter contundito, admixtaque nepita & salis momento, pastillos fingito & siccato: in usu, cum lacte applicato, unumque cum mulla potato. At si fluuiatiles cancros desideres, marinis utitor. extrinsecus autem plagae inductus caprarum simus ex uino strenue auxiliatur: aut lauri folia cum oleo incocta, aut baccae lauri, aut nepita, erica, ruta, apium, abrotanum, galbanum in splenio adhibitum, origanum uiride laeuigatum, gallinacei pulli dissecti, † & protinus calidi impositi: farina erui cum uino macerata crebro emplastri forma illita, raphani cortex laeuigatus, scilla cocta, farina hordeacea ex oxymelite, cucumeris syluestris folia cum tenuissimo farinae ordeacea polline, sex uini similiter cum farinae polline, ruta cum sale & melle, surfures in aceto coctae, cinis cum aceto, cedrinus liquor cum sale, pix liquida cum sale. Foueri debent trifolij decocto aut pulegii, aut muria aceto adiecto. Quum autem subcruenta pustulae euaserint, ipsas scarificabis, ita ne excories. deinde multa aqua foueto, lenticulam coctam cum melle obducito, dum consanescant. At ex uiperis antidotum proprie his & potum & plagae impositum efficax est.

† Melior est uetus cod. *ἐπιτιθέμενοι θερμὴ καὶ συχνῶς ἐπ' ἀλλήλους*, id est, calidi impositi & frequenter permutati.

De amphibena & scytale. Cap. XIII.

Consimilia ex horum moribus eueniunt, eademque; ipsis auxiliatur, quare peculiarem aliquam descriptionem sortita non sunt.

De dryino. Galeni haec praefatio. Cap. XV.

Dryinus in quercuum radicibus uitam agens, tam malefica parataque; ad nocendum ui est, ut calcatus solum, pedes hominis cute nudos relinquat: totisque; cruribus tumorem laxum quem oedema uocant, copiosum excitet. Ad haec quod multo magis est mirabile, forunt omnes eorum pariter manus excoriari qui curationem uitii administrauerint, & si quis ulciscendi studio interemerit, dicunt hunc praeuimodum olere, illoque; suo foetore omnium aliorum odorum sensum auferre. Ictis ab hoc animali tumor circa locum uitiatum cum

cum rubore excitatur, pustulæ in circuitu assurgunt. aliquândo aquosa sanies emanat, stomachi erosio uexat, & torsiones. Cōgruit ipsius aristolochia uino pota. item trifolium herba, radixque hastulæ regiæ consimiliter assumpta. prōdest cuiuscunque quercus fructus lænigatus, & epotus. Idem ilicis radices tu-
sz, & loco admotæ auxiliantur.

*De hæmorrhoo, & prestere seu dipsa-
de. Cap. XVI.*

Qui hæmorrhoi ictum sensere, ualidos experiuntur cruciatus, admodum exigua angustaq; reddūtur cor-
pora ex dolore continuo, multus ex plaga sanguis erūpit: & si cicatrix toto corpore inducta fuerit, rūpitur, funditq; sanguinē, cruēta excernūtur recrementa, sanguis qui de-
fluit in grumum concretus est: russi ex pulmone sanguinem reiiciūt, quē euomentes ēt sine remedio intereunt. A dipsade percussos ardor intolerabilis urget, sitis tanta excruciat, ut nec
extingui, nec intermitteri possit, copie sē potū ægri hauriūt, eadē
tamē siti cōficiunt, tanquā nihil planē hausissent, similesq; to-
to habitu sunt ijs, qui antea potus nihil hauserint. unde pro-
pter cōtinuā potus assumptionē præstet ab urendo, dipsas à si-
giendo serpens appellatur. Multi aut ueterum ab hæmorrhoo
& dipsade commotos ceu desperatæ salutis & conclamatos
esse putauerunt. Porrò si specialia aduersus feram præsidia de-
sideremus, communia tētare oportet, ac protinus scarificatio-
nem ustionemq; adhibere: & si liceat partem uitiatam præci-
dere. deinceps aut acria cataplasma imponi debent. utilia sūt
omniū ciborum acrium esus, præsertim quæ ex balsamētis pe-
tuntur, uini meraci potio, & lauacrum hæc autem continuē, &
exiguīs temporum interuallis subinde adhibenda, priusquam
morbi corripuerint. nam ubi illi semel emerferint, nulla medi-
corum ope iuantur. Cæterum remedia, quæ loco inducūtur.
contra morsus inscripta reperimus, dipsadis quidem, portula-
cæ folia contrita ex aceto, polentam, rubi folia cum melle læ-
nigata, plantaginem, hyssopum, allium album, porrum, rutam,
urticam, hæmorrhoi præter iam dicta etiam hæc benefaciunt,
uitis folia cocta cum melle læuigata per os autem hæmorrhoi
ipsius crematum potui datur, aut allium cum irino oleo: esui
dantur etiam uuæ passæ.

De natrice quam Græci hydropion dicunt.

Cap. XVII.

Natrice morsu ulcus factū dilatur, & liuescens auge-
tur, sanies ex eo nigra copiosa, & foedi odoris, qualis
ex depascēte ulcere, excernitur. Curatio mali, tēporis
processu, & uix procedit. imponet itaq; moribus origanū læ-
ue, ex aquā maceratū. confert & cinis quercus, oleo tēperatus:
uel ordeacea farina cū melle deliquato bibit, itē aristolochia
drachmis duabus diluta uini portione, uel in poscā duobus cy-
this: deinde marrubij succus aut decoctū cū uino, aut nastur-
tium syluestre, aut semen hastulæ regiæ seu flos, aut fœniculi
semen cum uino: item recens fauus cum aceto comeditur:

De Cenchro. Cap. XVIII.

Quod si cenchrus nocuit, morsus eius uiperæ similis
est, putredo comitatur & carnes intumescit prius,
ut in aqua inter cutē, defluunt, lethargo ueternoq;
premuntur. Testatus Heraclistratus est, iecur ipsis, uescam, & co-
lon affici: resectis siquidē ipsis, partes quodammodo corruptæ
inueniuntur. His igitur lactucæ semen cum lini semine appli-
catum auxiliatur. uoccurrit & satureia trita, ruta syluestris, ser-
pillum cū hastula regia læuigatum. potui uero datæ protinus,
cēntaurij radicis drachmæ duæ cum ternis uini cythis: aut
aristolochiæ radix similiter, nasturtium itidem & gentiana,
potu conducunt.

De Ceraſte & Aspide. Cap. XIX.

Tria aspidis genera Galenus prodit, primam eius quam
cherſæam quali terrestre uocant, mox eam quæ chelido-
nia dicta est, tertiam pyada appellarunt, quæ omnium est
perniciosa. siquidē erecto collo, extensoq; pro distantia lo-
ci, ad quē dirigit, uenenū in hominē iaculatur. hanc memoriæ
tradit, reginā Cleopatram, quā Antonio deuictō Augustus eā
capere uellet, sinistræ mamme admouisse, morsamq; ab ea in-
teruisse, ut quæ longē celerrimam mortē inferat. Porro cera-
stis, morsu locus cum duritie & pustulis intumescit, emanat ex
uulnere sanies, modò nigra, modò subpallida & porraceo colo-
re: totū corpus uaricum modo attollitur, genitale arrigitur,
mens alienatur, oculi obscurescunt: postremò, conuulsione ut
in tetano pereunt. Verū aspidis morsus acus puncturæ simi-
lis, om-

lis, omnino exiguus sine tumore apparet, sanguis non copiosus, sed exiguus & niger destillat, subita oculorum hebetudo inuadit, dolor corporis multiplex admodum, sed mitis, nec sine uoluptate comitatur. Quapropter rectè Nicander cecinit.

Et uir perit absque dolore.

Mutatur color & uirescit, stomachi rosio exigua infestat, frons continuè reuellit, palpebræ sine sensu ueluti in somno commouentur, atque inter hæc morsprehendit, ne tertia quidam diei parte dilata. His itaque utrisque membri affecti mutilatio mox à morfu facta, succurrit: eoque sine mora, si fieri potest, præcidendum est, & in his & propinquis partibus omnem carnem circum secare statim, & radicitus usque ad os excindere oportet: deinde reliquæ ferro candenti exiccandæ sunt. etenim horum uirus, sicut & basilisci, taurino sanguine similiter, celerrimè sanguine sistræ, celerrimè sanguinem in arteris & spiritum coagulat.

De basilisco. Cap. XX.

Hæc bestia rarò quidem hominum oculis occurrit. Erastriatus autem hæc inquit quum basiliscus momorderit, plaga sub aureo colore tingitur. conducunt ipsi, inquit, castorij drachmæ tres potæ. similiter etiam papaueris liquor. Nos autem hæc experti non sumus.

De pastinaca marina, & muræna. Cap. XXI.

In marinis nempe pastinaca & muræna, agnitio manifesta est, pisces enim hi ab omnibus cognoscuntur. Auxiliatur ipsorum moribus lactis siculnei guttæ quatuor aut paulò plures, cum ramusculis, serpilli tribus aut quatuor, & quæ ad uiperas commemorata sunt.

De dracone marino. Cap. XXII.

Marini draconis ictum plumbo infricato, aut serpillio trito obducito, aut lente elixa, aut sulfure cum aceto, aut dracone ipso euiscerato, foueri locus urina humana debet, absinthium cum diluta uini portione bibi: aut eleliphacus, aut fureuli siculnei, in dulci uino dilutum, aut piscis ipsius cerebrum.

De scorpione marino. Cap. XXIII.

Scorpij marini ictum sanat nullus piscis dissectus impositusque, sulfur uiuum cum aceto infricatum, baccæ lauri tres tritæ potæque.

Quomodo

Quomodo testudinis marinae sanguis præparetur. Cap. XXIII.

Testudinis marinae sanguis in hunc modum præparatus, reponitur. In ligneo aut fictili uase resupinata testudine, caput ipsius celeriter amputato. cōcretum autem sanguinem in multas partes arundine diuidito, impositoq; operculi instar uasi cribro: siccatum excipiens utitor aduersus uiperarum morsus, ut prædictum est, drachmis duabus cum uno aceti cyatho. sequenti drachmis quatuor, cum duobus cyathis: tertio die, drachmis octo cum tribus aceti cyathis.

De crocodili morso. Cap. XXV.

Ad crocodili morsus nitrum cum melle tritum usque dum ulcus repurgetur, imposito: deinde repleto melle, butyro, medulla ceruina, adipe anserino. Galenus autem tradit se cognouisse qui a crocodilis commorssi, adipe ipsorum imposita uulneribus, exacte fuerint adiuti.

De hominis morso. Cap. XXVI.

Non extra institutum fuerit, cum uirulentis bestiis, et hominis morsus conscribere. siquidem maligniores multo aliis ulceribus apparent, praesertim si ieiunus momorderit, prius leguminibus usus, & praesertim lenticula. Comuni-ter itaq; quae in aliis uirulentis commemorata sunt, et in his extrinsecus per initia moribus applicare conueniet, praeter ea quae nimium acria, adurentiaq; sunt. peculiariter autem oleo morsum prius illitum, foeniculi radice cum melle obducito, aut lomento cum posca & oxyrhodino, frequenter immutans. Emplastro autem hoc utere, quod recipit squamæ æris, galbani, æruginis singulorum uncia, teræ libram, plumbaginis libras duas, olei sextarium: plumbago cum oleo prius incocta assumet æruginem, & squamam: ubi coierint, quae liquari possunt adduntur. Finita autem inflammatione, communis ulceris modo etiam hæc curabis.

De uenenis. Cap. XXVII.

Quum de uirulentis bestiis succincte tradiderimus, proximū fuerit, ut de uenenis sermonem aggrediamur, sim-
plicia quidem referentes eorumq; notas & remedia, tum
cōita, tum specialia: cōposita autem ex studio omitemus, etenim nonnulli uariorum medicamentorum lethaliū cōpositiones exposue-
runt, quæ nocere magis, quam iuuare legētes possunt, neq; n ex-
acta horum

etia horum indicia in his qui assumpserunt, inueniuntur, ut etia congruum ipsis remedium queas adaptare. Quum igitur hæc uaria ex superante in ipsis ui appareant, id etiam aliquis rectè quod exhibetur, uarium adaptans, nonnunquam ex æquo, nonnunquam ut excellat, medebitur. Incipiemus itaq; & hic rursus à præcautione.

De uenenorum præcautione.

Cap. XXVIII.

DE uenenosis medicamentis disciplinæ ea pars quæ præcauere illa, & declinare præcipit, longè difficillima est. propterea quòd ij qui huiusmodi insidias homini clàm machinantur, tanto id astu faciunt, ut uel peritissimus quisque decipi possit. siquidem amaritudines uenenorum dulci aliquo admixto, obtundunt, grauemq; odorè odoramētis additis operiunt. interim ceu ad sanitatē, salutisq; gratia in morbis hæc propinare crediti, quod genus est absinthium, abrotanum, opopanax, castorium, uenena ipsis admiscunt, tum in cibis, puta solidioribus, uel obsoniorum uarietate adumbrantes, ipsa offerunt, unde cui in suspitione huius doli uita fuerit, uitare eum oportet condita elaborataq; cibaria, omneisq; in gustu qualitates intensiores, exempli gratia, dulcis, acidas, & salas, potissimum uero aquæ quod satis est præsumere oportet, restincto enim hac appetitu, postea qualitates aliæ à stomacho non apprehenduntur. ueruntamen alia quædam ratio asserendi hominem ab iniuriis uenenorum est, est efficacior. Couenit. n. quum suspicio mali medicamēti accepta fuerit, præcomedisse aliquid quod obtundere uenena possit, & inefficacia reddere: cuiusmodi sunt caricæ cū nucibus iuglandibus, ruta, salis grummo, & quæ mala medica dicuntur: item naporum semen drachmæ pondere cum uino, aut nepiræ folia, aut terram quam lemniam sphragidem uocant, aut tutæ folia uiginti: nullamq; nocebit uenenum. Iam uerò antidota cum uino quotidie fabæ Aegyptiæ instar assumpta, tutò admodū præseruant, quale est quod terrestri crocodilo constat, dia scincu dicitur, & quod à uariorum animalium sanguine dia hæmaton uocatur, & Mithridatium, hoc aliquando etiā ipse rex Mithridates usus est, quotidie præsumens, ut à lethali medicamento se uiuicaret, præseruaretq;. Quum igitur à Romanis captus, bis lethali medicamento epot9, mori non posset, gladio sibi ipsi uitam ademit.

Quoniam

Quoniam uerò etiā citra insidias propter necessitatē aliquando locis desertis nociuis uersantes. fortē sub arboribus, ut picea aut pinu cibum assumunt, diligenter attendendū est, ne ex his aut superioribus locis mortifera labantur animalia, & uasa, tū quibus hauritur uinum, tū quibus aqua, tū quibus obsonia incoquantur, exactē operculentur, quemadmodum in uirulentorum animalium præcautione expositum est.

Communis uenenorum quomodocunque assumptorum curatio. Cap. XXIX.

AT si nonnulli lethale uenenū sponte sua, ut mortem si bi consciscant, assumpserint, qualia multa in hominū uita solent accidere, aut etiam aliquorū insidiis, siquidem nobis constet quod ueneni genus potatū sit, protinus ad conueniēs ei remediū discendemus, ut in horū enumeratione dicetur: at si medicamen exhibitū tunc nobis fuerit incertum incognitumq; , conuenit statim ad ea quæ cōmuniter ad quæcūq; uenena sumpta congruunt, diuertere. Nam indicia quæ comitantur si expectes, nihil planē in medicina spei est, egris propter moram iam deploratis, desperatisq; . Actutum igitur nulla mora interposita, oleo calenti per se, aut etiam cū aqua exhibitō, uomere cogendi sunt. Si eius copia non est, butyrū cū aqua calida ingeri debet: aut malux, linī ve seminis, aut tragi frugis, aut scēnugræci, aut urticæ seminis decoctū. Non enim tōlum uomitionibus euacuabunt, sed aluū quoq; subducent, & uenenorum malignitati aduersabuntur, acrimonias ipsorum habetantia, præsertimq; oleū, quod manifesto inde licet cognoscere. Si nanq; cutis exulcerandæ studio, cantharide aut calce uiua, aut eiusmodi quodā acri utaris, corpus oleo prius oblitum, non exulcerabitur. imo neq; corpus astringere potueris oleo præcunctum. Præterea uomitus non modō quod nociuū euacuat, utilis est, sed interim hāstum uenenū odore, concretis grumis, aut colore prodit. odore siquidem & amaritudine, cicutam: colore, cerussam, uel gypsum: concretia grumis, lac aut recentē sanguinē: halitus grauitate: uirus qualitate & odore, leporem marinum, & rubetant: ranam ostendit, ut per hæc ad accommodata singulis remedia uia non sit difficilis. Admiscebitur autem oleo malux, decoctū, aut anserinus adeps, aut ius ex carnibus pinguibus, uel gallinarum: aut ex lignorum cinere

nere facta lixiuia . Facit etiam huc nitrum detritum cum hydromelite potum, uinum copiosum & uetus : & quæ adipe aut butyro constant. Verum ijs quæ in uentriculo hærent, par uomitum ablatis : quod intestinis illapsum est, clystere acriore euacuabimus . Post hæc lac potui dabimus . nam ab hoc quod afficit, & uenenosum est, facile immutabitur . Iam uero medicamenta omnibus communiter conuenientia offeruntur, quale est, minium lemnium, abrotanum, agaricum, erysimum, eryngii radix, pastinacæ erraticæ semen, uel nepitæ, nardum gallicum, castorium, medulla uiridis ferulæ, nerii, quod rhododerideon est aut rododaphne flores, marrubii succus, laserpitium aut liquor ipsius, sagapenum, opopanax, peucedani liquor & radix, aristolochia longa, rutæ syluestris semen, folia cestri, quæ betonica dicitur. danturq; singula drachmæ pondere cum uino. Efficax in id est, polii herbæ decoctum & picis liquidæ linctus generosissimè etiam opitulantur antidora superius comprehensa, magisq; ex uiperis theriaca . non autem easdem uireis habent, si post medicamenta lethalia, assumantur, quas præsumpta . quæ enim ipsorum quantitas præsumpta ad affectum cauendum est sufficiens, hæc si quadruplo auctior, aut quintuplo post præstetur, adiuuat : idque non semel die, sed bis etiam . sic enim & Galeno illi admirando uisum est .

Enumeratio simplicium uenenorum. Cap. XXX.

INter uenena, animalia quidè sunt uitæ noxia hæc, cantharis, buprestis, salamandra, piceæ cruce, lepus marinus, rana rubeta, & mutescens palustris rana, hirudines deuoratæ : ex seminibus, altercū, coriandrū, psilliū, cicuta, melanthium: ex liquoribus, meconiū, opocarpasum, thapsiæ succus, elateriū, mandragora: ex radicibus chamelæon aconitum, thapsia, ixia, uera trum, agaricum nigrum, ephemerum, quod nonnulli colchicum dicunt, quod in colchide nascatur: ex ramosis & oleribus, smilax, quam nonnulli rhymium uocant, Romani taxum, solanum furiosum, quod etiam dorycnion appellant, sardoe herba; quæ species est ranunculi, papauer corniculare, pharicum, toxicū, ruta syluestris, fungi: ab animalibus autem, sanguis tauri recens, lac cui coagulum sit admixtum, mel quod ad heracliam nascitur: metallica, gypsus, cerussa, calx, auripigmentū sandarachæ, argenti spuma, adarce, plumbum, & quod uocatur argentum

argentum uiuum: ex iis quę domestica & in quotidiano uitę usu sunt, uinum copiosum raptim à balneo potum, aut passum aut frigida aqua similiter.

De cantharide.

Cap. XXXI.

QVI cantharidē assumpserunt, eos notę grauissimę comitantur. ferē. n. à stomacho usq; ad uescicam cuncta illis morderi sentiuntur, gustum similē pici aut cedri-
no liquori habent, dextra præcordiorum partē inflammationē expectantur, urinam difficulter, sæpe etiam sanguinē per eam reddunt: item per aluū ipsi excernuntur, qualia in torminibus intestinorum egeri solent, præterea animo linquantur angunturq;, & uertiginibus laborant: tandem uero mente alienantur. Succurrit ipsis uomitus ex hydrelæo petitus, & lactis potio, terrę cimolię drachmę quatuor cum mulsā, nuclei pinei, cucumeris semen. Adiuuat bene & ius pingue ex bubulæ factum, aut anserinum, aut ouillum: carnesq; gallinaceorum, aut agninx, aut ouillę, aut porcellorū, omnesq; flaccescentes coctura longiore, & pingues cum lini semine elixę: uinum item dulce, & copiosum, thuris corticis drachmę quatuor. Post cibum iniicietur per clysterem cremor oryzzę aut chondri, aut tragi, aut ptisanę, aut maluz, aut lini seminis, aut althęę, aut scœnugręci. interim etiam mulsā cum nitro intestino absterfo, conuenit hæc rursus inferere. postea uerò inflammatione occipata medicamentis ex lini semine & ordeo lenire. per initia enim offendunt, deinde & lauacris aquę dulcis utendum est, item unguentum irinum rosaceumq; potui dabitur.

De bupresti.

Cap. XXXI.

BVpræsti potione absorpto, in gustu niroso simile quippiam percipitur, dolor stomachi uentrisq; uehemens comitatur, eademque partes in speciem hydropici intumescent, extrema totius corporis cutis intenditur, urināq; cohibetur. Profunt ipsis quęcunque aduersus cantharides opitulantur. priuatim autem conducunt, post euacuationes & uomitu, & clystere factas, ficus aridę, item earum decoctū ex uino. Vbi uero periculum iam de suo acumine remisierit, declināq;, Thebaicarum palmularum cibo, aut earundem tritarum in mulsō aut lactis potu, uiuantur, pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac muliebre bibere, conuenit.

*De Salamandra .**Cap. XXXIII.*

Q Vibus Salamandra data est, eis lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quodā & resolutione urget, partes quædam corporis in orbem liuoribus uariantur, ut subinde permanente ueneno, putrefactæ defluant. Ad quæ omnia faciemus quæ in cantharidibus dicta sunt propriè autem resinam è picea, aut pinu, uel galbanū cum melle offeremus, aut nucleos pineos cum decocto chamæpityos, aut urticæ folia cū lilij in oleo decocta, testudinis marinæ uel terrestris oua elixa, ranunculorum ius esculentum, in cocta simul ipsi eryngii radice.

*De pinorum erucis .**Cap. XXXIII.*

P Inorum eruca pota, statim sequitur oris palatiq; dolor, ualida linguæ inflammatio, stomachi, intestinorumq; cruciatus, quæ cum pruritu circumtendi sentiantur: feruor itidem toto corpore affligit, & stomachi fastidium urget. Succurri debet nō aliter quàm iis qui cantharidas biberunt priuatim aut in ipsis loco simplicis olei melinum adhibebimus.

*De marino lepore .**Cap. XXXV.*

L Eporis marini potum, gustus sequitur piscibus urosis nō absimilis, tempore procedente aluus indolet, urina suppressitur: si quando autē eruperit, purpurei coloris cernitur. præterea qui illum assumpserunt, auersantur oderuntq; pisceis omneis: sudor foetidus erumpit, biliosusq; uomitus, nonnunquam sanguine mixtus superuenit. Adiutari autē debent hoc malo circumuenti, lacte asinino aut passo continuè exhibito, aut maluæ radice & foliorum decocto, aut cyclamini radice trita ex uino, aut ueratri nigri, aut scammonie liquoris drachma ex mulsâ, anserique sanguine recenti adhuc calido. item caneros fluuialeis solos, si sustinent, offerre oportet. Nota autem salutis est, quum piscem quoq; possunt comedere.

*De rana rubeta & palustri.**Cap. XXXVI.*

R Ana rubeta, aut palustris hausta, corporis tumorem inducit, palloremq; intensum, buxo similem, ægrè spiritus trahitur, os foetet, singultus infestat, aliquando etiā semen sine uoluntate prorumpit. facile autem post uomitum reficiuntur, multa meraci uini potione assumpta, arundinis radicis drachmis duabus, aut cyperi toridem. Cæterum cogendi

sunt obambulare celeriter & currere, ob torporem qui ex hoc malo contrahitur, adhuc quotidie lauare.

De hirudinibus.

Cap. XXXVII.

Hirudines deuoratas, cum aqua & adhærescenteis faucibus, inde adeò dignoscēs, quòd uentriculi os ueluti exustione uellicatur mordeturq; atq; hæc etiã nota est hirudinis deuoratz, nonnunquam & sanguinem floridũ, hoc est uiuum excreant, hirudinibus gutturi affixis, quas muricæ forbitio expellit, aut betæ folia cum aceto, aut niuis glebula cũ pœsca epota, gargarizandum quoq; nitrum cum aqua, & atramentum sutorium cum aceto. At si gutturi adhæserint, in calidam aquam descendant, item lupinorum farinam assument, frigida in ore retenta eximentur quippe frigida aquæ appetentiores ad eam festinant profluuntq;. Nonnulli cimices iis quibus sanguisuga deuorata erat, exhibuerunt ego autem (inquit Galenus) alliis in his utens, cimicibus nunquam opus habui.

De chamæleonte.

Cap. XXXVIII.

Chamæleonte nigro assumpto, ualida superuenit uetris erosio, dolor, cum totius corporis peruersione tremor, mox conuulsio incidit. item uomitiones pituitosæ & spumantes, quibusdam etiam singultus aduenit, uox nihil sonat, facies distorquetur. His autem conuenit cremor tritici pinguis, calidus epotus, item dulce uinum aquosum calidum, uomitus, lactis potio, mollis clyster, fomentaq; ex cataplasmatibus. ad eum uerò qui suffocationem parit liuoremq;, absinthium bibitur, aut nitrum cum oxymelite, uel radiculæ: fotsq; præcordiorum congruet.

De alterco.

Cap. XXXIX.

Saltercum aliquis, aut ebibit, aut comedit, mente abalienatur ebrii modo: facilem tamen curationem recipit, multa liberalius pota, & lacte, præcipuè asinino: sin minus, caprillo, aut uaccino: siccumq; siccarum decocto, benefaciunt ipsi & nuclei pinei, & cucumeris semen cum passio assumptum, præterea uinum salsum cum recenti adipe suillo & passio: urticæ semen similiter, uel nitrum cum aqua conduit: insuper cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus, cepæ, & allia, singula cum uino, sumpta. Cæterum conquiescere cogendus qui altercum hausit, ut id sicuti qui uinum biberunt, concoquat.

De

*De coriandro.**Cap. XL.*

COriandrum latere propter odorē nō potest: potū uerò raucitatē facit & mentē mouet, consimiliter temulentis. Loquuntur itaq; qui id sumpserunt turpia, totius corporis ipsorū odor coriandriū indicat. Aduuantur, ubi id oleo aut irino unguēto, ut suprà monstratū est, eduxerint, uino meraciorē cū absinthio, & p se potio: ouisq; uacuat in sese detritis, cū muria sorptis: ad hęc muria ipsa bibitur, & ius salsum & gallinaceū & anserinū: postremo passum cum lixiua sumitur.

*De psyllio.**Cap. XLI.*

PSyllij potu totum corpus refrigerat torpetq; cum resolutione & tristitia, ut animum despondeant. Præsidio sunt omnia quæ contra coriandri potum commendantur.

*De cicuta.**Cap. XLII.*

Cicutam potam caligo uertiginesq; insequuntur, ut nec minimum uidere liceat. item singultus, mentis alienatio & artuum perfrictio comitatur: ultimoq; conuulsi qui eam sumpserunt, præfocantur, cessante à motu omni in arteriis spiritu. Per initia igitur, quemadmodū & in alijs, uomitu eam eliciemus. deinde hac euacuatione usi, quod in intestina delapsū est, excernemus: ac tunc, ad uini meraci potionem ueluti præsentissimum remedium transibimus, per interualla eam exhibentes. in quibus interuallis lac uaccinum, aut asininum, aut absinthiū cum pipere & uino, item castoriū, rutamq; & mentam cum uino exhibebimus, præterea cardamomi, aut styracis drachmā, aut piper cum urticæ semine ex uino, aut tenera lauri folia: similiterq; laserpitiū, aut eius liquorem cum oleo & passo. Item passum per se potum, præclare opitulatur.

*De papaueris liquore.**Cap. XLIII.*

Papaueris liquorē, epotum, subsequitur ueternus cum perfrictione & pruritu adeo uehementi, ut subinde ueneno in crudescente tanta oboriatur prurigo, ut qui id biberunt, ab ea excite ntur, adhuc totò corpore ueneni odor sentitur. Saluti est post uomitiones oleo factas, acri uti clystere. item oxymel cum sale potum proficit: aut cum calido rosaceo, mel: præterea merum copiosius, cum absinthio & cinnamomo: nec non

acetum calidum per se: insuper nitrū cum aqua: origanum cum lixiuio, rutæ semen cum pipere, ipsumq; piper cum castorio & oxymelite, uel satireiæ, aut organi decocto, uino addito. Cæterum excitare ægros oportet iis quæ naribus admoventur, & in aquam calidam deducere, fomentisq; propter accedentem pruritum adiuuare: à lauacro, pingui iure, cum uino aut passo, uti. Iam medulla cum oleo pota ipsis opitulatur.

De carpesiæ liquore.

Cap. XLIIII.

CArpesiæ liquor potus, soporem & strangulatum præcipientem inducit. Eodem remedio, quo & cicutæ, auxiliamur.

De mandragora.

Cap. XLV.

Accidit mandragoræ potu quàm primū sopor, uiriū resolutio ualidus ueternus, ut nihil à morbo qui lethargus dicitur differat. quibus antequàm horum aliquod eueniat, uomitus cōducit: post hunc, aqua mulsæ, nitrum, & absinthiū cum passo, aut uino dulciore sumpta, caput rosaceo foueri & aceto debet, corpus excitar, cōmoueriq;: adhibenda itidem quæ odoratu excitant, piper, sinapi, castoriū, ruta cū aceto trita, pix liquida, lucernarū funiculi cōbusti extinctiq;. Quod si ægrè excitentur, etiā quæ sternutamenta mouent, adducenda, alijsq; communibus remedijs in his quoq; utendum est.

De aconito.

Cap. XLVI.

Aconitum statim quum potum est, in lingua cum astrictione quadam dulescit: inde uertigines, præsertim in exurgendo, & oculorū humiditates inducit, thoracis, grauitatē & præcordiorū, ita ut multi flatus erumpant. In quo uitio uomitu uenenum educi debet, & aluus clystere subduci. Portiones contra aconitū hæc proficiunt, organi, rutæ aut marubij cum uino, aut absinthii, aut erucæ, aut abrotani, aut chamæleæ, aut chamæpityos Prodest ipsis & opobalsami drachma cum uino item coagulū hœdi, aut leporis aut hinuli cū aceto, adhæc ferri recementū aut uinum in quo ipsum ferrum, aut aurum, aut argentū sit restinctum. insuper lixiuiū cum uino, & gallinacæ elixa cernium uel pinguiū ius cum uino assumptum. Cæterum chamæpitys quæ peculi ariter aduersus aconitū conducit, in Heraclia Ponti, ubi & aconitum nascitur, holocleros appellatur, Athenis, didionia: in Eubœa, sideritis.

De

*Deixia.**Cap. XLVII.*

IXia quæ & ulophonos dicitur, odorem habet & gustū quū sumitur ocimi, linguæ inflātionē ualidā inducit, mētem labalienat, atque omneis naturaleis excretiones supprimit, strepitus tumultusq; alui elidit cum animæ defectu, nec quicquam tamē eiicitur. Adiuuātur læsi ab ea, postquā uomitio- nibus fuerit educta maior ueneni portio, aut aluus soluta, ab- sinthij diluto cum uino pleniore aut aceto aut oxymelite po- to: item rutæ syluestris semine, uel laserpitij radice, similiter tragorigani decocto cum prædictorū aliquo, aut lacte, aut resi- na terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut Laserpitio, singu- lis oboli pondere. Profunt cum uino etiā nucis iuglādis nucleī læuigati, resina, castorio, & ruta additis, singulis drachmæ pon- dere. Proficiunt itidem chamæleæ drachmæ duæ, aut thapsiæ succi totidē cum aqua mulsā. utiliter & acetū calidum bibitur.

*De ephemero.**Cap. XLVIII.*

Ephemeron, quod nōnulli Colchicon eo q̄ in Colchi- de nascatur, uocant, aut bulbum agrestem, epotū protī- nus, totū corpus prurire facit, uelut urtica & scilla ta- ctum irritatumq; interiora erodit, stomachū urit cum ponde- rosa grauitate. Inualecente aut malo, cruenta strigmentis mi- sta per aluum egeruntur. Succurrendum, ut salamandræ, uomi- tionibus & clysterijs: sed antequā uireis sibi ascisat ueneni, dari debet foliorum quercus, aut glandium, aut malicorij, aut serpilli decoctū cum lacte bibendum: aut polygonii succus aut furculorum uitis, aut rubi, aut tenerarū ferularum medulla, aut myrtorum cum uino item ipsorum myrtorū in læuorem detritorum, maceratorumq; in aqua, dilutū potum auxiliatur: benefacit itidem castanearum interior tunica, si cum aliquo, è succis quos prædiximus, assumatur: organum quoque cum lixiua potum, in idem efficax est. Adeo uerò exactum præsi- dium est lac uaccinum calidum potum, & simul in ore conten- tum, ut hoc præsentē nullum aliud desideretur.

*De smilace.**Cap. XLIX.*

Smilax, quæ à quibusdā thymion, à Romanis taxus no- minatur, pota perfrictionem totius corporis & strangu- latum, mortemq; maximè præcipitē inducit: quibus on- nia auxiliantur, quæ & cicutæ epotæ.

De solano furioso, quod dorycnion à nonnullis dicitur. *Cap. L.*

Dorycnium potum, quod aliqui solanū furiosum appellant, gustum quidem ceu lactis repræsentat, singultus crebros facit, linguæ humiditatem, & cumulatam sanguinis educationem: per aluum mucosa feruntur simillima torminosis. Auxilio sunt, antequam horum aliquod fuerit secutum, quæ in ephemero dicta sunt, uomitus dico & clyster, & quæcunq; potum uenenum possunt excernere. Propriè autem ipsi succurrit aqua mulsa aut lac asininum caprillumbe, & dulce usum tepidum cum anisi modico potum: item amygdalæ, & elixa gallinarum pectora, idem præstant conchyliis cruda pariter & tosta, in cibo, adhæc locustæ marinæ & gammari, & ius ex ipsis esculentum potui assumptum.

De sardonio. *Cap. L I.*

Quæ sardonio herba nuncupatur, ranūculi species est, pota autem uel comesta mentem abalienat, cōuulsiones adfert cum laborū contractione, ut risus imaginem præbeat, à quo affectu etiam risus sardonius non laudabili dicitur inter homines iactatur. Cui uitio priuatim post uomitionem conducit aqua mulsa liberalius exhibita, lactisq; potio. itē corporis totius resperio inunctioq; ex medicamentis quæ calefaciunt perita uincit item in hydrelæum calidum descendere, deinde corpus inungere & ualenter infricare. summatim, ut in conuulsione tota curatio administranda est.

De papauere corniculato. *Cap. L I I.*

Papauer quod corniculatum appellatur, esum potum uel eadem quæ papaueris liquor inducens pericula, ipsidem quoq; curatur remediis.

De pharico. *Cap. L I I I.*

Pharicum dictū toto gustu nardium syluestrem repræsentat: potum uerò resolutionē cum furore & conuulsione excitat. Aduersus quod, ubi uomitu fuerit eductum, absinthium cū uino propinatur: item cinamomū, aut myrrha, aut nardū Cilicium, quod nonnulli isatin uocauerunt, aut spicæ nardi drachmæ duæ, myrrhæ oboli duo cū passo misti: aut iris crociq; flos ex uino Caput ipsorum derafum farina ordeacea cū ruta trita, & aceto cataplasmatibus modo obducere conuenit.

De

*De toxico.**Cap. LIIII.*

Toxicum inde nomen uidetur accepisse, & barbari sagittas, quas toxemata uocant, eo illinant. ubi potum est sequitur laborum & linguæ inflammatio, mētis furor, qui coerceri non possit, uariis obnoxius imaginibus. eoq; difficile curationem recipit: raro etiam nonnulli qui id biberunt uitæ restituuntur. Oportet igitur continere ipsos uinculis & cogere, & ui adigere, ut ninū dulce cum rosaceo bibant, reddantque per uomitum. Item raptum semen cū uino potum peculiariter ipsis confert, & quinq; folij radix, hircinus caprillus uē sanguis potui datus ad hæc, quercus cortex aut fagi, aut ilicis cum lacte læuigatus potusq; proficit. Idem faciunt mala cotonea manducata, uel trita cum pulegio, ex aqua pota: prætera amomum, & balsami cum uino semē Qui uero mali huius periculum euaserint, diu in lecto decumbunt, & quum surrexerint, attoniti ac stupentes reliquum uitæ tempus transigunt.

*De fungis.**Cap. LV.*

Fungorum alij genere, alij copia offendunt, integri sumpti strangulatus laqueis simileis inducunt. his statim cōmuni præsidio resistendum est, & qui eos hauerūt, oleo ad uomitum cogendi. Mirificè his proficit lixiuium ex sarmenis, aut ex pirastri surculorum cinere cum posca, sale uel nitro, potum: item pira ipsa syluestria aut folia simul incocta, uim strangulandi quæ fungis inest, tollunt, eademq; in cibo conferunt, ad hæc oua gallinarū elixa & in posca pota, aristolochiæ drachma aut absinthij, cū uino, insuper mel de linctū potumq; cum aqua Prodest apiastrum cū nitro, panacis radix & semē cū uino, floces uini cōbustæ, cum aqua, aut atramentum futorium cum aceto, raphanus itidem aut sinapi, aut nasturtium in cibo sumptum. Quoniam uero nonnulli fungi à uenenatis corrosi non modò strangulant, sed etiam intestina exulcerant, dari debet absinthium copiosum & ficuum decoctū, origaniq; ad hæc ex aqua mulsæ, uomitus confert, in calidam descendere, & crudam farinam ordeaceam præcordiis admouere.

*De sanguine taurino.**Cap. LVI.*

Sanguis tauri recens occisi potus, spiritus difficultatem & strangulatum procreat, dum rōsillarum & gutturis meatus cum ualida conuulsione obstruit. Iam lingua ijs qui

sanguinem hauserunt rubens inuenitur, dentes tincti, & uestigia cruoris concreti inter ipsorum commissuras. In hoc malo uomitus uitari debet, grumi enim attractu ad sublime relati, magis gulæ inculcantur. Exhibentur ergo quæ sanguinem coeuntem soluere, & aluum subducere possunt, ut grossi liquore suo pleni cum posca & nitro huc facit etiam omne coagulum cum aceto, & laserpitij radix cum suo liquore. similiter etiam brassicæ semen, lixiuiumq; ex cinere ficulneo: item cunilæ folia cum pipere, rubiq; succus cum aceto. Iam uerò alius rectè subducetur. Solent iis qui seruantur inferius recrementa scædi odoris egeri: stomachus & uenter ordeacea farina cum aqua mulsâ obduci debent.

De lacte intus congelato. Cap. LVII.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum, multam strangulationem parit, eo q̃ in grumos coit gelaturq̃ue. Auxiliatur huic malo, antidoti modo; coagulum, si cum aceto frequenter bibere compellas eū qui lac hausit. item conferunt nepitæ folia arida, aut succus ipsius similiter, aut laserpitij radix liquorue cum posca: idem præstat thymus cum uino, & è cinere lixiuia. salsum uerò nihil offerri debet, nam hinc lac magis coit ac in caseum transit. nec uomit in hoc malo conducit, nam in grumos concretum, dum ad stomachum assurgit, strangulat.

De melle quod in Heraclia nascitur. Cap. LVIII.

MEl quod in Heraclia Pōti prouenit, aut esum, aut bibitū, eadē pericula q̃ aconitū, infert. quare & eadē utriq; cōueniunt remedia. Facillimè aut curatur qui id hauserunt, cōtinuo hydromelitis potu, cui rutæ folia sint admista.

De gypso. Cap. LIX.

GYpsum potum strangulatum parit, in lapidem coalescens: unde trāsferre oportet huc præsidia quæ aduersus fungos cōueniunt datur et in hoc malo malux decoctum loco olei. pingue siquidem quum sit, & lubricas uomitiones procreet, corpora deradi non finit: quod lapidescens gypsus facit. Porro cōducit & oleum in mulsâ, & ficuum decoctum, lixiuiaq; è ficulneo, aut è sarmentorū cinere facta cū uino copiosiore, item origanum, aut thymus cum lixiuia acetoꝝue. Clyster ex passō & malux decocto in anum dabitur:

*De cerussa.**Cap. LX.*

Cerussa propter colorem faciliè deprehenditur, quoniã sponte sumpta palatũ & linguam, dentiumq; commissuras albefacit. præterea singultũ, tussim, linguæ siccitatem, extremorũ perfrictionem, cũ menthis ab alienatione, & difficili corporis motu, inducit. His prodest aqua mulsam, aut ficuum, aut malux decoctũ propinare. itẽ lac calidũ, uel sesamum cum uino tritum, aut lixiuium ẽ uitium sarmentis: aut oleum amaricinum, siue irinũ, uel persicorum ossa cum ordeĩ decocto: uel lachryma thuris, uel prunorum gummi, aut ulmĩ humor qui in folliculis ipsius seruatur, cum aqua tepida. Iam uomitus continuè cietur. Proficiet etiam succus thapsiæ, uel liquoris scammonix terni oboli cum aqua mulsã poti.

*De calce, sandaracha, & auripigmento.**Cap.**LXI.*

CAlx, sandaracha & auripigmentum pota, uentris & intestinorum torsiones cum uehementi rosione faciunt. quare omnia quæ temperare & soluere ea possint, adhiberi debent, item quæ uomitiones facileis & aluum lubricam efficiant, qualis est hibisci & malux succus, decoctumq; lini seminis, aut tragi, aut oryza: lac præterea copiosum, aqua mulsã, iura pingua, boniq; succi.

*De argenti spuma.**Cap. LXII.*

Spuma argẽti pota, quã Græci lythargyron dicũt, grauitatẽ stomachi, uẽtris, & intestinorũ, cũ torsionibus ualidis infert: nõnunquã & intestina pòdere uulnerat disrumpitq; urinã impedit: corpus eorũ qui eã biberũt, intumescit, & coloris plũbei fiũt, & deformitatẽ acquirũt. Aduuãtur, setũdũ uomitiones, agrestis hominis semine cũ uino: myrrhæ drachmis octo, absinthii, hyssopi aut apii semine: aut pipere, aut ligustri flore cum uino: palumbium fimo orido cum nardo & uino.

*De plumbo.**Cap. LXIII.*

Plumbi scobs aut lotura pota, similia inuehit argenti spumæ pericula: eademq; requirit præsidia.

*De argento uiuo.**Cap. LXIIII.*

ET argentum uiuum potum, eadem quæ spuma argẽti infert, atq; eisdem remediis qui id assumpserunt, adiuuantur.

uantur adhæc prædesse ipsis uidetur lac copiosè datum. cæterum & hi uomitionibus sollicitabuntur.

De ueratro albo, thapsia, elaterio, agarico nigro, ruta syluestri, nigella, & pappis. Cap. LXV.

HA benda cura est & eorum quæ iuuandi gratia exhibentur, sæpe uero non minora aliis pericula adferunt. cuiusmodi sunt superius commemorata, nempe ueratrū album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum, hæc enim strangulatus excitant, aut magis quàm opus est, purgant: in quibus strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, curabuntur: nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent, sistimus. Iam uero quæ paululum nocere uidentur, interim tamen pericula inferunt, negligi non debent: cuius generis est syluestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt spinæ quæ cactos dicitur, in quibus solus uomitus adhibitus laborantes sanitati restituit.

De familiaribus ac domesticis, nempe uino & aqua frigida. Cap. LXVI.


Aqua frigida subito ac cumulatim pota, uinumq; meracius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu, ualidisq; exercitiis strangulatus & dolores concitat. in quibus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminens periculum dissoluit.

FINIS LIBRÌ QVINTI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDICO INTERPRETE.



PAVLI AEGINETAE
 I IBER SEXTVS,
 IOANNE GVINTERIO
Andernaco Medico Interprete.



Proemium Chirurgicae. Cap. I.



VONTIAM chirurgica in partes duas diducta est, ut una sit quæ carnis vitia tractet, altera quæ ossium, tam in rupturis quàm luxationibus comprehendat, ab ea quæ carni seruit in præsentia exordiemur, consueto & hic usicōpendio. Rursus igitur à superioribus auspicantes quomodo caput, præsertimq; eius uertex utat̃, exponemus.

Quomodo caput aduratur in lippientibus, egre spirantibus, & elephantiosis. Cap. II.

CVM humor oculis influit supernè, cumq; difficilis urget spiratio, quæ humiditatis excrementitiæ copia è capite inferius in thoracè trāsmittit̃, & particulas indidem cōtinuo suo cursu offendēte cōtrahit̃, caput per mediū hoc modo urunt. Vertex ad cutē prius tondetur cutis adusq; os feramentis candētibz, nuclei modo rotundis aduritur. quod, ubi crusta deciderit, raditur. Nōnulli uero ubi id ipsum os addussērint, faciūt ut squama inde recedat exigua, quò facilè humores illinc perspiratu dissipēt̃ euacuēt̃q; seruat̃ diu ulcere, deinde sic ipsum ad cicatricē perducūt. At in elephantiasī curādā, quinq; nōnulli crustas in capite excitant, unam in priori parte supra

31111
 2 51012
 15 51015
 116 51116
 116 51116
 116 51116

uantur adhæc prædesse ipsis uideretur lac copiosè datum . cate-
rum & hi uomitionibus sollicitabuntur .

*De ueratro albo , thapsia , elaterio , agarico nigro, ruta
syluestri, nigella, & pappis. Cap. LXV.*

HA benda cura est & eorum quæ iuuandi gratia exhiben-
tur, sæpe uero non minora aliis pericula adferunt . cu-
iusmodi sunt superius commemorata , nempe ueratrū
album, thapsia, elaterium, agaricum nigrum, hæc enim strangu-
latus excitant, aut magis quàm opus est , purgant : in quibus
strangulationes, ut in fungis & similibus comprehensum est, cu-
rabuntur : nimias purgationes, iis quæ excretiones cohibent,
sistimus . Iam uero quæ paululum nocere uidentur, interim ta-
men pericula inferunt , negligi non debent : cuius generis est
syluestris ruta, melanthium, recentes pappi, flores autem sunt
spinæ quæ cactos dicitur, in quibus solus uomitus adhibitus la-
borantes sanitati restituit .

*De familiaribus ac domesticis, nempe uino & aqua
frigida. Cap. LXVI.*

AQua frigida subito ac cumulatim pota, uinumq; mera-
cius copiosum, dulce, præsertim à balneo, aut cursu, uali-
disq; exercitiis strangulatus & dolores concitat. in qui-
bus sanguinis dimissio protinus adhibita & inanitio, imminēs
periculum dissoluit .

FINIS LIBRÌ QVINTI IOANNE


GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.



PAULI AEGINETAE

LIBER SEXTVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.

Proemium Chirurgicae. Cap. I.



VONIAM chirurgica in partes duas diducta est, ut una sit quæ carnis vitia tractet, altera quæ ossium, tam in rupturis quàm luxationibus comprehendat, ab ea quæ carni seruit in præsentia exordiemur, consueto & hic usicōpendio. Rursus igitur à superioribus auspicientes quomodo caput, præsertimq; eius uertex utat, exponemus.

Quomodo caput aduratur in lippientibus, egre spirantibus, & elephantosis. Cap. II.

CVM humor oculis influit supernè, cumq; difficilis urget spiratio, quæ humiditatis excrementitæ copia è capite inferius in thoracè trāsmittit, & particulas indidem cōtinuo suo cursu offendēte cōtrahit, caput per mediū hoc modo urunt. Vertex ad cutē prius tondetur cutis adusq; os feramentis candētib; nuclei modo rotundis aduritur. quod, ubi crusta deciderit, raditur. Nōnulli uero ubi id ipsum os addusserint, faciūt ut squama inde recedat exigua, quò facilè humores illinc perspiratu dissipētur euacuēturq; seruato diu ulcere, deinde sic ipsum ad cicatricē perducūt. At in elephantiasi curāda, quinq; nōnulli crustas in capite excitant, unam in priori parte
supra

supra incipit, alterā hāc inferiorem, paulo superius quā frōs habetur, ubi serē pili desinunt: ac aliā in occipitio, quod Græci opisthocranion uocant, reliquas duas iuxta ossa à squamis dicta lepidoidē quæ superius aures conglutinant: unam ex his, parte dextra, alteram sinistra: atq; ita pruribus squammis detractis, & copiam, & crassitiem humorum euaporatu ex alto capitis deriuantes, lumina offendi prohibent. Iam leni quoq; aliud ferramentum adigunt, ut primo melancholici recremēti opifici per crustam in cute excitatam medeantur,

Cum humor capitis cutem inflat, eoq; intumescit & prementi digito cedit hydrocephalon dicitur. C. III.

SI humor natura aqueus capitis cutē subit, uiriū propriē hydrocephalon appellatur: accidit aut pueris quāprimū in lucē æduntur, capite ab obstetricibus parū dextrē pressō, aut ex causā latente, aut ex uasis unius, plurimū ē rupturā & sanguine qui emanat in ociosā inutilemq; mutato substantiā, aut materia ob meatuū raritatē resudante, ac inter cutē & mēbranā quæ caluariā integit, pericranion Græci uocant, erūpente: uel. n. inter hanc, & cutem humor consistit, uel inter pericranion & os, uel inter os & cerebri mēbranas. Cui itaq; cuti & mēbranæ caluariā integenti, humor interiacet, tumor sequitur, tactu mollis, concolor, indolens, turgidus, puluino sublimi, & paucis particulis subiectus: digitis prementibus faciliē cedit, & rursus assurgit. Quibus pericranion & os intercedit humor, reliqua sanē respondent, sed tumor durior multo est & lentē cedit, ut qui ēt pluribus corporibus sublit, dolorq; magis urget. Si inter cerebri mēbranā & os humor se receperit, tumor quidē erit, sed qui prementi nō cedat, neq; tactu sit mollis, tamē uiolēter pressus cedat, siquidē os infantii recens adhuc cōpactū faciliē cedit, præsertim cū futuris rarefactis humori trāsitus foras pateat: cognoscitur ex facili inde qd humor cū illū cōstringere uolumus, ex aduerso repressus in altum effugiat. Dolor his acrior obuenit, caput totū in diuersa agitur, frōs ipsis foras producta est, oculis cernūt incōnuiuentibus, & crebrius illachrymant. His igitur ceu desperatæ salutis nō est manus adhibēda, & si maxime nonnulli chirurgicorum cerebra perforatum os exemerint, ut in capitis fracturis dicitur. At si inta cutem & mēbranulam quæ sub cute caluariam cingit,

cingit, humor sit collectus, tumore quidem exiguo subflante, una linea per medium transuersa caput incidendum: si membranulæ caluariam inuolenti & ossi colluuiæ interueniat magisq; caput inturgescat, duabus utemur lineis per medium se mutuo secantibus: si magis adhuc sit turgidum etiam, tribus, ad similitudinem H literæ. Vbi manu humorem exemeris, insertis linamentis commodè partem deligabimus, & usque ad tertium diem cœnelæo perfundemus, inde solutam medicamento in linteolum illito persanabimus. Quod si longiore spatio os carnem non recipiat, leuiter ipsum rademus.

Quomodo arteriæ diuidantur, arteriotomia dicitur.

Cap. IIII.

IN longis oculorū defluxionibus, tum uertiginoso affectu, arterias post aures incidere consueuimus. Radenda igitur posterior capitis pars, & digitis notanda est. Nam arteriæ si tus ex loci pulsu faciliè deprehenditur. deinde ipsam linea scriptorio prius atramento ducta, duos digitos longa, usq; ad os diuidere oportet. Quod si in conspectum ita non uenit, incidendum circiter triū digitorū interuallum, atq; tunc manus iniicienda, sic ut arteriæ transuersim dissecentur, quousq; & pulsatilis sanguinis fluor apparuerit, & instrumentū os propius accedat. Vbi sat fluxerit sanguinis membranula, quæ caluariā sub cute ambit, diuisa, ne extensione inflammationem contrahat, rosaq; osse penicillum ex panniculo uulneribus debet insinuari, & medicamento quod linteolis illinitur adhiberi, quod si remaneat etiam hoc os lene, similiter id scalpello rademus.

Quomodo uasa diuidantur, quæ angiologia dicitur, eorumque adusio sit administranda.

Cap. V.

IN hemicranicis, & in iis, quorū oculos aut longus, aut etiā acutus dolor ex calida, acrisq; fluxione infestat adeo ut in temporum quoq; musculis calor, laxisque tumor, œdema uocant Græci, excitetur, omnes medici uasorum diuisionem probarunt. Derasis igitur primum in temporibus pilis, digitis uasa notabimus, sic ut fomenta præcesserint, aut etiam ceruix ligata sit: ubi iam uasa oculis sese obiecerint, atramento notabuntur, & cutis ex lateribus, tum sinistræ manus nostræ digitis tum ministri lenabitur, ipsumq; uas superficialia linea incidemus, deinde ubi totum penetrauerimus hamulis eleuatum & a membranis

sanguis effluxerit, extusis grumis, tria linamenta tortilia singulis incisuris inferemus, panniculumq; implicitum aqua madentem superiniectum deligabimus. Postridie œnelxo non solum ulceribus respersis, sed etiam temporum musculis, auribusque propter inflammationem, tertio die cum solueris, superfusione diu utendum, & basilico rosaceo soluto, linamentis insertis curationem quæ restat, absoluemus.

Quid agendum in sincipite secando, Perscypsum appellant Græci. Cap. VII.

IN quibus multa, & in alto uasa fluore copiosum oculis transmittunt, tribus lineis transversus coronæ modo sinciput secatur, quæ ratio perscypsisnæ Græcè uocatur. Hoc morbo laborantiû comites notæ sunt tales. Primum oculi alimētum nō sentiūt, exigui, & ad uisum impotētes, sunt anguli erosi, palpebræ exulceratæ, & pili ipsorū deflui, lachrymæ tenues admodū & acres cū calore deferuntur. Dolor in alto capitis acutus & uehemēs urget, sternutamentū cōtinuū. Itaq; derafo capite, transuersam lineā sine muscutorū in tēporibus, motus offensā, ut dictū est incidemus, quæ à sinistro tempore parte incipiens in alteram desinat, habeatq; terminos, ubi motus nullus est, paulo superius q̃ frons habetur, ducta: sic ut futura capiti pueriticè tendēs ad aures, Græcis dicitur *εἰς ἀνὰ ἄνα*, uideatur. Leonides per mediā frontē lineam deducit. Cæterū ossē detecto, penicillis, aut linamētis pluribus inuicē separabimus, extrema diuisionis deligabimus, & uino oleoq; mixtis ut prius dictū est, aspergemus. A solutione cū inflāmatio iā declinauerit, os raderetur, quoad caro suppullare incipiat, rationemq; carnis producendæ accommodabimus medicamentis aridis in id efficacibus utentes, quale est, quod recipit farinæ triticeæ partes duas, colophonix resinæ partē unā. Item quale est Cephalicum appellatum. Item quod ex pumice ad carnem creandum cōficitur. Nam cutis crassiuscula cicatrice densata, & occlusa uasorum ora per initia pituitæ impetum in oculos deferri prohibent.

De superioris palpebræ sutura, alijsque modis.

Cap.

VIII

GRæci appellant *στειχίασις*, cum naturali pilorum palpebræ ordini, alij præter naturam pili succrescunt: Quod uitium ex fluida affectione contrahitur quando humor qui

quin influit, copiosus quidē, sed rosionis & acrimoniz expers fuerit. Nam acrior, aut falsus magis, aut alio quodam modo rodens, spatio temporis etiam naturales palpebrae pilos corrumpit. Interim igitur in hac affectione, sutura utimur: interim in phalangosi cum cilium introspectat pilorum acie simul cum eo inuersa, interdum etiam in palpebris relaxatis, quando naturales pili bulbum compugunt. Aeger itaque in sedili collocabitur, uel aduersus, uel à sinistra, superiorque palpebra inuertetur: siquidem longos habeat pilos, illos ipsos indice & magno sinistrae manus digito apprehendemus: sin admodum breues, acus filum ducens per medium cilium in exteriorem partem transmittetur, deinde per filum sinistra manu sublata palpebra, dextra, cuspide specilli post filum in rugas plicasque coacta inuertetur, & subtus linea interius quam pili pungentes habeantur per cilium ducetur, à maiori angulo usque ad minorem pertinens. filo autem post interioris sectionis lineam subiecto, pollice manus sinistrae exiguum quoddam linamentum implicitum obijcientes, supercilium attollemus, aliaque parua linamenta implicita summis angulis imponentes famulo posterius stanti iubebimus, ut palpebras per ea attollat, atque tunc lineam uero modo rectam, obelizam Graeci uocant, primum scalbello futuris aptato incidemus paulo superius quam naturales pili existant, ab angulo ad angulum tendentem, altam ut sola possit cutis diuidi: post eam, lunatam adhibebimus, incipientes quidem unde & uero similis linea inceperit, in tantam uero sublimitatem tendentes, ut totam cutem quae superflua est circumscribamus, desinentesque similiter ubi & illa iam commemorata linea. Postea cum cutis duabus lineis circumscripta myrti similitudinem representet, angulo qui ad dextram nostram spectet hamulo transfixo totam hanc cuticulam excoriabimus, deinde uibicibus spongiatè quaterve ablutis, oras uulneris contrahemus, à media auspicantes, acum uero per ipsam interioris sectionem transmittentes: porro filum ex lana esto. Cæterum quod eius superfluum est ambutabimus, non prope futuras, sed ut circiter trium digitorum longitudo otiosa pendeat, eamque per frontem exportectam, cum emplastro quodam conglutinate applicabimus, palpebrae autem pulos à futuris, cuspide acus liberabimus. Hic igitur agendi modus & communis & securus est. Nonnulli exco-

riationem fugiunt, eoq; post ductum subtrus lineam, uolsella palpebris continendis accommoda, hoc est, ad palpebræ ambitum apprehendendum figurata, id quod superest cutis, eleuatū, scalpro amputant, ac suturas, ut comprehensum est, adiiciunt. At si in parte aliqua solū palpebræ ex pilis oriatur punctura, illi etiam soli manum adhibere conuenit, deinde linamenta implicata posca madida imponemus, deligabimusque imbuentes ipsam partē posca aquosa usq; ad tertium diem, quo ligaturam soluemus, ac superflua fili parte abscissa oblinemus palpebras, uel croco, uel glaucio, uel aliquo collyrio, quod inflammationem arceat, ut, croceno diarodon. At si inflammationem futuræ patiantur, etiā emplastrum aliquod lene ipsis superaccommodabimus, & ueluti lacte infuso oculum leniemus, laxiores autem redditas suturas amputādo abstrahemus. Notus mihi quidam est qui palpebra, ut dictū est, excoriata futuris non uteretur, sed medicamento cicatricem inducente curationem absolueret. Nam uulnere ad cicatricē ueniente, palpebram ex parte attollens pilos extra inclinare coegit. Quemadmodū igitur alius quispiam ne exeoriens quidem palpebrā neque externis duabus utens diuisionibus, sed in inferiore solum adhibita, palpebræ rugas digitis uel hamo attollebat, item duabus arundinulis aut lamellis quibusdam palpebræ longitudinem æquantibus, latitudinem angusti scalpelli, quod uenis secandis adhibetur, superflua totam cutē mediam prehensam cōstringebat, utriusq; ipsius terminos deuinciens. Atq; hac ratione, tota posterior cutis alimentum non sentiens, eoq; emoriēs, intra decimum aut plurimum quintumdecimum diem cum arundinulis aut lamellis excidebat, ita ut nulla ferē cicatrix appareret.

Quomodo palpebræ medicamento urantur. Cap. IX.

Visionem palpebrarum ex urente medicamento factam, omnes, ut uno uerbo dicam, ueteres damnauerūt, tum propter medicamenti acrimoniam oculis insidiantem, tum quod ex inmodica uisione affectus nascitur, quem Græci lagophthalmum appellant, in quo hiantibus palpebris qualicumq; de causa lumen offenditur. Quoniam uerò multi à pilis semper punctiōem experiunt, ne uocabulum quidem futuræ frequenter audire sultinentes detinent plerunq; nos etiā inuitos, tanquā aliis destituti præsidij uisionem per medica-

mentum adhibemus. Compositio uerò medicamenti hæc recipit, calcis uiuæ partes duas, saponis gallici uel cōis, toridē. Quidam ēt aphronitri partes quatuor læuigatas lixiuio, aut saponario, aut alio, ē ficu, aut quercu, aut urina pueri impubis excipiente s mucrone scalpelli palpebræ iniiciemus, tm̄ in myrtacei folij figurā, adurentes quantū etiam in descriptione cōprehenderimus. ubi iam primo medicamenti imposito cutis fuerit adusta, eo spongia ablato rursus aliud iniiciemus, tam diu id cuti inhærere sinentes quousq; nigrescat. Sin id non affecuti fuerimus, etiā tertiō inducetur. Postquā uerò cutis nigruerit, & reliquū iam crusta oborta medicamentum ablueris, & balneis & superfusionibus, quousq; crusta deciderit, utemur. Inde rasilibus linamentis & penicillis teneris, cicatricem moliemur.

Si oculus cute non obtegatur, lagophthalmum

dicitur.

Cap. X.

Lagophthalmon uocant cum superior palpebra sursum retracta est. Accidit aut hoc uitij, aut naturaliter, aut ex cicatrice uulneris, eiusq; uel sua spōte facti, uel ex sutura, uel uisione, ut nuper dicebamus, parū dextrè administrata: in qua etiā solum mediocris emendatio fieri potest si palpebra erassitiē amplā habeat. cōuenit n. ipsa cicatrice diuisa, & oris per linamentū diductis, etiā deligatura prorsus usq; ad absolutam curationē uti, ita ut non nimiū sicca, sed relaxantia magis unguina adhibeantur: quale est scēti græci succus superflusus & balilicum tetrapharmacū quod linteolis illinatur resolutum.

De inferioris palpebræ sutura & uisione per

medicamenta.

Cap. XI.

Quot pilorum affectibus superior palpebra opportuna est, tot etiā inferior. Etenim ultra naturæ suæ modum excrescēs, inuertitur, & phalangosim, & distichiā sustinet. Eodē igitur modo quo in superioris palpebræ sutura, utendum est, ordine inuerso: primū lunata incidi linea debet, ne sanguinis fluor opus impediat, deinde recta. Subtus uitanda est scētio, quoniam palpebra inferior pondere suo genuino promptè inuertitur. Cæterum reliqua curatio in superioris palpebræ sutura tractata, hic quoque conueniet, præter quā quòd sistorum excessus fronti sint agglutinandi. At si in hac etiam affectione manum extrimescens, uisionem potius ē medica-

mento

mento deligas, hanc quoque iam traditam habes.

De ectropiq.

Cap. XII.

Quemadmodum superiori palpebræ uitiū uocatū lagophthalmon, ita inferiori ectropion oboritur: uerum id intercedit discriminis, quod hoc non est natura prouenit, sed nonnunquā ex relaxatione, quam medicamenta in id efficacia, inflammatione præcedente cōcitarint: nonnunquā ex futura, aut inartificioſa uſtione palpebra inuertitur. Acu igitur duolina trahente carunculā tranſuemus, à ſiniſteriore angulo ad dextrū deducta. Deinde lino utriſque ipſius extremis admoto, carunculā per acum attollemus, atq; ita ipſam ſcalpello excindemus, auferentes ſimul cum ea & acum. Atq; ſi figurā palpebra receperit, & æqualiter ſit conuerſa, ſatis manu proſectū eſt. Sin autem poſtea quā caro fuerit ablata, adhuc inuerratur, auerſum ſcalpellū quā partē Græci cyathiſcū nomināt, iuxta cuſpidem palpebræ ſectæ ſubiiciemus, ac in externa illius parte duas inciſas lineas, à duobus factæ ſectionis angulis, auſpicantes, in acutiē quandā ducemus, eaſq; in unū cogentes, particulā Græcorū literæ Λ ſimilem amputabimus, ut eius acuta pars infrā ſpectet oculum, latitudo ſuprà, cilium appellatum reſpiciat. Secundum hoc diductas oras acu ex lana filum ducente committemus, duabus ſuturis contenti. Quod ſi uerò futura, aut uſtioni fertur acceptū ectropion, etiam ſub inferioribus palpebræ pilis per ipſam primam cicatricē lineā ſimplicem incidemus, labrisq; diductis linamenta inferemus, ac aliis præſidijs, quæ in lagophthalmis comprehenſa ſunt, utemur, præterquā fomentis, uſq; dum futura fuerit conglutinata.

De anabrochiſmo, & uſtione ſerramento adhibenda.

Cap. XIII.

In quibus haud multi palpebræ pili habentur, qui oculū iritent, ſed circiter unus, aut duo, aut plurimū tres, inuicē propinqui, anabrochiſmū græcè dictū, probamus, iſq; ſit hunc in modū. Per acus tenuiſſimæ auriculā capillus muliebris, aut ſimpliciſſimum byſſinum linum tranſmitritur, duobus ſimul extremis commiſſis, ut quod inferitur duplicem habeat anſulā alterumq; huiuſmodi filum, aut capillus anſulæ iniiciatur: traductaq; acu per cilium ubi pili enati apparent, pilū, pilosve anſulæ impoſitos, auriscalpio detrahemus. Et ſiquidem palpebræ

pilus prehensus est, anfulam attrahimus. Sin uerò unus, aut plures exciderint, per iniectum principium rursus anfula deorsum trahemus, iterumq; pilo, seu pilis in eam positis, attrahimus. At si unus duntaxat pilus gracilis oculū pungat, etiā alterum ex naturalibus palpebræ pilis simul euellemus, in unum prius gūmi, aut alio quodā glutinante, deligabimusq; donec pilus coalescat. Nonnulli autē ustionem præponunt anabrochismo: palpebram inuertunt, extractoq; uulsella pilo pungente siue uno, siue duobus, uel etiā tribus, candens aut specillū, quod utroq; extremo in cuspidem abeat, aut auriscalpium, aut eiusmodi aliquod tenue instrumentū loco adigunt, unde pilus, pilive sint euulsi. Sic enim cute densata, nullus, pilus nascitur.

De hydatide.

Cap. XIII.

HYDatis pinguis quædā est substantia, palpebræ cuti præter naturā substrata. In aliquibus autem, & præsertim pueris ceu natura humidioribus augescens, maiorū superuenientiū causā redditur, dū oculū pondere suo grauatur, eoq; fluxionē excitat, palpebræ igitur ipsis subter supercilia aquæ inter eutem representant, nec ut par est sursum possunt attolli. Si uerò digitis ipsas deprimamus, inde digitos separemus, qd̄ mediū intercedit, inflatur. Horis autē antelucanis porissimū de fluxione tentantur, neq; contra solis splendores cernere sustinent, sed tamē illachrymant, continuisque lippitudinibus instantur. figurato igitur cōmodè ægroto, digitis duobus, indice & medio paululū distantibus palpebrā constringemus, collectionem quandā hydatidis ad mediū digitis interpositū molientes. Minutro autē posterius stanti caput q; ægotantis firmiter continenti iubebimus per mediū supercilij palpebram modicè attollat, Nos sumpto in manus scalpello, ipsam per mediū lineam transversā diuidemus, non maiore quā in sanguinis per uenas detractōne fieri solet, alta uerò ut totā cutē diuidat, uel etiā hydatidē ipsam attingat, sed cura omnino debet adhiberi. pleriq; siquidem altius demisso scalpello, uel membranā quæ à cornu similitudine Ceratoides dicitur, uiolarunt, uel certè palpebræ musculos conuulnerarunt. Atq; si quidē protinus hydatidis in conspectū uenerit, ipsam extrahemus: sin minus, iterum diuisionem leuiter moliemur. Vnde si apparuerit digitis cum lintēolo molli apprehensam huc, illuc, nonnunquam etiā circumactam

cumactam mouendo extrahemus. ubi ablata fuerit implicitū panniculum posca madentem impositumq; deligabimus. Sunc autem qui & læuigatum salem specilli capitulo diuisionibus inferant, ut si ex hydatide quippiam fuerit relictum, ipsam consumat: postquam solueris si desit inflammatio collyrijs quæ illini possint, aut lycio, aut glaucio, aut croco curationem expediemus. Sin inflammatio urgeat, cataplasmatris ad ea inscriptis, alijsq; præsiidijs medebimur.

De palpebris commissis. Cap. XV.

Superior palpebra interim cum inferiori cilio coalescit, interim cū membrana adnata, interim etiam cum ea quæ ob cornus similitudinē græcè ceratoides appellatur, ac morbus oculum tractatu difficilem efficit. Conuenit igitur uel auriscalpio, lato palpebræ spatio subiecto, uel ea per hamulū eleuata coalitum scalpello ad pterygia excidenda idoneo dissoluere, cura adhibita ne cornea membrana uulneretur, atq; inde procidentię occasio fiat. Vbi incideris, succo in oculum infuso linamentis palpebras diducemus, ne rursus commissura fiat, lanaq; ouo madente imposita post tertium diem extenuantibus & quæ cicatricem inducunt collyrijs utemur.

De chalazijs. Cap. XVI.

Chalazium otiosi humoris in palpebra concretio est: quæ si ab exteriori parte palpebræ coaceruetur, scalpello extrinsecus trāsuerſa linea incidi debet: deinde auriscalpio, uel aliquo huiusmodi instrumēto Chalazion auferemus. Quod si magna est diuisio, aut dehiscit, suturis oras commitemus, ac emplastro utemur. Si exigua est, omisſis suturis, curationē absoluemus. Si ab interiori parte fuerit, ut per cartilaginem ipsa pelluceat, inuerſa palpebra & trāsuerſim intus diuisa, chalazion tollitur: quo factō, muriā uulneri infundemus.

De uerrucis & encanthide. Cap. XVII.

Palpebrarum uerrucis, & in maiore angulo encanthidibus appellatis uulſella prehenſis, scalpelloq; amputatis chalcitidem læuigatam imponemus,

De ungue oculorum, quod pterygion à Græcis uocatur. Cap. XVIII.

Pterygion neruosa membrana est: quæ ab oculi angulo maiore plurimum initium capiens, per minore ad inte-

riora progreditur, officitq; oculo, quod motū ipsius, bulbi cō-
tractione impediat, & q̄ progrediēs, totā pupillā cōtegat. Cū
igitur facilius curationē recipiāt, quæ tenuia sunt, & albicant,
hūc in modū admouēda manus est. Diductis palpebris, unguē
hamulo modicē inflexo exceptū attollimus. A cū uerō, pilum
equinū, aut linū ualidū ducentē, ac paululū inflexā per summa
ad unguis dimidiū traiciamus. Et lino quidē unguē deligatum
sublimē eleuamus, pilo autē partē pupillæ proximā defecantes,
utq; ad extremū excoriamus. Reliquam partē maiori angulo
uicinā scalpello futuris dicato ex basi absindimus, ita ut angu-
li carunculā relinquamus, ne ea ablata, humor postea semper
descendat, rhyada Græci uocant. Aliqui lino unguē eleuatum
ut diximus, scalpello in id accōmodato, totum illum excoriāt,
cauentes ne à cornu dictam Ceratoidem tunicam attingant.
Post manus administrationem momento salis in leuorem de-
tritū loco iniecto, lanam ouo imbutam illigabimus. Ab huius
solutione, muriam ipsis liberaliter instillabimus. Si inflamma-
tio subsecuta fuerit, ad eam inscriptis auxiliis succurremus.

De staphylomate.

Cap. XIX.

Staphyloma est tunicæ Ceratoidis, una cū rhagoidi, debi-
litatæ: aut uitio defluxionis, aut exulcerationis, eleuatio.
Admouemus autē huic uitio manū, non ut uisum abolitū
restituamus (nā id fieri nequit) uerū ut moderatū ægrotan-
ti decorē cōciliemus. Itaq; acu ab inferiore parte sursum per
basim staphylomatis traiecta, deinde alterā acum duplex linū
ducentē ab angulo qui ad manū spectat, ad alterum per basim
staphylomatis trāsmittere oportet, manenteq; prima acu, du-
plici lino amputato, staphylomatis aliā partem sursum, aliam
deorsum filis deuincire: atq; tunc acu detracta lanam oui li-
quore imbutā imponere. Post solutionem blandis infusioni-
bus oculū lenire, donec fila simul cum staphylomate decidāt.

De oculis purulentis, qui hypopyi dicuntur. Cap. XX.

DE oculis purulētis Gal. uerba apponere abūdē est, quæ
in eū modū habēt. Nostra ætate medicus quidā ocula-
rius cognomēto lustus, ēt cōcussione capitis plerosq;
hypopyos perſanauit. collocās. n. eos in sella rectos, ac capita
ipsorū utrinq; à lateribus cōprehendens, mox quatiebat adeo
ut pus ipsis descēdere palā uideremus. māsit autē deorsum pro-
pter

pter gravitatē substantiæ, tametſi hypochymata nequaquā manerent niſi quis admodū diligēter ea infarxiſſet. Ac progreſſus iterū idē Galenus (inquit) frequenter autem multū ſimul puris uacuauimus tunica ea diuiſa quæ cornuſ ſpeciē refert, paulō ſupra locū quo uniuerſæ inter ſe tnnicæ cōmittuntur, nominant aut locū, Græci nunc irim, nunc Stephanem hoc eſt coronam. Hoc quidē Galenus in commentario de morbis curādis prodidit. Cæterum poſt puris euacuationem, ulcuſ ex mulſa aut fœnugræci ſucco, melle addito infuſionibus repurgantes, deinceps reliquam purgationem accommodabimus.

*De ſuffuſis.**Cap. XXI.*

Suffuſio, ocioſi humoris in cornea mēbrana iuxta pupillam cōcretio eſt. quæ uiſum impedit, aut certē ne clare oculus cernat, efficit, Accidit potiſſimū ex perfrictione ac imbecillitate ſpiritus uiſorii, eoq; ſenes magis & lōgo morbo conſectos inuadit. ſit ēt ex uomitu uiolētius cōcitato & ex ictu, aliisq; pluribus de cauſis. Verū de ijs ſuffuſionibus quæ nondū radices egetūt, nullā manuſ adminiſtrationē requirētibus, tertio libro cōprehenſum eſt. In hoc aut eas quæ iam cōfirmate ſunt & ex toto cōcreuerunt, notis ſuis deſcribemus. Oēs igitur ſuffuſione laborātes lucē uidēt aut multā aut paucā, eoq; diſcrimine ſuffuſiones ab hebetudine & glaucōmate ſeparamus, tū eo q̄ hebetudinē & glaucōma experti lucē omnino nullā cernunt. Rurſus igitur Galenus docebit te ſuffuſionū & cōcretionem & differentiā, itē quō his manu mederi cōueniet. Oculuſ ſuffuſione tētatus cōcluditur, & palpebra magno digito ad oculum premitur, eiq; adducitur, ſimulq; hac illac exprimitur, deinde oculo aperto & mēte ei adhibita ſuffuſionē conſpicimus. In iis. n. quibus humor nondū coaluit, ſuſio quædā ex digiti impreſſione oboriē. ac primū latior apparet, rurſus in ſuā & figuram & magnitudinem recurrit. At in cōfirmatis ſuffuſionibus nulla immutatio nec latitudinis nec figuræ ex impreſſura obuenit. Quoniā uero cōe hoc eſt indicium & eorū in quibus modicē, & illorū in quibus ſuprà modū humor cōcreuit, colore ipſos diſcernemus. Nā ſi ferri aut marinæ aquæ aut plūbi colorē ſuffuſio habeat, moderatē coaluit, & ad eduſtionē idonea redditur: ſi uerò gypſo & grandini ſimilis color ſuffuſionis eſt, ſupra quā par eſt concreuit Sed quia hæc à Galeno didicimus,

phacomeli uocant, uel malicorio cum melle reliquisq; siccantibus prædidiis utemur. At si ægilops serpat ad angulum, summaq; inuadat, nequaquam tunc scalpello, quo aut pterygia, aut uenas secamus, media anguli parte ad abcessum resoluta, carnes ex alto educemus, item mediocriter desiccabimus. Vitri autem pulvis tenuissimus ipsis insparfus, mirabiliter desiccet. Ad hæc aloë similiter cum fuligine thuris. Reliquam uero Aegilopn medicinam, tertio libro sumus executi.

Si meatus auditorij non perforati sint. Cap. XXIII.

Hic affectus à prima natali die contrahi, mēbrana quādā auditoriū meatū obstruente, nunc per summa, nunc in alto, postea accedit præcedente in audiendi meatu exulceratione. siquidē caro supernascens ipsum occludit. Itaq; si mēbrana auditū impediens altē inhærescit, difficilis erit administratio. Tenrandū tamen est, tenui quodā instrumento ipsam incidere. si in summo fuerit, scalpro quod Græci scolopomachæ rion appellant, hanc diuisam, ubi usus exigit, et auferemus. At si caro supercreuerit, hanc pterygijs apto scalpello, aut specillo polypis idoneo tollemus, deinde tortile linamentū ex uiliore panniculo, spatiofo meatus sinui aptatū aqua imbuemus, inuolutumq; chalcitide læuigata, aut huiusmodi quodam arido in meatum demitemus, ne rursus caro enascatur. Si inflammatio male habeat, protinus id auferemus. Si fundat sanguinem meatus, spongiā aqua frigida imbutā imponemus. aliisq; conuenientibus utemur remediis.

Ad ea quæ in meatum auditorium inciderunt extrahenda. Cap. XXIIII.

Solet etiam in aurem incidere, non modò calculus, sed et uitrum, faba, & siliquarum grana. uitrum itaq; & calculus suam seruant magnitudinē: fabæ autē, & siliquarū grana, aliq; id genus, naturali corporis madore inflata, maximos cruciatus mouent. Conuenit igitur uel auriculario [specillo, uel hamulo, uel uulsella hæc extrahere. Aut uiolēta capitis cōcussione, aure super circulū quendā imposita. Iā uerò calamo hæc subinde extraximus, exurgentes et aquā auribus illapsam similiter, cera calami ambitū, qui auri inijcitur, obstruentes ne spiritui usquā sit exitus. Calculos, & eius generis corpuscula, ieduximus specillo lana inuoluto & in resinā terebinthinā,

aut

aut aliud quoddam glutinans demisso, eoq; in meatum auditorium coniecto leniter. Sin ista nihil proficiunt, medicamentum quod sternutamentum prouocet, naribus indito, os & nares obturato. Si ne horum quidem nulli cesserit prius quam inflammatio, conuulsio, & omnino periculum fuerit subsecutum, manu, & ferramenti ipsa auferemus: figurabitur itaq; egrotus, ut aures aversa sit ad basim ipsius post appellatam fibram, & lunata utemur diuisione exigua, aversaq; specilli parte corpusculum quod insidet, eximemus. Hoc ablato vulnus futuris commitemus, & medicaminibus ad cruenta inscriptis utemur.

De polypo.

Cap. XXV.

Polypus tumor est praeter naturam in naribus oboriens, ex marini polypodis similitudine nomen sortitus, tum quod illius carne representet, tum quod suo complexu quemadmodum ille, captantes ulciscitur, nares ipsorum comprehendens, ita & uitium hoc laborantium nares obstruit, id efficiens ut & difficulter respirent, & sermonem aegre exprimant. Duri igitur polypi, tactui renitentes, liuidi, & maligni, ceu canceri naturam induentes, attingi non debent. Molliores autem, laxos, stupidos, neque maleficos scalpello curare tentabimus. Figurato homine in sedili aduersus solis radios, & narium meatu sinistra manu explicato dilatatoq; spatula ad id facta in myrtacei folii modum acuta orbiculatim polypum, aut carunculam dextra praecidemus, illic acie ferramenti imposita, ubi naribus coaluit: secundum hanc instrumentum in oppositum conuerso, manubriolo ipsius, succisam carunculam foras eximemus. Et si quidem purum naris meatum uiderimus effectum, ad curationem descendemus. Sin reliquiae aliquae polypi superfuerint, alterius cultelli rasorii acie relictum corpus cum tensione, agitatione, & rasura ualenti auferemus. Malignos & pericaces polypos candentibus ferramentis aduertere consilium est. inde remedijs uestioni dicatis uti. Postquam serro satis effectum, spongia detergemus, ac poscam, aut uinum in nares fundemus. Et si humor per palatum in fauces euaserit, bene se habent munia scalpello obita: sin minus permeet, nota est carunculam polypi ossibus a colando ethmoidibus dictis insidere, aut supremis narium partibus, quam instrumenta non comprehenderit. Linum igitur mediocriter crassum funiculi instar, ceu duorum triumue digitorum longitudinis in nodos constri-

constrictum, per specilli duplici cuspide præditi foramen trāsmitemus, alterumq; extremum specillo per nares sursum ad meatus colatorios inferetur: idem perpalatum, & os eiicientes utraq; manu extrahemus, tanquam carunculas nodis defecantes. Deinde funiculari linamento meatum diductum habētes post triduum pastillo musæ, & consimilibus, reliquias absumemus simul & locum exiccabimus. Postea uero pastillis cicatricem ducentibus utemur, plumbeos canaliculos naribus, si opus sit, per totam curationem accommodantes.

Curta in auribus, & labris quomodo sarciri possint:

Græci uocant colobomata. Cap. XXVI.

Curta igitur in auribus aut labris, colobomata Græci uocant, hac ratione curantur. Primum cutis ab inferiori parte soluitur: mox oræ uulnere contrahuntur, ac id quod in callum coaluit, aufertur. Dein futuræ illis iniici debent, & conglutinantia,

De epulidibus, & parulidibus. Cap. XXVII.

Epulis carnis tuberculū est iuxta dentiū aliquē in gingiuis oriens. Parulis exiguus abscessus est, gingiuas infestans. Epulidē itaq; uulsellā, aut hamulo eleuatā præcidemus. Parulidi in orbem exactæ linamēta inferimus. Vidi autē subinde scalpello, quo uenas secamus, ipsam dūtātaxat pūctā, & pure uacuato conseruisse. post ferrum, uino collui præcipimus. In sequēti die mulsā, tertio Antheron, puluerē uulneri inducimus usq; dū curatio finiatur. At putredo gingiuis oborta si cōgruis medicamētis nō curetur: cādēti ferro ipsā aduremus.

Quomodo dentes eximantur. Cap. XXVIII.

Dens qui eximetur usq; ad receptaculū suum circumradi debet, inde forfice paulatim concussus, extrahitur. At si exesus est, id foramen tenui linamento primum replendum est, ne constrictus sub forfice confringatur. Eo exēpto, sale tenuissimo insparso relictas carunculas consumemus. Postea uino, aut postea os colluetur cum conseruescat. Quoniā uero superflui nonnulli dentes enascuntur, eos qui receptaculo adnati coaluerunt, scalpris excindemus: qui non coaluerūt, forfice tollemus. Sin autem dens aliquis excreuerit, aut etiam confractus fuerit, nonnunquam limula, id quod excedit, superfluumq; in eo est, detremus, adiectasq; ipsis, ut uerissimile est,

squamas

squamas auerso scalpello, aut rasorio, aut lima perpurgabim⁹.

De ligatione linguae quod ancylion dicitur.

Cap. XXXIX.

Ligatio linguae quae ancylloglosson Graecis appellatur, aliàs naturaliter accidit, membranis durioribus magisq; à prima origine minutis linguam continentibus, aliàs ex acquisito ob cicatricem quampiam duriores sub ipsa ex ulcere contractam Qui igitur ex natura hoc uitii habent, eo qd tardè sermonē explicare incipiunt & uinculum sub lingua iusto magis appareat, exulceratione non praecedente, cognoscuntur. Qui uero ex acquisito, cicatricem manifesto conspicuam habent. Collocari igitur debet aegrotus in sedili ea figura ut linguam ad palatū suspendeat, & nerueum illud uinculum transuersa plaga incidetur. Quod si ex cicatrice aliqua ligatio pro-uenerit, ea hamulo transfixa callum sursum extrahemus, ac laterali facta diuisione ligationē soluimus, cura adhibita ne particulas altè latentes incidamus. Nam sanguinis profusio quae sisti nequeat, frequenter inde secuta est. Post hæc aqua frigida, aut posca uulnus debet elui. deinde medicina utendum quae relaxet & carnem inducat.

De tonsillis. Cap. XXX.

Quemadmodum glandulae scirrho induratae, strumae appellatur, ita etiam tonsillae inflammationem expertae, & supra naturalem modum auctae, & ueluti desiccatae, deuorationi spirationiq; negotium exhibentes, e regione utrinq; sibi inuicem oppositae, eodem partis uocabulo, tonsillae, Graecè antiades uocantur. Quibus cum adest inflammatio, scalpellum adinouere cautio est. ubi illa modicè conquirit, manum admolierimur, praesertim albis, contractis, angusta basi firmatis. Nam humiditatis flaccescentes, rubicundae, amplam basim habentes, facillimè sanguinem profundūt. Collocatio igitur homine aduersus Solis lumen. iubebimus ut ore hiet, ministro caput continente, alteroq; linguam spatula ad id facta quam Graeci glossocatochon appellant, inferiori maxillae apprimente, nos hamulo per tonsillam traiecto, etiam quantum licet ipsam attrahemus, ita ut non membranas simul cuellamus. Deinde totam ipsa ex basi ambutabimus scalpro ligationi dicato, ἀγκυλότομον nuncupant.

pant. Sunt n. duo eiusmodi instrumenta, aduersos acie inflexus habentia. Postquam una fuerit succisa, ad alterā eodem modo uice conuersa ueniendum est. Functione scalpello obita, æger ex aqua frigida, aut posca gargarizabit. At si profluuiū sanguinis eueniat, etiā rubi & rosarum, & myrtiq; diluto egelido utetur. Si uero copia sanguinis prorumpat, plantaginis & symphyti succo item electro, pastillo & lemnia sphragide posca soluta os collui debet. Cessante autē profluuiō, proximo die, rosarū flore, croco & amylo cū lacte perungentur ex aqua, uel oui liquore cādido, uel hydrososato. Si sordes ulceribus increuerint etiā ex melle & collutiones, & illitus commodē adhibētur.

De uua.

Cap. XXXI.

Gurgulio tanquam aliquod uocis plestrū subinde destillationem à capite recipit: idemq; præter naturā auctus, si oblongior, tenuisq; fuerit, Columella nuncupatur: si uero crassior ab ima parte, & rotunda, Uua dicitur. utrunq; autem nomen à similitudine factum est. Si igitur uniuersalibus, nempe & per sanguinis dimissionē, & medicamento adhibitis uacuationibus non abigatur, neq; etiā remedijs loco admotis, quæ astringāt, repellantq;, etiā discutere possint, cesserit, ad scalpellū ueniemus: ne cōtinuo irritatu, tussis, uigilia, interim etiā strangulatus subsequatur. Quæ igitur cōtractæ sunt rotundæ, non oblongæ, cruentæ, uel subnigræ, nō attingi scalpe lo debent. Tenuēs autem, oblongæ, per summa graciles muris caudæ modo, remissæ, sanguinolentæ non admodū, sed albican tes, eæ curandæ sunt. hæ siquidē protinus inflammatione liberantur. Id autē ex uua præciditur, quod præter naturæ modum eminet. Etenim si ad finem illa præcidatur, extremam omnes thoracis regiones noxam percipiunt: & uox intermoritur. Itaque figuratu, ægrotatus in sedili contra Solis lumen, iubeturque magnum hiare deinde uulsella, aut forfice quod superuacuum est prehensum, inferiorique parti adductū scalpello uuis aut futuris accomodato, præcidimus. inde quæ in uasorum sectione comprehensa sunt, agemus. Sepe uero, aut propter laborantis timorem, sanguinis profluuij metum, medicamētū uel siccitatem ferrum uitantes, adurente potius medicamēto hanc absumimus. Conuenit igitur medicamento adurente quod in palpebrarum ustione dictū est, aut eius generis alio, uux uisæ sinus implere, ac homini magnum hiare iussio lingua per famulū

mulum forfice constricta, instrumento adaperto tam uue partem comprehendemus, quantam etiam sumus amputaturi. Cæterum spissitudinem medicamentum habebit neque liquidâ, ne diffuens ab uua deerret, subiectas autem partes adurat ob quod egro interdiciamus, ne per totum uulsionis tempus deglutiat, neq; omnino duram, quò facilius uue incidat, & si ex uno ipsius iniectu summa uue pars nigruerit, abundè est: sin minus, etiam bis utemur, egro per totum administrationis tempus inclinante ore, in terram, ut salua eliquesceus simul cum medicamento particulis extra os euadat, siquidè hora una emoritur: excidit autem tertio, quatuorve die. Secundum uulsionem lana molli aut stappa indice digito inuoluto quæ gurgulioni circum adhærescunt, extergemus, uel etiam aqua os collui iubebimus. At ceruicis regionem fomentis ex chamæmelino, tum in his, tum in illis quibus tonsillæ ademptæ sunt ex confortij lege adiutabimus. Ad hæc gargarizationibus, & perunctionibus similiter utemur.

Quomodo spinæ gutturi eximantur. Cap. XXXII.

Deuorantur subinde inter edendum spinæ, aut piscium, aut aliorum quorundam, diuersis in partibus. Quæ igitur in conspectum ueniunt, uulsella, quam Græci propriè appellant acanthobolon, eximemus: quæ inferius ad ipsas fauces peruenerint, alio modo. Sunt qui dicant maiores moles esse deuorandas, ut, caulem lactucarum, aut buccellam panis. Alij uero spongiam puram mollemque exiguæ magnitudinis linio illigatam deglutire iubent, linoq; apprehenso retrahi, idque frequenter efficere ut spina impacta spongiæ educatur. Leonides autem iubet cataplasmatibus uti, quæ concoquantur, cuiusmodi ex cruda ordeï farina conficiuntur, quò spina in pus redacta sua sponte excidat. At si eadem hora aut etiam ante uentriculi concoctionem in ægrotum inciderimus, eo quod in fixum est nobis non conspicuo, uomere iubebimus digitis aut pinnis in os dimissis. Nonnunquam enim, id quod est infixum unâ cum uomitu educetur.

Quomodo aspera arteria incidi debeat.

Cap. XXXIII.

Chirurgicorum præstantissimi hanc quoque administrationem literis prodiderunt. Antyllus itaque huc in modum

dum scribit, In synanchicis quidem, ut in ea parte dicetur quæ uictus rationem tradit Chirurgiam improbamus, cum inutilis sit præcisio, in quibus omnes arteriæ & pulmo affectus est. In ore autem & mentio inflammationem experiuntibus, aut etiã tonsillis, asperæ arteriæ os operientibus, incolumi sanè ipsa arteria, ratio est sectione uti, quò periculum strangulatus euitetur: deinde cum infra arteriæ caput spatium trium ipsius quatuorve circulorum manum adegerimus, partem nonnullà ipsius arteriæ scalpello pertundemus, totam diuidere securum non est, tum quòd hic locus excarnis sit tum quòd uasà procul à loco diuiso sint dissita. Itaq; inclinato ægroti capite retrorsum, ut arteria reddatur conspicua, transuersam lineam incidemus, inter duos circulos ipsam ducentes, ne cartilago, sed membrana cartilagine colligans, discindatur. At si meticulosior aliquis inter agendum fuerit, hamulo prius cutem eleuatam diuidet: deinde sic ipsi arteriæ incidens, uasis, si fortè occurrant, præteritis, lineam ducat. Hæc quidem Antyllus dixit: Conijciens arteriam scalpello esse penetratam, inde quòd spiritus per eam cum murmure quodam erumpat, tum quòd uox intercisa sit. ubi uero de strangulatu metus amplius non est, oras uulneris renouabimus, mox suturis committemus, ita ut solam cutim citra cartilaginem suamus, utemurque medicamento quod cruentis facit. Sin minus conglutinetur, præsidio quod carnem inducat insistemus. Simili uero curatione utendum etiam si quis nobis obtigerit qui mortis desiderio iugulum sibi inciderit.

De abscessu.

Cap. XXXIIII.

QUOD abscessus carniū, uel partiū carnosarū corruptela mutatioq; sit, quomodo generetur, quotq; eius sunt differentiæ, quarto libro abundè tractatum est. Nunc aut quæadmodū munu scalpelloq; ei medendū sit, exponemus, cū omnino in pus transierit. Hoc aut deprehēdimus inde quòd dolores, febris, si præcesserit, rubor, pulsus & reliqua inflammationis signa minora tunc appareant, ubi iam tumor in acutum fastigiatus est, & pus digitis innixis occurrat, præsertim cū summa occupat abscessus, tunc ad scalpellū ueniendū est. Si uero neque ad tactum occurrat, neq; fastigietur, eo quòd in alto delitescat, alij mutationis notis attendentes, manum admoliermur. Sciendum uero est crudos interim ipsos priusquam ex

toto in pus mutati sint, incidi, si aut articulis, aut principibus
 particulis uicini sint, ne ligamentum, aut aliquod eis necessa-
 rium assidua putredine pariter contabescat. Porro abscessus
 ano proximos crudos antequam in totū ematuruerint, dissecari
 Hippocrates præcipit, ueritus ne perforationem experian-
 tur. Inciduntur ergo non omnes simili linea, sed naturali qui-
 dem, ut in fronte: & pilosis locis, ut in capite. cura decoris quan-
 tum licet, habita. Recta uero linea artus secamus, ueluti in mu-
 sculis, diligentiam adhibentes ne & neruos & arterias & prin-
 cipales particulas attingamus: interim in rectū, interim trans-
 uersim abscessū prout cuiusq; usus exigit, diuiso. In minoribus
 unam scalpello sectionem molimur, in magnis plures, iuxta
 amplitudinis rationē ubiq; ea quæ tenuiora sunt & effluxioni
 idonea, incidentes. Illos sanè abscessu qui plurimum fastigian-
 tur, crudi tenues, & emortui sunt, præcidimus trianguli, aut
 mirtacei, folij, aut alterius anguli figura, cum circularis ad circa
 tricem recipiendam sit in idonea. Qui uero non in fastigiū at-
 tolluntur, eos simplici duntaxat linea dissecamus. At ubi ma-
 gnum sinū inuenimus, si cutis superinecta carnosā sit, & queat
 conglutinari, diuisione loci ea duntaxat utemur, quæ humoris
 effluxui conueniat: Sin tenuis, admodumq; ex carnis, totam in
 longitudinem simpliciter dissecabimus, & post simplicē diuisio-
 nem si corpora utrinq; sita gracilia ualde & nō carnosā uidean-
 tur, ipsa tollemus. Administrato iam scalpelli munere, spon-
 gia locus abstergi debet: si paruus, est abscessus, unaq; diuisio,
 simplex linamentum inferemus: Si magnus est & plures inci-
 sæ lineæ, implicitum aliquod in longitudinem linamentū, lem-
 niscon Græci uocant, ipsis demitteimus, ipsas similiter plagas
 linamentis replentes. Quod si erumpat sanguis, aqua frigida,
 aut posca utendum. si ita non substiterit, chalcitidis pollinem
 inspergemus, eoq; frequenter ob flaccidam humore putredinē
 utemur. Splenia si hyems est, & partes sint neruosæ, ænelæo
 imbuta deligabimus: sin æstas, & partes carnosæ, aqua cū oleo.
 aut ipso quoq; uino cum uino frigido tincta illigataq; sequen-
 ti die eisdē liquoribus superfundemus. Post tertium diem ubi
 soluerimus, spongiaq; deterferimus tetrapharmaco quod in
 linteola illinitur, utemur. Si inflammatione caret uomica, idē
 fomentum & medicamen linamētis illitum accommodabimus.
 Si inflammatio adest: cataplasma, quod concoquendi uim ha-
 beat,

beat, iniiciemus, superfusionibus antea usi ubi cessauerit inflammatio, medicina quæ pus maturet, & carnem inducat, medebimur. Cæterum unus, glutinantibus remedij, ut quarto uolumine de sinibus comprehensum est, curabimus.

De strumis.

Cap. XXXV.

Struma quæ græcè chœras dicitur, glandula est indurata, in ceruice, alis, & inguinibus potissimum enascens. Nomen habet à chœradis petris, aut suibus, quodd numerosæ sobolis existant, aut quodd colla habeant glandulosa. Oriuntur autem strumæ in priori ceruicis parte, aut in altera, aut utrinque una, aut duæ, aut plures. Omnes autem suis membranis includuntur, quemadmodum steatomata, atheromata, & melicerides. Quæ igitur indolent attractu, & medicamentis impositis deteriores redduntur, malignæ sunt, quas etiam Carcinodas aliqui dixerunt, notumque est omnibus ipsas curationi quæ manu sit, non cedere. Morigeræ autem ac blandæ tum tactui, tum congruo medicamentorum usui, hoc modo tractandæ sunt. Superficiaræ igitur, & in cutem erumpentes, simplici linea diuisæ, ab incumbenibus dissoluuntur. orarum cute hamulis distenta, membranis liberantur, ut in uasorum cōsectione, quam angiologiam uocauimus, expositum est, ac paulatim eximentur. Maiores autem strumas hamis transfixas suspendemus, & similiter excoriatæ corporibus eas continentibus undiquaque liberabuntur, animo adhibito ubique, ne arteriæ, quas carotidas uocant, & nerui recurrentes uiolenter. At si uas aliquod diuisum opus obscurer, funiculo id excipietur, uel per medium amputabitur, nisi magnū fueit: ubi in arcum strumæ basis uenerit, dextrè ipsa præcidetur: ac indice demisso tentabimus num & aliæ sint strumæ adiectæ quæ eodem modo auferentur. Quodd si magnum aliquod uas aut etiam plura subinde iuxta strumæ fundum esse suspicemur, nō ex basi ipsam excindere, sed funiculo excipere conuenit, quodd particulatim citra periculū sua sponte excidat, quo tempore medicamento in linteola illito, curatio tentabitur. Si uerō inde excindatur, oras committemus. omnino autem rectas diuisiones adhibere oportet. Atque si nihil superuacuum habuerint, inde futuris iungemus. Sin ex strumæ tumore cutis redundet, parte ipsius myrti instar ablata, futuris utemur, & medicamen cruentis aptum iniiciemus.

De steatomatis, atheromatibus & meliceridibus.

Cap.

XXXVI.

HAec quoque in abscessuum genere comprehenduntur: sed hoc discrimine ab illis variant, quod abscessus propriè dicti inflammationē doloremq; testentur, & acrem humorem, ac rodentem contineant, nulla peculiari membrana, aut tunica inclusi. Cæterum illa inter se quoque differunt, quod humor in steatomate contentus, sicut appellatio ostēdit, seu sit persimilis. In atheromate, pulsi frumentaceæ. In meliceride, humor mel repræsentet. Agnosces ipsa hunc in modū. Steatoma aliis durius est, tactui renititur, & basim habet solidiorem. Meliceris laxi cuiusdam corporis modo subsidet, & tardè quidem funditur: cito autem rursus succrescit. Curantur hæc quemadmodum strumæ, incisione, ex coriati, suturis & reliqua curatione, id solum cauendo, ne membrana uulneretur, unde humor qui continebatur, profusus operationem impediat, & ne pars ipsius relinquatur, nam renascendi occasionem plerunq; in brachiali, talo & articulamentis motui dicatis exhibet, quemadmodum etiam struma uel tota, uel portio ipsius relicta. quod si huiusmodi quippiā fuerit deprehensum, satius est non suere, sed exedētibz medicaminibus reliquias absumere.

De aneurysmate.

Cap. XXXVII.

Aneurysma tumor blandus tactu est, digitisq; cedit, ex sanguine & spiritu contractus. Galenus de eo hunc in modū scribit. Arteriæ apertæ affectus, aneurysma uocatur. Fit autem eadē quoq; conuulnerata, quoties incumbēs ei cutis cicatricē quidē contraxerit, maneat autē arteriæ uulnus, dum nec coaluerit, nec carne fuerit obstructa. Agnoscuntur huiusmodi affectus arteriæ pulsū, imò etiā prementibus nobis tumor omnis euanescit, substantia quæ ipsum efficit, in arterias recurrente. Hæc quidē Galenus. Nos autē ipsa aneurysmata hoc modo inuicē discernimus. Quæ ad aperta arteria fiunt, prolixiora apparent, & in alto constituuntur: digitisque impressis ceu strepitus quidā ex auditur, cū nullus sonus in iis quæ rupturæ feruntur accepta percipiatur: illa uerò rotunda magis sunt, & per summa occurrunt. Quæ igitur alas, inguina & ceruicē infestant, aliāq; loca, eximie magnitudinis aneurysmata, curare propter ualorū amplitudinem non tentabimus.

Quæ

Quæ uerò summas partes, artus uel caput affligunt, hac ratione aggredi conuenit. Si quidem ex aneurysmate tumor obuenit, cutem linea recta in longum incidemus, deinde hamis ductæ oræ sicut in uatorum dissectione dictum est, excoriabuntur, & scalpellis quibus membranæ auelluntur circumpurgata arteria nudabitur: acu traiecta duobus funiculis deligabitur, puncta prius arteria scalpello per medium: ubi cum ambienti membrana unita fuerit, curatione pus maturante utemur usque dum funiculi exciderint. At si ex ruptura arteriæ creatum sit aneurysma, totum id quatenus fieri licet, cum cute digitis apprehendendum est, deinde acu duplex linum trahente, inferius eo quod exceptum est transfluendum. Et post acus traiectionem ansulam forcice præcidere oportet, atque sic duobus filiis, hic illic tumorem deligare, ueluti in staphylomate comprehensum est. At si metus sit ne fila circumuolantur, altera etiam transmittenda est acus per totum quæ priorē premat similiter duo fila ducens: amputata an sua ex quatuor filiis constata, ita tumorem ex lino deligabimus, uel tumorem per medium ad apertum post excretionem, cutem adimemus, eam quæ ligata est relinquentes, ac splenium ex uino & oleo imponentes, remedijs in linamenta illitis utemur.

De aspera arteriæ tumore qui bronchocele dicitur. Cap. XXXVIII.

GRandis in ceruice, & rotundus tumor fit, nomen claturam ab internis partibus sortitus. Duplex eius tumoris differentia est, alius enim adipe tumet, alius partium illarum dilatatione accidit. Atque hunc notabimus ueluti & aneurysmata, desperatumque fugiemus, non aliter ac uniuersa aneurysmata quæ periculosam habeant administrationem: præcipue uero quæ circa ceruicem oriuntur, ob arteriarum magnitudinem. Qui adipe inturgescit, ita ut steatomata curari debet, discretis, præteritisque uasis, eo nimirum modo quem in strumis exposuimus.

De ganglijs.

Cap. XXXIX.

GAnglion, nerui est in nodum concretio, ex ictu, aut labore proficiscens, plerumque uero in manus iunctura, quæ cum orachio committitur, talo, & articulamenti absoluitur: quanquam in alijs quoque partibus proueniat. Hæ comites sunt notæ, tumor, concolor, rehitens, indolensque. At si uiolenter premas, stupidum sensum experitur, non in alto, sed ipsa sub cute

te radices agens:& ad latera quidē transferri potest:ſin autē uī adigas:tum antē,tum poſt,nequaquā poteſt. Quæ igitur in cruribus aut brachiis aut ſummis partibus oriuntur,excindere tutum non eſt:periculum enim ne particula reddatur mutila. Atque caput aut frontē inuadunt, cutē ſcalpello diuiſa curamus,& ſi quidē parua fuerint,uulſella cōprehenſa ex baſi præciduntur:ſi maiora,hamis tranſfixa excoriataq; tolluntur:oras futuris commiſſas, medicamento ad cruenta apto perſanamus.

De uenæ ſectiōe.

Cap. XL.

ET ſi omnibus ſatis cōſtet, quomodo uena incidi debeat, tamen ne parti chirurgicæ aliquid deſit,& propter artificioſas ipſius diſtinctiones,omittendū non eſt. Primū itaque uenæ ſectiōis conſiliū eſt,ut ſanguis qui redundat,euacuetur. Copia uerō ipſius duplici modo capi demonſtrata eſt,uno ad uires,uenæ licet plenæ nō appareāt:in quo ſtatu, homo proſtinus imbecillis ac inualidus reddit:natura ceu ad graue aliqd onus ferendū impotēte. Altero, uafa quæ id cōtinent,in alia loca pondus tranſfundere ſpectātur:& ſi uirtus haud cū moleſtia ipſum tōleret:in quibus ruptis interdū uenarū cōmerciis, ſanguinis ſputū, aut aliæ fluxiones accidunt. Copiæ igitur, quæ ex uiribus eſtimatur, corporis grauitas, nota eſt. Venarum copia tum extenſione, tum quōd illæ plenæ tument, agnoſcitur. utraque autem, uacuationem neceſſariam indicat. Itaque primo quoq; die ſanguinem uſu id exigente demittes, ſola in uentriculo ciborū concoctione, aut etiā perfectā in iocinore ſanguinis elaboratione expectata. At ſi inter initia ob cauſam aliquā ſanguinis detractio prætermiſſa fuerit, uel ultra ſeptimanam cum mittere alienū non eſt, ſi neceſſitas poſtulet, & uires non diſſuadeant. Cæterū qui uenā inciduſus eſt, id habet inſpiciendum, num multa ſtercoris retentio inteſtina urgeat. Quod ſi ita deprehenſum eſt, molli clyſtere aluius antea uacuari debet: ne uenæ putridam aliquam excrementorum colluiē ab inteſtinis attrahant. Iſ igitur qui ob morbi neceſſitatē, ſanguinis detractiōem requirunt, quouis tempore uenam incidemus, ſi particularium duntaxat in febribus acceſſionum uigorem ſeu ſtatum excipiamus. At ſi continens febris extiterit, matutinū omnino tempus magis idoneū eſt. Qui uerō nullo morbo urgente, ſed præcauēdi illius gratia ſanguinis uacuationem poſtulant,

stulant, his uero opportunū est. Porro in ætatibus usq; ad quartumdecimum annum sanguis mitti non debet, sicut ē post sexagesimum, nisi necessitas quædā ineuitabilis huc nos cōpel-
lat. in summa, imbecillis uiribus præditi, hanc uacuationē ui-
tabunt. Cæterū in particulis recens inflammatione tentatis, ex
opposito inanitione in moliri conuenit: in uetustioribus, ex
propinquo: siquidē ex multis corporis partibus sanguinē mit-
temus: frequētius aut ex interiori cubiti uena. Verū id cō-
siderandū uenit, interiori & alariæ dictæ uenæ, per totū, arteriā
subijci: mediæ neruū: superior quæ & humeraria dicitur, peri-
culi expers est. Ac in capitis morbis humerariā inci dimus. In
his qui infra ceruicē affligunt, alariā: media utrisq; conuenit.
Fascia igitur arcta partem aliquā circa brachij musculos deli-
gare oportet, & frictione manuū alternante, repletā uenā usui
cōmodā transfusim per totā ipsius latitudinē solam diuidere.
Etenim maiores hac plagæ, ægrè cicatricē admittunt. arctæ ni-
mium inflammationē experiuntur, præterquam q̃ crassioris
succī transitū impediunt. In quibus autem & secundo & tertio
die, interim uerò & quarto sanguinē detrahendū esse speramus,
obliquius uena secari debet, quò manus inflexu dehiscens non
pròtinus cicatrice obducatur, sic. n. uisum est Antyllo. At quā-
tum euacuabitur, ex uirū robore, & morbi magnitudine me-
tiemur. Si humoris copia subest, & materia efferuescit, una ui-
ce usq; dū anima deficiat extrahemus, uirtute uidelicet robu-
sta, sic aut ut æger nō ex humoris in uentriculū confluxu defi-
ciat: ob quod ē multi ante iustā uacuationē per initia statim
animo destituuntur: uerū eius deliquiū his uacuati humoris
ratione obuenire oportet. Iam uerò si magnā uacuationē res
postulet, uires aut sint inualidæ, distribuenda erit inanitio: ac
primū parcius detractō sanguine denuo idem auferetur: si res
exigat ē tertio. Cæterū uacuare solemus corpus uniuersum
non modo in plethorica affectione, ueluti & Galenus tradit,
sed ē propter affectus magnitudinē, quanquā totū corpus hu-
moribus uideas cōmoderatū, quemadmodū in sanguinis ex na-
ribus, aut alia parte profluuiō, quod nō copia excitauerit: ac
uacuare reuulsorio modo ex oppositis conuenit. Quinetiam
in ualida inflammatione idem faciendū est, sicut in colicis & re-
nibus calculosis, lippitudine, & ijs quæ tā præcipiti modo ur-
gent. Nā dolor & partis inflammata calor defluxioni præbent

occasionem, licet uniuersum corpus superfluitatibus careat. Quapropter parcius id tunc faciundū est, uacuatione adhibita, quæ potissimū laborantis ætati, & naturæ cōpetere uideatur: cōsideratio ēt anni tempore, loco, & ægrotantis cōsuetudine. Porro in quibus propè uenā quæ diuidetur magna quædā est inflammatio, quemadmodū in pleuriticis & iocinorosis, optimum est expectare, dū color sanguinis, & substantia mutetur. Diuersus autē est in inflāmatione sanguis, à naturali: quoniam largius incallescens, siquidē prius erat crudior, rubicundior, magisq; flauus euadit: si autē talis prius extiterit, in nigrū adustus mutatur. Nō tamen ex toto mutationē ipsius expectare consiliū est: sed ēt ante illam nōnunquam cessare cōuenit, idque duplici de causa, aut ob uiriū imbecillitatē, quas solui ex pulsum tactu cognosces: sunt. n. ipsi inæquales uehementia, & magnitudine, uel ēt languidi, & robur fluxionis inclinans imbecilles iam uires notat: ut propter inflammationis malignitatem: nonnunquā. n. nihil remittit, sed uehementer impacta. At si nihil horū obstiterit, ægerq; floridæ ætatis sit, expectanda est sanguinis mutatio, magisq; si ambiens aer temperatus fuerit. Si uerò sanguis ante iustam uacuationē fuerit suppressus, id autē accidit, aut propter timorē, & animi defectū, aut sanguinis grumū, aut uiolentā constrictionē, cōtra singula pugnabimus: Animā deficientem, odoratis naribus admotis resocillantes: cōstrictionē, uinculo remisso soluantes: in grumū coactū sanguinem, uel olei infusione, uel digitorū fotu dissoluentes. Reliqua sanguinis dimittendi præparatio nulli non cognita est: uerum hæc in cubiti uenis fieri solent. At ex fronte sanguis detrahet in capitis doloribus ita: capite fomentis adiuto, fascia ceruicē uinciemus, digitis super guttur interpositis, ne suffocatu ægri intereant: repleta iam uena in fronte, acie scalpelli diuidetur. Eodē modo etiā circa guttur extantes uenæ sphagitides appellatæ, ob uetustam lippitudinem aduersa scalpelli parte scinduntur, ita ut sanguis erūpat. Item uenas linguæ subditas, ueluti in anguis, transuersus incidimus, euitantes constrictionem. Nonnulli uero in maioribus oculorū angulis uenas eminētes, sicut in longis capitis, uel oculorū morbis similem in modum diuidunt. In quibus internas quoq; nariū uenas uel mucrone scalpelli cōtundentes, uel quibusdā asperis irritantes distrūpūt, item post aures sitas ob capitis affectus feriunt. Quæ uero po-
plitem

plitem perreptant, in renū cruciatibus aperiūtur. Quæ extremas corporis partes intercurrunt, superiacentibus uinculo exceptis & manū frictione, & pedū incessu repletæ diuidētur. in sinistra quidem manu, cum lien malè habet, uenam quæ inter parū & anularem digitū porrigitur, præcipuè incidemus. cum recur affigitur, in dextra. Nam extremarum partium inanitio è longinquo magis facta efficaciorē molitur reuulsionem: in pede, ueluti cum coxendicum dolores, aut uteri uicia urgent, eam quæ supra interiorem talum eminet, dissecābimus.

De cucurbitularum usu.

Cap. XLI.

Cucurbitulis neq; per affectuum initia, neq; cū corpora sunt plethorica, utemur: sed ijs prius euacuatis, cumq; nihil particulæ influit. Vfus eius est mouere aliquid, agitare, & foras extrahere. Leuis itaq; cucurbitula inflationes discutit, distillationes in stomachū suspendit, sanguinem attrahit, & profluentem rursus sistit, obiectis partibus admota: & quod alte conditum est, in summa rursus educit in totum humores traducit, spiritus euacuat. At quæ cum scarificatu adhibetur, efficaciorē causis perspiratū præbet, sensibiliter ex alto ea quæ nocent eliciens: quippe non modò sanguinem, sed alios quoq; humores uacuat, præsertim cum flamma ampliore adglutinata: uerū si à carnosis particulis detractionem moliri statuimus, primū cutis scalpello exasperanda, deinde cucurbitula imponenda est. Sin ex carnis magis pars fuerit, leuē prius cucurbitulam defigemus: ubi in tumorem particula eleuata sit, scarificatu adhibito, rursus ipsam accommodābimus: & si paululum uacuare cogitamus, unā diuisio abundè est: sin amplius, plures adhibentur. Item si tenuiorem qui continetur sanguinē acceperimus, summa scarificari, si crassiorem, alta debent: quando etiam concretionem ex ictu sanguinē educere animus est. Terminus autem moderatæ diuisionum altitudinis est, sola cutis crassitudo. Nonnulli instrumentum ad hoc excogitarunt tribus scalpellis æqualibus simul iunctis, ut unica insectione tres fierent plagæ: uerū hoc nos inutile purantes simplici scapello contenti sumus. Alii cucurbitulis usi sunt uitreis, ut sanguinis qui uacuatur mensura in extractione pellucescat: uerum æneæ cum maiorem sustineant flammam, multo sunt efficaciores uitreis, quæ faciliè dirumpuntur. Quinetiā

quæ ex cornibus, ore sugētes trahunt, minus quidem inaniūtō non autem siccant, quemadmodum quæ cum flamma si opus fuerit, adhibentur. Cæterum cum admoturi sumus cucurbitulam, particulæ in rectum figuratæ ex latere hanc defigemus. Si enim iacentibus ipsis super linamentū ex lucerna, simul cum flamma inducamus, in cutem decidens illa, grauitèr adurit, usū hoc non postulante. Est cum cucurbitulæ magnitudo subiectæ parti adæquabitur, eaq; de causâ permultū cucurbitulæ & paruitate & magnitudine differunt, quemadmodum etiam collo prolixiores & spatio inferiori latiores aliis efficacius extrahūt. Cauendum autem ne prope māmillas cucurbitula applicetur. nam illap̄sæ cucurbitulis nōnunquā manimæ & inturgescētes uehementer. haud faciliē ipsas relinquunt, atq; tunc spōgias ex calida cucurbitulis circumdare oportet, sic enim remittuntur: sin minus hoc modo fuerint laxatæ, perforari ipsas ratio est.

Quomodo alæ adurantur. Cap. XLII.

Humeri articulo luxato in nonnullis caput frequēter & continuē excidit, uel humiditatis superantis uitio, uel quod cōtinuæ luxationi opportunus locus euaserit, quando ad uisionē descendere oportet. Proinde ægro, aut supino, aut in sanum latus inclinato, interiorē alæ cutem quā potissimum articulus excidit, duobus sinistræ manus digitis, uel hamulis tenuibus & oblongis eleuatā, candenti ferro adurere oportet, quousq; ferramentum ex aduerso inflexum uno impressu duas crustas excitarit, & si magnū intercedens harū spatium fuerit, mucrone scalpelli per ipsas traiecto aliam in medio crustā faciemus, adurentes usq; dum ferramentum urens scalpello inciderit. Item alias duas Hippocrates iuxta utriusque dictæ mediā fieri cōsultat, æquali illis spatio distantes quadrangulæ figuræ modo. Altius autē cutē non penetrabimus, quæ nerui, glandulæ, ac aliæ particulæ quæ inflammationē difficultatemq; functionum, excitare possint, subiecta sint: curari uero adusta debent porro cū sale crito & imposito, tū aliis præstidiis ad crustas inscriptis, postea manu operandum cautè erit.

De adnatis digitis & sexto digito. Cap. XLIII.

Adnaſcuntur digiti in manu nunc propè maiores digitos, nunc propè exiguos, raro autē uisi sunt iuxta aliorum aliquem. Eorum uero qui adnaſcuntur, alii per totum

tum carnosum sunt, alii ossa in se continent, nonnunquam & ungues. Ossa habentium, hi ab articulo procedunt, cuius commissuram alteri digito communicant, alii ex naturalium digitorum fissura oriuntur: atque huiusmodi perpetuo sunt immobiles: reliqui mouentur nonnunquam. Carnosorum expedita est praesidio. nam scalpello quod superuacuum est in totum tollimus. Eorum qui ab articulo prodeunt, difficilior est tractatio illis qui à digitorum fissura originem traxerunt: primum caro orbiculatim usque ad os excinditur, ipsumque os excisum aut erasum, aufertur. Cæterum inter curandum radimus ipsa, & cicatrice obducimus quemadmodum etiam in ossium uulneribus declaratum est.

Quomodo purulentis adustio adhibenda.

Cap. XLIII.

VScio efficacissimum purulentis praesidium inuentum est. Conuenit igitur ferro candenti crustas excitare: una inter clauiculæ compagem cute sursum educta duas autem exiguas iuxta mentum, sic ut ab arterijs quæ carotides appellantur, recedatur. Duas item sub mammillis ampliores inter tertiam quartamque costam, alias duas inter quintam & sextam paulum in posteriora spectantes: aliam, per medium pectus: rursus aliam supra os uentriculi, tres posterius: per medium dorsum unam, utroque spinæ latere duas, quæ in dorso facta crustam excedant non admodum extantes. Alii, ut tradit etiam Leonides, ferro mucronato candenti per medium costæ spatium ubi abscessus est, adacto, usque ad pus uestionem moliri sunt. Nonnulli etiam hos curare ausi sunt, transuersa linea inter quintam & sextam costam ducta, & cute paululum oblique diuisa, deinde sic scalpello membrana quæ costas succingit perforata, pus excreuerunt. Atque hi cum illis qui ferro usque ad imum adurant, aut statim mortem inferunt, uitali spiritu confertim una cum pure euacuato, aut fistulas reddunt insanabiles.

De cancro.

Cap. XLV.

Cancer, tumor est inæqualis, oris prætumidis, aspectu teter, liuidus, & indolens, interim sine ulcere, quæ Hippocrates latentem nominauit: is si curerur, peior euadit: interim exulceratus: nam cum ex atra bile ducat originem, magna parte eroditur. Pluribus quidem corporis partibus accidit,

cidit, præcipuè fœminarum locis, & mammis, quæ uenas undiquaq; turgidas habent, quemadmodum cancer animal pedes, unde etiam nomen sortitus est. Quæ igitur per medicamentâ curatio adhibetur, quarto uolumine abundè explicata est: eius autem cancri qui uuluum infestat, tertio. Quoniam uero partes putrefactæ, aut quæ (ut simpliciter dicam) naturæ modum excefferunt, ablationem sui postulant: cancris autè uuluz manus opera nec potest, nec utile est admoueri: eorum qui exteriora infestant, præcipuè mammas curandi administrationē trademus. Quidam enim totam partem uiciatam ferramētis candentibus absumunt: alij totam mammam præcisam adurunt. Galenus solam administrationem quæ per sectionem fit, recipiens, hoc modo scribit. Si quando cancrum scalpello curare audebis, incepisse uacuationem à melancholici humoris purgatione oportebit, ubi iam totum quod uiciatum est exactè præcideris, sic ut nulla radix superfit, sanguinem effluere finito, nec celerius eum cohibebis, uerum etiam premèdo uicinas uenas, crassiorē ex ipsis sanguinem exprimes: deinde aliorum ulcerū modo curabis. Hæc quidē Galenus memoriæ prodidit Reliqua uero maligna putridaq; ulcera nempe phagedænas, gangrænas & cōsimilia eodem tractare modo debes.

De ijs quibus mamma fœminarum modo inturgescunt. Cap. XLVI.

Quemadmodum fœminis, ita masculis quoq; pubertatis tempore, māmillæ modicè inflantur, sed plerisq; rursus subsidunt, in nōnullis sumpto initio crescent pinguedine subnascente. Cū itaq; indecora hæc corporis figura muliebris habitudinis notam repræsentet, digna est cui manus admoveatur. Lunata per imam māmillæ partem linea ducitur cute detracta: ademptaq; pinguedine, futuris cōmittetur. At si fortè māmilla partibus ipsius ob magnitudinē adimā, ut in mulieribus, inclinauerit, lunatas duas plagas in extremis inuicem cœuentes inferemus, ut minor à maiore cōprehendatur. Cute quæ intercedit cum pinguedine adempta, similiter futuris utemur. At si aberrantes minus exciderimus, tunc eo quod superest rursus adempto, futuras iniiciemus, & medicamentum cruentis idoneum accommodabimus.

Quomodo

Quomodo iecur aduratur. Cap. XLVII.

SI dolor cum grauitate iis oboariatur quibus iecur uomicæ laborat, carnea ipsa substantia uitata ostenditur. Si acutus dolor magis urgeat, puris in tunica collectio: adurere hoc modo oportet: ferrum candens mucrone tenui, paulò supra inguen quæ iecur desinit, iniicitur, ut crustam unam excitet: Vbi uero totam cutem adusserit, & usq; ad tunicam penetrauerit, pus excerneretur. Ab euacuatione phacomelite, hoc est, lenticula melle addito utemur, tum ijs quæ mulsæ & speciebus ad carnem creandam componuntur: postea uero etiam cicatricem ducentibus.

Quomodo lien aduratur. Cap. XLVIII.

CVis quæ lieni incumbit, hamo eleuata, oblongo ferro candenti per totum ipsa aduretur, ut unico impressu duæ fiant crustæ idq; faciemus ter, quò omnes crustas numero sex habeas Marcellus autem tridente quam trienam Græci dicunt, aut tridenti simili ferramento utens, uno adactu crustas excitauit.

*Quomodo Stomachus aduratur.**Cap. XLIX.*

IN longis stomachi defluxionibus, recetiores usi sunt adustione. Alii ferramentis candentibus mucronatis tres crustas moliuntur, unam iuxta cartilaginem quæ ab ensis figura Græcis uocatur xiphocides: alias duas inferius trianguli figura, altas ut cutem diuidant: Alii unam duntaxat adhibent, ampliolem supra ipsum os uentriculi. Sunt, qui ne ferro quidem urant, sed iscis appellatis: sunt autem hæ spongiosa quædam corpora in quercubus & corylis nascentia, barbaris magis usitata. permittunt autem uulnera sine cicatrice diu manere, imò etiam magis adhuc diuidunt, ut maiore per ipsa diffatu os uentriculi ab influxionibus immune permaneat.

Quomodo aqua hydropicis emittatur. Cap. L.

Quomodo aqua intercus contrahatur, quot sint ipsius differentia, quæ causa, quæ notæ, quodq; remedium, tertio uolumine sumus executi: ubi & demonstratum est, illud solum aquæ inter cutem genus quo ueluti in utrum aqua

aqua colligitur, asciten dicunt, manus operam postulare. Atq; eam hoc loco explicabimus. Itaq; rectus homo statuitur, sin minus, in sedili collocatur: si ne hoc quidem fieri potest, attingi non debet, cum adeò sit inualidus. Stante recto homine ministris retro assistentibus, iubebimus ut tumorem ad pubem digitis premat, depellatq;. Nos aculeo, aut scalpello quo uena inciditur, si ex partibus iuxta intestina sitis originem cōtraxerit. directè sub umbilico tribus digitis interpositis imum abdomen usq; tenuem membranam quæ peritonæos uocatur, diuidemus. Sin autem primario iecoris affectui malum fertur acceptum, à sinistro umbilici parte dissecabimus. si à liene uitium trahit originem, in dextra non enim in illa parte sectionem moliemur, in quam decumbent. Ac cute quæ superiacet acie instrumenti excoriata, membranam quæ sinit abdomen, peritonæos uocatur, diuidemus, quousque scalpellum ad uacuam usq; regionem penetrauerit. Deinde per foramen abdominis, & peritonæi, æneam fistulam scriptoriis calamis acie similem demitemus, & per hanc humor effundendus est pro cuiusque uitium ratione, quam ex pulsus tactu deprehendemus. Deinde exempta fistula, humor sisti debet, sistetur autem statim cum diuisio ipsa alternatim sit facta. At nos securitatis gratia linamentum tortile per solam abdominis diuisionem dimittimus, ægro recumbente recreatoque, per insequentem diem rursus momentum humoris quantum uirtus exigit fistula euacuabimus, atq; ita deinceps faciundū est, quousq; minimum humoris superfit, ira tamen, ut ubique subitam cumulatamq; uacuationem uitemus, multis siquidem imperitè manum admoliti una cum humore uitali etiam spiritu uacuato subito hominem iugularunt: qui uero securius rem agunt, modico humore educto, ut uirtus magno leuaretur pondere, reliquum medicamentis aquam ducentibus arena, solè, siti, & cibis desiccantibus consumpserunt. Iam uero uestione super stomachum, iecur, lienem, imum uentrem & umbilicum usi sunt, quinque crustas adhibentes. Alii ferro tenui candenti: alii iscis nuncupatis, aut aliquo ex alia huiusmodi materia, & pleriq; hac curandi ratione magis consauerunt, interim nullam in rotum compunctionem (quam paracentesin uocant) experti.

De umbi-

De umbilico prominente.

Cap. LI.

Vmbilicus indecorè prominere solet, quod uitiū Græcè exomphalon dicitur, interim mēbrana quæ abdomen finit, peritonæum appellauī, illic dirupta, ac procidente, aut omento, aut intestino, interim colluue otiosi humoris sub umbilico contracta, interim uero carne subnata, aliquando sanguine irrumpente, propter uenæ, aut arteriæ rupturam, ut in aneurysmatis, interdū non sanguine, uerū spiritū solū irruente. Si igitur momentū prociderit, circa umbilicū tumor cōcolor, mollis tactu, indolens & inæqualis apparet. Si intestinum prolapsū est, præter compressis memorata, etiam inæqualis magis tumor est, & digitis impressis cedit, euanescitq; nonnūquam strepitū elidens, balneis, & distentionibus magis increfcit. At si humor collectus est, mollis similiter tumor apparet: pressus autem non cedit, neq; decrefcit, neq; tamen augetur. Quod si autem accedat superioribus signis, ut tumor sit liuidior, carneq; subnata durior, etiam tactui renitetur, & eadē in magnitudine manet. Si ex inflatione eminet, tumor mollis ad tactum subsequetur, qui digitorum impulsu sonum quendam reddit, & pressus aboletur. Hunc in modum curabitur: erecto homini iubemus ut spiritum contineat, quod in omnē partem distendatur: deinde omnem umbilici excrefcenciā orbiculatim atramēto scriptorio norabimus, resupinatoq; homine scalpello tumorē, quā nota atramenti est exasperabimus: deinde medium hamo eleuatum, lino aut neruo quā exasperatio, est circum astringemus (hoc enim pacto continebitur ne deuoluatur) ansulam supra deligaturam ponentes, postea tumore quē contrinximus iuxta uerticem ad apertū digitorū indicem demitemus, tentabimusq; diligenter num intestini implexus, aut pars omenti simul fuerit constricta. Ac si quidē intestinum fuerit relictū laxata funiculi ansula, id introrsum pellemus: si uero omentum sit, eo retracto, quod superuacū est amputabimus, uase quod (ut uerisimile est) coincidit, lino deligato: mox accipientes duas acus simplex linum ducentes, iuxta hiatū per incisionem cutis factam traiectamus, & ansulis linorū præcisīs, quemadmodū in aneurysmate dictū est, ex quatuor initiis constrictionem moliemur. Vbi corpora lino deuincta computruerint exciderintq;, medicamentis in linteola illicitis curatio obsoletur,

soluetur, si cauiam magis cicatricē fieri semper cupiamus. Hæc quidē ad momenti, aut intestini affectum pertinent. At si caro aut humor, aut sanguis uitū creatit, tumoris medio circulatim præciso. deinde eo quod incumbit extra peritonæū, sublato, curationem carni generandæ dicatā tentabimus. Porro si umbilicus emineat, aut ex uasorum dilatatione, aut spiritu intercluso, attingi non debet, quemadmodum etiam aneurysmata .

De peritonæo, hoc est, interiore abdominis membrana conuulnerata item de intestini, aut omenti procidentia. ubi etiam tractatur, quomodo uentris uulnera scarantur ex commentarijs Galeni. Cap. LII.

Quomodo peritonæi, hoc est, interioris abdominis membranæ uulnera optimè quæas manu curare, deinceps uenit considerandū. Si igitur paruū adeo uulnus extiterit ut inflatum iam quod procidit intestinum remittere non liceat: necessarium est, aut flatū elicere, aut uulnus ampliare. Satiùs autem fuerit meo iudicio quod prius dixi agere, si modo id consequi possis. At qua magis ratione id consequare, quàm si causam unde intestinū inflatur, è medio sustuleris? Quæ igitur ea est, nimirum, ambientis nos aeris refrigeratio: quare etiam remedium ex calore petetur. Itaq; spongia molli aqua calida madenti, mox expressa calefacere intestinum oportet. Præparetur autem interea uinum austerū calidum etenim hoc magis quàm aqua calefacit, ac robur intestino adijcit. At si per hæc intestini inflatio non cesserit, tanta peritonæi pars incidi debet, quanta id quod excidit, opus habet. Idonea uero ad eiusmodi sectionē habentur scalpella recta quæ Græci syringotoma uocant, id est, quæ ad fistulas incidendas sunt accommodatæ. Figura autē laboranti apposita fuerit, cum in inferiori parte uulnus factum est, si sursum uergat: cum in superioribus, si deorsum, & si in dextris uulnus sit, in contrariā partem corpus incumbet, si in sinistris, in dextram, atq; hoc tum magnis, tum exiguis uulneribus commune est. Cæterū cum intestina in proprium reponi locum debent, ex magno uulnere collapsa ministro dextro opus est: oportet n. ipsum, ubi manibus suis totum uulnus à foris apprehenderit, intro repellere, constringere ac exiguū semper suenti denudare: quinetiam id quod consutum est, mediocriter

diocriter comprimere, quoad totum exactè persuatur. Porro quæ idonea suendi abdominis ratio existat, deinceps dicamus. Quoniam coire abdomen cum peritonæo conueniet, incipiendum quidem à cute est, atq; ab externo introrsus acus demittitur: ubi iam & cutem, & rectum musculum totum transierit, præterito quod ei adiacet peritonæo, per reliquam huius partem eam ab interno extrorsum, atq; inde per reliquum abdomen traiectabis: ubi hoc penitus pertransierit, rursus ab externo introrsum, idem abdomen perforandum est: mox ubi peritonæum quod illi quoq; adiacet præterieris, & ad oppositum perueneris, id quoq; ab interno extrorsum perpungi, unaq; eū eo totum ipsi cohærens abdomen debet. Deinde ab hoc rursus incipiendum, atq; id cum opposito peritonæo consuendum. Ac rursus uicina etiam cute traiecta, iterum ab ea parte acus introrsum est injicienda, consuendumq; id cum opposito peritonæo, inibi quoq; uicina cute transmissa: atq; hæc iterum iterumque facienda sunt, quoad totum uulnus similiter consueuerimus. Interuallum uero suturarum quod ad compescenda ea quæ subsunt, pertinet, breuissimum esse postulat. Quod autem ad firmitatem requiritur, inter suturas cutis ne alibi rumpatur, utiliter breue non est. quare uitato utriusq; excessu, eligenda mediocritas est. Iam hoc quoq; omnium ulcerum commune quodammodo est, sicuti etiam ipsius quo fiuntur, fili ratio. Quod enim durius est, cutem rumpet: quod mollius, confestim ipsum rumpitur. pari modo si proximè oras summas acū transegerit, quod reliquum est cutis, quoniam minimum est, dum uolenter adducitur, rumpi cogitur. Sin plurimum ab iis recesseris, non parum cutis inglutinatum relinquetur. Hæc licet omnium sint ulcerum communia, maximè tamen seruanda in abdomine suendo arbitror. Porro ipsum abdomen, aut quemadmodum est expositum; consuetur, huc diligentia adhibita, ut peritonæum abdomini coalescere possit: quod uix sperare audeas, cum nervosum existat: aut sicuti quidā facit, qui quæ cognatæ naturæ sunt, ea committunt, utpote peritonæū peritonæo, abdomen abdomini. Id autem fiet in eum modum. A uicino nobis abdomine incipitur, atq; ab externo introrsum per id solum acus traiectatur. post præteritis utriusque peritonæi labris, ex obiecta parte à foris introrsum per utrumq; eius labrum acus reuocatur: dein hæc rursus reducitur, atq; ab interioribus

rioribus foras per aduersum abdomen transmittitur. Hic modus à communi, & ex prompto, quo nimirum uno adactu per quatuor labra acus traicitur, id differt, quòd peritonæum totū intra abdomen prorsus recondit. Cæterum medicamenta ad hæc idonea materiæ illius esse debent, cuius sunt ea quæ cruentis iniiciuntur. Vt autem nulla pars principalior confortij lege doleat, lanam conuenit mollem oleo mediocriter calido imbutam toti, quod inter inguina & axillas est, circumdare. Præstiterit autem si per clysterem intestinis aliud simile infundas. Si uero nonnihil in ipsis quoq; intestinis conuulneratum sit: quod iniicietur, uinum nigrum, austerū & tepens erit, eoque magis si totum usque ad anteriorem meatū pertusum sit. Facile igitur curationem recipiunt intestina crassa: secus habent tenuia: ieiunum uero omnibus insanabile est, tum propter uasorum magnitudinem multitudinemq;, tum quòd tunica eius prætenuis nervosaq; existat. accedit huc quod etiam bilem synceram totam recipiat: adde quòd omnium maximè iecori uicinum habeatur. Ventriculi porro imę partes carnosæ ulceratæ curati cum fiducia debent, siquidem fieri potest ut res bene succedat, non solum quòd hæ crassiores sint, sed etiā quòd sedes medicamentis quæ illas curabunt, adhibendis in eo loco est accommoda. At ulcerum quæ os & gulam infestant, solo transitu medicamenta attingunt: quæ autem orificium ipsius obsident, ij sensus quoq; in illo acutus sanationi aduersatur. Cū autē peritonæo rupto omentum prolapsum aut liuescat aut nigruerit, fune exceptum antequā nigrescat, ne sanguis profundatur, præcidere conuenit id quod post uinculum habetur, atq; ut in extremo inferiori iam cōmemoratæ abdominis futuræ uinculi fines pendeant, curabimus, quo scilicet facile eos cum ex uulnere suppurante eructentur, eximamus.

Ad tegendam glandem colis si nuda est. Cap. LIII.

IN quibus glans colis penuria cutis non contegitur, aliqui indecori gratia duplicem administrationis modū excogitarunt, nunc in superiore colis initio cutem orbiculatim secantes, ut facto ipsius diuortio, inferior cutis attrahatur, donec glans occultetur: nunc subtus interiorem cutem à glandis radice scalpello excoriantes, inde inferiorem trahentes, mox linteo quodam molli ambiens præputium deligantes, ita ut lintecolum

teolum aliquod quâ cuti excoiata est, interponatur, ne præputium cum glande coalescat. Hunc modum Antyllus magis recipit, longiore ipsum oratione exponens. Nos autem summatim dixisse contenti sumus, quoniam raro inter artis opera huiusmodi administratio requiritur, tum quod affectus nullâ minus obeundis difficultatem pariat, tum quod neque tantum indecori afferat, ut hac magis inquisitionem aliquam ex chirurgia deligas.

Quomodo glans penis contacta aperiri possit, vitium dicitur hypospadiæon. Cap. LIIII.

Plerisque glans ab origine non perforata est: uerum sub carne appellato quâ glans suspensa est, foramen habetur: unde neque urinam facere antèius possunt, nisi particulam uersus imam uentris regionem, admodum inclinent, neque liberis dare operam, cum semen ipsorum in uterum rectâ non possit eiaculari. Omnium itaque simplicissimus tutissimusque curatio- nis modus est qui fit per præcisionem. Itaque resupinato homi- ne glans sinistrae manus digitis ualidè attolletur: deinde scal- pelli acie ipsâ iuxta coronam præcidetur, plaga non obliqua, sed sculpturae simili, ut per medium eminentia quædam glandem repræsentans appareat. Quoniam uerò sæpe sanguis pro- fundi solet, si fieri potest medicamenti ei retinendo dicatis si- stemus, sin minus, tenuibus ferramentis aduremus.

De phymo.

Cap. LV.

Dvplex phymi causa est: aliquando enim sic glandem præputium tegit ne nudari possit: aliquando retrorsum deducta reduci non potest. Hæc species propriè periphymosis dicitur. Prior itaque differentia, aut ex cicatrice quæ in præputio concreuerit, aut ex carnis incremento quæ illic coa- luerit. Altera genitalium inflammationibus fertur accepta, quo- ties abducta cuti retrorsum glans intumuerit, nec ultra præpu- tium receperit. Si igitur prima phymi causa fuerit, curatione hoc pacto tentabimus: figurato homine, ut par est, præputium in anteriorem partem attrahemus, demissisque in summum ip- sum hamulis tribus, quaternisve, ministris continendum exhi- bebimus, iubentes, ipsum quantum fieri potest, diducant ape- riantque; deinde si ex cicatrice exterior collectio fuerit creata, scalpello ab interiore parte præputium in tribus quatuorve lo-

PAVLI AEGIN.

C. cis

cis incidemus lineis directis & æquali inuicem spatio distantibus, idq; intrinsecus: est autem duplex in glande præputium: os igitur ipsius ab interiori parte diuidemus, sic. n. contractione quæ ex cicatrice coaluit, dissoluta, præputium superinducemus. At si caro ab interioribus adnata phymum produxerit, carne tota ferro scarificata, præputium abstrahemus: carnem inter lineas eminentem rademus, postea plumbeum canalem glandi uniuersæ circundabimus, inuoluta ipsi papyro sicca. Ha beat autem canalis foramen undiq; æquale. sic enim huius circumpositu præputium adductum rursus coalescere prohibebitur, dum & à plumbo & papyro inuoluta distentium seruatur: intumescens enim ex deligatura magis adhuc cutem diducet. Hoc igitur faciendū est, siue ob cicatricē, siue carnis excrescentiam phymo generato manū adhibuerimus Sin autē periphymosis appellata creetur, uetustate temporis coalescit, & curationem non recipit, nisi quis eo modo uelit tractare quem ad tegendam glandem usurpamus Sin autē nondum coaluerit, uibicibus super ipsum rectis tribus, aut quatuor, aut etiam pluribus circularim excitatis, oleo copiosiore tepido superfuso, extrorsum attrahemus.

Si præputium glandi adhærescit. Cap. LVI.

GLans & præputium inuicem committuntur exulceratione præcedente. Conuenit igitur subtus cute, quantum licet, excoriata, acie scalpelli, aut spatula polypo accommodata, ea quæ resistunt dissoluere, id potissimum conantes, ut glandē purē à præputio adhærescente discernamus: quod si non fuerit expeditum, glandis potius nōnihil ad præputium assumere, quàm e contrario: cum enim præputium tenue sit, facile perforatur. Vbi commissurā dissolueris linteū tenue aqua frigida madens, glandi & præputio interponendum, ne rursus coalescant, uino astringente cicatricem ipsis obducemus.

De cir cuncisis. Cap. LVII.

NON de ijs qui religioso gentium more circuncidūtur, nunc uerba faciemus: sed de ijs quibus affectu naturalium oborto, præputium nigrescit. Itaq; in ijs totum quod nigruerit, orbiculatim præcidi debet, deinde squama cū melle utendū, uel etiam malicorio, & eruo medicamenti instar quod linteolis illinitur. Si uerò sanguis quandoq; profluat, ser

ramentis

ramentis lunatis candētibz utendū, quæ utriq; simul inijcian-
tur, & ipsi sanguinis profluuiο, & uulneri depascenti. At si tota
interim glans absumpta fuerit, exiguū ē plumbo canaliculū im-
ponētes meatui, per ipsum ægroto urinā reddere iubebimus.

De thymis naturalium.

Cap. LVIII.

Thymi carnosa sunt tubercula, nunc in glande, nunc in
præputio prouenientia. Ex his, alij maligni, alij nō sunt.
Mitiores itaq; scalpelli acie deradere conuenit, & chal-
citidem ipsis inspergere: in malignis, eo quod uitiatum est, exci-
so, adustione utendum. At si ex opposito aduersoq; sibi inui-
cem in præputio fiant thymi, hi, intra ipsum, illi, extra, nō opor-
tet omnibus ipsis confestim manum admoliri, ne præputium
structura tenue, imprudenter pertundamus. Sed primū interio-
res auferre consiliū est, ijsq; cicatrice obductis, tunc quoq; ex-
teriores aggredi. Nonnulli uerō recentiorū forfice ipsos auel-
lentes equino pilo deligatos, curare solent, quemadmodum
alii refrigerato ferro candenti eisdem deurunt.

De catheterismo, & clystere uesicæ. Cap. LIX.

Cum urina non redditur, quod iter ipsius obstructum sit
aut concreto intus sanguine, aut calculo, aut alia qua-
dam causā, catheterismo id quod superfluum est exi-
memus. Sumpto igitur cathetere, ærati & sexui conuenienti,
probe ipsum dirigemus, quod hoc modo fiet: lana exigua lino
deligata per mediū, linoq; ex acuto iunco per catheteris fistu-
lam traducto lanam foramini adaptabimus, quod iuxta cathe-
teris mucronē est, ac forfice præciso eo quod ex lana eminet,
catheterē in oleū demitemus, ægro in subscelliū collocato, &
fomentis si nihil prohibet, irrorato: catheterē in rectū infere-
mus usq; ad colis basim: deinde naturalia ad umbilicum incli-
nabimus, etenim ab hac parte obliquus uesicæ meatus existit,
deinde sic cathetera adigemus. Quum uerō iuxta regionē in-
ter scrotum, & anum, propè sedē fuerit, rursus genitalia im-
posito instrumento deflectemus, in naturalem reducentes figu-
ram. nam à peritonæo uesicæ meatus sursum tendit, propelle-
musq; catheterē usq; dum uesicæ sinum penetrauerit: secundū
hoc, linū catheteri iniectū retrahemus, quod urina simul cum la-
na attracta subsequatur, quemadmodū in syphonibus accidit:
atque talis demittendi catheteris modus est. At quia subinde

exulcerata uesica collui desiderat, siquidē auricularij clysteres, id quod iniiciendū est possint trāsmittere, illis in prædictū modum utemur, in uesicā demissis: si fieri nequit, catheteri pelle, aut uesica bubula adaptata, eoq; indito, uesicam colluemus.

Quæ curatio calculosis adhibeatur. Cap. LX.

CVM alibi demonstratū sit qua ex causa calculi generentur, tum, quòd pueris in uesica magis: prouectioribus, in renibus crescant, nunc rationē exponemus, qua excindi possint, ubi notas prius eorum qui uesica habentur, designauerimus. Vrina igitur aquosa est, quòd in eis subsidet, arenosum: pundendū cōtinuo uexatur pruritu, laxatur sine ratione, rursusq; arrigitur, crebro id contrectant irritati ægri, & maxime pueri cum calculus in ceruicē uesicæ incidit, etiā repente urina supprimitur. Porro inter eos quibus calculus excinditur, pueri quidē usq; ad quatuordecim annos propter corporū molitudinē, facile curationē recipiunt: senes, quòd corpus ipsorū contumax sit, uix consanescūt: mediæ horū ætates etiā in hoc, medio quodā modo habēt ac rursus facile sanantur qui maiores calculos habēt, quòd inflammationibus assuerunt: qui minores, difficulter sanantur, contrarias ob causas. Hæc cū ita se habeant, ad chirurgiam profecti, cōcussione utemur prius, interrim per famulos, interim ipso ægroto ex alto quodā loco desiliēti, quò calculus ad uesicæ ceruicē propellatu, deinde figuri æger debet, ceu rectus in sedili, manibus subter femora porrectis, quò in angustū uesica compellatur. Si igitur cōtingenti bus nobis calculus in regionē scroti & ani intermediam procidat concussione exturbatus, inde ad sectionem conuertemur. Sin minus occurrat, indicē sinistrae manus digitū, si puer sit qui ægroat, uel etiā mediū, si ætatis sit prouectioris, oleo perunctum, in anū demitemus, & supinis digitis perquirentes, calculumq; occurrentē paulatim traducētes, in uesicæ ceruicē coarctabimus: & digito uno, pluribusq; propellētes ipsum in exteriora, impactū, ministro altero manibus uesicā premere iussu, alteri præcipiemus dextra manu testiculos sursum teneat, sinistra regionē inter scrotū & anū mediā extēdat in alterā partē, ab ea qua sectionē moliemur: ipsi assumpto scalpello ad calculos aptato, inter anū & testiculos, non per mediū locū inter scrotū & anum, sed in alterā partem iuxta sinisteriorem clunem obliquam

obliquam super lapidē qui subijcitur incidēdis, ducemus lineā, quæ extrinsecus latū habeat spatiū, intus nō amplius, quā ut calculus per id queat excidere. Interim siquidem digitis super anū innixis, aut digito una cū sectione sine euulsione calculus leniter exilit. sin minus exilierit, unco huic rei accōmodo iniecto eximemus. Calculo iam ablato, medicamētis sanguinem coercentibus ex fuligine thuris, aloē, symphito, uel ēt misy, & cōsimilibus sanguinis profusione sistētes, lanas, aut linamenta implicita, uino & oleo madentia imponemus, & ligaminibus sex processuū ad calculos accōmodatis utemur. At si profluuij sanguinis metus, sit linamentū implicitū ex posca, aut rosaceo aqua admixta iniiciendū est, & ægro decūbente crebrius locū perfundemus. Postquā tertio die solueris, & hydrelæo copioso irroraueris, tetrapharmaco linteolis illinito utendū, ita ut frequētius ipsos soluas, curesq; propter urinæ acrimoniā. At si inflammatio quæpiā superuenerit, cataplasmatibus & superfusionibus ad eā inscriptis adiuuabimus, ac in uesicā rosaceū, aut chamæmelinū, aut butyrū nisi aliqua nos inflāmatio impediāt, demitemus similiter ēt si ulcus pascendo, aut alio quodā modo serpat, aut maleficū fuerit, singulis cōgruētia adaptabimus, cū ulcus inflāmatione caret, lauacrū adhibetur, inde emplastrum diachylon, tū lumbis tū imo uentri super accommodatur. Per totū uero curationis curriculū, femora inter se cōuenit deligare, & cū remediis requiescere. Sin exiguus calculus coli incidērit & per urinā reddi nequeat, præputium ualidē in anteriora attractū deligabimus iuxta glandis summitatē, itē posteriore parte pudēdi colē uinciēmus, iuxta terminū ad uesicā spectantem cōstrictione adhibita: deinde infra colē diuidemus, super lapidē ipsum qui excidendis subijcitur, flexo autē cole calculū eiiciēmus, solutisq; uinculis ulcus sanguine concreto uacuabimus. Posterius itaq; uinculum iniectum est, ne calculus retrorsum recurat: antēius, ne post calculum exemptum præputij soluti cutis in oppositum recurrens diuisionem contegat.

De testiculorum partibus. Cap. LXI.

PArticularū quæ circa testes habētur, finitiones cū ad rami cum incidendorū doctrinā cōferant prius describemus, q̄ ad illā ueniamus. Igitur testiculus substantia quædam est glandulosa, fragilis, ad genitricem seminis effecta. At nervi testium,

stium, quos Græci paraftatas & cremasteras ab eo appellât, q̃ ex illis genitales partes depēdent, spinalis medullæ ex cerebri mēbrana propagines sunt, cū uenis arteriosis ad testiculos pertinentes, per quos semen in naturalia permeat. Seminaria aut̃ uasâ, uenæ sunt à caua uena in testiculos sinuosis anfractibus pertingentes, unde testiculi alimentū capiunt. irē tunica erythroïdes naturæ neruosa, in gibba quidē parte, atq; anteriori, à testiculo libera est: in cōcaua & posteriore, ipsi adhærescit, ex peritonæo originē trahēs. Vocât aut̃ partē hanc qua testiculo adnata est, posteriōrē prosphyſin, quasi dicas adnexū Darti uero mēbranæ sunt, quæ exteriorē testiculū cōglutinât, iuxta tunicâ erythroïdē dictam ei adhærentes: quibus partibus & illa post testiculos tunica adunitur. Hæc autē ipsa cutis exterior rugosa testibus circumdata, scrotum nobis Græcis oscheon dī.

De aquoso ramice, hydrocele dicitur. Cap. LXII.

Hvmoris ociosi in particulis scrotū implicantibus colluuius, tumorē excitās sensibilē, hoc nomē sortita est. Itaque humor magna ex parte, in tunica erythroïde appellata, testiculū ambiente, in partē anteriōrē colligitur, qua potissimū mēbrana illa à testiculo separât. Raro extra mēbranâ hanc erythroïdē uitii cōtrahitur. Subinde peculiari tunica humor cōprehenditur: uocantq; hoc malū chirurgici in superadnata ortū. Quare si ob causam præcedentē, exēpli gratia, particularū imbecillitatē uitii oboriat, sanguis alimēti ratione adductus, in aquosam serosamue, & inuile substantiam mutatur: si ex ictu, sanguinea, aut sæculenta substantia cōprehenditur. Cōis igitur nota est, tumor indolens, firmus, ac stabilis in scroto, quacunq; tandē occasione nō euanesceus, sed in iis qui modicū cōtinent humorē, cedēs: in illis qui copiosum habēt, nō item. Ac quibus in erythroïde tunica humor cōprehensus est, tumor rotūdus paululū, & oui modo lōgiusculus apparet. His testiculus in cōspectū nō uenit, ut qui undiquaq; sit implicitus. Sin aut̃ extra erythroïdē mēbranâ sub dartis habeatur, propter paucitatē particularū occurrit. At si humor in mēbrana superadnata coierit propter cōtractionē ex omni parte, & ro tunditatē, tumor alterius testiculi imaginē exhibet: & cum a quosus humor extitrit, tumor cōcolor pellucet: cum autem sæculentus fuerit, aut sanguineus, aut rubicūdus, aut liuidus apparet.

paret. At cū in utraq; scroti parte hæ noræ apparuerint, duplicem ibi ramicē esse cogno sces. hoc modo scalpello curantur: derafa pube & scroto, nisi puer fuerit, ægrū super sedile resupinabimus, podici panniculo multiplici subiecto, scroto aut spōgia iustæ magni udinis, ac sedētes à sinistra ægrotātis, ministri qui ad dextrā sedebit, iubebimus ut genitale in alterā partem protendat, & cutē scroti ad abdomen eleuet, nos scalpello scrotum à medio iuxta lōgitudinē usq; ad pubē ferē recta linea incidemus, quæ uicina sit lineæ scrotū per mediū secanti, diuidemusq; tūc tunicā etythroidem. Porro si humor in adnata membrana hæreat, quā uertex eiisdē tunicæ eminet, illac diuisionem moliemur. Hamulo aut oræ uulneris diducētur, & cultro ad hydrocelicos aptato scalpelloq; dartos detegemus, crudata uero erythroidis, scalpello quo uenæ incidi solent, mediam ipsam diuidemus, per illas potissimū partes, in quibus à testiculo recedit. Humore iam toto, aut maiore ipsius portione in uase aliquo excreto, erythroidē membranā hamulis eximemus, quā fieri licet tenuissimā ipsius partē. Inde uerò Antylus suturis & medicina cruētis accōmodata utitur: recētiore ea, quæ q̄ carnē inducat, sarcotice appellatur. At si testiculus putredinē expertus aliōue modo uitiatu deprehendatur, uasa cū neruo, qui ab inguinibus dependet, cremastere dicto, fune excipiemus, ipsoq; cremastere præciso, testiculus eximetur. Itē in ijs qui duplici laborant ramice, similiter bifariā curationē moliemur, utrinq; per scroti partes ad inguina lineas incidentes. mox specilli mucrone per diuisionē deorsum ad scroti extremum demisso, ipsoq; scrotū attollentes, acuto scalpro lineam qua humoris est emissariū, incidemus, ut & sanguinem cōcretū & pus per eam excernamus, ipso uerò scalpelli mucrone linamentū in longitudinē implicitū superiori diuisioni inferemus, & uibicibus per spongiā deterfis lanā oleo madentē per sectionem infra ad testiculū, insinuabimus, extrinsecus alias lanas uino & oleo imbutas scroto, imo uentri, inguinibus, regioni inter scrotū & anū & lumbis superinijciebus, ac ubi linamentum triplex super hæc implicitū deligauerimus uinculo in sex processus expotrecto, congruisq; fasciis, homo decūbet lanis scroto subiectis, ut cōquiescat, pelleq; super ipsas molli explicata, quo fomenta excipiantur. Superfundemus autem oleo calente, usq; ad triduum. post hoc ubi solueris, tetrapharmaco lin-

reolis illito in uulnere,uteris,linamentum in longitudinē implicitum ex farinaceo polline superaccōmodans , extrinsecus fomenta rursus propter inflammationē usq; ad diē septimum injicientur: inde medicamēto quod linteolo seruetur utemur. Vulnere expurgato,& catne iam mediocri obducta , deinceps etiā lauacris adhibitis linamentū in longitudinē implicitū au ferri debet,& reliqua curationis parte subsequente, quēadmodum prius explicatū est,utemur. At si inflammatio quæpiā fuerit,aut sanguinis profluuiū,aut aliquid eiusmodi interea supervenerit,cōuenienter unicuiq; occurrere cōuenit , ne semel dicta iterū repetā. Si uero uisionē potius in aquoso ramice, sicut recentioribus uisum est,adhibeamus , omnia quæ ante chirurgiam,& post eā dicta sunt, exequemur , ipsum uero chirurgiæ opus sine ferro tantū & diuisione per humoris emissariū fieri debet. Decem itaq; aut duodecim ferramētis literā græcorum Γ imitātibus,& duobus gladiolis primū scrotū ferro Γ referēti per mediū aduremus,cultello aut,aut cæco hamo membranas excoriantes ferramēto ensi simili,has ceu præcidentes, aduremus. Nudata uero tunica erythroide,facilē aut cum alba & tenuis existat,cognoscitur, acie ferramenti instar Γ literæ facti perurentes humorē excernemus , postea totam ipsam detectā hamulis attollentes,ferramento gladiolo simili auferemus.

De carnosoramicæ & tophacæ. Cap. LXIII.

Caro in particulis quæ scrotū implicant alibi succrescēs carnosum ramicem producit. Nascitur aut ea,ex causa latēte,testiculo fluxionem scirrhumq; experto, aut ex ictu,aut imperita post ramicis succissionē curatione: subsequitur aut hos colorubiq; sui similis cū duritia. Si aut tumor in scirrhu coaluerit, nullus nec color, nec sensus adest: si malignus sit,dolor urget punctorius. Itaq; manū admouētes egro, figurabimus ipsum,sicut & prius, diuidemusq; similiter, & si quidem ex generata carne,uitiū testiculi creatū sit, & darton membranā & erythroidē cōsimiliter discindemus,deinde testiculo eleuato, eoq; extra erythroidē exēpto,cremastere segregato à uasis,hęc quidē cōstringemus,illū uero nēpe cremastere amputabimus: testiculū aut qui cū adnata carne coaluerit,ceu alienum eiiciemus. Sin hęc carnis generatio in tunica aliqua,aut,uasē fiat,scroto diuiso subiectisq; carni membranis,

totum

totum quod in carnē cōcreuit auferemus, q̄ si posterior com-
missura carne fuerit obducta, iis quæ ambiunt ipsam ademptis
testiculū simul cū ea excipiemus: quippe fieri nequit, ut testi-
culus sine hac permaneat. Cæterum tophi & in testiculo & in
membrana erythroide occalescūt, renixu multo, duritie, & in-
æqualitate à carnofo ramice & aquaso discreti. His igitur ma-
num sicut etiam carnofo ramici admoliermur.

De uaricofo ramice & uentoso. Cap. LXIIII.

Vasa in scroto, aut dartis mēbranis, dilatata, uarices sim-
plici uocabulo nomināt. Alia uero quæ testiculum nu-
triant, si uaricū more dilatentur, uaricosum ramicem,
Græci cirrocelen uitiū nuncupant. Notæ horū euidentes sunt,
quippe pars affecta tumidior, obliqua modicē uix in modū, &
testiculi relaxatio antea apparet, tū aliæ nonnullæ in agendo
difficultates maximē in cursu, exercitio, & itinere. Hoc modo
curamus: ubi cōmodē ægrum figuraueris, scrotum manu per-
mulcetur, neruus cremaster in partē inferiorē repellitur. Fa-
cilē autē is dinoscitur, ut qui tenuior uasis sit, solidior, renitēsq;
ceu potēs ualidusq; æger quoq; ad depressionē ipsius inolet,
& iuxta colē turbatur: uasa autē digitis nostris & ministri exce-
pta in scroto, ualideq; distenta, acie scalpelli obliqua adacta su-
pra instrumentum quod uasis cedendis supponitur secabimus.
deinde per hamulos ea quæ cuti subiacent eleuata excoriantur.
uasis ut in capite de angiologia & aneurysmatis disputatū
est, denudatis, acus duplex linū trahens transmittitur: ansæque
lini abscessa, uasa & in prima ipsorū dilatatione & inferiori ex-
tremo fune deligabimus, & per mediū recta incisa linea, & san-
guine qui coierat euacuato, medicina ipsos curabimus quæ pus
moueat, ut ēt funiculi cū uasis sua sponte excidant. Leonides
autem præcipit, q̄ si aliqua ex uasis testiculū nutrientibus di-
latata fuerint, hoc modo esse faciendū: sin autē omnia, testicu-
lum cū ipsis capi oportet, ne uasis alentibus destitutus conta-
bescat. Porro uentosus ramex, quū genere aneurysma existat,
Leonidi quidē nō attingendus uidetur, propter periculū quod
in uaricibus ab incessabili sanguinis profluuiio accidit. Recen-
tiores autē quum duplex ipse sit generatio, alia ex quatuor
uasis testiculum alentibus, alia ab arteriis darton membranā
& scrotum intercurrentibus: hunc quidē ceu desperatē salu-
tis,

tis, repudiant: illum priorem scalpello curant, discernimus autem ipsos, quod qui ab arteriis enascitur, facile ad digitorum constricti onem euanescat, qui à uenis testiculum nutrientibus, aut neutiquam, aut cum multo metu. Cæterum curamus ipsos, ut in uaricosis ramicibus comprehensum est, singulas uenas fune excipientes deligantesque.

De intestinorum ramice.

Cap. LXV.

Intestinorum ramex, quem Græci enterocelen dicunt, est cum intestina sunt in scrotum deuoluta: id quod fit aut peritonæo circa ilia dirupto, aut eodem extenso. utraq; igitur, ruptura (dico) & extensio ex uiolenta quadam occasione præcedente proueniunt, nempe ictu, aut saltu, aut clamore. At qui laxationi fertur acceptus, propriè & propter resolutionem & alias corporis imbecillitates, accidit. Notæ utriq; communes sunt: conspicuus in scroto tumor: item q̃ in exercitiis, itinere, spiritus recentione, aliisque occasionibus, idē maior quam prius euadat: cōpressus, tardè quidem recurat, celeriter autē rursus deuoluatur, supernè intestinū resupinatis in loco permaneat, donec exigantur. Stercus autem in scrotum receptū periculum subinde ipsis intulit: dolent enim, nonnunquam etiā impressis digitis sonitum elidunt. Peculiariora ramicis ad relaxationem relati indicia sunt, q̃ ob causas quaslibet, nonnunquam intestinum deuoluatur, tumor æquabilis & profundus appareat, intestino quod deuolutum est, peritonæo constricto. Ex ruptura facti ramicis signum est propriū, q̃ una uice ac subito ab initio intestinum deuoluatur, idq; ob causas uiolentas duntaxat: q̃ tumor immensæ magnitudinis, inæqualis, & per summa protinus in cute emineat, quoniam intestina extra peritonæum elabuntur. Si igitur rupto peritonæo omentū duntaxat in scrotū inciderit, uitium omenti ramex, Græcis epiplocele appellatur: si intestinum quoq; delabatur, omenti intestiniq; ramex, Græcè epiploenterocele dicitur: si uero & aqua in tunica erythroide apparuerit, cōposita ex tribus quoq; appellatio sumitur. Cæterū neq; hos, neq; ex ruptura intestinorum ramicē chirurgiæ subiicimus, solum uero ex relaxatione ramicē intestini manu curamus, hūc in modū. homine resupinato & cute iuxta inguina per ministrū eleuata, trāsuersam lineā incidimus, ut in angiologia explicitum est. Nonnulli uerò non

non trāsuersam, sed rectā lineā ducūt, hamuloq; defixo diuisionem explicant, quæ testiculū retractū mēsurā adæquet, deinde rursus tot hamulis per quartā cutē transmissis quot uulneris magnitudini sufficiant, cæco hamo, & ut cultro membranas & pinguedinē subtrus excoriantes, scalpello præcidimus, detecto aut undequa; peritonæo, demissoq; indice digito ad posteriorem scroti partē inter peritonæū & dattū membranā, posteriorem cōnexū soluemus, deinde dextra manu extremum implicantes ad interiora scroti, simulq; sinistra peritonæū retrahentes ad diuisionē retrahemus testiculū una cū membrana erythroide, ac ministro uni iubebimus testiculū eleuet, ipsi uero posteriorem adnexū ex toto simul cū membrana erythroide dissoluentes, explorabimus digitis nū intestini inuolutio quædam in tunica erythroide relicta sit, & infra hanc ad aluū propellemus, deinde acu bonæ magnitudinis linū ducente duplex, decies implicitū ad peritonæi terminum qui diuisionē respicit per mediū trāsuemus. † Succisis autē linis quatuor faciemus inītia, atq; his per uinculū rursus implicatis, utrobique peritonæū ualēter destingemus, iterumq; inītiis circunuolutis, astringemus quidē strenuē, ut nullū ex uasis nutrientibus adhuc possit cedere ne inflāmatiō inde cōcitetur, itē secūdum extrinsecus uinculum iniiciemus minus quā duos digitos à priori distās; Post hæc uincula digiti instar ex peritonæo relinquentes, totum ipsum orbiculatim præcidemus, auferētes simul nimirum & testiculum: rursus diuisione iuxta emissarium scroti adhibita, linamētum in longitudinē implicitum iniicitur, & fomētis oleo imbutis uinculisq; ut in aquoso ramice iniectis, oīa quæ restant, quæadmodum illic expōitum est, perficiemus. Nōnullos autem nō inperitos chirurgos noui, qui membrana erythroide excisa, ferramētis cādentibus extremum ipsius adurent sanguinis profluuij metu, ut est uerisimile. Hi autem ipsi post scalpelli administrationem ægros protinus in solio oblongo ligneo, cui aqua inesset calida ad septimum diē usq; lauabant, quinquies per diem noctemq; id facientes, præsertim in pueris, & mirificè res processit: nā citra inflammationem ipsi scabāt, & funiculi una cum corporibus protinus decidebant. Interea uero dum ægri lauabāt, prædictæ insperfusiones iniiciebantur. Alius quispiam præter cōmemorata etiam pipere trito cum oleo ceruicem ipsorum eodem tempore infricabat.

†Hic

†Hic locus sic legiū in ueteri cod. κόψαντες δὲ τὴν δαιπλῶν τέσσαρας ἀρχὰς ποιήσωμεν, καὶ ταύτας κατὰ χιασμὸν ἀντεμ-
πλέξαντες ἐξ ἀμφοτέρων, i. postquam sciderimus duplicatum
linum quatuor capita faciamus, & his decussatim implicatis ex
utraq; parte peritonæum ualidè constringamus.

De inguinum ramice, bubonocèle uocatur.

Cap. LXVI.

Intestini ramice ex relaxatione creatū, inguinū hernia præ-
cedit: primū. n. peritonæo nimis intēso, intestinū laxatum
tūc quidē in inguina abscedit, facitq; ramicē, quē Græci bu-
bonocelen dicūt. Hūc uetustiores in eū modū scalpello curāt,
linea trāsuersa per inguina intumescētia, tres digitos lōga inci-
ditur Hinc mēbranæ & pinguedo eximūtur, aduerso aut specil-
lo peritonæo per mediū detecto qua fastigiā adigi debet, id. n.
intestina in altū repellit. Itaq; peritonæū intus restitutū utro-
biq; aduerso specillo, futuris inuicē cōmittemur, deinde specil-
lum extrahemus, neq; peritonæū præcidētes, neq; testiculum,
neq; aliud quippiā retinētes, sed præsidio cruentis idoneo per
sanātes. Qm̄ uero recētiores uisionē potius in inguinū rami-
cibus probarūt, hāc quoq; non præter institutū trademus. Ho-
mo mediocriter moueatur, tussi uiolēta, intēctione, spirituq; re-
tēto. ubi tumor in inguinibus apparuerit, locū qui uri debet,
atramēto scriptorio, aut collyrio, figura triāgula circumscribe-
mus, trāsuersam lineam per inguina sursum ducētes, iniicie-
musq; signū per trianguli mediū. postquā æger decubuerit, cā-
dens ferrū per mediā notā imprimemus, primū clauatum, inde
per triāguli costas Græce Γ literæ figurā representans, tertio
laterculari, aut lenticulato totū triangulū adæquabimus, min-
istro per totā uisionē sanie panniculo extergente: tā altē ue-
ro aduremus quousq; pinguedinē pertingamus, idq; in habitu
corporis moderato, neq; n. in gracilibus ob siccitatē ferrū al-
tius admouendū est, ne imprudentes peritonæū aduramus, ne-
que tamē in crassioribus pinguioribusq; in quibus uel ante iu-
stam uisionē pinguedo apparet, sed quantum uti conueniat ar-
tificiosa deprehendemus coniectura. Secundum uisionem sal-
ua cum porro tritus crustæ insinuabitur, & inguinatio in lite-
ræ Χ similitudinem ligamento utemur, per insequētes dies re-
mediis crustā adimūt, nepe phacomelite & similib⁹ curabimus.

De scroto

De scroto attenuato, laxoque attritorum panniculorum modo. Cap. LXVII.

LAxata scroti cute siue interioribus ipsius particulis uitium maximè indecorū gignitur, quod Cræci racosin appellāt. Leonides igitur resupinato homine, quod in ea superfluum erat scalpello super asserē, aut durū coriū, quod incidendis subijcitur excidebat, orasq; uulneris suturis committebat. Antyllus autem tribus etiam quatuorve suturis superfluum cutem prius punctam forfice acuta aut scalpello post suturas auferbat, suturisq; adunitam ut cruenta.

Quomodo fiant eunuchi. Cap. LXVIII.

Cum ars nostra huc tēdat, ut corpora à statu qui præter naturā est in naturālē deducat, eunuchos faciēdi ratio, quam Græci eunuchismū dicunt, contraria promittit. uerum quia & inuiti subinde à præpotentibus quibuscūq; eunuchos facere cogimur, explicandus cōpendiosè modus est, quo illis satisficiamus. duplex itaq; est, alter contusione, alter excisione perficitur, & prior quidē in hunc modū. Pueri adhuc infantes. in aquæ calidæ soliū collocantur: deinde ubi corpora eodem folio fuerint relaxata, digitis testiculi premuntur, usque dum aboleantur & euanescent, dissoluti non amplius ad tactum occurrant, Excisione hac ratione efficitur: Resupinatur in sedili qui eunuchus fieri debet, & scrotū cū testiculis sinistræ manus digitis premitur: quo factō duas lineas rectas unā per alterū testiculū scalpello incidēs: ubi exilierint testiculi cute de tracta excabuntur, ita tenuissimū solū naturale uasorū commercium relinquitur, atq; hic modus, eo qui per contusionem fit magis probatur. Nam qui contusionē testiculorum sunt experti, nonnunquam uenerem appetunt, parte aliqua ut uerisimile est testiculorum inter contundendum delitescēte.

De hermaphroditis. Cap. LXIX.

Hermaphroditon uitium ex compositione Mercurijs, Veneris appellatum est, multū utriq; sexui adferens in decori. Cum. n. quātor Leonide autore differentię existant, tres quidē in uiris, una in mulieribus constituitur. In uiris siquidē aliās iuxta regionē inter scrotum, & anū aliās in medio scroto muliebris pudendi pilis obseci forma apparet. Tertia uero ad hæc accedit in qua nonnulli ueluti ex pudēdo quod in scroto

scroto est urinā profundūt. In mulieribus supra pudendū iuxta pubē uirile frequēter genitale inuenitur tribus quibusdā extantibus corporibus uno tanquā cole, duobus autē ueluti testiculis. Tertia itaq; uirorū deformitas qua urina per scrotū excernitur, curationē non recipit, reliquæ tres curantur corporibus superuacuis ē medio sublati & ulcerum modo tractatis.

Quomodo nympha excidenda sit, & cercosis emendanda. Cap. LXX.

CAruncula in sinu muliebris pudendi subsultans Græcorum lingua nymphe dicitur: quibusdam immensæ magnitudinis efficitur, & non decentis inuerecundiæ notam præse fert. Quemadmodum uero nonnulli memoriæ produnt, sunt quæ hanc partem arrigunt, uiris similiter, & in uenerem ruunt. Quapropter resupinata muliere uulsella nymphae superfluum prehensum scalpello exindimns: diligentia adhibita ne altē ipsam penetremus: unde fluidus affectus, rhyda uocant, excitetur. Porro cercosim, cum sit carnis ab uteri ore propago quæ muliebri pudendum repleat, interim foras caudæ modo procidat, nymphae consimiliter auferemus.

De muliebrium locorum thymis condylomatibus & hæmorrhoidibus. Cap. LXXI.

THymus eminentia quædam est, nunc rubens, nūc alba, plurima parte sine dolore, thymi corymbis similis: condylomata uero, excrescētiæ sunt rugosæ, quemadmodū hæmorrhoides ijs quæ in auo sunt respondētes, interim & sanguinem profundunt. omnes itaq; eiusmodi in mulieribus excrescentias, quæ in conspectū ueniunt, inter detegendū uulsella cōprehensas, ferramenti quod ex dimidio spathā refert, acie excindemus, utemurq; galla leuigata, aut scisso alumine. Nam ē lino deligaturam in his maiores chirurgi non admittunt.

De non perforatis & phymo. Cap. LXXII.

GEnitales mulierum partes clauduntur, interim ex natura, interim ex accessorio, morbo quodā præcedēte, aliàs in imo, aliàs in alis, sæpe etiam in medio spatio, idque aut secundū naturā aut ex obstructione. Quod autē foramen intersepit intercluditq; uel caro uel membrana est. Cæterum hoc mali graue sit impedimentū, modo in coitu, modo in con-

ceptu

ceptu uel puerperio, aliquādo mēsum purgatione, si quæ loca obstruit caro totum spatium occupauerit, in quibusdam. n. me dium foramine patet scit. Causa igitur inuenta, uel ex promptu uel etiam demissio speculo, si quidē cōmissura solū fuerit, hanc recta linea scalpello fistulis accommodato dissoluemus: sin au tem distentio; hamulis per mediū corpus siue id membrana siue caro existat transfixis eleuatum, scalpello diuidemus, ac san guinis fluore medicamentis sine rosione siccantibus suppressio nis quæ cicatricem ducunt utemur, pessarium aliquo cicatricem inducente unctam subiicientes, in quibus potissimum non al tē admodum administratio est adhibita, quod ea de causa fiet, ne particulæ rursus coalescant. Iam phymus in ostio uulvæ succrescens pari modo curatur.

De abscessu uulvæ.

Cap. LXXIII.

VBi abscessus circa os uulvæ prouenerit qui manu tra ctari queat, non promptē ad sectionē properare confi lium est, sed cum affectio fuerit absoluta, inflammatio plurima parte increuerit, corpora quæ humoribus incumbūt, attenuata, idq; propter uteri excellenriā. Inter agendum uero mulier in sella resupinabitur cruribus ad abdomen, & femina contractis, inuicē diuaticatis: cubiti ipsius sub poplitibus subi ciuntur, & funiculis congruentibus ad cernicē deligabūtur, me dicus autē ex dextra sedens tentabit speculo, quod dioptrā di cunt ætati accōmodato. conuenit autē specillo sinus muliebris altitudinē metiri, ne maiori speculi tridente, uterū premi con ringat, & si amplior ille sinu reperiatur, linamēta implicita alis imponuntur, ut super ipsa speculū firmetur. Cæterum cōuenit speculi tridentem qui testulam habeat, in superiore parte intro demittere, & specillū à medico cōtineri, testulā à ministro con uerti, ut laminis tridentis diductus sinus aperiat. Iam uero si abscessus occurrens mollis & tenuis existat, qui digiti tactu sub fidet, iuxta uerticē diuidetur spathula, aut specillo: ori uulvæ pure uacuatō, linamentū in longitudinē implicitū, lemniscon dicunt, tenerimū ex oleo rosaceo imponetur, uel potius ex tra diuisionē sinui muliebri sine compulso inferetur. Extra ue ro summas oras & super pectinem lumbosq; lanæ succidæ aut puræ, oleo madētes accōmodabuntur. Tertio die insidebit mu lier in hydrelæū calidū, aut malvæ decoctū: abstergis sudoribus linamentum

linamentum in longitudinē implicitū in fissuram tetrapharma-
co per se, uel cum discocto melle inunctum leniter insinuabis:
erit autē solutum butyro aut rosaceo, exterior regio cataplas-
matis obducetur dum inflammatio cessauerit, & uulua absces-
su purgata fuerit. Sin autem difficulter expurgetur, collui de-
bet auriculario clystere ex iridis decocto, aut aristolochiæ aut
melle. Cicatrix duci debet emplastro ex cadmia, soluto uino
per linamentum madidum. At si intra os uuluz abscessus fue-
rit. Attingi non debet.

*Qua ratione partus ex utero excutiat excida-
turque.* Cap. LXXIIII.

Quomodo ægrè parienti succurratur tertio uolumine
tradidimus: sin autē eo nihil proficiatur, ad chirurgiā
merito diuertimus, id primū notantes, mulier super-
stes ne futura sit, an minus: & si quidem salus speratur tunc ma-
num admoliermur: sin contrā, attingi non debet. Quæ igitur
perniciem sui portendunt, in expugnabili dormiendi necessita-
te ut in lethargo sopiuntur, resolutæ sunt, & uix possunt excita-
ri, ac si excitentur, imbecilliter respondentes, rursus graui so-
pore præmuntur. Nōnullæ conuulsionis modo contrahuntur,
aut neruis cōmoentur, aut alimentū non sentiunt, pulsus ua-
lidè inturgescens deprehenditur, sed languidus & imbecillis:
quæ incolumes futuræ sunt, nihil eiusmodi patiūtur. Oportet
igitur resupinam mulierē in lecto sic collocare, ut figura ipsius
magis sit decliuis, crura ipsius elata mulieres utrinq; cōtineāt,
aut quædā ministræ. Si uerò non adfuerint, mulieris thoracē
uinculis quibusdā lectulo adfirmabunt, ut ne corpus attrahen-
tes sequens, tractionis uim dissoluat, ac alis uuluz diductis, per
ministrū † sinistram manū contractam cum ualentibus digitis
extenuatis, in ostiolū inferemus, idemq; pertētabimus, & oleo
infuso relaxabimus disquirentes ubi uncū quo fœtus extrahē-
tur, defigi conueniat. Idonei uerò loci sunt quibus iniicietur, si
in caput conuersus infans descendit, oculi, occiput, os iuxta pa-
latum, mentū, clauiculæ, & sub costis sitæ regiones, adhæc præ-
cordia, quæ Græci hypocondria appellant: si in pedes conuer-
titur, ossa super pubem extantia, intercostalia, clauiculæ rursus
& deinde uncus dextra manu continebitur, flexu ipsius digitis
occultato, sinistra manu leniter inferemus, & particulæ cuipiā

ex prædictis usq; ad uacua transmittemus. huic alter opponetur, quod attractio recta procedat, neq; alterā in partem inclinet, deinde æquabiliter trahetur non solū recta, sed etiam in latera quemadmodum in dentibus eximendis fieri solet, & tensionem interea remittere iterū non conuenit, postea uerò indici digiti unctum, aut etiam plures demissos inter os uulue & corpus impactū, orbiculatim circumagere, ueluti exoriano: si autē iuxta rationē uncus subsequatur, in superiora transferre cōueniet, atq; sic agere dum perfecta fuerit extractio. Si autē manus obiecta fuerit, nec propter obstructionē queat conuerti, circumposito panniculo, ne reuoluatur, modicē attrahere oportet, ac prolapsam totam ab humero abscindere, idemq; facere etiam si duæ manus prociderint. similiter etiam pedes procidentes, corpore reliquo nō subsequente, ab inguinibus amputari oportet: deinde reliquum corpus dirigere conandum. At si caput iusto maius obstructionē pariat, & hydrocephalon sit, id est, aquā in capite infans collegerit, spatula polypis dicata, aut scalpro, aut cultro quod scolopomechæ rion dicitur, inter digitos occultato, caluariā diuidemus ut uacuata concidat. q̃ si naturaliter amplū sit caput, similiter diuisam caluariā foripe qua dentes aut ossa extrahuntur, cōprimemus. Si ossa emineant, hæc quoq; auferre ratio est. At si capite ad thoracem adactō, obstructio prouenerit, eodē instrumento clauicularum compages usq; ad interiora spatia diuidentur, ut humore uacuato thorax concidat & collabatur: quod si non concidat, diuisas etiam clauiculas ipsas auferemus, tunc. n. collabebitur. Porro si imus uenter mortuo fœtu sit inflatus, aut aquam subter cutē collegerit, eadē ratione ac uia eum uacuare cū ipsis interaneis aggrediemur. Cæterū si in pedes deferuntur, fœtus declinati facile ad uteri os diriguntur: quod si iuxta thoracem aut abdomen fuerit impactus, linamento ipsum attraheamus, eodemq; modo ea quæ ambiunt, diuidemus. At si reliquis ablatis caput ad superiora reuersum inhæserit firmiter, sinistra manus demitteretur in uterū, & si os ipsius pateat, manū in ima transferemus, ac caput inuestigatū digitis ad os deuoluemus: deinde uncum unū aut alterū defigētes, propter orificij inflammationem non propellemus, sed infusionibus pinguibus copiosisq; utemur: itē infusibus, fomentis, & cataplasmatibus, ut de ducto ore auferatur, quemadmodum superius cōprehensum est.

Porro latera foetus, si quidem in rectū dirigūtur, prædictis utemur rationibus: sin minus, totū ipsum intus dissectū particulatim extimemus, cura adhibita, ne particula quæpiā ipsius nobis nesciis intus relinquatur. Postquā manu scalpelloq; administrationem obierimus, remedijs ad inflammationem inscriptis utendum est. quod si profluvium sanguinis oboriat, huius quoq; curationem accepisti.

† Huius loci multo uerior est scriptura in ueteri codice, τὴν ἐξώτην μου χεῖρα συνκνήμεναι μετ' ἐνδράτων διακτύλων λευκασμένην, id est, dextram manum contractam cum fortibus digitis pingui aliquo inunctam, &c.

Si secundæ fuerint relictæ.

Cap. LXXV.

Foetu excusso frequēter accidit, ut uelamentū illius in utero firmiter adhærescat, quod nostri secundas, Græci chorion, & deuterion appellant. Diducto igitur uulvæ ostio, secundæ quæ inibi relictæ sunt, & in partē aliquā orbiculatim conuersæ, facile educuntur. Manu siquidē sinistra calida, inunctaq; in fundum demissa, secundas sublabentes oportet eijcere. Si autē fundo uteri fuerint adnatæ, demissa similiter manu comprehendentes tendemus, neq; in rectū, ne uulva procidat, neq; uiolēter admodū, sed leniter primum deducemus, huc illuc circumagentes, deinde paulo ualētius. hoc. n. pacto obsequuntur & à connexu dissoluuntur. Quod si uulvæ os conuiuere fuerit deprehensum, remedijs ad hoc cōmemoratis utendum est. Si uires nō fuerint inualidæ, etiam iis quæ sternutamenta prouocant, & aromatum halitu ex fecili uapori conueniet: & si os uteri diductum sit, manu inserta, secundos ut dictū est extrahere conabimur. At sine sic quidem exemptæ fuerint, terrere nos non debet, secundum paucos. n. dies putrefactæ & in sanie resolutæ excidunt. Quia uerò grauitate odoris & caput opplent & stomachum peruertunt, suffitus conuenientes excitabuntur: ad eos autem cardamomum & ficus aridæ commendantur.

Quomodo coxendices adurantur. *Cap. LXXVI.*

Quemadmodum humerus, ita etiam coxa propter humiditatis copiam nonnullis excidens, uisionē postulat, quod Hippocrates his uerbis testatur. Quibus coxa ea diuturno ipsius cruciatu loco suo mouetur, crus conbescit & claudi fiunt, nisi uisionem experiantur. Conuenit igitur

tur tunc illum præsertim locum adurere, è quo articulus excidit: sic. n. humor redundâs deficcabitur, & locus cicatrice densatus non amplius os suspiciet, quare etiâ penitus illic ulsionem moliri conuenit. Recentiores autê tres crustas adhibent, unam retro urentes in acetabuli sinu, alterâ supra genu extrinsecus, & tertiam supra exteriorem talem, quâ est carnosior.

De fistulis & favis.

Cap. LXXVII.

Cum locus postulet de ani fistulis differere, nihil mali fuerit prius generatim de omnibus fistulis uerba facere. Itaq; fistula sinus est callo obductus, aliquatenus indolens, in pluribus nascens particulis, magna uerò parte ex abscessibus oritur parû dextrè curatis. Callus autê continua quædam caro est, albida, madoris expers eoq; etiam doloris, neque uena, neq; neruo ad ipsum pertinente Interim sinus siccus, interim humidus est, nunc humor incontinenter fluit, nunc certis quibusdâ temporibus remittit, ore ipsius oppleto iterumq; adaperto: Alias fistulæ in os desinunt, aliâs in neruum, aut aliâ quampiam principê particulam, uel rectè intus tendentes, uel obliquè, item uel uno ore, uel pluribus peruiz. Quæ igitur in grandes arterias aut neruos, aut tendines notatu dignos, aut membranâ costas succingentê, aut aliquam principalê particulam deueniunt, uel nequaquâ, uel certe, cum artificiosq; diligentia attingere debemus reliquis hunc in modû manum ad moliemur, primum tentabimus, si quidem rectè intus tendant, cultro excisorio: si oblique, specillo duplici cuspede, flexili. Huiusmodi autê sunt quæ ex stagno fiunt, itè ex ære tenuissima. In quibus autê duæ pluresue oræ habentur, notationi per specillum non obtemperantes, sinu per unum ipsius orificiû aduflto, ex clysteris in reliquas oras transitu deprehendemus, num una fistula sit pluribus oris dehiscens, in plures: ac ubi tenratû est, siquidè per summa habeatur sinus, artusq; sit, demisso specillo explicantes, scalpello figura cõmodiore callum tollemus, aut unguibus, aut acie scalpri deradentes: at si latitudinem habeat, corpora superflua, tolli debent: sin autê non summa occuauerit, sed penitus rectè tendat, eo quatenus licet in alto diuiso, orbiculatim totû callum auferemus: quod si reliquæ ipsius aliquæ remanserint, medicamento adurente eas consumeamus, quod si amplus quû sit medicamento non cedat, ferro can-

dente crustas ei inducemus. Cæterū si fistula in os terminatur, hoc idē quod integrum est, duntaxat rademus: ubi uero cariē aliamve quandā corruptionē experitur, quod uiciatū est, totū excisorijs, aciē inter sese oppositā habentibus tollemus, si opus sit, prius terebra perforatū, siue ad perspiratū duntaxat, siue ad medullam usq; fuerit uiciatum. At si os quoq; emineat, caulis modo porrectum, serra ipsum adimemus. Sumptis itaq; duobus loris, unius quidem medium ossi, eminenti subijciemus, ipsumq; per ministrū attollemus: alterius autē quod crassius est, uel ex lana quoq; factum, similiter medium carni quæ ossi subiacet adaptantes, initiaq; infrā prehendentes, per ipsum lorum carnem deorsum iubebimus detrahi, ne ipsa serra dētibus perradatur, atq; hoc pacto nos excretionē molimur. Vbi uerò particula quæpiam princeps subiecta est, exempli gratia, membrana costas inuoluens aut spinalis medulla aut eiusmodi aliqua, inter excidendum aut serra concutiendū os, lamina, quæ quod membranam cerebri custodit meningophylax græcè dicitur, subijciemus: non uiciato autē osse, totum orbiculatim carne nudum serra eodē modo deradetur. Fieri nanq; haud potest, ut ossa circulatim implicita carne obducantur. Simili ratione si ossis terminus prope articulū fuerit uiciatus, idam serra auferri debet. At si totum subinde os, nempe cubitus aut radius aut tibia aut eiusmodi aliquod contabuerit, totū adimetur. Femoris autem caput, aut coxa, aut spinalis medullæ uertebra affecta, attingi non debet, periculi quod ex arterijs adiacētibus accidit euitandi gratia. Hoc igitur modo ac uia faciendū est, in singulis ubiq; particularum uiciarum situ, uicinitate, & naturæ consortio inspecto, item morbi magnitudine, & laborantis uitium robore considerato. Cerion autē, hoc est faux quā sinus sic fistulosus, mellea diffluens humiditate, eandem administrationem curationemq; cum fistulis & alijs sinibus requirit.

De ani fistulis.

Cap. LXXVIII.

ANi fistulæ latentes quidē notantur inde q̄ ore nō apparente dolor ipsis oboriat, & purulenta humiditas per anum profundatur. Plurimis abscessus quoq; indicia præcesserunt: manifestæ autē cultro excisorio, aut seta porcina demissa noscuntur. Nam instrumentū ad ima penetrat, & digito indice in sedem transmissō occurrit, fistula nimirum ad interiora

interiora perforata. At in ijs quæ perforatæ nō sunt, inſtrū digito, nō ſtatim occurrit, ſed obſtat in medio corpus nō perforatū. Tortuoſas autē & labyrinthi modo flexuoſas agnoſces inde, q̃ inſtrū paululū procedat, pus autē ad illarū portione copioſum efferat. At quæ prope inteſtinū oriunt̃ fiſtulæ, agnitionem ſui præbēt, q̃ nōnūquā & lumbrici & ſtercus per oriſciū erumpat. In oībus autē ferè callus aliquis in oriſcio prominet. Itaq; fiſtula iſanabilis eſt, quæ ueſicæ ceruicē perforauerit, aut quæ ad femoris articulū ſit, aut quæ ad ipſum lōganonē tēdat. Aegrè uerò cōſaneſcit, quæ oriſcio caret, tū quæ deliteſcit & in os terminaſ, multifariamq; fiſſa eſt: reliquæ in uniuerſum facile curant̃, adminiſtratione hūc in modū adhibita: reſupinato hoīe, ut cruribus ſuſum porrectis femora ad uētreſ inclinēt, quēadmodū ſit in ijs quibus clyſter in aluū mittit̃, ſi fiſtulæ extremū in ſummo occurrit, culter, aut auricularū ſpecillum per oriſciū demittit̃, ſubiectaq; cutis ſimplici linea excidit̃: ſi autē altē intra ſedē fiſtulæ terminus ſinat, demiſſo per oriſciū cultello, ſiquidē perforatā ipſam inuenerimus, demiſſo iuxta oppoſitam aſpecto ano manū indice digito, eiuldē cultelli initū adigentes, & deſcētētes, ipſum foras reducemus, ac corpora quæ incūbunt cultello, ſimplici diuiſione liberabimus. At ſi nodū fiſtula perforata reperiaſ, in altū uero ani duntaxat termineſ, & tentatibus nobis indiçi digito occurrat, corpus intercedens cū ſquamofum mēbraneumq; ſit, uehemētius mucrone cultelli perforabimus, tractoq; per ſedē cultro, rurfus ſcalpello corpora quæ ei incūbunt diſſoluemus, quēadmodū prius explicatū eſt. Si igiſ terebræ, aut ſcalpelli ad fiſtulas accōmodati acie ſinus fundū iuxta ſedē perforauerimus, ipſum inſtrū per anum inferentes, illinc totū quod interiacet acie terebelli pertundemus, & poſt exciſionem uulſella, aut forſice corpora diuiſionē ambientia (calli autē ſunt) prehenſa ex toto adimemus, muſculum qui anū cōſtringit, ſpinēter dē, ubiq; uirantes. Nōnulli ſiquidem rudius dū in alto ſectionem molirent̃, ipſum cōuulnearūt, atq; inde inuolūtaria ſtercoris excretio homini accidit. At ſi qui timi diuſculi chirurgiā fugiant, Hippocratica ut debent ē lino deligatura. Iubet ſiquidem Hippocrates, linū quintuplex crudū cultro foratro uel ſpecillo p̃ fiſtulā demittere, & lini principia cōiungi, ac quotidie cōſtringi donec corpus totū quod duabus oris intercedit, diſſectū, linū eructet. Si uetulaſtē

malū cōtraxerit, quum dissolues, ēt psaro, aut eiusmodi quodā arido illito linum oportet pertrahere. Sunt qui foramini terebræ fistulis dicatæ inserti linū iuxta prædictā rōnem propellunt, quod meo iudicio nō cōuenit. Dum n. chirurgiā uitant, præter q̄ hanc requirunt, ēt curationem remorantur. de lateribus autem fistulis Leonides in hunc modum tradit. Cum autem alta pars stringentis anum muscoli in fistulam dehiscit, quæ uel à sede incipiat, uel longius procedat, post notas iudicatas, disquiretur instrū quod ad sedem diducendā sit aptatum. dico autē exiguo per specillo quod Græci dioptrion appellant, anū ut muliebrem sinum, distendi. At cū fistulæ os clarè apparuerit, per ipsum specilli mucro demitteretur, propellereturq; in imū: lamina uero subiecta tota fistula super eā diuideit semipathula, aut spatha fistulis incidēdis peculiari. Nos autē cum in talem incidissemus affectū, hoc administrationis modo uti non potuimus, q̄ ductus fistulæ in cōspectum nō ueniret. Nā inter anum & eius fibulā dextra parte sita erat, instrū uerò quod ei diducendæ erat impositū, magis operationē adumbrabat: at per digitos distendentibus anū nobis, rimā quædā inter unam quandā ani rugā ceu fistulæ emissarium apparebat, etenim pus per ipsam emanabat, per eandē uero cultelli mucronē in fistulam demittebamus ceu manu ab ea ducti, deinde dextræ manus indice digito, ani fistulæ inserto, cū inuenissemus quoddam inter digitum & instrū, tenue corpus, cumq; uiolentius cultellum digito adegissemus, fundum fistulæ sursum cōuersum perforauimus, ubi iam digito mucronem instrumēti foras traiecitassēmus, conspicuum nobis factum totum corpus quod inter fistulæ orificia habebatur, dico autem ea quæ initio ad humoris emissarium sita erant, & ea quæ nunc à nobis facta sunt scalpello præcidentes dissoluimus.

De hæmorrhoidibus.

Cap. LXXIX.

CUm hæmorrhoidum notæ ex ipso quod uacuatur innotuerint, antequam manum admoliamur, clystere utemur copiosissimo, simul intestini superuacua inanes, simul & anum, ut prōptius interuertatur & extrema ipsius pars exeat, irritatēs. Resupinato igitur ægrotante aduersus lumen clarum, siquidē cōstrictione usi fuerimus, linū quintuplex ferramēto quo ora uenarum in ano extantia aduritur, uel quo

uel quo uuez, labris hæmorrhoidum circumponentes unamquamq; hoc fane astringemus, una duntaxat relicta, qua sanguis superfluus emanet, quod etiã Hippocrates præcipit. Post astrictionẽ linamento implicito oleo madẽte, & ad sedem accommodato ligamine, usq; ægro quietẽ indicemus, oleo tepido, aut mulsã uentri medicãtes, deinde postea cataplasmate ex micis panis & croco utemur. Vbi hæmorrhoides exciderint uino cicatrix ducitur. Leonides aut nõ è lino deligat, sed forcipe prehensas ampliter hæmorrhoidas scalpello excindit. A chirurgia, fuligine thuris utendum & amylo, chalcitide, uel eo medicamento quod usta spongia simul & pice cõstat, itẽ pastillo faustino ad absolutã adustionem. Alii uero instrumẽti quo uuez uruntur, concauo, medicamine quod adurat repleto, quẽadmodum uuam, sic etiam hæmorrhoidas ufferunt.

De condylomatibus, tuberculis, & rimis. Cap. LXXX.

ANi condyloma loco solum ab eo quod muliebres locellos infestat, differt, rugosa & ipsa sedis excresecia, aut inflãmatione, aut rima quæ dicitur rhagas præcedente. Per initia itaq; tuberculum appellatur: cum occalescit autem, condyloma: quare conuenit, hæc quoq; , quemadmodum illa, uulsellis apprehensa excindere, & medicamentis crustam ducentibus curationem absolueret. rimas autem à stercore potissimum indurescentes, & quia dum cicatrix generatur, occalescunt, inueterascuntq; , recentes, faciemus, uel unguibus uel scalpello radentes & cicatricem ut par est, inducimus.

De ano non perforato. Cap. LXXXI.

Peris receus natis, anus ex natura nõ perforatus interim inuenitur, membrana nidelicet obstructus. hæc igitur si fieri põt, digitis ipsis dirumperur: sin minus, acie scalpelli eam excidentes, uino curabimus. Qm̃ uero & prouectis subinde ob ulcus non dextrẽ curatum anus committitur, conuenit hanc unionem instrumento cõuenienti disruptam curare, fistula plumbea, aut obturamine quodã ano usq; dum in totum consanescat, cõmodẽ imposito, ne rursus coalescat. Porro obturamentũ medicamine quodã cicatricẽ ducẽte obliui debet.

Quomodo uarices excendantur. Cap. LXXXII.

Varix uenæ dilatatio est, aliquando in temporibus, aliquando in ima uentris parte sub umbilico, nonnunquã

etiam circa testiculos, sed maximè in cruribus. Hic igitur originem plurima parte ex materia melancholica trahit, eorum autem qui testiculis oboriuntur curationem per scalpellum iam in capite de uaricum ramice tradidimus, atq; his similiter crura infestantes aggrediemur, ab interiori femoris parte incipientes, ubi etiam origo ipsorum magna ex parte inuenitur. Inferius enim, in plures distributi propagines difficilius tractantur. Loto igitur humore, funiculum superiori femoris regioni circundamus. iubemusq; ut inambulet inde repletā uenam atramento scriptorio, aut collyrio notabimus iuxta uaricis situm trium digitorum, aut paulo ampliori spatio interposito, decumbente ægro cruribus extensis, alterum funiculum supra genu iniiciemus. Elata autem in tumorem uena, scalpellum adigimus, quā atramenti nota est tam altè, ut curè duntaxat scalpellum penetret, ne uenam diuidamus. ubi oras uulneris hamulis diduxerimus & membranas cultio inflexo ad ramicem aquosum accommodo excorauerimus, uena detecta & undiquaq; explicata femoris ligamenta soluemus, uase per cæcum hamum suspensio, acum duplex linum trahentem subiiciemus, plexumq; lini amputabimus, & diuisa scalpello per medium uena, detrahemus sanguinis quantum usus postulat: deinde funiculo superiorem uasis partem constringentes, erectumq; crus eleuantes manuum expressu, sanguinem qui in crure est euacuabimus: deinde infra rursus uas denuncientes, uel id uenæ quod inter uincula est, abscissum tollemus, aut manere id sinemus usq; dum sua sponte cum funibus excidat, & uulnere siccis linamentis oppleto, splenium uino & oleo madens, iniectum deligabimus, medicamentoq; ad pus faciendū apto quod linteolis illinatur persanabimus. Noui autem ueteres nonnullos, funibus non usos: alios inde uas denudatum ex cindere: alios altè ipsum eleuatum cum uolentia extrahere abruptes. Verū omnium tutissimus chirurgiæ modus est, quem supra diximus. Porro uarices in imo uentris suborietes consimiliter tractabimus item eos qui tempora infestant, quemadmodum in angiologia comprehensum est.

De dracunculo.

Cap. LXXXIII.

DE dracuuculo quomodo medicamentis potissimum emendetur, quarto libro peregrinamus.

De ex-

De extremarum partium præcisione, acroteria smon appellant. Cap. LXXXIIII.

SVMmis partibus nonnunquam putredine cōsumptis, nepe manu aut pede, ut etiam ossa ipsa contabuerint, uel ex causa exterius adueniente, fracta, uel etiam ex interiore causa putredinem experta, & ferrula præcidi postulent, ante hanc necesse est corpora ossibus circumdata primum diuidere. Verum quia dum hoc primum fit, deinde longiore temporis spatio serræ administratio peragitur, sanguinis profluuij metus subsequitur, rectè Leonides non omnia primum corpora præscindit, nisi ex toto putredine contabuerint, sed partē, ubi non plures neq; grandiores esse uenas aut arterias existimet principio celeriter usq; ad os refecat, deinde os protinus serra præscinder, panniculum lineum partibus sectis circumponēs, ne serra per ipsa tracta dolores pariat. Atq; tunc reliqua parte excisa, ferramenta candentia uasis iniijcito, & sanguinis fluore suppresso linamentis insertis & conuenienti deligatura adhibita, remedio utitor quod pus moueat.

De unguium pterigijs. Cap. LXXXV.

PTERYGium in ungibus carnis incrementum est partem unguis operiens. Fit autem in pedis manusq; potissimū pollicibus: in pedibus quidem, ex offensione plerunque: in manibus autem, ex neglecta reduuia, inflammata, & in pus mutata. Siquidem hoc, pus dico, spatio temporis unguis radicē exedit, ipsumq; corrumpit, subinde totum abolet, sæpe mediū unguis admodum infestat. Iuxta unguis autem radicē ipsam, nonnullam ipsius partem putrefactam, aliquando totam radicem à rosione immunem relinquit: Est quum & os corripat, odor ædæ grauis, digitus per summa dilatur magisq; liueat. his igitur manes deber admoueri, ita ut totam unguis partem relictam acie scalpelli refecemus auferamusq; deinde exulceratam incisamq; partem ferramentis aduramus. Etenim pterygium genere depastio est, quæ nome Græcè dicitur, neque subidet, nisi adustum, adeoq; si negligitur, digitum corrumpit. At si osse & ungui à uitio immunibus, exterior unguis angulus qui delitescit, & carnem ipsi agnatam pungit, & inflammationem excitat, conuenit pungentem unguis particulam tenui cultro aut eiusmodi quodam subiecto sublimen eleuatā, acie

acie scalpelli adimere, & quod eminet medicamento crustis faciendis idoneo consumere. Pleriq; hoc modo administrationis consanuerunt. Si amplius fuerit uitiū primū scalpello circum adimemus, mox remedium ex medicamētis petemus.

De ungue contuso. Cap. LXXXVI.

Quoniam uero subinde ex ictu unguibus contusis dolores subsequuntur, qui ad manus operationem nos pertrahant, satis est Galeni uerba hic apposuisse, quæ sonant in hunc modum. Unguibus contusis præsens planè remedium ad dolorem auferendum sanguinis detractionem experti sumus, quum pulsus doloresq; uehementissimi oboriuntur. Cæterum linea obliqua, non recta in imum, supernè deorsum scalpello acuto debet incidi, ut sanie excreta, secta hæc unguis particula ueluti operculum quoddam subiacētium efficiatur. At si in rectum supernè deorsum lineam duxeris carnis excrescentia quam Græci *ὑπερσθέντια* uocant, diuersum nimirum corpus à carne quæ ungui subijcitur per mediam diuisionem suppullulante, gignitur, inde rursus doloresprehendūt, quos in reduiis nominauimus, carne quæ sub ungue succreuit, compressa. Quia igitur ex huiusmodi sectione dolorē protinus ægro adimi uidere licet, per dies insequentes commodū est, nobis subsectam unguis carnem leuiter attollentibus, unguis saniem excernere, ac rursus subiectæ carni quemadmodū dixi unguem operculi modo imponere: reliqua uero digiti totius medicina uti conuenit quæ leniat, discutiatq;.

De clauis, myrmecijs, & uerrucis. Cap. LXXXVII.

Clauus rotundus callus est, coloris candidi, clauorū capitibus similis: toto corpore, sed pedū solo digitisq; præcipuè enascitur, dolor sequitur, & incessus impedimentum. Itaq; circumsarificatus uulsellâq; apprehensus, scalpro acutæ aciei, aut quo uenæ scinduntur, radicitus eximetur. Nonnulli, ne rursus succrescat, candenti ferro utuntur. Myrmecia uerò cutis tuberculum est exiguum, callosum, rotundū, & crassum, ad basim insidens, & ad frigora sensum formicarum moribus similem excitat. Hæc quoq; totum corpus, præsertim aut manus infestat, nonnulli igitur, inter quos & Galenus est, præcipiunt scarificata extremitate parte, fistula pennæ durioris, quales sunt ueterum gallorum, anserum, & aquilarum, in imum adacta,

adacta, ex basi myrmeciam auferre. Alij ærea, aut ferrea fistula, idem faciunt. Recentioribus satis est, scarificatam uulsellâq; apprehensam, scalpro, clauorum modo excindere. At uertuca, quæ acrochordon græcè dicitur, exigua cutis eminētia est, doloris expers, callosa, rotunda, plurima parte basim habet angustam, ut suspensa esse nideatur. Nominata uero sic est, quæ chorædæ nexui respondeat. Extendentes igitur, eminentiam excindimus: sin autem hoc non fiat, lino saltem, aut pilo deligabimus. Noui plerosq; & has & prædictas omneis excrescentias ferramento extincto, ut dicunt, consumpsisse.

De telis è corpore extrahendis. Cap. LXXXVIII.

Chirurgicæ partem telis extrahendis dicatam maximè necessariam esse poeta Homerus his uersibus innuit.

Vir medicus multis alijs præstantior, ut qui

Corpore tela trahens, medicamine uulnura curet.

Primum itaq; telorum differentiarum enumerari debent, differunt autem tela materia, figura, magnitudine, numero, habitu, uiribus. Materia quidē quatenus hastilia, aut lignea sunt, aut arundinea. Ipsa uero tela aut ferrea sunt, aut ærea, aut stâneæ, aut plumbeæ, aut corneæ, aut uitreæ, aut osseæ: aut arundinea, uel etiam eadem linea, tot enim diuæ potissimum apud Aegyptios reperiuntur, figura autem, quatenus alia sunt rotunda, talia unguulosa, nempe triângula, alia sulcata quæ & gonchota dicuntur, alia trifidula, atq; alia cuspidata, alia cuspidibus carēt, ac cuspidatorum, hæc cuspides posteriora spectantes habent, ut dum extrahuntur cōtra defigantur, illa in anteriora, ut propulsata idem faciunt: quædam obuersas cuspides habent, fulminis instar, ut dum ipsa trahuntur propellunturq; in obiecta infigantur. Sunt quæ mota cardine cuspides habent, cōtractas, quæ dum in trahendo explicantur, telum extrahi prohibent. Magnitudine uariant tela, quatenus alia magna sunt, ut trium digitorum longitudinem expleant: alia parua, ut unum digitum æquent, quæ sanè & myiata apud Aegyptios uocantur, alia medium inter hæc locum occupant. Numero autem quatenus nonnulla simplicia sunt, nonnulla composita. tenuia siquidem ferramenta ipsis imponuntur, quæ in teli extractione in imo delitescunt. Habitu, quatenus alia ferrum acutum ligno habent insitum, alia cōcauum: ac quædam firmiter ligno

infixa sunt, quædam negligentius, ut in extractione separata intus remaneant. Viribus differunt, quatenus ueneno quædā sunt oblita, quædam non. Atq; hæc sunt telorum discrimina. Nunc dicamus quō extrahantur in conuulneratis, & in bello, & extra bellum, sponte, & inuito, quacunq; occasione, ac quolibet ex materia confecta. Cæterum dupliciter tela in carne extrahuntur, tum euulsione, tum propulsatu. In quibus n. per summa telum impactū est, euulsione eximi debet. similiter ēē quæ altē inhiærent, obiectæ uero partes si conuulnerentur, sanguinis profluuiū, aut dolore ex consortij lege periclitantur. At propulsatu utimur in quibus altē telum infixum est, & partes obiectæ breue spatium continent, neq; nervus, neq; os, neque eiusmodi aliquod diuisionem impedit: osse autem cōuulnerato euulsorium modum assumit. Si igitur telum conspicuū fuerit, inde extractionem moliemur: si occultatum est, conuenit autore Hippocrate, modō uulneratus possit, in ea figura constitutum notare, in qua ēē uulneratus est: si non possit, iacentis certē quatenus licet modo figurantes specillo tentabimus, & si quidem in carne fixum est telum, manibus extrahemus, aut eius hastili quod etiā attraction appellat, nisi exciderit, ligneamq; id potissimum sit: si excidat forcipe qua dentes radicesue, euelluntur, aut ferramento quod à telo extrahendo bellicum Græci uocant aut alio quopiam instrō accommodo, extractionem moliemur, nonnunquam etiam carnem prius incidentes, si uulnus instrū non recipiat. At si etiam in opposita telum processerit, nec illac ipsum possit extrahi quā infixum est, diuisis ijs quæ opposita sunt, per illa ipsum eximemus, uel euellentes ut dictum est, uel per eam partem in quā tetendit propellentes, uel si hostile exciderit, demisso instrumento propulsorio ita ut neruum, aut tendinem, aut arteriam, aut eiusmodi aliquod necessarium uitemus, protrudere oportet, turpe siquidē est, dum telum extrahimus, peius eo malum efficere. Et siquidē caudatū telum sit (hoc aut specillo deprehendemus) femina propulsorii instrumēti demissa accommodatāq; telum propellemus: si cōcauitatem, marem. Telum uero exēptum si sculpturas quasdā habere, ceu aliorum tenuium ferramentorū quæ ipsis imposita esse possint, appareat, specillo rursus usi, si illa inueniamus, eadē rōne & uia auferemus: sin oppositas cuspidēs, ut uerisimile est, telum habēs nō exilierit, uicinus ei locus

ei locus dissecari debet, si nulla pars necessaria contigua sit, de-
 lectumq; telū eleuantes, modeltē extrahemus. Nonnulli uero
 exigua arundine cuspidibus ipsis circumposita sic telum euel-
 lunt, ne carnes à cuspide radantur. & si uulnus inflammatione
 uacauerit, futuris uli cruentorum modo curabimus: si inflam-
 mationem experiatur, fomentis, cataplasmatibus, & consimilibus
 medebimur. Porro si uenenato telo quis ictus est, totam car-
 nem quæ ueneno iam mutata est, si quidem fieri potest, præci-
 demus. Agnosces autem eam quod è sana carne differat palli-
 da enim, subliuida, & ueluti emortua apparet. Aiunt autē Da-
 cos & Dalmaras cuspidibus elenium & ninum dictum obline-
 re, idq; ubi sanguini uulneratorū obuenerit, hominem occide-
 re: comestum uero ipsis innocuum esse, & nihil mali, efficere.
 At si telum ossi inhæserit, rursus instrumento experiewur, & si
 quidem caro impediatur, hanc adimemus aut diducemus. si uero
 etiam altè in osse lapsus est, quod cognoscimus si firmiter id
 infixum nulla ui cōmoueatur, excisorio cultro osse quod iux-
 ta est exempto, aut etiā terebra prius perforato, si crassum sit,
 telum liberabimus. Porro si in principem aliquam particulā
 telum defigitur, exempli gratia, cerebrum, aut cor, aut guttur,
 aut pulmonem, aut iecur, aut uenterculum, aut intestina, aut re-
 nes, aut uuluam, aut uesicam, quum iam notæ lethales apparue-
 rint, & euulsio præsertim multum cruciatum exactionemq; ac-
 ceritura est, nihil tentabimus, ne præterquam quod nihil sum-
 mus profecturi, etiam conuertiendi occasionem idiotis præbea-
 mus. Si uero exitus fuerit obscurus nec in conspectum ueniat,
 præfati periculum, opus aggrediemur. Multi siquidem absces-
 su quoq; in aliqua uitæ necessaria parte oborto, præter opinio-
 nem consanuerunt, quum & iecoris fibram, & omenti partem,
 peritonæique, & totam uuluam subinde ademptam fuisse, nec
 mortem inde subsequutam, memoriæ prodatur. Est quum gut-
 tur de industria subinde in angulis diuidamus, ut in capite de
 ipsius incisioe dicebamus telum itaq; si in his relinquatur, in
 præsentaneam mortem præcipitat, præterquam quod artem
 etiam inhumanum ostendat: si eximatur, fortè etiam salus sub-
 sequitur. Porro principalium particularum uulneratarum agnitio
 non est difficilis, ut quæ ex accidentium proprietate, ex cremē-
 tis, & particularum situ, inueniatur. Si enim cerebri membrana
 uulnus accepit, dolor capitis ualidus subsequitur, oculi feruēt,
 rubentq;

rubentq; lingua agitur, mens desipit. Si cerebrum percussum est, ægri concidunt, uox nihil sonat, facies peruertitur, bilis uomitus sequitur, sanguis per naris erumpit, per autem humor albus pusticulæ similis emanat, sanies per uulnus exit. At si in uacuam thoracis regionem telum defigatur, foramine spatiofo permanente spiritus erumpit. Corde uulnerato iuxta mamillam sinisteriore, telum apparet non penetrant, sed ceu alteri impactum, ac nonnunquã pulsatilem motum ædit, sanguisq; niger effertur, si transitus pateat: extrema frigescent, sudor emanat, animus deficit, & sine mora exitium subsequitur. Pulmone icto, si spatiosa laxitas est, sanguis ex plaga spumians uacuat: quum non est, ore magis per uomitum redditur, ceruicis uasa attoluntur, lingua alium colorem assumit, multum spiritus attrahunt ægri, frigidi appetentes. In septo transuerso uulnerato, telum quidem iuxta spurias costas defixum apparet, in spiratio autem magna oritur, cum gemitu & dolore per totam humeri partium compagem. Quod si abdomen uulnus acceperit, id ex recrementis innotescet, quum latum intus spatium existat, uel etiam telo exempto, uel hastili intus fracto, succus ex uentriulo euacuatur, ex intestinis sterces, interim & omentum, uel intestinum procidit. Vesica autem uulnerata, urina ex cernitur. Itaq; in cerebro eiusq; membranis ictis, caluaria perforata telum eximimus, quemadmodum in capitis fracturis mox dicitur. In thorace autem, nisi telum subsequutum fuerit, per mediocrem intercostalium incisionem, uel etiam una excisa costa, lamina quæ membranam custodiat subiecta, euellimus. Similiter in uentre, uesica, cæterisq; in alto particulis, si quidem telum subsequatur, citra negotium eximemus: sin minus, rursus disione adhibita medicina utemur, quæ cruentis conueniat. In uentre, si res postulet, etiam suendi eius ratio, quæ gastrographia dicitur accommodabitur, quem in modum comprehensum est. At si in grandiore quodam uase, exempli gratia, in iugularibus uenis quæ in imo latent, aut arteriis quas carotidas appellant, aut etiam magnis arteriis quæ alas uel inguina intercurrunt, telum dextrum, copiosius sanguinis profluuium propter exemptionem minuetur, ratio est hæc funibus antea ex utraque parte constringere, deinde teli euulsionem moliri. At si particulæ plures confixæ fuerint, uerbi causa, brachio cum thorace coniuncto, uel cubito cum aliis corporis particulis, uel pedibus

diſibus inuicem, ſiquidem non per totas utraſq; partes telū penetrauerit aut haſta, apprehenſa hæc extrinſecus, ueluti etiam in una euellemus: ſin ambas penetrauerit, dimidia ligni parte ſerra reſecata, particulatim ſingula faciliori figura extrahimus. Quoniam uere & lapides ſubinde uel buccina, uel plumbum, uel ſimile quippiam ex funda mittitur, tum ui, tum quòd anguloſa ſunt deſiguntur. Agnoſces igitur ea, quòd moles aſpera & inæqualis illabatur, item quòd non omnino in rectū tendit diuiſio, ſed amplior, & caro ueluti cōtuſa liuidaq; appareat, adhæro, quòd cum grauitate dolor affligat. Hæc igitur conuenit agitata inſtrumento quo quid attollimus, aut aduerſa ſcalpellī parte, aut uulnerario ſpecillo recipere. ſi autem fieri poſſeſt, etiam forſice extrahemus. Multis autem infixæ tela integra intus inſederint, quæ uulneribus cicatrice obductis, deinde longiore temporis ſpatio partem eam abſceſſu occupante & dirupro exiliere.

† Hic locus ſic deſcriptus eſt in vet. Cod. τὰ δὲ γωνιώτα καὶ τοῦτων τὰ μὲν διχλῶχίνα, τὰ δὲ γλωχινιώτα καὶ λόγχεα καλοῦμένα, τὰ δὲ τριγλῶχίνα, i. alia angulis habentia, & horū quidē alia duos angulos habēt, alia uerò angulū habentia, quæ lonchota, id eſt, longa ut haſta, alia tres habent angulos &c.

De fracturis, & quot ipſarum ſint differentiæ.

Cap.

LXXXIX.

Proximū fuerit tradita carnis uitiorū manu ſcalpellū uel curandorū ratione, etiam de oſſiū fracturis, dico ſanè etiā luxationibus, ſermonem inſtituere, quoniā & ipſæ chirurgiæ generi ſubijciuntur & primū de fracturis agam, iſſq; prius quæ in capite ſiunt, tum quòd inter carnis & oſſiū chirurgiam medium locum obtinent, tum quòd omnibus partibus caluaria præcellit. In uniuerſum igitur fractura oſſis eſt diuiſio, aut ruptura, aut præciſio, à uiolentia quadam extrinſecus accidēs. Cæterum plures fracturarū ſunt differentiæ, alia ſiquidem dicitur fieri raphanidon, hoc eſt, ad raphani ſpeciem, alia ſchidacidon, alia ἑς onycha, alia alphithidon, alia cata apothraufin, id eſt, iuxta reſurrectionem. Raphanidon igitur ruptura oſſis eſt tranſuerſim per craſſitudinem facta, quæ etiā ſicyedon & cæledon nonnullis appellatur, ex cucumerū & caulīū fractorū ſimilitudine. Schidacidon autem, quaſi aſſulæ modo, eſt oblonga
oſis

ossis fissura. *os onycha*, quasi dicas in unguem, iuxta partē aliquam recta est fissura, in extremo lunata: quę etiam calamidon appellatur. *Alphitidon*, ad farinę similitudinē dicta, est quū os in multas tenuis partes finditur, quę & ipsa *caryedō* à quibusdam uocatur. *Refractio* aut, quę apothrausis dicitur uel etiam præcisio, est quū pars ossis per summitatis rupturā aufertur, ut ablata superinnatet. Atq; tot fracturę constant differentijs.

De fracturis capitis.

Cap. XC.

Fractura in capite peculiariter caluarię est diuisio, nunc simplex, nūc multifida, à ui quadam exteriore facta. Porro differentię capitis fracturarū hæc numerantur. *Rhogme*, id est fissio, *Eccope*, hoc est excisio, *Ecpiesma*, quod est effractio, *Engisoma*, id est corporum appropinquatio, *Camarosis*, hoc est restudinatio, in infantibus etiā *Thlasis* quod est contusio. *Rhogme* igitur caluarię per summa est diuisio, aut rima profundior, in qua nequaquam os uitiatū foras emouetur. *Eccope* caluarię fissura est cū ossis offensi ruptura. At si à reliquo osse pars offensa discesserit, apocseparnismō nonnulli uitiatū appellant. *Ecpiesma* in multas parteis caluarię effractio est, in qua profundius ossa descenderint, & cerebri membranā contactu suo premant. *Engisoma* caluę ictus est, in quo os uitiatū ad interiorem cerebri membranā descenderit. *Camarosis* diuisio caluarię est, in qua pars affecta camerę modo exaltata relinquatur, ut Galenus tradit, ac intro à sanis fracturę partibus ossa magis recedunt, membranęq; innitūtur, quemadmodum in *ecpiesmate* sic enim ille existimat. Alii etiam *trichismō*, quasi dicas capillationem, his adnumerarunt. Est autē *trichismus* arctissima *rhogme*, sensum plerunq; fallens, eoq; latens: quę quia non facile se ostendit, mortis causam sæpe adferat. *Thlasis* caluarię diuisio non est, eoq; nec fracturam rectē dixeris eiusmodi affectionē, uerū est ossis caluę in interiorē partem impulsio, aut inflexio, concauitatē integra caluę continuitate tantū efficiens, ut licet in plumbeis ex crudoq; corio confectis uasculis, si foris percutiantur illidantur uel, cōspicari. Porro contusionis huius duę existunt differentię: uel enim calua per totam ipsius crassitię contunditur, ut frequenter etiam cerebri mēbrana abscessu occupetur: uel omnino à caluaria hæc per totum aut non per totū premitur, sed iuxta exteriorē dun-

taxat

taxat superficiem usque ad laminam secundam deprimitur. Sunt qui his differentiis apechema, quasi dicas ab Echo respon-
sionem, addiderint. Ea est, à contraria ictus parte facta calua-
riz fractura. At falluntur hi, quoniam non fit in hominis cal-
ua quemadmodum in vitreis quibusdam uasculis fieri illi do-
cent. illa siquidem uacua sunt, ideoq; id patiuntur: calua autē
hominis undiq; plena & alioquin solida est, ac rhogme seu fissu-
ra caluariz, quæ aliarum complurium capitis partiū ictarum
lapsu, uel citra cutis continui solutionem generatur: quæq; po-
stea abscessu in ea facto, eodemq; secto, apparuerit, in opposita
ictus parte factā esse ipsius uidetur. atq; hoc uitiū quemadmo-
dum prima dicta rhogme curatur. Si igitur fractura capitis fa-
cta fuerit, speciem ipsius ex corpore quod percussit, deprehen-
des, si acutum fuerit, aut graue, aut durum, aut uiolenter impa-
ctum. Item ex symptomatis quæ icto superueniunt, exempli
gratā, uertiginibus, uoce amissā, aut subito collapsu, præser-
tim in engisomate, aut cōtusione, aut ecpiessmate, aut interiori
camarosi cerebro cōpresso: item ex notis quæ à sensu capiun-
tur. Si n. ampla cutis fuerit diuisio, per ipsam promptè cogno-
scemus: sin autem diuisio non per totū ierit, aut angusta sit, fra-
cturam tamen esse suspicemur, cutē diuisa, & oculis, & specillo
demisso eam pernoscemus. Si n. ex alijs quæpiam fracturis fue-
rit, inde manifestum euadet: at si rhogme solum angusta & pilo-
sa sensum fugiens, medicamento aliquo nigro, liquido, uel etiā
ipso atramento scriptorio infuso, os rademus, ipsa nanq; rhog-
me nigra ostenditur, conuenitq; rasuræ tam diu insistere, quo-
usque signum rhogmes aboleatur. Si ad cerebri membranam
usq; peruenerit fractura, non rademus, sed agnoscere conabi-
mur utrum membrana ab ossē recesserit, an affixa permaneat.
Si enim ipsa manet, inflāmatiō nulla unlnus infestat, eger pau-
latim febris liberatur, & pus coctum apparet: si recesserit mem-
brana, augentur dolores, & febris similiter, os alium sumit co-
lorem, pus tenue & crudum effertur, & si medicus rem negli-
gentius tractet, nec perforatione utatur, hoc grauiora oboriri
symptomata, nempe bilis uomitus, conuulsio, mentis deli-
rium, febris acuta, in quibus manum admoliri non oportet.
Quòd si his absentibus membrana cerebri nō abscesserit, rhog-
me autem duntaxat fuerit, etiam solo rasorio curatur, uel si ut-
que in altum penetret. Sin autem tantum usq; ad laminam se-

cundam, quæ diploe dicitur, fractura peruenerit, eo usq; radendum est, uel etiam confractum os eximendum, quemadmodum docebitur. At si in tenuia frustra os fuerit comminutum, hæc quoq; diligenter instrumento idoneo auferentur, etiam si membrana non abscesserit. Ab initio autē quū uulneratū susceperis, hieme quidē ante d. ē quartū de cimū omnino os auferre tentato: æstate, ante septimū priusquā cōmemorata oboriantur symptomata. Cæterum manum hoc modo admolieris.

Caluariae fractæ curatio.

DEraso super uulnus capite, duas lineas iuxta rectos angulos mutuò se secanteis, quæ literæ X figuram accipiant, incidemus. harum autē alterā esse conuenit, quæ iam antea erat, deinde quatuor in uertice angulos excoriantes, ut totum os, quod perforabitur nudum exstat: si quidem sanguis fertur, linamentis ex posca obiectis cohibebimus: sin minus, siccis deinde implicito linamento ex uino & oleo iniecto, conuenienti uinculo utemur. sequenti die, nisi recentius aliquod symptoma prohibeat, perforare os uitiatum aggrediemur. Collocato igitur in sedili ægroto, aut recumbente prout uulneri conuenit, auribusq; ipsius lana obturatis, propter sonitum qui ex apulsu redditur, uinculum aliquod uulneris soluemus. linamentis omnibus exemptis, & spongia deterfis sordibus, iubebimus ministris duobus, ut tenuibus fasciis circumpositis, quatuor angulos corporum quæ fracturæ incumbunt, attollāt, & si quidem os fuerit imbecillum, aut natura, aut fracturæ uitio, id scalpris excisoriis acie inter se aduersis, auferemus, primum cauis excisorijs scalpris, quos Græci cycliscos uocant, à latiore incipientes, mox angustioribus, deinde specilli modo angustis, malaeolo sensim adactis, ad capitis concussionē utemur. Si autem ualidum os fuerit, prius eo terebellis quæ mergi non possint, quas ab argumento a baptisinos dicunt, perforato, (eiusmodi uero sunt quæ paulo interius quā culpis acuta est, eminentias habent, quæ ipsas ad cerebri membranam demergi prohibeant) per scalpria circuncisione usq; id quod uiciatū est, auferemus, non subito, sed particulatim, siquidem fieri potest, digitis: si non, forcepe, aut uulsella qua uel ossa uel pili apprehenduntur, aut eiusmodi quodam instrumento. Locus autē qui inter foramenta est, tantum spatium continebit, quantum maximi mucronis

muctonis specilli longitudo, tam altè uerò descendet, ut interiorē ossis superficie accedat, cura adhibita, ne membranā cerebri terebra attingat. Quare etiā terebram ossis crassitudini respondere conuenit, cōpluribus id genus ad hoc præparatis. At si fractura caluariæ usq; ad secundam laminā duntaxat per uenerit, ad hanc etiam usq; solum foranda est. Osse iam ablato, asperitudinem quæ ab excisione caluariæ prouenit, rasorio aut quodam scalpello excisorio adæquabimus, laminam quæ membranæ custos est, subiicientes, ac officulis quæ remanserant, ut uerisimile est, aut spiculis ingeniosè ablati, linamenta inseremus, quē modum diamotosin appellant. Hæc ratio chirurgiæ communior simul & promptior est, & periculo uacat. Item modus qui per lenticulatum excisorium scalpri, sic mirū in modum Galeno commendatur, sine foratione, post inscriptionem cyclifcis scalpri factam, ipsum adhibenti. Scribit itaque hunc in modum. Si uerò unam semel partem nudaueris, ac scalprium qui in cuspide præfixam habet retusam leuemque lenticulæ speciē, aciem uerò per longitudinem erectam, submiseris, ubi latam partem lenticulæ super membranam defixeris, malleolo feries, diuidesq; sic caluariā. ita siquidem agentibus, omnia quæ requiruntur, euenient. Nam membrana, ne si dormitans quidē, agas, latæ tantum lenticulæ parti occurrens uiolari non potest. Quod si ubi adhæreat caluariæ membrana, huius quoq; adhærentiam innoxie dirimit rotundum lenticulæ extremū, subsequitur autē præeuntem eam à tergo ipse scalper caluariam secans. Quare nec qui minore cum periculo, nec qui celerius perficiatur, forandi modum inuenias. At quæ administratio ferris & mediolo, quæ chœnicion siue chœnicida Græci uocant, peragitur, recentioribus, ceu noxia, improbata est, sed administrationem quam in rhogme exposuimus, probant. Idē uero modus ossium excindendorum conueniet in reliquis etiā caluariæ fracturis. Quantū uero excidere conueniat, Galenus nos, docebit, hunc in modū manifestò scribens. Quod uehementer est confractū id totum auferri debet: si uero ab eo fragmenta quædā longius excurrant, quemadmodum aliquando cernitur accidere, hæc persequi ad extremū nō oportet, illud probè scientes, nullā inde noxā sequuturam, modo reliqua omnia ritè sint confecta. Post chirurgiam panniculo simplici lineo uulneri æquali, rosaceo madeti, cerebri mem-

branam operiemus, exiguamq; lanæ stuppâ similiter rosaceo imbutæ prædicto panniculo imponemus, deinde linamentum implicitum duplex in uino & oleo aut ipso rosaceo tinctum, toti uulneri circumponemus, diligentia adhibita ne cerebri membrana grauetur, postea latiore utemur ligamento, neque hoc astringentes, uerum ut linamenta solum retineat. Victus adhibebitur qui inflammationem arceat, & febribus peculiaris est, membrana cerebri crebrius interea rosaceo, superfusa. Post tertium diem, ubi uincula dissolueris, & sordes spongia deterferis, remedium induces quod crentis iniicitur, & inflammationem repellit superaccommodans membranae aliquod ex cephalicis dictis aridis, usque dum carne oppleatur. Nonnunquam os radetur, si hoc res postulet, propter quasdam summitates extantes, aut etiam propter ipsius carnis productionem. Reliqua medicamentorum materies, ut in uulneribus comprehendimus, ad moueri debet.

De cerebri membrana inflammatione.

Quoniam frequenter cerebri quoque membrana post chirurgiam inflammationem experitur, ut non solum caluariæ crassitudinem, sed etiam cutem ipsius excedat cum renixu, & ut naturalis ipsius motus pulsatilis impediatur, quæ potissimum & conuulsio aliaque graua symptomata uel ipsa mors subsequitur. Origo inflammationis aut ex acuti quadam ossis eminentia pungere ducitur, aut ex linamentorum grauitate, aut perfrictione, aut multo esu, aut uini potione, aut alia quadam occasione latente. Si quidem ex manifesta occasione inflammationem contraxerit membrana, ea protinus amputanda est: si ex latenti, magis pugnare conuenit, ut pote sanguinis dimissione, si causa non obstitit, uictu qui inflammationi congruat. Item loco induci remedia debent, calætis rosacei fons & superfusio ex althææ decocto, aut foenugreci, seminis lini, chamæmelorum, similiumque cataplasmata uero ex cruda ordeï farina, aut lini semine, cum prædicto decocto & gallinarum adipe, adhæc fomētum ex lana adhibebitur. Capiti & occipitio meatuique auditorio oleum aliquod inflammationem prohibens instillabitur. Viscerum quoque cura habenda est, cataplasmatibus adhibitis, item toti corpori prospicere, consilium est, in calidam id aquam: ut par est, collocantes inungentesque. Si perseverat inflammatio, & nihil aliud prohibet, medicamentum quod bili ducenda est, purgare ipsos Hippocrates præcipit.

† Rectior

† Rectior est scriptura ueteris libri, πλέον ἀγωνίζεσθαι πρὸς σήκειν καὶ φλεβοτομίαν χρωμένους εἰ μὴ εἶναι καλύσει, ἢ ασιτία, ἢ τῇ πρὸς φλεγμονὴν ἀρμοζούσῃ διαίτῃ. Id est magis pugnare oportet, uel uenam secantes, si nihil prohibet, uel inedia, uel uictu inflammationi conuenienti.

Si membrana cerebri nigruerit.

Cerebri membrana si quidem per summa ex medicamentis in id efficacibus nigruerit, † mel triplum rosaceo miscētes & per linamenta id applicātes, curabimus, deinceps & reliqua admouētes. At si nigrities sua spē prouenerit, idq; in imo potissimū, cū aliis grauib; indicijs, attingi tūc non debet, ut quæ natiuū calorem emortuū innuat. Noui quendā qui post annum quā̄m affectu cōflictaretur, caluaria perforata superuixerit, erat enim fractura in sincipite ex telo facta, emissariumq; habēs per quod etiam membrana ab offensa immunis conseruata est.

† Græcus codex antiquus μέλιτι τριπλὴν μίξαντες ῥοδίνῃς. Id est, melli triplum rosacei miscētes.

De naribus fractis contusisq;.

Cap. XCI.

Narium pars ima, quū sit cartilaginosa, frangi nō solet, sed contundi, sima fieri & perueri: superior quæ ossēa est, nōnunquā frangitur. In his autē deligaturā damnat Hippocrates, ut quæ magis resimas efficiat & distorqueat, præterquā̄m in his quæ ex ictu per medias nareis emineant. in his enim cōuenientē fasciā, cū medicamine imposito assumit, ut cōpressæ nares naturalē figurā recipiāt. Fractis igitur naribus, in ima quidē parte, ind ce aut paruo digito demissio in exteriora dirigētur: in interiore, ēt scalpelli nucleo id faciundum est, primo statim die, aut nō multo post. Quū uero decimo die naris ossa cōtinentur, extrinsecus indice magnoq; digito hāc efformare cōgruit. Vt autē figura quā fingis non cōcidat, duo obturamina tortilia ex panniculo inuoluta, naso impones, unum singulis nasi foraminibus, & si altera dūtaxat naris pars sit peruersa: eaq; sinere cōuenit, donec os aut cartilago contineat. Nōnulli fistulas ex anserū pennis pāniculis replentes, naribus insinuarūt, quò figura custodiatur, & respiratio nō impediatur, quod nō necessariū puto, quū spiritus per os trahatur. At si inflammationē nares sentiant, medicamentū aliquod quod eam arceat indemus, exēpli gratia, ex succis inscriptum, aut quod

oxelzo constat, aut eiusmodi aliquod, uel ex triticea simila & thuris fuligine seu gūmi una incoctis cataplasma iniiciemus, tum propter inflammationē, tum ut nares cōtineātur. Quòd si in alterā partē nares distortæ, Hippocrates postquā commodē eas figuraueris, oblongā habenulā digitali latitudine iubet circundari, alterā ipsos extremū taurino glutine, aut gūmi illicū summæ nariū parti agglutinari, ex latere quò inclināt. ubi illa exaruerint, habenā transferre per aurē oppositā uersus occipit. & frons ē oportet, deinde ipsi sub altero habenæ principio affirmabitur, ut nares in latera retractæ ad mediam dirigantur figuram, quod nō admodum recentioribus placuit. Porro minutim confractis narium ossibus, diuidere ipsas, aut superiorē ipsarum partē cōuenit, ac frugmenta ossiculorū uulsella auferemus, futuris diductas partes cōmittentes accommodantesq; ipsis remedium quod cruentis aptum est, & cōglutinat. Sin autem extra nares ulcus fuerit excitatum, linamentis in longitudinem implicitis curabimus. Sūt qui plumbeis canalibus, quas solenas Græci dicūt, usq; dum cicatrix fuerit obducta usi sunt, ne caro ex ulceribus supercrescat.

De maxilla confracta, & aure contusa. Cap. XCII.

DE aure contusa tertio libro tractatum est, tanquā huiusmodi affectio ad fracturas non pertineat. Maxilla multas ob causas frāgitur. Si igitur extrinsecus solum offensa, non per trāuersum fissā, introrsus cauata fuerit, promptum sanē est cognoscere, Opus autē est altera manu, siquidem dextra maxilla fracta fuerit, dextra: si altera, sinistra. indice igitur & medio digito in affecti os demissis, interiorē fracturæ extantiam, probe foras cōpellere conuenit: altera manu foris eā excipiente. Rectitudinē uerò maxillæ ex eiusdem dentium æqualitate deprehendemus. Quòd si fractura per transuersum facta fuerit, primū tensione, deinde retractione, quā antitaxis uocāt, partis in cōtrariū, usus, ministro eā cōtinente, ut dictum est, dirigere aggredieris: porro denteis in parte cōfracta diductos, inter se, ut Hippocrates præcipit, auro deligare, nēpe lino ab auro chrysolino dicto, aut chrysonemate: qm̄ uero huius facultas nō omnibus cōceditur, lino ualido, aut bysso, aut pilo equino, aut id genus aliquo, Verūm siquidē cū ulcere fractura

cura euenerit, specillo tentandū, nō tandem ēt refractio ossis facta sit. atq; si exigua diuisione facta, os unū refractum, aut plura remanserint, idoneo instrō auferentes, futuris oras ulceris cōmittemus, & medicamento cruētis apto usi deligabimus: si autē citra ulcus cōtigerit, ceratū simplex maxillæ impositū conuenienter deuinciemus. fasciæ medium per occiput dispensabitur. habenulæ utrinq; per aureis ad summā maxillā, inde rursus ad occiput, mox ad mentū, inde per genas ad sinciput, inde rursus sub imā occipitii partē, distribuentur, ubi & fasciā desinere oportet. Super hæc rursus uinculum aliud fronti circumdatum, quod epielema Græci dicunt, post caput cōiugetur, oēs prædictæ fasciolæ id circum astringēt. Alij uero tenuem ferulā, quæ admodum alij corium, quod æquē sit longū impositum maxillæ, deligant, ut commemoratum est: reliqui deligatura, quam Græci dicunt phorbiā, quasi dicas capistrū, utuntur. At si utraq; maxilla in summo mento auellatur, qua etiam parte coeunt, ambabus manibus parum inuicem distantibus, rursus adaptato, & dentibus adunitis, quomodo diximus, deligato: † ac congrua usus ligatione, tenui ac sorbili alimento ægrotantem nutrire iubeto. Nam mandere ipsi inimicum est. Si aliquid emotū à figura conuenienti putaueris, tertio die soluens, iterum illigato, quod tam diu facies, quàm callus fracturam firmarit. firmatur autem maxilla intra treis potissimū septimanas, quoniam laxa & medullæ plena est. Quod si inflammatio aliqua superuenerit, ne aduersus hanc quidem tum fomenta, tum cataplasmata negligere oportet. Quod in omnibus ex æquo obseruatum abs te cupierim.

† Antiq. codex, καὶ τῇ προσκλήσει χρητάμενος ἐπιδέσει κέλευσον ἡγεμὴν λεπταῖς καὶ βοφηματώδεσι τροφαῖς χρωμένους, & congrua usus ligatione, iubet ut quiescat & tenui ac sorbili uictu utatur.

De iugulo confracto.

Cap. XCIII.

Ivgulum, quod etiā clauicula dīr, quū naturaliter figuratū est, interiore ipsius extremo, cū pectore cōmittitur: exteriore, cū summi humeri cōpage, seu articulamēto adunif. eoq; si humerū, aut ipsum sustinēs brachiū, fracturā quacūq; tandē parte experiatur, quā humerū suū spectat, plerūq; infra interius extremū fertur, una cū brachio de fractū. Præstite-

rit autē per transuersum potius quā assulati, aut arundinis modo, hoc est, in longitudinē clauiculā frangi, quod uulgo receptum est. Nā trāuersim cōfractū, extensione cōpressionēq; digitorum prōptē in naturalem figurā reuertitur: cætera uero eminentias habent, quæ ægrè possint coaptari. Si igitur per totam ipsius crassitudinē quocunq; modo, iugulū fractum fuerit, duo ministri, unus ad humerū eiusdem lateris fractæ clauiculæ manibus circūiniectis, brachiū ad exteriora simul & sursum trahens, alter oppositū humerū, aut certē ceruicē attrahens, retractionē à se, quā Græci uocant antitalin, molientur: medicus suis digitis fracturā diriget, prominētiora pellendo, ima foras attrahendo. Quod si maiore retractionē à se desideret, orbiculū bonæ magnitudinis ex panniculo, aut lanis, aut eiusmodi aliquod corpus alæ subijciens, curbitū lateri indidem adiget, ac reliqua sicut dictū est, exequetur: si aut id nequeat, extremum clauiculæ iuxta humerū in alto sitū ad superiora, ægrotāte resupinato, educet ceruicali quodā mediocri, dorso subiecto. ministro humeros duos ad ima deprimēte, ut os clauiculæ quod in imo est, reuocetur, rursus digitis suis fracturā conformabit. Porro si partē aliquā iuguli refractā, instabilē, aut et pungentē percipiamus, scalpello in rectū diuisam eandē auferemus, ac reliqua scalpris excisoriis, lamina quæ à tuendis cerebri mēbranis menyngophylax dī, aut alia quæ ex cidēdis supponit propter firmitatē clauiculæ subiecta, exæquabimus & siquidē inflammatione careat, suturis: sin aliter est, linamētis uremur. & tplenis diuersis præparatis ad ossis eminetis inclinationē, maiora ex eis & crassiora superaccommodabimus, si inflāmatio infestat, oleo imbuta: si minus, sicca, ac mediocri ex lana orbe propter alā subiecto, cōuenientem inducemus deligaturā, per axillas, affectā clauiculā, scapulasq;, prout res exigit, deligātes. & si quidē ad ima tetenderit pars clauiculæ humero proxima, latoris habenulæ dimidiū, eiusdem cubito subiicientes, totum brachium ex collo suspendemus: altero autē uinculi dimidio, manū, quemadmodum in iis sit quibus ex cubito sanguis detractus est. At si uersus superius extremum inclinauerit, quod raram est, brachium suspendi non debet, uerum resupinus æger decumbet, & tenui nutrietur uictu. si uero opus est, etiā fomentis adiunabitur, sed pro ratione, usq; dum callus eam firmarit: id quod fit plurima ex parte diebus uiginti.

De scapulis. Cap. XCIII.

Scapulæ quæ latæ sunt & mensæ figurâ repræsentant, non franguntur: iuxta spinam uero fracturam sustinent, nunc compressæ, nunc rupturam simplicem expertæ, interim etiam refractæ. Compressionem itaq; tactu cognoscimus, si caua occurrat, stuporem proximi brachij, & dolorem pulsatile inducat. Ruptura ex tactus asperitudine & loci dolore deprehenditur: ambo autem ratione qua inflammatione arcemus, curantur. Refractio & ipsa tactu agnoscitur: leuis ac modica fascia conuenienti adaptatur: aucta uero & pungens ablatione per scalpellum adhibita & futuris, ut prius dictum est. Fasciæ autem & hic similiter ut in clauicula iniiciuntur: incubitus oppositi lateris conueniet.

De pectore. Cap. XCV.

Medium pectus, diuiditur imprimiturq;: summû, refrigeritur. Rupturam itaq; per medium factâ dolor loci & inæqualitas sequitur, & strepitus digitis in nixis eliditur: impressione uero dolor uehemens, spirandi difficultas, tussis, membrana quæ costas incingit dispûga, nonnunquam etiam sanguinis eruptio, partis cõfractæ cauitas, & in cedendo facilitas. Curationem eam adhibere oportet, quâ in scapulis prodidimus. In impressione autem adaptatio Hippocratis adhibebitur, quâ ille in clauicula quæ foras processerit, usurpat, per incubitum supinum ceruicali dorso subiecto, scapulisq; constrictis, ita ut costæ utring; manibus simul contrahantur. Iam uero costis lanna obtectis circularem adhibebis deligaturâ, loris prius in rectum subditis, postea duorum initia inuicem excipiuntur, quæ orbiculares fascias decidere prohibeant.

De costis. Cap. XCVI.

EX costis quæ pleuræ & spathæ Græcis dicuntur, ossæ quidem omni in parte rupturam sustinent: spuræ autem in ea tantum quæ spinæ adiacet. nam hic solum ossæam habent naturam: in exteriori parte in cartilaginè degenerantes, contunduntur, nullam fracturam percipiunt. Notæ ipsarum non sunt difficiles, etenim inæqualitas digitis explorantibus occurrit, strepitusq;, & ad cõfractum adductio. Quod si intro spectauerint, dolor uehemens punctorius sequitur, eo qui in costis prouenit grauior, q; aculei modo membranam costas

stas integrentem conuulneret, item ægra respiratio, tussis, eruptio sanguinis, subinde comitatur. & reliquas utiq; declinationes digitis licet cōformare, eam uero quæ intrò spectat, nequaquam, q̃ tendi nequeat. unde alii cibum statulētum uberemq; assumi iubent, ut fractura ex inflatione & tensione foras propellatur, quod necessarium non esse puto. Nihil. n. cōmune ad hoc inter se habent, tū thorax, tum uiscera nutritoria, præterquam q̃ inflammatio ēt ex repletionē augeatur. Alii cucurbitulam adglutināt, q̃ à ratione & uia curandi alienum non esset, nisi particularū ex attractu, collectione, fracturam amplius ad interiora propellerent. Quapropter Soranus hunc in modum scribit Lanis oleo calido madentibus partes cōteguntur, & linamentis implicitis intercostale replebitur, ut deligatura æqualis iuxta orbicularem circumductū ueluti in pectore fiat. Omnia uero ut in pleuriticis fieri debent. ad magnitudinis proportionem. Porro si magna quædam necessitas compellat, q̃ membrana costas cingens uehementer cōpungatur, cutem dividere conuenit, & fractam costæ partem detegere. deinde lamina, ne tunica costas tegens cōuulneretur, prius subiecta, officula quæ pungunt ingeniosè excindere ac eiicere oportet. postquam hoc feceris, e a sanè quæ inflammatione carent cōiunges. & cruentorū modo curabis: quæ aut illa affigūtur, linamētis oleo madidis operies uictū curationemq; adhibens inflāmationi dicatā. Decumbēt ægri ea figura quā facilis tulerint.

De coxarum & peſtiniſ ossibus. Cap. XCVII.

COxarum aut ilium ossa rarò quidem franguntur, sed easdem cū scapulis differentias sustinent. Frangūtur. n. in extremis, rumpunturq; in longitudinem, & per medium comprimuntur. Comites notæ ipsorum sunt, dolor partem affectam affligens, punctiōis pulsusq; sensus, cruris in eodem latere subitus stupor propter cōpressionē, adaptationem uero scapulis similē postulāt, auersantur aut solam ex chirurgia eius quod fractū est, exemptionem per externas partes. nā si opus sit, digitis cōformantur. deinceps aut etiam aliam curationem moliri oportet, & fomentis utendo, & cōcava ilium linamentis adimplēdo, quò deligatura ceu fasciis circularibus, superiniectis, æquabilis efficiatur. Eadem ēt dicenda sunt, de peſtiniſ ossibus, nihil enim peculiarius de ipsis dicere habemus.

De uer-

*De uertebriſ, ſpina dorſi & ſacro oſſe.**Cap. XCVIII.*

Vertebrarum complexus interim ſanẽ contuſionem, raro uero & fracturam experiuntur. propter quæ contuſis ſpinalis medullæ mēbranæ, uel ipſa ē medulla, nerui in doloris conſortium aduectur, & mors præceps ſubſequitur, magiſq; ſi ceruicis uertebraſ affectus infeſlarit, unde præſatus periculum, ſiquidem fieri poteſt, audebis ē ſectiōne oſſiculum quod premit eximere: ſi minus, ratione ſalutē qua inflammatio propulſa ur, ipſas lenies. At ſi proceſſus uertebra- tum aliquis unde ſpina conſtat, fuerit refractus, digitis tentantibus promptē occurret, dum refractio mouetur, ruruſq; in locum tranſponitur. Conuenit autē id quod refractum eſt auferre, cutē extrinſecus incifa: ſuturiſq; commiſſa, remedio cruentis idoneo uti. Cæterum oſſe ſacro contracto, index ſiniſtræ manus digitus in anum demittendus eſt, dextra manu quod contractum eſt, quatenus licet, in naturalem figurā reducere oportet. Si autem aliquid refractum ſentiamus, hoc quoq; diuiſo, deligaturam curationemq; congruam adhibebimus.

*De brachio.**Cap. XCIX.*

In brachio contracto Hippocrates quidem intentionem hoc pacto molitus eſt. Lignum, inquit, oblongum manubrij ligonis modo, per ſumma fune deligatū, obliquum ex trabe quadā ſuſpendere oportet: collocato autem homine in ſublimi quodā erectius, quā iuxta figuram qua recta ceruice dormimus, orthocatheudon dī, manū ipſius ſuper cōmemoratum lignum traducere, ut mediū ligni alæ eius tranſuerſim adaptetur. manum autē inflexo iuxta rectū angulū cubito, miniſter procūbens continebit, deinde graue aliquid, exēpli gratia, lapidē aut pondus plumbeū uel eiufmodi quippiam ex cubito ſuſpendens, ſinensq; pendere ſublime, ita fracturam cōformabis: uel loco ponderis, ſamulus ad ima brachiū detrahat. Nonnulli uerō loco manubrij ligonis gradu ſcalæ uſi ſunt. Soranus hunc in modū tradit: ægro in ſedili collocato, uel, quod ſatius eſt, reſupinato quod minus moleſtiæ ſentiat, manu fune ligata iuxta compagem qua ipſa cum brachio cōiungitur, & ex ceruice ſuſpenſa, ut anguloſa ipſius figura ſeruetur, miniſtris duobus

bus iubeamus, huic, supra fracturā, illi, infra digitos circumponant, atq; sic tensionem perficiant. Quod si ualētiore opus sit tractione, duos funeis æqualeis brachio circundamus, unum, supra fracturam: alterum, infra. atq; uni famulo super ægrotantis caput consistenti, alteri iuxta pedes, capita funiū tradentes, iubeamus in diuersa brachiū distendere. At si summus humerus fracturā senserit, dimidio uinculi, quod ciria dicitur, alæ subiecto, reliquā partem iuxta caput teneri iubentes, alio quod oppositū est retrahente, antitalin, hoc est à se retractionē uti dictum est, moliemur, quēadmodū sanè si cubitus confractus fuerit, illi uel iuncturæ manus cū brachio funis iniicietur. Oilibus iam fracturæ probè coaptatis, distentio quidem remittetur, sed iuxta Hippocraticam consuetudinem deligabitur. Porro si fractura inflammatione uacet, recensq; sit, lineis utendū fasciis oblongis abūdē, circa treis quatuorue digitos latis, aqua madētibus, aut ēt posca: si inflāmatio adest, lanis tenuibus mollibusq;, oleo imbutis: & si quidē in medio brachij fuerit fractura, initiū fasciæ super fracturā iniiciet: ubi his tēue illigaueris, sursum fasciā ducere cōuenit, ut (quēadmodū inquit) sanguinis influiones excipiātur, atq; illic finiat. Iam uero & secūda fascia uti oportet, initiū eius similiter supra fracturā iniiciēdo, atq; alia eo modo quo in priori: rursus autē supernē deorsum, atq; iterū sursum reuocare, illic ēt sic terminabitur. Porro cōstrictio mediocris esto, tū nostri sensus, tū ipsius ægrotantis iudicio. At si iuxta summā humeri cōpagē cōtigerit, priore fascia illā & scapulas, & pectus cōprehendes, ut deligatura fiat quā Græci geranida appellāt, perq; secundā usq; ad cubitū dispēsabis, ac inde ad supraposita recurre, cū summo humero scapulas pectusq; cōprehendens, primæ fasciolæ similiter. Quod si iuxta cubiti flexū fractura obuenerit, ēt cubitū colligare expedit, ita ut angularis figura cōseruetur. similiter in aliis quoq; artubus, nimirum cubito, femote, tibia, cū fractura in parte, aut ēt iuxta articulamentū & nō in medio mēbro existit, post articulū fasciam iniicere expedit. Retētiore itaq; secundum deligaturam protinus ferulas ēt iniiciunt, ut adaptationis figura contineatur, constringentes ipsas prout sensus & tumor ex inflammatione posulat: ueteres autem, à die septimo ferulas accommodarunt. nam intra hunc inflammatione declināte membrū redditur tenuius. At Hippocrates tertio quoq; die ligamēta solui iubet,

iubet, ne tensio quæpiã, aut motus præter solitũ cõteat partikulæ obuéniat, aut eius quod iam infixum fracturæ est, perspiratus prohibeantur, propter quos non solum noxijs pruritus quibusdam accidit, sed etiam erosa è saniei acrimonia nonnumquam cute, exulceratio concitatur. Itaque aquæ temperatæ tantum superfundere ratio est, quantum saniem discutere sufficit. Post septimum diem, ex maiore interuallo soluere conuenit, ceu partes non amplius saniem excernere desideret. imò etiam calli obfirmatio hoc modo felicius prouenit. Cæterum ferulæ iuxta sequentem rationem debent injici. Splenia triplicia oleo imbuta super fascias circundantur. Si igitur membrum crassitudine fuerit æquale, similiter: si inæquale, partibus magis concavis per splenia repletis, æquale ipsum crassitie ferulis accommodandis efficiemus. deinde lana aut stuppa ferula mediocriter inuolutas, in orbem fracturæ circundamus, non minore quàm digiti spatio inuicem distantes, easque moderatè constringemus: ita tamen, ut quatenus fieri licet, ferulas propius accedere articulum prohibeamus, præsertim iuxta anteriorem flexus partem. ulcera siquidem in ipsis nonnumquam & neruorum inflammationes pariunt, uerum: illic laxiores ipsas esse oportet, quemadmodum ualentiores, ubi fractura curuatur. Præstiterit autem thoraci etiam brachium mediocriter colligare, ne ipsum loco motum, figuram peruertat. At si quandoque inflammatio fuerit, (eam uerò agnosces ex ambiente tumore, ac rubore, & quod membrum nunc multò magis quàm prius stringatur) uel si confractum membrum, distortum sit, & nihil horum appareat, sed ligamenta laxa, uel econtrario strictiora, quàm par est, inueniantur solutis ipsis de ligatura instauranda est. Resupinari igitur egrotus debet, ita ut super stomachum manũ contineat: brachio subijciatur molle quiddam pellem super se habens, ut superfusionum influxus excipiat. Superfunderetur autem quotidie oleo calido, præsertim quum urget inflammatio, quando etiam cibus tenuis exhiberi debet: postea mediocris, ad calli generationem quies indicitur usque dum fracta occalluerint. occalescunt autem brachium & tibia, diebus circiter quadraginta, post quos ubi solueris fascias, & lauacro usus fueris, emplastris ad fracturas faciis persanare conuenit. hæc tractandi ratio omnibus alijs prope-modum confractis artubus conuenit.

Cubitus radiusq; interim uterque iuxta eundem locum frangitur, interim alter duntaxat, uel in medio, uel in parte iuxta flexuram, aut brachiale. Omnium itaq; deterrimum est quā ambo eadem parte franguntur, deinde etiam cubitus solus. At radius fractus, aliis facilius curatur. siquidem maior cubito non est, sed illum ipsum subiectum habet, ut ueluti infideat. Porro si ipsorum alter duntaxat fractus fuerit, in illo maximè intentionem ualidiorem moliemur: si uterq; similiter intēdemus, manu anguli modo figurata, ut pollex omnium digitorum altissimus, exiguus digitus humillimus habeatur. sic enim cubitum radio subiici contingeret. At si ualentiore opus sit intētionē, ambobus potissimum contractis, non solū manibus, sed etiam funibus intēdere aggrediemur, ut in capite de brachio comprehensum est. Cæterū omnis deligatura, & reliqua præsidia, una cum ferularum iniectione, hic adhibenda sunt, dum callus eos firmarit. Firmatur autem cubitus diebus plurimum triginta. Ac repositio ipsius similis erit ei, quam brachium fractum uendicat, præter ea quæ ipsi subiiciuntur.

Brachialis & aduersæ eius partis, & in digitis articularū ossa, quā laxa fistulosaq; natura sint, contunduntur quidem plerunq; raro autem franguntur. Aegro igitur in alto sedili collocato, medicus in altero quodā æquali aduersus sedebit, priusquam manū imponat: ac tensis per ministrum iis quæ fracta sunt, duobus digitis ipsa cōformabit; pollice & indice digito prius cōpressa. deligatura utetur, quo tempore urget inflāmatio. Nā propter laxitatem facili in ipsius callus amplior concrescit. At si acies digitorū, aut digitus simpliciter contractus est, siquidē magnus & pollex appellatus, fuerit, post commodam deligationem ab inferiore parte, ipsum utiq; cum manu ligabis, ne dimoueatur: si ex aliis quispiā, uel index, uel paruus digitus, proximo colligabitur: sin aliquis ex mediis, iis qui utrinque habentur, uel etiam omnes deinceps ligari unā debent, melius enim conquiescunt. quemadmodū si contracti ferulis quoque colligentur.

*De femore.**Cap. CII.*

EAdem de femore dicenda sunt, quæ de brachio prodidimus. peculiariter autem magis femur fractum, in anteriorem partem & exteriorē promouetur. etenim in his naturaliter dilatatum est, instauratur autem manibus, funiculis, & antennis æquivalentibus, una, supra fracturam posita: altera, subter. Quod si in parte fractura euenerit, idq; iuxta femoris caput, dimidio fasciæ lana circumdato, ne corpora incidat, iuxta inguina disponemus, & initia ad caput reducta, famulo ut partem contineat, trademus: infra autē si acuram fune circumposito initia ad intentionem alteri munistro exhibebimus. Quod si ad genu fractura habeatur, funem sanè supra fracturā injiciemus, initia eius ad extensionem dispensamus, genu etiā ipsum implicito quodam fune continemus. hanc autem partē restituimus ægro decumbente, & crure exportecto: quæ pungunt ossa ut subinde dictum est, eleuata, superius tollemus. reliquam curationem in capite de brachio exposuimus. cæterum callo firmatur femur quinquaginta circà diebus. At quomodo reponi debeat, post totius cruris disciplinā, comprehensum est.

*De patella.**Cap. CIII.*

PAtella os laxū est ac molle, ualidè corporibus superiore & ima parte cōprehensum. frequēter sanè contunditur, rarò autē frangi solet. sustinet autē rupturā per cōtassitudinē, & in tenuia fragmēta finditur, cū uulnere, uel sine uulnere. Nota uero cōspicua (motus. n. continuitatis intercidit) & cavitās & sonitus. Instauratur autem pars cruris extensa, nam quæ bifariā fissā est digitis eousq; cōmittitur, donec fracturæ labra supra sese contingant, & inuicē iungantur: quæ uero in tenuia fragmenta fissā est, manu cōformatur. etenim callo nō generato, eo quod pars utraq; per musculos cognatos & nervos, à femore & tibia in contrarium non retrahatur, tamē multitu-
do distentionis contrahet, & functionis difficultatē affectis inducet, neq; enim laborātibz ipsis diutius genu sustinet, & obambulādo illi impediūtur, præsertim ascensuri. siquidē in æquali per planiciē motu actionis difficultas occultatur: in ascensu autē, eo quod genu, in crucis eleuatione & positu non inflectatur, deprehenditur. Iam uero ossiculum si quod pungit, eleuatum prius eximito, ac curationē consentaneam adhibeto.

*De tibia.**Cap. CIIII.*

Tibia cubito respondens, eandē curationem recipit. etenim illa duobus ossibus fulta, altero crassiore & cognomini, altero tenui, quod ex similitudine perone Græcis, quasi fibula, latinis sura dictū easdem fracturā differētiā recipit in omnem enim partem distorquetur, quū ambo ossa contracta fuerint. in treis autē, quum alterum, intra & extrā: tibia quidem, retro: sura, antè, quapropter etiam ipsa similiter restituitur manibus, aut funiculis superioribus, quā fracturæ funes sunt, interim ipsi tibiæ circumdatis, interim femori. Nam quum genu sit ualidius, articulum integrum per tentiōnem seruabimus. Similiter & inferiore fracturæ funiculo, ut in cubito dictū est: reliqua ut in capite de brachio tradidimus.

*De pede summo.**Cap. CV.*

Talus nequaquā frangi solet, eo quòd undequaq; tibia, sura, & osse quod ob tessaræ similitudinē uocatur cyboides custodiatur minuaturq;. At os quod à cymbæ figura dicitur scaphoides, & supernæ pedis regionis, item pedis digitum ossa, ipsumq; cyboides, similiter iis quæ in brachiali & opposita eius parte, manusq; digitis sunt, franguntur. quare etiā quæ de illis diximus, ne eadem repetantur, illinc huc transferre consilium est.

*Quomodo crus reponi debeat.**Cap. CVI.*

Femore fracto, aut tibia, non minori cura repositionē ipsius, quàm reliquā curationē obibis. Nā: partiū contractarum æqualitas, hac potissimū probè administrata, conseruatur. Nonnulli igitur canali, quā solenam Græci dicunt, nunc lignea, nunc fictili, membrū fractum, aut etiam crus ipsum reposerunt: alij uerò sola ea quæ cum uulnete fracta sunt. eo qd hæc ferulis nequeant constringi. in totum uerò solenarū usum posteriores damnarunt, multis sanè de causis, sed præcipuè, qd ipsarū duritia partibus negotiū facesseret. Neq; tamen alienū est, artus cū uulnere fractos ferulis excipere, ut ostēdemus. Aeger itaq; resupinabitur, ac indumentum aliquod crassum cruri æquale, in longitudinē utrobq; contractū & inuolutū, ut canali per mediā concauitatē oblongā proportionē respōdeat, subijcietur: pellis super ipsam molliuscula explicabitur, quæ superfusiones excipiat, deinde in longū crus concauitati huic canalem

nalem referenti, insinuabitur. à lateribus alia uestimenta la-
næ ve apponentur, ne membrū in latera declinet, pedis autem
ima pars asserculum rectū panniculo circumdatū, propter mol-
litiē, assumet. ac maioris securitatis gratia, media fasciarū dua-
rum trium ve, uestimēto canalis modo præparato subiicientes
fractum membrū ipsi leuiter deligabimus. At si æger non tole-
rans conetur pedem totū contrahere, conuenit id facere quod
in superiore pedis parte dictum est, deinde blandē cum assercu-
lo deligare, ne inuiti inter dormiendū, ut uerisimile est, pedem
contrahant. Aliqui uerò etiā stragula lecti per medium per-
tundunt, ut ipsi sint immobiles, & per foramen urina & stercus
reddatur, usq; dum callus coalescat.

De fracturis qua cum uulnere incidunt. Cap. CVII.

FRACTURA cū uulnere facta, siquidē sanguis profundatur,
hunc prius sistemus: si inflammatio fuerit, præditiis in-
eam efficacibus utemur. Carnibus contusis, partē affe-
ctam scarificabimus, metu, ne in gangrænā incidat, sublato: at si
illa quoq; accesserit, aut alia quæpiā serpens putredo, conue-
nienter occurremus habes autē horū singulorū curationē quar-
ro uolumine explicitam. At si nihil horum adfuerit, neq; ossa
largiter denudata sint, hamulis, suturisq; usi, remedio cruentis
apto, his medebimur, sic, ut ossicula refracta, ut uerisimile est, &
pungentia innatantiaq; primū auferamus. Quod si magnū ali-
quod os emineat nō cōmissum propter magnitudinē, in inten-
sione huic prospicies. Siquidē Hippocrates femore & brachio
confractis ossa excedentia statim eicere dehortatur, periculū
his futurum prædicens ex inflammatione, quam tensio crearit,
uel etiam cōuulsione, ut credibile est, musculorū neruorumq;
Tempus uerò nōnunquā administrationē cōmodam inuenit.
In quocunq; igitur osse quod ex sede sua excidit, manū admo-
uere uolumus, nequaquā in inflammatione aggrediemur, sed
primo statim, die, antequām inflammatione occupetur. aut no-
no, inflāmatione iam finita. Adaptamus uerò ossa uectis quam
Græci mochliscon uocāt, est autē ea instrumentū ferreū septē
octo ve digitos longū mediocriter crassum, ne inter cōmouen-
dum inflectatur, acutū in summo latumq;, & leuiter inflexū,
cuius acutum extremū superposito ossis tuberculis subiicier-
tes, ex altero in oppositū tendentes simul, & mediocri inten-
sione

sione membri facta, inter se sineis fracturæ cōmittemus. quod si facere nequeamus, scalpris excisorijs obuertas acies habentibus quod eminet auferemus, aut serra subsecabimus, quemadmodum in fistulis docuimus: ossiumque asperitudine adæquata, & membro directo, medicamentis quæ in linteolis illinantur, curabimus. Maximè autem animum adhibere oportet in membris coniugalibus, aut à iugis appellatis, alio ero autem in ipsis osse particulatim serra abscisso, ut membrum in contractum maneat, etiam intensione accurata utemur. deligatura uerò hoc modo adhibenda est. Circulares itaque fasciæ, partibus uulneris utroque inijci debent: obliquæ uerò, per ulceris longitudinem, ut in literæ Græcæ X similitudinem conclusio omnium fiat. Si sordidum adhuc ulcus est, purgantia adhibebimus: si purum, quæ carnem inducunt, linteolis illita, aliamque comprobata usum materiam. Hippocrates pissera emplastro in linteolis utitur, id autem esse dicunt tetrapharmacum basilicum. Vbi caro increuerit, ferulæ inijciuntur, aliqui uerò per initia ipsas accommodant, ulceris locum uitantes, & pro usu urgente ipsas constringentes, uel rursus remittentes. In quibus autem squama ab osse recedet, notabimus quidem hoc, inde quod copiosus humor & tenuis excernatur, caro autem ulceribus uacua inanisque facta attollatur: deligatura quidem laxiore ad curationem utemur, hamulo autem, aut eiusmodi quopiam squamam euellentes, iterum ualidiore deligatura utemur. porro per totum ulceris tempus medicamen aliquod ex iis quæ inflammationem arcent linamento illitum, uulnere incumbet, ac simplices fasciæ inijciuntur, quæ singulis curationibus solui debent, quum alia supra dicta maneant, ut in capite brachio expositum est.

Si præter modum fracturis callus obducatur. Ca. CVIII.

Immodici fracturarum calli indecoram omnino specie efficiunt, nonnunquam etiam functiones impediunt, si prope articulum coaluerint. Si igitur recens adhuc callus coierit, remedijs admodum astringentibus utemur deligatura ipsa accommodantes. Nonnunquam uero & plumbea imposita lamina, id quod requiritur, efficiamus. At si lapidosus solidusque fuerit, incidentes ipsum rademus, id quod eminet, scalpris auferentes: si res exigat, etiam terebris usum.

Si distortum membrum callus firmarit. Cap. CIX.

Q Vibus membrum distortum callus firmauerit, difficultate functionū obeundarum haud exigua subsequente, præsertim si in pedibus fuerit, repositionis quidē modus nō recipiendus est, ut qui extrema inferat discrimina, uerū si callus nondū radices egerit, laxatibus superfusionibus, & cataplasmatibus ex ficis pinguibus & colūbarū stercore, alijsq; medicamentis quæ à callo soluendo porolytica dicuntur, utimur. Insuper per manus frictione, & contractione hunc dissoluemus. Quodd si lapidosus euaserit, scalpello superficie diuisa, excisoriis scalpris consortiū ab osse liberabimus, deinde fracturæ medebimur, ut superius à me dictum est.

Si fractura callo non firmentur. Cap. CX.

FRACTURÆ nonnullæ sine callo permanēt, suprā definitū naturæ tēpus, aut ob cōtinuas resolutiones, aut immodicas superfusiones, aut motū intempestiuū, aut fasciatū copiā, aut quia totū corpus alimentum nō percipit, in quibus etiā tenuius fieri membrū contingit. Itaq; cum alias occasiones, tū maximè corporis inediā tollere conandum est, partim per calidiora alimenta materiam particulæ distribuendo, partim cibū subministrando sufficientē, item lauacra, & reliquas animi uoluptates. Porro notæ eos qui callo iam firmanentur comitantes, hæ inter alias sunt præcipuæ, si fasciolarum cruorē referāt, et non ob orto uulnere, quod forsan accidit, calli substantia quando coalescit fistulis ossium inspersas sanguinis guttas extūdentes.

De ossibus luxatis. Cap. CXI.

QUUM luxationes fracturis proximæ sint, de ijs uerba facere aggrediemur. Luxatio igitur est, ut summatim dicam, quum articulus à proprio sinu, ad insolitū excidit, in qua motus arbitrarius impeditur. differentias ipsius alias dicere non habemus, nisi eam dūtaxat quæ ex maioris minorisq; ratione sumitur. quum enim articulus in totum exciderit, communi generis uocabulo affectus Græcis exarthrema, latinis luxatio dicitur: quum aut aliquatenus duntaxat emotus est, aut usq; ad superficiem è sinu elapsus, pararthrema.

De maxilla. Cap. CXII.

RVSUS à superioribus incipientes de maxilla dicamus. Nam quum malæ sint immobiles, luxatione non periclitantur.

clitantur. maxilla autē toto loco non mouetur, quod capita ipsius malis firmiter ac tutò insinuata sint: modicam uerò peruerſionem quam pararthrema uocauimus, subinde experitur, quòd ob musculos qui ipsam continent ex continuo mandendi loquendiq; exercitio in mollitiē elanguescenteis, qualibet de causā faciliè laxetur, quod uerbū apud Hippocratē *σχαρά* dicitur, in quibus sine aliqua difficultate articulus spōte in proprium locū reuertitur. uerū de maxilla in totū luxata, satis est illius uerba exponere, quæ compendiosa, integra, & perspicua exiſtunt. Scribit itaq; hunc in modū. Excidit quidem maxilla rarò, laxatur autē subinde oris hiatu, quomodo etiā aliæ plures musculorū neruorumq; peruerſiones, id efficiunt. Clarū itaque hinc potissimum est, quando cunq; exciderit. Nam maxilla in anteriora prope litur, & ad contraria eius unde prolapsa est, peruenit, ossisq; tuberculum iuxta malas tumidus apparet, difficulter ægri maxillam cōmittunt. Qualis autē repositio ipsis congruat, manifestò liquet. alium. n. continere caput oportet, alium comprehendentē ab interiore parte & euteriore digitis iuxta mentum hiantē hominē quā mediocriter potest; primū quidem maxillā commouere aliquādiu, & huc, illuc manu diducere, ipsiq; homini iubere, ut laxam maxillam habeat, simulq; remittat, & concedat, ut repentē potissimum laxetur. tribus pariter figuris, mente adhibita. Ratio siquidem est illam ex peruerſione in naturalem statū reducere. Oportet autem maxillam in posteriora propellere, item cōsequenter his cōmittere, neq; hiare. Inſertio igitur hæc etiā in aliis figuris fieri non poterit. medicina autē modica sufficiet, spleniū, appositum ceratum fascia laxiore deligare. Sed tutius est, resupinato hominē firmare caput ipsius puluinis subiectis quā plenissimis, ut quā minime cedat. Cæterum ulcerati caput aliquis continebit. Siu autē utraq; eadem maxilla eluxata fuerit, curatio quidē adhibebitur: uerum cōmittere minus hi os possunt, ut quibus prominentiores maxillæ sint. rectitudinem autē in denexam maximè cognosces. dentiū & superiorū & inferiorū terminis, secundū horū directam aciem confert illas quā citissimè inſerere quomodo autem inſerentur, expositum est. Quòd si locis suis non insinuentur, & periculū de anima subſequetur ex febribus continentibus, & torpido Caro. Nam musculi hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, Carū inducunt,

inducunt, uenter solet his biliosa deijcere, uel syncera pauca, & si etiam uomant indiscreta eijciunt. hi igitur decimo die potissimum moriuntur. ac hoc modo iniectionis nos subinde uisum sumus, fomentis prius ex hydrelæo calido per spongiam super luxatam maxillam adhibitis, quando potissimū ægrè potest restitui, homineque humi collocato, post ipsum nos sedentes, quemadmodum ab Hippocrate traditum est, operamur.

De clauicula & summo humero. Cap. CXIII.

Clauicula interiori quidem extremo nō excidit, ut quopectori committatur. unde ne mouetur quidē in ipsō. At si uiolentia cuiusdā acuti extrinsecus ferientis auelatur, quemadmodum fractura ipsius instaurari debet. Extremum autem, ipsius quod humeri articulo inferitur, non admodum sanè excidit, à bicipiti musculo summoq; humeri tuberculo prohibitum imò neq; uiolento quodam motu clauicula priuatim agitur, propter solam thoracis factam separationem. Vnde homo solus inter animantia clauiculam obtinet: quam si in palæstra, ut uerisimile est perueri contingat, conformatione per manus dirigitur, & splenijs multiplicibus accommodatis unā cum deligatura decenti: eadem curatione etiam summus humerus peruersus in propriam sedem reuertitur. Est autem ossiculum cartilagineum quod clauiculam scapulis colligat, in resiccatis mortuorum cadaueribus occultatū, quod loco motum, imaginem imperitis exhibet, brachij caput excidisse, etenim in hoc exterior humeri pars acutior apparet: concauum autem, id unde excidit. uerum notis quas deinceps subiungam ipsa discernentur.

De humero luxato.

Cap. CXIIII.

Brachii caput scapularum sinui insertum, excidit quidē frequenter, uerum neq; in superiore partem, ut quod scapularum processus ancoræ similis impediatur: neque in posteriorem, propter ipsas scapulas: neq; tamen in anteriore, ob muscoli bicipitis tendinē, ipsumq; humeri fastigium. Sed raro quidē in interiorē exterioremq; prolabitur, continuè uerò præsertim macilentioribus, ad ima atq; his sanè faciliè & excidit & rursus inseritur: multa autem carne præditis contra, raro quidē elabitur, sed ægrè in sedem suā compellitur. Quibusdā itaq; etiam nō luxatis, ex itū frequenter elapsi loco membri

suspicio oritur. eo quod ualida inflammatio subsequatur. Porro quibus in imam partem luxatus humerus est, hoc modo agnoscas: affectus humerus si cum sano conferatur, multum differt, quum exterior eius pars unde excidit, cōcaua appareat, ut in summo humero eluxato diximus, quod acutius quàm naturaliter esse debet, apparet, & brachij caput elapsum in ala manifestò occurrit, ac manus huius cubitus à costis magis recessit, quibus quidem costis si ipsum adigas, cum dolore admouetur, neq; ægri manū extenso cubito ad aurē possunt reducere, neq; alium motū multiplicem per eā moliri. In pueris itaq; uel in quibus recens nec ampla facta est eluxatio, ēt nodo medij digiti flexi eminente medici manus, uel ipsius affecti, sanæ manus, si nō puer sit, frequenter restituta est, ut inquit Hippocrates. ualentius autē hoc modo luxata inferuntur. Homo lotus & superfusionibus laxandi uirtute præditis usus, resupinari humi debet, & pila mediocris uel coriacea, uel alia quæpiam nō admodum mollis alæ accommodabitur, ac sedēs medicus aduersus ægrum, iuxta latus affectū, si quidē dexter humerus luxatus sit, dextri pedis calcē superponet pilæ alæ suppositæ, si sinister, sinistri. ac affectā manū prehensā ad pedes trahet, simulq; calcaneo alam in diuersum propellet, ita ut aliquis post caput ad alterum humerū resistat, ne corpus circū diuellatur. Est & alia ratio immittendi, quæ humero subnixo perficitur, quod Græci κατωμίzen dicunt. Adolescens, aut longior ægrotāte, aut altius consistens iuxta affectū latus, ægri indidē collocari alæ suū ipsius humerū subijciēt, & manum eleuatā ad uentrem suū attrahet, ut reliquū ægri corpus post eū qui humerū suum alæ subiecit sublime pendeat. At si æger leuior fuerit, alius quispiā puer leuis ex ipso suspēdetur. Nā manu ac reliquo corpore in contraria detractis ad ima, subiectus alæ humerus facilē elapsū articulū reponit. atq; hoc ēt ligno quod Græci hyperon dicūt, efficiamus. Est autē id lignū oblongum, rectū, quod in pauimēto super aliud quoddā solidū ponitur. huius igitur summū extremum rotundū, quod non admodū crassum neq; tamen tenue est, alæ ægri aut stantis, aut sedētis, subiicietur, iuxta totā ipsius lōgitudinē. Ac manu per lignū istud porrecta & detracta, reliquo autē corpore contra inferius uergente, uel sua sponte, uel alio quodā trahente, restitutio fiet. atq; hoc in scalæ gradu fieri debet, quemadmodū in con fracto brachio per tensionem fieri dicebamus.

dicebamus, hic autem rotundum quoddam corpus super gradum deligatur, quod ægrotantis alæ possit adaptari & brachii caput propellere. Porro si ob uetustatē affectus, aut corporis duritiem, repositio nobis facessat negotiū, utemur et ratione quæ per spatham ligneam, amben appellatā sit. Est autē ambe lignū quod longitudinē duorum cubitorum habet, latitudinē quatuor digitorum, crassitudinem instar digiti, alterum extremum rotundum, quod etiā promptē in alæ sinum ingreditur, perinde ut ligni quod hyperon uocatur, extremum. hoc itaq; extremum panniculo circundatum, quō lenius existat, capitulo brachii iuxta alam accommodabimus, totam uero manum ad lignum intensam cū eo deligabimus, iuxta brachium, cubitum, & eius extremum, deinde ligno obliquo inter duas colūnnulas rectas adaptato, uel rursus supra scalæ gradum manu traiecta cum ligno, ut ala per transuersum gradum accommodetur, manum infra trahentes, sinemus in alteram partem reliquum corpus in sublimi pendere, tunc n articulus ingreditur. Vbi fuerit repositus, mediocris ex lana pila si quidem inflammationem pars non sentiat, sicca: si sentiat, oleo madens alæ iniecta, deligabitur. per hanc autem alam & humerum & alteram alam uinculi deligationes literæ X figuram potissimum apparebunt. ita ut in hunc modū facta deligatura super affectum humerum accommodetur, brachium autem costis colligetur, ipseq; cubitus & summa manus, ex ceruice deuinciantur, ne rursus de integro articulus excidat. Post septimum diem uel tardius ubi fascias dissolueris, mediocri uti frictione præstat, eo quod corpore solidiore facto, articulus ita firmetur, ut nō facilē prolabatur. Quod si autē crebro prolabatur, aut humiditatis uitio, aut ob aliā quampiam iam diu factā elabendi uiam, ad ulationē ueniendum est, sicut supra comprehendimus. Quum autē uel infantibus in utero aut æditis quidem in lucem, sed adhuc incrementibus, particula fuerit luxata, necdum reposita. in humero quidem carnes nihil à naturali figura deficiunt, neq; enim manus quodcunq; opus perficere impeditur, os autem brachii breuius permanet, non augescens, ac tales nominantur galiancones. In femore etiam os incrementum non sentit, & totum crus contabescit, quum enim pondus corporis ferre nequeat, non exercetur, ac in aliis membris luxatis manentibus quæ subijciuntur partes, omnium iniuriis expositæ sunt.

De cubito. Cap. CXV.

Quanto cubiti articulus humero magis uarius creatus est, tanto plus negotii prolapsus exhibet, & tardius quidem existit, sed difficilius reponitur, propter tuberculorum sinuumq; frequentiam. Nonnunquā igitur solum aliquatenus detorquetur, quem casum pararthrema dixi, sæpe uero etiam ex toto in omnem partem probabitur, præcipuè in priorem & posteriorem, quod facile dignoscitur, eo quod excidit oculis & tactui obiecto, in quodcumq; prolapsum sit, & sinu unde excidit apparente. Hæc uerò potissimum sani cubiti inspectio coarguit. Conuenit autem protinus membrū reponere priusquam inflammatione occupetur: siquidem eam expertū, difficulter curatur. Quædam etiam nullam prorsus curationē recipiūt, maximè si in posteriora prolapsa sint. Hæc enim luxatio omnium quæ in cubito fiunt maximè dolorifica est & periculosa. Quòd si modicè articulus inuersus sit, moderata etiam intensiōe restituitur. sic ut ministri manum exporrectam iuxta brachium cubitumq; contineant, & in aduersa retrahant, medicus autem suæ manus palma quod excessit in suam sedem compellat. Hippocrates in priora luxationē subito manus inflexu instaurat: ut palma ipsius humerum iuxta rectum pulset: in posteriora uerò, subita rursus & diutius facta extensione, quoniam luxatio in priorem partem, uiolenta potissimū extensione efficitur: quæ in posteriora, flexu similiter uehementi. Quòd si luxatio perseveret, etiam ualidam magis intensiōem usurpabimus, eiusmodi uero est potissimum quam Hippocrates in brachio cōfractō exposuit, ubi ligonis maunbrium adhibebat. Porro recentiorū aliqui hunc in modum adaprant, ministris duobus manum ut dictum est, intendentibus, ita ut alter sursum ad alam contineat, alter deorsum iuxta brachiale, medicus aduersus ægrotanti consistens, duabus palmis iuxta articulū, brachium circundat, ac ubi iusserit uestimentū cōtractum in oblongum uel latam fasciam manibus ipsius simul & ægrotantis brachio circundare, & in exteriora imaque propter summam manum retrahere, ipse deinceps cum tēsiōne constrictas ipsas trahit, donec cubiti articulum excedant. Cæterum manus prius oleo illini debet, ut lubrica fiat & facillè medici palmis deducatur. Sic enim prolapsa, si pertrahentiū manum

manum uī premantur, in propriam sedem reuertuntur. Postquam sunt reposita, in anguli modum figurata manu, ex splenijs & conuenienti deligatura curationem petemus.

De brachiali & digitis luxatis. Cap. CXVI.

Brachialis digitorumq; luxatio nullum fa cessit negotiū per se, nisi cum ulcere facta fuerit de hac igitur in capite de luxationibus quæ cum ulcere fiunt tractabitur. At si sine ulcere luxatis, mediocri intentione, & remedijs quæ inflammationem pellunt, medebimur.

De uertebri spina. Cap. CXVII.

Vertebrae spinæ si ex toto prolabantur exciduntq; præsentaneam mortem inferunt. Medulla siquidem ipsius spinæ uel quamlibet cōpressionē nō sustinet, quum & solus ex ipsa neruorum processus si cōtundatur, hominem in periculum perducere sufficit. Peruersionibus autē subinde affligitur, nūc in priorem partem distorta, ac uitium lordosin Græci appellant: nunc in posteriorem, & cyphosin à loco gibbato uocant: interim uero in latera, quod scoliosin nūcupant. Quū igitur multæ simul uertebrae paululum adeò peruersæ fuerint, plurium simul peruersio ex circulari flexus rotunditate fieri apparet, ac putant nonnulli decepti, ab una uertebra ampliter peruersa id fieri. Nā magna distortio non rotundum, sed angularem spinæ flexum molitur, quando etiam magis periculum subsequitur. Si igitur introrsum spina est peruersa, restitutionis spes nulla est, eo q̃ per uentrē, antè oppositio fieri nequeat. qui. n. in scala hic affectos intendūt, aut cucurbitulas admovent, aut sternutamenta aut tussim, aut flatus excitāt, quid tandem promouere putati sint, Hippocrates abundè ostendit: Quoniam uero subinde cuiusdā ossiculi spinæ refractio facta, cauum locū repræsentat, quemadmodum in capite de fracturis cōprehensum est, aliqui uitium lordosin esse crediderūt, deinde hoc celerius perſanato (promptè. n. callo firmatur) lordosin curatu facilem existerè pronuntiarunt, & si nullam curationem, aut certè difficilem recipiat. his etenim urina supprimitur, aluus nō respondet, corpus inhorrescit, postea etiā sine uoluntate excrementa prorumpunt. Hæc autē eueniunt, neruis & musculis confortij lege laceratis, ac celeriter ægri moriūtur: præsertim si superiores & ceruicis uertebrae affectum fuerint

rint expertæ. Cui uerò iam inde à paruulo potissimum uertebrae gibbatæ protuberant, uitiū longum esse neq; celeriter mor-
 teni, sed morbū accersire, & insanabile Hippocrates prodidit.
 At quibus recens hic gibber ex casu prouenerit, machinæ qui-
 dem per scalam, & rectam ægri suspensionem ac uteri inflatio-
 nem adhibetæ, ridiculæ sunt. sola autem Hippocratis adaptatio
 sufficiet. Conuenit enim, inquit, lignū magnum quod tantā
 longitudinem, ac latitudinem habeat, ut hominē excipiat, aut
 scamnum huic æquale, prope parietem deponere, ac iuxta hūc
 ita extendere, ut in longitudinem pede non amplius absit, &
 uestimenta quædam super ipsum explicare, ne hominis corpus
 infringatur, (erit autem hic lotus antequā super lignū scam-
 numue insideat,) deinde loro pectus ipsius bis circumdatum,
 per alas iuxta dorsum uincire, initia lori ligno oblongo pistil-
 lo simili deligare, atq; hoc super pauimentum iuxta ligni, aut
 scamni subiecti extremum constituere, & ministro post ægrā
 caput stanti ex superiore parte continendum tradere, ut imo-
 quidem extremo contra fixo, altiore supra caput tracto, oppor-
 tuna fiat intentio: altero autē loro pedes simul & superiores
 talorum partes deligantes, & rursus alio, superiora ilium & lū-
 bos ita ut huius in lumbis fiat connexio, iterum extrema ho-
 rum ligamentorum cōiungemus: alii autem ligno pistillo re-
 spondenti, similiter prædicto illigantes, statuemus in ligni aut
 scamni extremo quod iuxta pedes est, lignum pistillum repræ-
 sentans, ad prioris similitudinem, deinde famulis iubebimus ut
 per ligna retractionem in diuersa moliantur. Quidam uero
 asellis dictis hanc efficiunt. sunt autem hi axes qui contra re-
 ctum lignum uertūtur: utroq; huius magni ligni, aut scamni
 latere iuxta extrema ad pedes, caputq; sita, lora inuoluantur.
 Quum aut sic intentio ipsa administratur, manus palma gib-
 berum constringemus: si aut usus postulat, etiam super ipsum
 insidebimus, nullum ueriti periculum. At si ne sic quidē spina
 instaretur, & æger pressionem ferat, utile est parietem adiacē-
 tem in longum canalis modo exculpere è regione gibberi, ut
 sculptura cubiti longitudinem habeat, neq; altior sit ægrotan-
 tis spina, neq; multo humilior, imò sculpturā prius præparatā
 esse oportet. huius enim causa etiam lignum ab initio prope
 parietem poni maluimus. deinde asseris mediocris alterum fi-
 nem ad ima comprimemus, donec sensibilibiter spina dirigatur.

uerum,

uerum, ut inquit Hippocrates, sola intensio citra asserem, rursusq; per asserem sola curatio, id quod requiritur potest efficere. Quòd si hoc uerum est, non alienum etiam in lordosi & scoliosi per initia intensiorem prædictam, sine cōstrictione uidelicet, moliri: post adaptationem uero, lamina lignea quæ latitudine treis digitos æquet, longitudine gibbero respondeat & aliquam ex sanis uertebis comprehendat, loro lineo, aut stipula propter duritiē inuoluta, uertebis ipsis imponi & conueniēter deligari debet, uictus adhibebitur tenuis. At si post hæc quædam gibberi reliquæ remanserint, laxantibus emollientibusq; remediis cum laminæ appressu, per diu utendum est. alii qui uero plumbeam laminam usurparunt.

*De coxa luxata.**Cap. CXVIII.*

QUum alia corporis ossa interim paulum excedant, interim toto loco excidant, coxæ humeriq; articulus soli luxationi opportunus est, quæ tota sēde promouetur, atq; ex his, magis coxæ articulus, quoniam sinum & rotundum, & profundum possidet, ad hæc, q̃ elatioribus marginibus munitus sit. At si quandoq; articulus ob uim quandam uehementē sinu suo exciderit, etiam multæ luxationis secundum minoris, maiorisq; rationem dīzæ, proueniūt, quatuorq; modis, imò locis coxa luxatur, uel enim in interiorē partē, uel exteriorē, uel priorem, uel posteriorē, prolabitur: uerum intrò quidē & extra continuē, & multo frequentius intrò: in anteriora autem & posteriora, rarius. Quibus itaq; in interiorē partem coxa prolapsa est, iis crus affectū, si cum sano conferas, longius spectatur, & genu prominentius, & ad inguina crus inflectere nequeūt, & in regione scroti & ani intermedia tumor manifestus occurrit, tanquam femoris capite illic desidente. Quibus aut in exteriora promota est, iis contrariæ notæ eueniunt, siquidem crus breuius apparet, & inter scrotum & anū in sinum dehiscit, iuxta clunes in tumorem attollitur, & genu interius demergitur, crus inflectere ægri possunt. Si in priore partem prolapsa est, crus sine dolore genu extendunt, non aut ad interiorē partem inclinare possunt, incedere conantes. Vrina his supprimitur, inguina intumescunt, nares rugosæ ex carnesq; apparent, calci inter ambulandum innituntur. Porro quibus in posteriora excidit, nō aut poplitem, aut genu extendunt,

dunt, neq; inflectere possunt prius quàm inguina flexerint, atque his crus breuius, inguina laxiora apparent, & per nates femoris caput eminet. Quibus sanè iam inde à pueritia, aut certè longiore tēporis spatio articulus prolapsus curæ non fuit, èt præsidium nihil promouerit, mēbro iam in orbē coacto. Quibus aut continenter excidit, hi curationem Hippocratis assument, quapropter statim reponi luxata debent, uetustæ siquidē coxæ luxationes, nullo modo cōsanescunt Communiter itaque in quatuor luxationibus instauratio congruet, tum quæ conuersione articuli & circumductu fit, tum quæ intensione. Si enim affectus recens fuerit, & æger iuuenis, nonnunquam femur continentes. circumagentesque huc illuc, articulum reposuimus. Quod si in interiorem partem luxatio declinauerit, etiam crure tantum subito & ualenter ad inguina quàm intimè flexo, id quod requiritur effecimus: sin autē his non cesserit, intensione utendum, primū per manus adhibita, quæ crus ab inferiore parte trahant ac per femur tibiamq; constringant, ex superiore autem parte, sub alis corpus circumdēt. Quod si etiā ualentior desideretur intensio, funibus contextis aut implicitis, uel loris crus deligare, omnino quidem supra talum: ut aut genu nihil patiatur, hoc quoq; superius, oportet: at pectoris regionē uincire necesse non est, uerum, ut dictū est, manibus subter alas cōprehendatur, loriq; mollis & ualidi medium iuxta regionem inter scrotum & anum adaptatum in humeros reducemus antèrius per inguina & clauiculam: postèrius, per summas partes, duoq; lori initia ministro trademus, deinde oēs simul trahentes, ut ægrotantis corpus eleuetur, intensiōnem molientur. hic quidem intendendi modus cōis est quatuor femoris luxationū differentijs, priuatim aut in singulis modus quo ossa ueste in sedē suam cōpelluntur, Græci molliam dicunt, euariat. Intensio enim homine si quidem in interiorem partem articulus exciderit, lori per regionē quæ scrotū & anum interioret, traiectione medium inter femoris caput ipsamq; regionem à scroto ad anum tendentem dispensari conuenit, referri autem lorum per inguina adiacentia & clauiculam expedit. Ad adolescens quidā duabus ulnis affectū femur, quæ crassius est, circumdatum, in exteriora ualenter extrahet. Atque hic modus inferendi aliis expeditior est, cui si articulus non cesserit, aliis quoq; utēdum, uariis quidem magis, sed hoc efficacior

efficacioribus. intendi etenim hominē super lignū grādius aut scānum oportet, in quo ēt spinæ gibbero uiciatos intendimus. Insculpētur aut per totū ferē oblongæ quædā ceu fossæ, quæ latitudinē altitudinemq; triū digitorū, non maiore habeāt, distidentes inuicē nō magis quā digitos quaternos, ut uelē iuxta extremū in ipsis resistēte, in quancunq; partem cōueniat restitatur, membrū. Per mediū autem lignū aut scamnum, aliud impingatur lignū pedalis lōgitudinis, lagonis manubrij modo crassum, ut sub hoc intētio homine, lignū mediū inter regionē à scroto ad annm porrectā & femoris caput cōsistat. Simul. n. corpus iis qui à pedibus trahūt porrigi prohibebit, eoq; ne usū quidē sæpe uenit in contraria ex superiore parte intētio: simul aut intensio quoq; homine ipsum lignum femoris caput foras propellet. ac intētio ad superius dictū modū administrabitur, præsertim pedis. Quod si ne sic quidē in sedem suam redierit, impactum lignū rectum auferri debet ex latere autem huius sit utrinque singula ligna infigentur, tanquam postes, nō minus quā pedalis longitudinis. his aliud lignum adaptabitur gradus scalæ modo, ut tritum lignorum figura H literā representet, nam paulò inferius summis, medium lignum accōmodabitur. Deinde in sanum latus iacente homine sanum quidē crus inter hos postes subter gradum quodammodo ducemus, affectum autem crus ex superiore parte super hunc ponemus, ut ipsi femoris capiti accommodetur, substrato prius ei multiplici uestimento, ne femur contundatur. aliud autem lignum mediocriter latum tantam habens longitudinem ut à femoris capite usq; ad talum subiectum pertineat, intrinsecus cruri alligabitur. Vbi iam facta est hæc intensio, aut per pistillum, ut in gibbero prius diximus, detrahete ad ima crus cum alligato ligno oportet, ut niolentia hac femoris caput in propriam sedem reuertatur. Cæterum est & alius reponendi modus sine intensione per lignum, ab Hippocrate commendatus. Manus enim, inquit, ægrotantis molliter costis alligare oportet, & pedes utroq; ualido loro molli per talos & super genu deuincire, ut quatuor digitorum spatio inuicem distent: intenso autē affecto crure duobus digiris magis quā alterum, hominem suspendere, ut caput cubitos duos à terra ab sit. Adolescens uero aliquis peritus ulnis suis femur affectum cōprehendens quā crassissimum est, ubi & caput femoris, subito pendere ex homine

mine cogetur. facile nanque articulus ingreditur. Hic reponendi modus aliis quidem simplicior est, ut qui non multo apparatu peragatur, sed ueluti miserabilem ipsum, plerique medici auersantur. Porro si in exteriora membrum fuerit laxatum, homo superius intendi debet, lorum autem iuxta regionem inter scrotum & anum per oppositas parteis ferri conuenit, inguina dico & clauiculam, medicum autem ab exteriori parte introrsum agitare iuxta conuenientem foueam ex iis quae insculptae sunt, ministro quodam uectem ad sanum clunem ne cedat, obijciente. Sin autem in priora promotus est articulus, homine inteso uir quidam ualidus dexterae manus palmam affectis inguinibus imponens, altera comprimet, simul ad ima, genu uersus constringet. At si in posteriora prolapsum est articulamentum, non opus est quidem hominem in sublime usque intendi, sed in solido iacere, quemadmodum etiam si in exteriora articulus exciderit. Sicuti autem in gibbero dicebatur, super lignum aut scamnum homo pronus intenditur, uinculis non perilia, sed in crure, ut nuper dictum est, porrectis. Iam uero uti conuenit constrictione per asserem adhibita, iuxta clunium regionem, ubi & articulus excidit. atque haec sane de coxendite ex causa foris adueniente luxata, dicta sint. quoniam uero propter copiam humiditatis, ueluti humurus, sic etiam coxa prolabitur, unctione utendum est, quemadmodum in capite ipsius comprehendimus.

De Genu articulo.

Cap. CXIX.

Genu in treis parteis promouetur, interiore in nimirum exteriorem, & iuxta poplitem. in priorem enim prolabi opposita patella prohibetur. Eiusdem igitur intentionis utentes modis, interim per manus solas, interim etiam funibus decenter deligabimus, reliquamque adferemus curationem, hoc spectantes ut particula dilutius immobilis conseruetur.

De tali articulo, ubi etiam de pedis digitis agitur.

Cap. CXX.

Tali articulus si paulum excessit, modica etiam intentione curatur: si roto loco mutatus est, uehementiore indiget auxilio. Tentandum itaque & hic per manus ualidiore intentione uti. Quod si non reponitur, homine humi resupinato extensoque, longum aliquem & ualidum palum inter

ter duo femora iuxta regionem scroto & ano interiectam humi per ima rectum defigemus, ut corpus aduersus eum renitens, ad pedis intentionē non cedat, imò prius defigetur, quàm homo decumbat. Quòd si magnum illud lignū adest, quod pedale aliud lignum per medium habere defixum diximus, super hoc intensionem moliemur, ministro uno femur cōtinente retrahenteq; alter manibus aut loro pedem trahet, medicus luxatum manibus dirigit, alterumq; pedem alius ad ima cōtinebit. A repositione deligari tutò per debet fasciis, ad superiorem pedis partem, alijs ad talum distributis, cura adhibita ne posterior tendo iuxta calcem constringatur. In hoc casu usq; ad dies quadraginta in quiete homini perseuerandū est. nam incedere ante absolutam curationem tentantes, particulam reddunt inutilem. At si quis ex saltu, ut fieri solet, calcis os peruerterit, uel etiam aliam quampiam inflammationis affectionem excitarit, blanda quadam intensione, conformatione, fomentis inflammationi contrariis, & fasciis firmis id dirigendum est, homine similiter usque dum confanuerit, in lectulo perseuerante. Cæterum digitorum peruersio, ut in manibus dicebamus, non difficulter moderata tensione emendatur. In omnibus autem luxatis peruehisq; postquàm instaurata sunt & conquerint, inflammationem in articulis, ut uerisimile est, remanentem, aut tumorem, quæ etiam diu membra à functionibus impediunt, mollientibus remedijs persanabimus, quorū materiam nullius qui in artis operibus uersatur, ignorat.

De luxatis cum ulcere.

Cap. CXXI.

IN luxatis cum ulcere multa requiritur prudentia. Dum enim hæc inferuntur, extrema pericula, nonnunquam & mortem inferunt. inflāmati enim extensione iis qui adiacent neruis & musculis, dolores ualidi, conuulsiones, & febres acutæ oboruntur, præsertim in cubiti gibbero, genu, & superpositis partibus. Nam quo principalibus sunt uiciniora, hoc maius periculum concitant. Hippocrates itaq; horū repositionem, ualentioremq; deligaturam omnino auersatur. solis autem quæ inflammationem abigunt leniuntq; præsidis, per initia uti præcipit. Sic enim ipsis superesse forsitan licebit. Quod autem ipse in solis digitis consulit, id nos reliquis etiam articulis facere tentabimus, ac inter initia statim quū pars adhuc inflammationem

inflammatione caret, prolapsum articulum mediocri intensio-
ne reponemus. quod si secundum auium institutum euenerit,
persistemus, sola ratione quæ inflammationem arcet, utentes
si inflammatio quæpiam, aut conuulsio, aut aliquid prædicto-
rum contigerit, rursus eijcere ipsos necessarium est, siquidem
citra uim porrigantur. at si hoc quoque discrimen metuamus,
(non enim porrigentur forsân inflammata) satius est per ini-
tia in maioribus quidem articulis repositione supersedere. ubi
uerò inflammatio declinauerit, (id autem sit post septimum
nonum uel diem) præfati etiam periculum, quod ex repositio-
ne futurum sit, tum quòd si non repositum fuerit, claudi omni-
no superuiuent, conabimur tutò, administrationē obire, uten-
tes, propter cōmoditatem, etiam ueste. Porro ulceris curatio-
nem ut in fracturis cum ulcere dictum est, administrabimus,

De luxatione cum fractura facta. Cap. CXXII.

AT si luxatio sine ulcere cum fractura euenerit, commu-
ni intensioe & per manus conformatione utendum
est, ut in simplicibus fracturis docuimus: cum ulcere
autem rursus, ex fracturis cum exulceratione & luxationibus
priuatim exposiris, congruam administrationem petemus.

FINIS LIBRI SEXTI IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.




PAVLI AEGINETAE

I IBER SEPTIMVS,

IOANNE GVINTERIO

Andernaco Medico Interprete.



De temperamentis, quę per gustatus qualitates deprehenduntur. Cap. I.



DE S E N S I L I V M corporum temperamento, coniecturam ex odoratu aliam quam sumere, haud est securum. Nam inodora, substantijs crassa quidē sunt, sed quanto sint calore, & frigiditate prædita non ita constat: odora uerò, & tenuia quodāmodo sunt & calida, sed quatenus id sint, neutiquā ostenditur, eo q̃ substantiā habeant inæqualem.

Multo adhuc minus ex coloribus exactē quid licet colligere, cum in singulis calida, frigida, humida & sicca reperiantur. Verum in gustatu omnes similiter particulae corporū gustabiliū, ut hoc uocabuli usurpē, linguae obijciuntur, sensumq; mouent: ut manifestò ex ipso quoq; temperamentorū uires deprehendamus. Quod igitur astringit, cogere, obturare, dēfāre, repellere, incrassare. atq; ante hæc omnia, refrigerare, siccareq; est idoneum. Acidū incidere, diuidere, extenuare, aperire, & perpur-gare citra calefactionē potest. Acre, similem acido effectū præstat, extenuando purgandōq; sed acidum refrigerando euariat acre, calefaciendo: præterea illud repellit, hoc attrahit, dissipat, rumpit, crustas inducit. Pari modo etiam amarum, meatus ex-

PAVLI AEGIN.

G purgat,

purgat, abstergit, extenuat, incidit succorum spissitudinem, si-
ne calore manifesto. Aquosum frigidum, incrassat, cogit, con-
trahit, obturat, sensum aufert, stuporemq; inducit. Salsum con-
trahit, stringit, condit, siccatur, citra insignem caliditatem frigidi-
tatem ve. Dulce laxat, concoquit, emollit, rarefacit: oleosum
humectat, emollit & laxat.

De ordine & intervallo temperamentorum.

Cap.

II.

MOderatum sanè medicamentum ita ut temperatura
ei respōdeat cui admouetur, inde quod nec siccet, nec
humectet, nec refrigeret, nec calefaciat, ipsum neque
siccum neq; humidum, neq; frigidū, neq; calidū nominare con-
uenit. Quod autē siccus est, aut humidus, aut calidus, aut fri-
gidus, à præpollente appellatur facultate. Præstat autem in
unoquoq; excessu, quatuor, quantū ad usum spectat, ordines
fuisse: calidum quidem nominantes in primo ordine quod i-
que nos calefacit, sed non euidenter, ut illius rationali quadā
demonstratione indigeat. Simili ratione, frigidum, & siccum,
& humidum quodcunq; demonstrationem requirat, nondum
actionem ualidam neq; euidentem fortitum. At quæ manife-
stò iā siccare uel humectare uel calefacere uel refrigerare pos-
sunt, ad secundum huiusmodi ordinem referuntur. quæ uehe-
menter iam sed non summè id faciunt, tertio annumerantur.
quæ uerò sic calefaciunt ut crustas inducant, quarti sunt ordi-
nis. similiter quæ refrigerant, ut iam sensu priuent, hæc quoq;
ad quartum relegantur. Porro siccus medicamentum nullum
est inuenire quarti ordinis, si non utat. Nam si quod summè
exiccat, id planè urit: huius notæ sunt, chalcitis, misy & calx.
Tertij uerò ordinis siccantium potest aliquod esse etiam non
urens, quemadmodum quæ uehementer astringunt omnia, è
quorum numero est omphacium, rhus, & alumen.

*De particularium simplicium medicamentorum
facultatibus.*

Cap. III.

Abrotanum.

ABrotanum & calefacit & siccatur in tertio abscessu, di-
scutiendi incidendiq; facultate præditum, modicè uerò
astringit, totiūq; corpori cum oleo infricatum, rigores
circuitu remeantes persanatur, stomacho minus amicum est. cre-
matum

matum maiores in siccando uires acquirit, quàm quòd ignem non est expertum. Capillorum defluuia quas alopecias uocant cum tenui quodam oleo inunctum explet.

Agallochum.

A Gallochum, lignum est Indicum Thuix ligno similæ, odoratum. Mansum animæ suauitatem commendat. Item in suffitum adhibetur. Radix eius pota drachmæ pondere, flaccidum ex superflua humiditate stomachû resolutum, q; cõfirmat. Ad hæc iocinorosis, dysentericis, pleuriticisque opitulatur.

Agaricum.

A Garicum radix est, in arboris trûco prognata, corpore fungoso, quæ ex aëria terrestriq; substantia coaluerit, uis eius est discutere & crassos humores incidere. Viscerum maximè obstructionibus purgando medetur.

Ageraton.

A Geraton uim habet discutiendi, & leniter etiam inflammationem quodammodo arcet.

Agnus, qui uitex dicitur.

V itex qui græcè agnus uel lygos appellatur, in tertio ordine tum calefacit tû siccatur, substantia tenuis est, eoq; flatus abolet, castitati conseruandæ facere creditur, non modo cõmanducatus potusq; uerùm etiam in cubitû substratus. Semen ipsius etiam iocinoris & lienis infarctus liberat epotum. Frixû autem minus est flatulentum, & facilè in membra distribuitur.

Agrestis, gramen.

G Ramen Parnasi admodû utile est. Siccatur & modicè refrigerat: tenuiumq; partium & subacerbû existit. eoq; cruenta uulnera glutinat: Decoctum eius calculos confringit.

Anchusæ quatuor.

Q uatuor sunt anchusæ, non eiusdem omnes facultatis. Nam onocleæ appellatæ radix astringendi uim habet & quiddam subamarum, ad lienis renumq; dolores efficax, cataplasmatibus autem modo cum polentis applicata erysipelatis succurrit: folia minus radice refrigerant desiccantq; hinc ad alui profluuiû bibuntur. Quæ dicitur lycopsis, astringens quodammodo efficacius, similiter erysipelatis conuenit. Onocelos uerò seu Alchibiadios nuncupata medicatio quodammodo,

uiperarum morfibus succurrit forma cataplasmatidis adhibita, alligata, & comesta. Quarta omnibus alijs breuior, sine nomine propemodum, maiore quàm Alcibiadios, amaritudine donata: latis alui lumbricis instar acerabili pota benefacit.

Adarce.

A Darce ueluti spuma quædam est aquæ sanæ in cremis & arundinibus concreta, tantum uerò acrimoniæ habet & caloris, ut extrinsecus cum alijs imposita ferè urat. intrò eam assumere nulli licet.

Adiantum.

A Diantum siccatur, extenuatur, & modicè discutitur, calore ac frigidityte medium quodammodo est: Alopecijis igitur medetur, tumores discutit, calculos potu confringit, è pulmone reiectiones desiccatur, alui profluuium sistit.

Aizoon, semperuiuum.

S Emperuiuum duplex, refrigerat quidem ex tertio abscessu, desiccatur autem alstringitq; mediocriter. Hac ratione igitur ualet erysipelatis, & ad herpetas inflammationesq; ex fluxione concitatas conuenit.

Aetonychon.

D E Aetonycho in capite de lapibus pertractabitur.

Athera.

A Thera pulicula est sorbilis è zea molita, aut è frumento confecta infantibus accommodatur. Item cataplasmatidis uice illinitur.

Aegilops.

A Egilops discutiendi facultate prædita est, unde etiam indurescentibus inflammationibus & ægilopi quæ oculorum fistula est, opitulatur.

Aegiros. populus nigra.

P Opulus nigra in primo ordine calefacit, modicè siccatur, & tenuis est substantiæ, cuius folia cum aceto cataplasmatidis instar applicata, podagricos dolores sopiunt. Quæ uerò ex ea distillat resina, floribus calidior miscetur acopis: & malagmetis, fructus cum aceto potus comitiales auxiliatur.

Aedæon, hoc est pudendum masculi cerui.

P Vdendum cerui masculi siccatur tritumque ex uino potum,

tum, uiperarum moribus subuenit, miscetur autem compositis remediis.

Aethale, fuligo.

Aethale & lygnys in litera L. exponetur.

Aethiopis.

Aethiopis similia uerbasco habet folia, radice decoctum, potu datur ischiadicis, pleuriticis & sanguinem reijcientibus, & arteriæ asperitates cum melle lenit.

Aima sanguis.

Sanguis frigidus nullus est, uerum suillus, humidus est, & minus calet, humano maximè temperamento similis. Columbarum uero, palumbi & turturis, temperatus quodammodo, oculorum liuores ex ictu, hyposphagnata dicunt, medicatur, si calidus instilletur. Item crassiori cerebri membranæ infusus, in his quorum calua perforata est, inflammationem arcet. Notuæ sanguis cum uino, aut aqua potus, spirandi difficultatem adiuuat. Vespertilionum, uirginum māmillas tuetur, & pilorū incrementa illitum prohibere dicunt. Similiter sanguis ranarū, chamelæontis, & ricinorum qui in canibus hærentes inueniantur, sanguis facit. Galeus autem hæc facto rei experimento falsa esse pronunciat. Caprarum uero siccitatis nomine aquas cutem subeuntes cum melle potus iuuat, renumq; calculos cōterit. Gallinarum cohortalium sanguinis ē cerebri membrana profluua coercet. Agninus comitalibus prodest: hædinus nuper coagulatus circa heminx dimidium cum pari aceto contra cruentas pectoris excreationes bibitur. Vrsorum, syluestriū caprarum, hyrcorum, & taurorum, abscessus maturare fertur, Terrestris crocodili, oculorum claritatem efficit. Equarum quæ sunt expertæ admissuram, remediis exedentibus, ΣΑΡΤΗΝΑ Græci uocāt, admiscetur. Antidotum ex sanguinibus quod in lethalia medicamenta efficax est, anatis, hædi, & anseris, sanguinem recipit.

Aera, lolium.

Lolium calore & siccitate ad tertium ferè ordinem pertingit, iridi facultate simile.

Acacalis.

Acacalis fruticis, in Aegypto nascentis fructus est, cuius dilutum collyriis claritati oculorum efficacibus miscetur.

Acacia.

A Cacia tertii quidem desiccantium ordinis est, primi uero refrigerantium, at si elota fuerit, secundi. Est autem acerbata & terrestris.

Acalyphe, urtica.

U Rticæ & fructus & folia tenuem habent substantiâ, citraquæ rosionem siccant, tumores discutiunt, abstergunt, uentris subducunt, mediocriter flatulenta, quare et ad uentrem incitant.

Acanthus.

A Canthum alii à nigro colore foliorum melamphillo appellant, alii pæderoten, nis eius est discutere & siccare.

Acanthium.

A Canthium tenui calidaque natura præditum, conuulsis auxiliatur.

Acantha leuce, spina alba.

S Pina alba radicem siccantem & modicè astringentem obtinet, eoque & stomachicis, & sanguinem expuentibus, dentiumque doloribus succurrit: semen tenue calidumque est, quia uiconuulsioni quoque medetur.

Acantha, id est, spina Aegyptia, uel Arabica.

S Pina Aegyptia, secundum alios Arabica, astringit siccataque impensè, unce & sanguinem, & alias defluxiones retinet.

Acinos.

A Cinos ocymo similis, mediocres astringendi vires habet, ideoque aluum & menses pota sistit, applicata uero panos & sacros ignes persanat.

Aconitum.

A Conitum, quod quidem pardalianches dicitur, exedentem lethalemque uim habet, quam ob causam intro non assumitur: extrinsecus tamen in carnibus quas exedi oporteat, uti licet. quod uero à lupis lycoctinon dicitur, similes priori vires fortitum, priuatim lupos, ut illud pantheras enecat.

Acoron.

A Coron in tertio abscessu calefacit & desiccet, radice ipsius ad ciendam urinam, lienisque scirrhum utimur: cæterum membranæ oculorum, ob cornus similitudinem ceratoidis dictæ, crassitiem extenuat.

Acrides, locustæ.

LOcistas urinæ angustis præsertimq; mulierum, odoris suis-
fitu profunt. At quæ alis caret, contra scorpionis morsus
cum uino salutariter bibitur.

Atte, hoc est, sambucus. & chamaatte, id est, ebulus.

SAmbucus, & ebulus qui chamaactæ dicitur, quasi humilis
sambucus, uterque desicandi facultatem obtinet: modicè
discutit & conglutinat, potus autem & manducatus, aquâ per
aluum educit.

Als, sal.

SAl quilibet uim habet uehementer siccam & astringentem
unde quicquid in corporibus humidum est, id omne depa-
scit, reliquum astrictione leuiter contrahit, qua ratione ad con-
dimenta omnia adhibetur, putredinemq; arcet: crematus ue-
ro sal magis discutit.

Althæa.

ALthæa seu ebiscus species est malux syluestris, uis eius di-
scutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phymata con-
coquit, radix autem & semen reliqua sanè intensa habet, uerû
exerit etiam uitilignes abstergitq; præcipuè autem semen
calculos quoq; confringit.

Alimon.

ALimon dissimiliariū partiū est, salsum gustu & leuiter astring-
ens, maxima ipsius pars calore temperata cum humidita-
te insuperabili est, lactis itaq; & seminis ubertatem conciliat.

Alcaa.

ALcæa syluestris malux & hæc genus est, in uino pota in-
testinorū torminibus & erusionibus medetur, multo ma-
gis ipsius radix.

Alcyonium.

ALcyonij genera omnia quidem abstergunt discutuntq;,
Acri qualitate prædita, sed milesium (est autem uermiculū
purpureumq;) cæteris præstat: quare combustum, pilorū de-
fluuiâ, quæ alopeciæ dicuntur, impetigines, uitilignesq; abster-
git. Porro, q; in superficie lauiorem habet & uehementer acre-
est, nō modo abstergit, uerum etiam excoriat. Postremò, quod
lanis succidis respondet, omnium est imbecillimum.

Alme, quæ muria dicitur.

MVria nulli alteri miya substantiæ, similes habet salis vires, sed imbecilliores aqua cōtemperata: at salforum piscium oliuarumq; colymbadum muria ualentius abstergit, contra intestinorum tormina & coxendicum dolores clystere iniicitur.

Aloe.

ALoe calefacit in primo, siccatur in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq; aluū subducit, lota uero minus detergit, sed stomacho gravior est, inflammationem prohibet, & ulceribus cicatricem inducit, præsertim sedem & naturalia infestantibus.

Alos Anthos, id est, salis flos.

FLos salis liquidum est medicamentum sale concremato tenuius, acre, & abundè discutiens.

Alos achne, id est, salis spuma.

Salis spuma lanugo salis spumosa est, tenuior quidē illo magisq; discutiens, sed minus contrahit.

Alfine, auricula muris.

Alfine, quam alij muris auriculam uocant, uim habet helixinæ similem quæ refrigerat humectatq; quapropter ad feruentis inflammationes conuenit.

Alypon.

ALypi semen bilem atram per inferiora purgat pari epithymio mensura sumptum cum sale & aceto, ueruntamen intestina leuiter exulcerat.

Alysson.

ALysson quod à cane rabido morsos iuuat, sic appellatum. Est, cæterum siccatoria, discussoria, absterforiaq; ui præditū, renum meatus aperit, ephelidem, quæ aspera discolorq; cutis est, exurit.

Alopes, uulpes.

Vulpes uiua aut mortua, tota in oleo decocta, discutiendū uim oleo conciliat, aded ut humores altè fixos in cutē extrahat hinc articularij in solio eo repleto diutius immorari, incipientem quidem affectum finierunt, inueteratū uero moderatiorem reddidere.

Amaracus.

A Maracus tertio in ordine calefacit, secundo desiccatur.

Amarantus.

A Marantus extenuat, incidit, mensis cum uino potus educit, sanguinis grumos dissoluit cum mulso omneisque fluxiones desiccatur, stomacho inimicus.

Ambrosia.

A mbrosia cataplasmatibus modo imposita uim habet astringendi repellendique.

Ami.

A mi ad tertium calefacientium siccantiumque ordinem refertur, tenue, discutiens, & urinæ mouendæ efficax, semen ipsius longè utilissimum est.

Amiantum.

A miantum in Cypro nascitur alumini scisso simile, quod in ignem coniectum accenditur quidem inflammaturque, sed non cōburitur, utuntur eo nonnulli in desiccantibus psilothris.

Ammos, arena.

A rena littorū maris affatim desiccatur, seruata Sole aqua subter cutem exhaurit, corporibus hydropicorū in ea cooperitis: torrefacta autem ad neca fomenta in salis, & milij uicem adhibetur.

Ammoniacum thymiana, quod latinis ammoniacum suffimen, & ammoniaci gutta dicitur.

A mmoniacum thymiana liquore est tanta molliendi uirtute præditus, ut scirrhos & tophos discutiat.

Amurca.

A murca secundi calefacientium siccantiumque ordinis est, eiusque intensi, hac etenim ratione ulcera in siccis quidem corporibus curat: in aliis autem intendit, irritatque.

Ampeloprasum, agreste porrum.

A mpeloprasum, seu porrum sylvestre acerrimū est calidissimumque in summo ordine, quamobrem etiam exulcerat, inciditque, uiscerum meatus recludit, stomacho inimicum.

Ampelos agria, uitis sylvestris.

V itis sylvestris racemi & germina ipsa abstergendi facultate pol-

te pollent, item non nihil astringens obtinent.

Ampelos humeros, uitis sativa.

Vitis sativæ facultas respōdet sylvestri, sed imbecillior est.

Ampelos leuce, uitis alba, quæ & bryonia dicitur.

Vitis albæ, quam & bryoniam & psilothron appellant, germina sanè ceu stomacho grata eduntur, urinæque ciendæ sunt, radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida, unde fit ut lienes etiam potu consumat, extrinsecus autem cū ficis applicata scabiei & lepræ medetur.

Ampelos melana, uitis nigra.

Vitis nigra, quæ & ipsa bryonia nuncupatur, superiori confimilis est, nisi quòd inefficacior.

Amygdala.

Amygdala quæ quidè amara sunt extenuant, viscosos crassosq; humores altius hærentes euellunt, tum cutis vitia abstergunt: arbor eandè uim repræsentat: dulcia uero amygdala moderato calore donata sunt.

Amylon.

Amylon ex puro tritico aqua sub caniculæ æstu macerato conficitur, quæ (aquam dico) quinquies in die mutatur: quum autem tenerrimum euaserit, colo traiecta aqua quâ superfuderis, furfures secernere siccareq; ad solem oportet prius antequam acescat. Cæterum uis eius est refrigerare mediocriter, & siccare, & acria lenire.

Amomum.

Amomum acoro uirtute, respondet, sed hoc quidem siccatur magis: illud autem expeditius concoquit.

Anagallis.

Anagallis utraq; uim habet abundè abstergentem subcalidam quoq; nonnullam & attractricem, ut etiam aculeos euellat, item succus ipsius naribus instillatus caput purgat.

Anagyris.

Anagyris frutex est grauis odoris, acrisq; calefacit & discutit, semen tenuius, & uomitui ciendo est.

Andrachne, portulaca.

Portulaca tertio quidem abscessu refrigerat, secundo autem humectat,

humectat, qua de re etiam caufone laborantes uentriculo imposita, iuuat, & fluxiones repellit, lentore suo dentium stuporem ex acidis contractum corrigit: ob astrictione uero, & intestinorum tormina & sanguinis profluvia coerces.

Androsamon.

Androsæmi duplex genus est, alterum ascyrrhon uel ascyrrhoides nominatur specie hyperici, alterum dionysias, semen ipsorum purgat, folia autem magis desiccant.

Androsarces.

Androsarces amara acrisq; herba est uis eius est discutere & desiccare potum ipsa, tum semen ipsius urinam promouet.

Anemone.

Anemonæ omnes uim habent acrem absterforiamq; item extrahendi, & oris uasorum recludendis, idonea qua pituitam illiciunt, lepras tollunt appositu, & lac in mamas suggerunt.

Anethum.

Anethum calefacit in secundo ordine intenso siccatur paulo remissius, quod in oleo excoctum discutit, dolorem sopit, somnum conciliat, & crudos tumores maturat, uisum tertii calefacientium siccantiumq; ordinis efficitur, ex humiditate nimia flaccidis ulceribus applicatum confert: uiride autem humidus minusq; calidum est, & concoquit.

Anthyllis.

Anthyllis duplex quidē est, sed utraq; ulcera persiccat, quæ chamæpityi respondet, tenuior est, quare etiam comitialibus competit, cæterum efficacius eadem abstergit.

Anisum.

Anisi semen acrius est, in tertio abscessu calefaciens, siccaturq; hinc utiq; & urinam mouet, & flatu discutit.

Antirrhinon, uel anarrhinon.

Antirrhinon siue anarrhinon persimile inguinarum uim obtinet, sed minus efficacē, atq; ex illo hoc quoq; cognosces.

Anonis, uel ononis.

Anonis siue ononis calida facultate est, præsertimq; eius radix, cuius succus cum uino potus urinam ducit, calculos conterit, crustas rumpit & dentes mitigat.

Aparine

Aparine.

AParine, quam alii philanthropon, alii omphacocarpon appellant, modicè abstergit & desiccatur, item tenue quippiam in se continet.

Apios, pirus.

APios tēperatura inæqualis est, terrestre aliud sortita, aliud aquosum ob quod manducata stomachum iuuat sitimque arcet, ad mota uero forma cataplasmatum, siccatur refrigeratque mediocriter.

Apocoon, aut cynocrambe, canina brassica.

APocoon aut cynocrambe, dicitur autem & cynomoron quod celerimè canes enecet, eademque ui maleficium & lethalis homini est, scedi admodum odoris, & calida citra siccitatem unde etiam discutiendi facultatem applicata repræsentat.

Pochyma.

APochyma pix est uetus quæ à nauigijs deraditur, tumores diffundit, siccatur & discutit.

Arachne, araneus.

ARaneus cum emplastro subactus, impositusque fronti, & temporibus tertianarum febrim circuitus finit, ut Dioscorides memoriæ mandauit, tela ipsius applicata sanguinis fluores sistit, & ulcera in summa cute ab inflammationibus tuetur.

Argemone.

ARgemonæ facultas est abstergere simul & discutere.

Arisarum.

ARisarum mulro breuius est aro, acriusque, radicem oliuæ magnitudine obtinet.

Aristolochia, malum terræ.

ARistolochia omnis calida, tenuis, abstergens, amara, & subacris, ad medicinas utilissima. At Rotunda, tenuior, & in omnibus efficacior est. Clematidis hoc est sarmentacea, odorata quidem, sed imbecillior. Longa uerò præter alia, media harum est, sed non minus calida, quam rotunda.

Arceutos, Iuniperus.

Iuniperus calefacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidem similiter, sed in primo gradu siccatur.

Arction

Arction.

ARction, prosopites, folia habet cucurbitæ similia, maiora autem & duriora, discuti quidem siccatur, & astringit, quapropter & folia ipsius uetusta ulcera perosanant.

Arction.

ARction uerbascum simile est, radicem habet teneram, candidam, & dulcem, uis eius est tenuis, siccatur, & mediocriter astringens.

Armeniacum.

ARmeniacum, uim habet absterforiam simul cum modica acrimonia & minore astrictione, hinc etiam oculariis, medicinis miscetur, & augendis palpebrarum pilis usum habet.

Arnabo.

ARnabo, odoramentis adnumeratur, ob quod unguentis potissimum expetitur, calida siccaque potentia præditum in tertio ordine, cassiæ & carpesio simile, unde Posidonius ubi cinamomii copia non datur, hoc utendum esse censet.

Arnoglossum, plantago.

Plantago refrigerat pariter & desiccatur in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam astrictiōis nonnihil adit, quare ad maligna ulcera, fluxiones, putredinesque, temperamenti moderatione accommodata est, sanguinis quoque profluvia cohibet & plurimis congruit, etenim siccitatis quæ nequaquam rodit compos est, & frigiditatis quæ nondum stuporem inducit.

Aron.

ARon calore & siccitate primi est ordinis, ex terrestri calida & absterforia substantia & hoc generatum, radices ipsius calidiores sunt dracunculus autem efficacior.

Arsenicum, auripigmentum.

ARsenici uis est caustica, utuntur eo & in pilis abolendis, quod si diutius adhæserit, etiam cutim ipsam attingit, uisum uerò tenuius redditur.

Artemisia.

ARtemisia utraque secundo in ordine calefacit, siccatur in primo, tenui substantia prædita, eoque renum calculos commiuit, & uteri fomentis accommodatur.

Artos, panis.

PAnis illitus magis discutit quàm triticum, ceu & salis & fermenti particeps. Nam ad extrahendum ea quæ altè hærent, fermentum idoneum est.

Asarum.

ASarum similem acoro uirtutē habet, sed magis intensam.

Asbole, fuligo pictorum.

Fuligo qua pictores utuntur, ex uitrarijs officinis sumitur, uim habet discutientem, adeoq; acrem, ut & urat, & exedat, cæterum fracta cum rosaceo cerato ad cicatricem perducit.

Ascalabotes, stellio transmarinus.

AScalabotes animal ad reliqua sanè inutile est, sed scorpiorum ictibus impositum opitulari ipsum tradunt: expetitur etiam naturalia intendentibus medicinis.

Asclepias.

ASclepias calida, sicca, & tenuis substantiæ, torsionibus cum uino pota competit, uenenatorum autem moribus & maleficis mammarū muliebrumq; locorū uitij applicatur.

Ascyrrhon.

AScyrrhon in adrosæmo expositum est.

Aspalathus.

ASpalathus dissimili constat uirtute, acri & astringēte, & ob utramq; siccatur, idcirco & putredini, & fluxionib. utilis est.

Asparagus.

ASparagus petræus, aut myacanthinus abstergit utiq; sed calore, & frigidityate medius est, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen. Itē dētiū doloribus medetur.

Asplenon.

ASplenon tenue quidē est uirtute, non tamē calidū, hac utique ratione, & calculos confringit, & lienes consumit.

Aslaphis, uua passa.

ASlaphis domestica sanè concoquit simul & astringit, & leuiter discutit, syluestris autem acris adeo est, ut pituitam per os educat, & uehementer abstergat.

Aster atticus, siue inguinalis herba.

ASter atticus, quam alij herbam inguinalem uocant, ob hoc ipsum

ipsum quodd non tantum emplastri modo imposita, uerum ad-
alligata etiam bubonibus prodesse creditur, mixta est uirtutis,
discutientis, & refrigeratoriæ.

Astragalus.

Astragalus frutex est exiguus cuius radices astringunt, ipse
non ignauiter desiccatur: ulcera itaque uetusta ad cicatricem
perducit, & aluum fluentem radix in uin pota sistit: plurimus
in Phæneo Arcadiæ nascitur.

Asphaltus, bitumen.

Bitumen siccatur, calefaciturque in ordine secundo, quare ulce-
ra cruenta glutinat.

Asphodelus, hastula regia.

Asphodeli radix uim habet detergentem discutientemque,
concremata autem ipsius cinis calidior, siccior, & tenuior
euadit, quo fit ut alopecij medeatur.

Atractylis.

Atractylis seu enicum syluestre ex spinosorum genere ha-
betur, ui siccante, & mediocriter calida.

Atriplex.

Atriplex humectat sanè in secundo, refrigerat in primo or-
dine, qua de causa etiam uetrem celeriter permeat: semen
ipsius ui pollet absterforia, unde ictericis ex iocinoris obstru-
ctione accommodatum est.

Aphace.

Aphace lenticulæ modo astringit, sed māducata ægrius con-
coquitur, ualentius siccatur, mediocriter calefaciens.

Aphronitrum.

Aphronitri uis est discutere & abstergere, ut non solum for-
dida exterat, sed etiam pruritui, quippe saniem dissipat, me-
deatur, potum uerò stomacho nocet.

Aphros, spuma nitri.

Spuma nitri proximam nitro facultatem obtinet, sed tenuior
substantia, ob quod & læuis, farinæ, modo existit.

Achras, pirum agreste.

Pirum agreste eandem piro domestico uirtutem habet, sed
magis intēsā, quæ propter magnis uulnerib. glutinādis est.
Absinthium.

Absinthium.

Absinthium calidum primo abscissū est, siccum tertio, astringenti, amara, & acri simul donatum qualitate: qua biliosos in uentriculo humores per aluum & urinas inanit: quibus autem pituita redundat, hos propter astringentem nihil iuuat: succus ipsius, herba multo calidior est.

ENUMERATIO EORVM QVAE

AB INCIPIUNT.

Balanus myrepfica, glans unguentaria.

Quod intra unguentariam glandē ueluti carnosum est, abstergēdi incidēdiq; cū astringentia uim habet, eamq; ob causam drachmæ unius pondere cum mulsā pota, faciliē uomitiones ciēt, & inferiorem uentrem subducit, cum posca uerō ad uiscerum obstructions conuenit: item cutis uitia cum aceto perunctum abstergit cortex uerō ipsius ualdē astringit.

Baccharis.

Baccharis odorata est herba similis cinamomo, coronaria & acris: huius radicis decoctum meatus obstructos aperit, urinam & menleis citat, folia ipsius quum sint astringentia, fluxionibus opitulantur.

Balaustium.

Balaustium, syluestris punice flos est, ualidē astringens, sicca & frigida facultate præditum, itaque summæ cutis ulceræ ad cicatricem perducit, & fluxiones cohibet.

Balsamum.

Balsami, quod ueluti lignū est, siccatur & calefacit in secundo ordine, subtilēq; habet substantiā, liquor aut multo tenuior est, fructus proximē hunc uirtute accedit, sed minus tenuis est.

Ballote, marrubium nigrum.

Ballote quā alij marrubiū nigrū dicūt, acris est & absterforiæ facultatis, impositū cū sale rabidi canis moribus medetur.

Batus, rubus.

Bati fruticosum, abūdē astringit & siccatur, quæ de causa & uulnèra cōmittit, & defluxiones sistit, radix autem præter astringentia, non parū etiā subtilis est, unde renū calculos cōfringere est

re est idonea fructus si maturus est, magis calefacit, simulq; me-
diocriter astringit, ac ideo, cibo idoneus est, immaturus autem
& acerbus est & ualide siccatur, præsertim, retorridus. Eadem
etiam flos efficit.

Batrachion, ranunculus herba.

Ranunculi quatuor sunt genera, omnia excellenter calida,
sicca, acria, urentia, adeo ut ulcus cum dolore excitent: qui-
bus si modice utaris, cutis uicia tantum exterunt, radix autem
arida sternutamentis ciendis est medicamentum.

Batrachi, rana.

Ranae aduersus uirulentorum morsus in iusculo eduntur. Cræ-
matarum ranarum cinis maxime siccans redditus, sanguinis
eruptiones sistit & alopeciiis cum pice liquida medetur.

Bdellium.

Bdellium tum Scythicum tum Arabicum scirrhus emollit,
præsertimq; recentes, Arabicum uero urinæ ciendæ est, cal-
culos comminuit, & cruda concoquit.

Betonica.

Betonica herba est ramulis exilibus pulegio similibus sed te-
nuioribus, & propemodum si gustes, nullam qualitatem refe-
rentibus. Nasciutur potissimum locis petrosis, qua & in renu medi-
cinis utuntur. Est autem apud Romanos alia quedam betonica
dicta, quam Dioscorides nominat cestron, alii uero psychotro-
phon, eod q; frigidis locis gaudeat, nihil simile cum prædicta habet
præter actionem: at ultra quod urinam ciat, etiam aliis multis bene-
facit, potissimumq; radix ipsius, cum hydromelite pota uomiti-
onem mouet, folia autem aluum subducunt.

Bechium tussilago.

Tussilago, quæ Græcis bechion siue bechion inde dicitur,
quod tusses & recta ceruice spirantes, suffitu iuuat, constat
ex calida aquosaque substantia.

Blitum.

Blitum esculentum olus est, humidum frigidumq; in abscessu secundum.

Bulbus.

Bulbus esculentus amari simul & astringentis modice compos-
est, siccatur glutinatque uulnera, & abstergit. Qui autem uo-
mitum cit, calidiorem quam alter repræsentat.

Botrys.

Botrys, quam alii ambrosiam, alii artemisiam dicunt, planta est insigniter odorata, hæc cum uino pota, subrepta ceruicæ spirantibus quos orthopnoicos appellant, succurrit.

Bubonium, inguinalis herba.

Bubonium in attico altere dictum est.

Buglossum, lingua bubula.

Buglossum humidum calidumq; temperamento est, eamq; ob causam uino iniectum lætitiæ animi conciliare dicitur.

Bunium.

Bunium quod alii arction appellā, calidū est, urinæ & mēstris educēdis accommodatū, huic respondet & pseudiobunium.

Buprestis.

Buprestis animalculum est cantharidi simile, reponitur itaque sicut & illa.

Butyrum.

Butyrum concoquit & modicè discutit, in teneris corporibus, bubones igitur & parotides iuuat, gingiuas extenuat, & præsertim in infantibus dentientibus, item humores in pectore fixos, linctum concoquit.

Buphthalmon.

Buphthalmon similem habet chamæmelo florem, sed multo maiorem acrioremq; ideo & discutientem, adeo ut cerato mixtum duricias remolliat.

Brathy, herba Sabina.

Sabina, cupresso similis calefacit siccataq; in tertio ordine, tenuissimaq; est, extenuat & discutit pota, tum in putredines cupresso similiter efficax est.

Britannica.

Britannica astringit & conglutinat, syluestri lapathio specie similis, succus ipsius putredines os infestantes per sanat.

Bromus auena.

Auena similem hordeo obtinet facultatem, siccata autem & modicè citra, corrosionem discutit, iam & nonnullius astrictionis compos est, unde & alui profluvii subuenit.

Bryonia.

Bryonthalassion, muscus marinus.

Muscus marinus, refrigerat simul & astringit, eoq; feruentibus inflammationes cataplasmate admodum, iuuat.

Bryon, muscus.

Bryon, quod alii splanchnon dicunt, in quercubus & populis albis, piceisq; inuenitur, discutiendi simul & molliendi uim moderatam obtinet potissimum quod cedris adhæret.

Bryonia.

Bryonia dicta est uitis alba.

Initium literæ G.

Gala, lac.

Lac omne tribus constat substantiis, caseosa, serosa, & pingui, quam copiosissimam bubulum obtinet, unde etiam butyrum efficitur. Serum ipsius uim habet abstergendi, unde & aluum subducit, si ipsum per decoctionem secernas. id uerò quod caseum refert & crassum est, magis obstruit, atque ideo acrimoniam obrundit: coctum uerò lac aut marinis calculis ignitis in ipsum iniectis, aut alio quodam modo, præsens fit remedium dysenteriae, & acrium in uentrem defluxionum. Cæterum lac totum ad acres oculorum fluores, aliasque acrimonias conducit. At temperatissimum lac, muliebre est, mox caprillum, hinc asininum, ouillumque, postremo uaccinum.

Gale, mustela.

Mustelæ concremata cinis abundè discutit, ex aceto igitur illitus podagricos, & articulares dolores iuuat: inaresceta autem in ueteraq; mustela comitialibus auxiliatur.

Galion.

Galion à coagulando lacte dictum est, a parinæ simile, siccan di uim, mediocremq; acrimoniam habet: flos eius ad sanguinis eruptiones & ambusta, congruit.

Galopsis, uel galiopsis.

Galopsis, quā alij galibdolon appellant, urticæ similis herba est, lauior aut, & fædi odoris, scirrhosos tumores dissipat & emolli, ite ad ulcera serpentina facit in cataplasmate imposita.

Garum.

Garum calefacit exiccatq; efficaciter, ac id eo aduersus ulcera

ra putrida extrinsecus eo utitur, præterea contra intestinorū tormina & coxendicis dolores ex partibus inferioribus iniiciunt.

Genciana.

Gentiana radix efficax admodum est extenuare, perpurigare, abstergere, & meatus infarctos aperire.

Geranium.

Geranium id quod foliis respōdet anemonæ, radicem habet esculentā, quæ cū uino drachmæ modo pota uteri inflatio nes dissoluit. altera geranii species ad medicinam inutilis est.

Ge, terra.

Omnis terra desiccatur, quæ uero alterius substantiæ expers est, etiam sine morsu id facit. at si ignea quædam ipsi qualitas admixta sit lotione hanc quoq; deponit. Inter cultas igitur terras quælibet pinguis omnium particularū quæ siccare possunt curationi accommodata est, Aegypto igitur luto utuntur contra aquas cutē lubeantes, & lienosos affectus, item ad fungosos laxosq; tumores euidenter proficit. Ex terris medicatis lemnium miniū, quæ sphragis dicitur, siccat pariter & astringit mediocriter, contra lethalia medicamenta præsentis antidoti vires habet, ulceribus malignis cum aceto aut uino medetur, sanguinis profusione quamlibet sistit, & depascentē dysenteriam intestino mulla prius, deinde muria per clysterem eloto, coercet. Miniū rubricū uehementius, quàm lemnii obstruentibus quæ emplastica dicuntur, miscetis medicinis, & pota lumbricos interimit, sed multo lenior est. Samia quàm Lemnia terra, ceu glutinans & uiscosa, quare utendū ea est in his quæ leniri oporteat & sanguinis reiectiones, quacunq; ex parte fiāt, compefcit. Selenusia & Chia maiore abstergendi uirtute pollent, ideoq; mulieribus ad nitorem cutis & læuorem in facie utilis est, ulceribus carnē & cicatricē inducit, præsertim ambustis. Cimolia mixtæ facultatis est, refrigerantis discutientisq;, idq; illota lota uerò magis refrigerat, & ambustis ex posca medetur. Ampelitis, est autē ea quæ uiribus inungitur, quod innascentes ipsi uermes enecat, siccat & discutit egregiè citra erosionem, Cretica, aëria est, & sine rosione abstergit. Eerethrias euidenter astringit, cōcremata uerò & elota sine rosione desiccatur, præstantior uerò est cinerea, Pnigitis similes cimoliz vires repræsentat, sed colore nigrescit. Aruënia, quæ etiam bolum nominant,

nant, summè desiccant, unde dysentericis,alui fluxionibus,putro cruento,tubi,spiritus difficultati ex humiditate, ulceribus humidis,& pestilentialibus uitiiis strenuè opitulatur. Cæterum cum uino tenui diluto bibitur: si febris adsit,cum aqua. Alana autem gleba Armeniæ uim obtinet. Ochra uim habet discutie di exedendiq;,reprimat igitur supercrescentia ulcera,& caua cum cerato mixta replet.

Geras,seneſta,anguis.

Seneſta anguis affatim siccatur: aceto igitur subseruescitur,denſum doloribus medetur. Aspidis exuium cum melle tritu delitumq;, oculorum aciem maximè iuuat.

Ges enteræ,terræ intestina, seu uermes terreni.

Lumbrici terræ detriti neruorum uulneribus impositi,repente,cuestigio mirabile adferunt præsidium.

Gigarta,nuclei acinorum uua.

Nuclei acinorum uua,desiccant ordine secundo, refrigerant primo,quum itaq; abundè sint acerbi omnibus alui uitiiis fluidis,conueniunt.

Gingidium.

Gingidium calorem non adeo manifestum fortitum est,cæterum siccatur in abscessu tertio,& astringit,qua de causa& stomacho utile est.

Glaucium.

Glaucium astringit, sed ita ut etiam nonnihil gustanti sit ingratum,manifestè refrigerat,eaq; ui erysipelatis non tam ualidis succurrit.

Glaux.

Glaux herba calida & humida temperamento est, unde ad lac generandum efficax est.

Glecon,pulegium.

Pulegium calefacit,& extenuat uehementer, unde si cataplasmate applicetur ruborem excitat,& crassos uiscososq; humores è thorace & pulmone emolitur.

Glæos,sordes balneorum.

Sordes balneorū calefaciunt modicè,emolliunt,discutiunt,ſrhagadibus ani & condylomatis accommodatæ.

Glycyrriza dulcis radícula.

Glycyrriza tepidi humidique temperamenti est, alicuius etiam astrictiōis particeps, unde & asperitates læuigat, nō artēriarū tantū, sed etiam uesciæ scabiei medetur, eadem sicim arcet.

Glycyfide, pæonia.

Glycyfide quam alii pentameron, nonnulli pæoniam uocant, radicem habet acrem & leuiter subamaram & siccantem, cui etiam astrictiōis nonnihil inest, quapropter mensēis ciet, renes & iecur purgat, instar amygdalæ pota cum uino: at si hoc austerum fuerit, alui quoque fluores coercet, ad alligata uerō puero, morbum comitiale abigit.

Gnaphalium, centunculus.

Centunculus dictus est gnaphalium quod folijs ipsius tenebris loco tomenti, gnaphalon dicitur, utamur. sunt autē calida & modicē astringentia, atque hinc ad dysenterias cum uino austero bibuntur.

Gongylis, rapum.

Rapi & radix & semen flatulenta & semini creando sunt, ueneremque excitant.

Gordilion.

Gordylion alii fefeli appellant, calidum est, urinae & mensibus educendis habile, radix ipsius cum melle linctā, quæ in thorace hærent, educit.

Gyris, pollen farinaceus.

Pollen uirtute respondet amylo, sed calidior est.

Gypsum.

Gypsum uim habet siccantem opplentemque, propter quam ad sanguinis eruptionem conuenit. temperatum cum polline candido oui liquore, uisum uim opplendi non similiter retinet, uerum magis siccāt & repellit, præsertim cum posca.

*Quæ à D incipiunt.**Dades, tedæ.*

Tedæ acré quiddam habent, item uim concoquendi, & abstergendi nonnullam, unde aceto incoctæ dentium doloribus si hoc aceto colluantur, succurrunt: at si mel adiectum fuerit, pituitam per os educunt, mixtæ etiam eclegmatis faciles è thorace excreatus reddunt.

Damascena.

DAmascena, quum ad pruna uentum erit, exponam.

Damasonium.

DAmasonium absterforiam quandam uim obrinet, qua calculos conterit, & quæ per aluû diffluû, ad urinas deriuat.

Daucus.

DAucus, quod & staphylinus dicitur, duplex est, cuius radix flatulenta est, & uenerem mouet. Syluestris dauci semen minimè flatus creat, sed urinam & menses citat, quemadmodum & herba ipsa.

Daphne, laurus arbor.

LAuri arboris folia siccant & calefaciunt insigniter, magis quoq; fructus: radicis cortex amarus & leuiter astringens calculos comminuit, & iocinorosis opitulatur cum uino odorato triobolari pondere potus.

Daphne herba, laurus alexandrina.

DAphne herba, quæ & Alexandrina dicitur, calida, acris, & subamara est, idcirco menses & urinas commouet: laureola uero, quæ daphnoides græcè nuncupatur, eiusdem facultatis est: tum chamædaphne, quasi dicas homilem laurum, quæ & ipsa commanducatur.

Derma, pellis.

PELLIS ouina recens detracta, calens adhuc ijs qui flagris cæsi sunt circumposita, mirificè auxiliatur. At hippopotami pellicobusta & cû aqua leuis imposita phymata discutit. At uiperæ pellic detricta impositaq; alopecijis mirabiliter pilos reficit.

Dermata, hoc est, pellos seu coria ueterrum calceamentorum.

CORIA ueterrum calceamentorum crematorum cinerem reddunt siccatoriu, unde ex calceis pedum attritis nondum inflammatis, ambustis, intertriginibus, & tuberculis medentur.

Dictamnus.

DICTAMNÛ tenuius est uirtute pulegio, cætera simile, quod autem uocatur pseudodictamnus imbecillius est.

Dionysias.

DIONYSIAS dicta est in audrosæmo.

Diphryges.

Diphryges mixta est facultatis: habet enim quippiā astringens & mediocriter acre, ideoq; malignis ulceribus præsens est remedium.

Dipsacus, quod labrum ueneri dicitur.

Dipsaci spinæ radix in secundo ordine desiccatur, nonnullam uera abstergendi uim simul obtinet.

Dorycnion.

Dorycnion simile temperamento est papaueri & mandragoræ, immodicè refrigerans: siquidem modicum, stuporè inducit: copiosius assumptum, interimit.

Dracuntium, dracunculus.

Dracunculus simile quidam aro habet, sed eo acrius, amarior, calidius, tenuiusq; est. Itē astringionis nonnihil habet coniunctum. Radix ipsius potè uiscera purgat, & peruiacium seu malignorum ulcerum excellentissimum est remediū: folia respondent: semen ualentius est.

Dryopteris, filicula.

Fillicula dulcis, actis, & leuiter amara est: radix acerbior, cæterum uim habet exedentem, qua & pilos abolet.

Drys, quercus.

Quercus & folia & fructus siccante & tepida ui pollent, quamobrem uulnera recentia glutinant, inflammationibus incipientibus medentur: at quod sub glandis corio membranoso, fructus carnē ambit, cum ualentius astringat, ad fluxum muliebrem, aliosq; fluidos morbos exhibetur.

*Quæ ab E incipiunt.**Ebenus.*

Ebeni ligni uis est excalfactoria, deterforia, & subtilis: unde etiam caliginem oculorum abstergere creditur, alijsq; oculariis miscetur medicinis.

Encephalos, cerebrum.

Cerebrum leporis coctum detritum, comistumq; infantium dentitionibus utile esse fertur: nonnulli uero tremoribus succurrere manducatum, literis prodiderunt. At galli cerebrum cum nino potum ad uenenatos morsus efficax esse Dioscorides pro-

des pronuntiat, & sanguinis è cerebri membranis eruptionem cohibere. Cameli cerebrum Galeno autore siccum cum aceto potum, comitiales per sanat. Idem facit mustelæ cerebrum. Hirundinum cum melle in oculorum suffusiones efficax est. Cerebrum ouillum similiter præparatum, infancium dentitionibus exactè opitulatur.

Elea, olea.

O Leæ ramusculi quantum astringunt, tantum etiam refrigerant, fructus qui exactè ematuruit, moderatè calidus est immaturus maiorem tum astringendi tum refrigerandi vim repræsentat.

Elea, hoc est olea, Aethiopica.

O Leæ æthiopica lachryma ammoniaco tenui similis, vires habet extensorias, quare ad cicatrices, albugines, hebetudinesq; oculorum ea utuntur, & ad dentium dolores, si cauis ipsorum iniiciatur, efficax est: nonnulli uero syluaticam esse hæc oleam asserunt.

Elæon, oleum.

O Leum ex oliuis drupis dulce calidumq; mediocriter est magis humectans: at quod ex immaturis oliuis exprimitur, Græci omotribes appellant, tantæ astringentis particeps est, quantæ etiam frigiditatis. Elotum uero oleû morfu ac rosione caret. uetus quato diutius reseruatum, tanto magis calefacit, discutitq; præsertim si iam inde ab initio tenue extiterit: iudicatur autem id, si purum sit, pellucidum, si paucum magnam corporis partem inungat, & ex facili cutem penetret combibaturq; huiusmodi nimirum est Sabinum: quod autè ex agresti olea funditur, abstergit simul & astringit, squalidissimumq; id est, pro oleorum ratione. ricininum uerò æquales ueteri uires obtinet: reliqua uerò nempe sesaminum aut raphaninum & quæ eius sunt generis pro substantiis ex quibus constant, uires quoq; diuersas præ se ferunt.

Elæomeli.

O Leum in Syria ex trunco quodam arboris emanat crassius melle & dulcius, quod instar duorum cyathorum potum cū aquæ hemina, crudos humores biliososq; ex aluo educit: qui uerò id bibunt, torpescunt, quod extimescendum non est, sed excitari ipsi debent.

Elaterium.

ELaterium succus sylvestris cucumeris fructus appellatur, in secundo ordine calefaciens: quod menseis prouocat, fetus appositu propter summam amaritudinem necat, euacuatione metiam ex naribus cum lacte instillarum molitur: ab inferioribus partibus inditum, pituitam, nonnunquam etiam sanguinem extrahit.

Elate, abies.

ABies arbor calefacit siccaturque; ut nigra populus similiter: de resina ipsius in resinarum sermone agemus.

Elatine.

ELatine herba est parietariae similis, mediocri frigiditate & astrictione donata.

Elaphoboscus.

ELaphoboscus uirtutis est calefactoriae & siccae in secundo abscessu, substantia tenuis.

Elelisuacus, saluia.

Saluia euidenter calefacit & leuiter astringit.

Helenium, inula campana.

Helenium calidum est & siccum cum excrementitia humiditate, quare & eclegmatis temperatum infarctos thoraci humores educit, ac ex eo in particulis ruborem excitant.

Eleoselinon, palustre apium.

Eleoselinon in aquosis natum locis idem potest quod hortense apium, licet maius ipso existat.

Ebur.

EBoris ex ungue ramenta si obducantur, reduiuis profunt: item, ossium dentiumque; ipsius quum sint siccae facultatis & absterforiae, huiusmodi miscentur medicamentis.

Helcysma, argenti recrementum.

Helcysma, argenti est excrementum, uiribus plumbagini respondens. quippe astringit, simul atque extrahit, quod fit ut emplastris quas phaeas appellant & iis quae cicatricem ducunt, admisceatur.

Helleborus, ueratrum.

Veratrum utrunque; calefacit & desiccet in tertio abscessu, item acre est & absterforium, unde etiam ad leprosa cutis

uitia

uitia conuenit: nigrum uerò si fistulis inseratur tribus diebus callum exterit.

Helechryson.

Helechryson alii chrysanthon, alii amaranthum appellant, coronarius est frutex, coma aurum referente, quæ cū uino pota urinæ angustitiis, serpentium moribus, coxarum dolori, & ruptis accommodata est, ex mulso pota mensis educit, sanguinemq; concretum dissoluit, & destillationibus auxiliatur.

Helxine, parietaria.

Helxinem alii perdicium, alii parthenium, quidā sideritum, quidam heraciam nuncupant, uis eius est abstergere, ac leuiter astringere, cum humiditate subfrigida.

Helxine.

Helxine quæ & cisampelus dicitur, uim habet discutiendi.

Elymus, quæ & meline dicitur, panicum.

Panicum simile est milio, siccans refrigeransq; extrinsecus inductum, cæterum &alui fluores desiccatur.

Empetron.

Empetron, quod ab aliis prafoides nominatur, pituitam & bilem purgat, est etiam salsum, quare absterisionibus accommodatur.

Epithymum.

Epithymum in tertio abscessu siccatur & calefacit, thymo efficacius.

Epimedium.

Epimedium uirtus est mediocriter frigida cū humiditate aquosa, quod si obducatur, mammas erectas conseruat, dicitur etiam sterilitatem potu facere.

Epimelis.

Epimelis, quæ etiam ab Italicis rusticis uocatur unedon, malus est syluestris, cuius fructus acerbus & stomacho inimicus est, capitiq; dolorem mouet.

Epipactis.

Epipactis, quæ & elleborine appellatur, aduersus uenena & iocinpris affectus hibitur.

Erebinthus, cicer.

Cicer quod quidem cōsuetum legumen est, flatu creat, ualentis

& emplasticum, & rosionis experts.

Quæ à Z incipiunt.

Zea.

ZEa tritico uiribus respondet, medium inter calorem, & siccitatem obtinens, leuiter exiccat. necnon uim opplendi quam uocant emplasticen, obtinet.

Zingiber.

Zingiberis radix impensè quidem calefacit, sed non primò statim occursum, quòd ineuictæ cuiusdam & crassioris humiditatis particeps sit, propter quam etiam facile perforatur, firmam autem conseruat caliditatem.

Zythus.

Zythus compositæ est substantiæ, etenim acris est, ceu ex putredine procreatus, & frigidus, ex qualitate acide, eoque prauis uicibus habetur.

Zyme fermentum.

Fermentum & ipsum contrariis constat qualitatibus, quippe acoris cuiusdam frigidi, ac è putredine nati caloris, tum eius qui ex salis & farinæ natura contrahitur, compos est: quare non mediocriter calefacit atque discutit.

Zomos, Piscium ius.

Recentium piscium ius esculentum aluum per se, & cum uino potum deijcit, priuatim uerò in hunc usum conficitur ex phycidibus, scorpionibus, iulidibus, percis, & saxatilibus aliis teneris simpliciter cum aqua, oleo, anetho, & sale. Item eorum quæ testacea cute integuntur, tellinarum, hiatularum, conchularum, & ueteris galli cum sale diutissime excocti iusculum, uentrem subducit, e contrario gallinæ ius comprimit.

Quæ ab H incipiunt, quod Latini in E longum uertunt.

Hediosmus, Menta.

Menta in tertio ordine calida, tenuis, acris cum humiditate semicocta exilit, cuius causa etiam in uenerè incitat: sed amari quoque non nihil obtinet, quo lumbricos enecat. Quæ uerò acerba est recentes sanguinis reiectiones coercet.

Hedysarum.

Hedysarum.

Hedysarum aut pelecinos amarum est, leuiterque astringit, unde potum stomacho gratum redditur, cæterum uiscera obstructa repurgat.

Heliotropium.

Heliotropium maius, quod & scorpiurum uocant, calidam, siccam, & abstergentem uim præ se fert, cuius decoctum potu educit pituitam, bilemque: applicatum uero semen ipsius myrmecias & huius notæ uicia perficcat. Minus autem heliotropium, & hæc abolet & latas tineas interimit, si cum semine suo adiecto, nitro, hyssopo, & nasturtio bibatur.

Electrum, Succinum.

Electrum populi albæ lacrymā dicunt, quæ iuxta amnē Eridanum destillat, & in spissitudinē coit, aureo colore, quod si leuigatum bibatur, stomachi & alui fluxiones, & sanguinē cōpescit.

Hemerocalles.

Hemerocallis radix uiribus lilio respondet, perinde ac illud ambustis opitulatur.

Hemionitis.

Hemionitis astringens simul & amara est, idcirco lienosis cum aceto pota succurrit.

Hepar, Iecur.

Iecur rabidi canis tostum comestumque, ijs qui ab eo commorati sunt subuenire fertur. Caprilli iecoris inassati sanies lusciosis iuuare instillata: uaporemque eius decocti oculis recipi iubent: idem quoque iecur esse: manducatum uero comitiales coarctare. Idem præstare & hircinum ferunt. Adhæc lacertæ iecur dentibus corrosis impositum, dolorē sopit. Item lupinum, medicamini hepatico quod constat eupatorio iniicitur. Alpinum tostum comitiales, si ieiuni id manducent, adiuuat. Apri iecur recens inarefactum tritumque cum uino, ad serpentium morsus bibitur. At mergi iecur siccum epotū, calculos eicit.

Erigerum, senecio herba.

Senecio mixtas habet uires, refrigerat & modicè discutit.

Eryngium.

Eryngium calefacit quidem non manifestè, siccitatis autem laud obscuræ, nec modicæ particeps.

Quæ

Quæ à T H incipiunt.

Thalassion hydor, marina aqua.

Aqua marina acris, calfactoria mediocriter, desiccans, & pota stomacho quidē contraria est, uentrem autē turbat, pituitamq; educit: si calida superfundatur, extrahit, & discutit.

Taliethrum.

Thaliethrum siccandi uim sine rosione habet, hinc ulcera inueterata cicatrice obducit.

Thapsia.

Thapsia acris est, & ualenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumque eadem discutit.

Theion, sulphur.

Sulphur trahendi & ipsum uim obtinet, calidum & substantia tenue, ut aduersus pleraq; uirulenta animalia resistat, præsertim turturum marinum, draconemque, uel siccum inspersum, uel saluæ quoque mistum, uel urinæ pueri, uel oleo, uel mellis: item scabiosa corporis uitia mirificè per sanat.

Thermos, lupinum.

Lupinum, esculentū quidē opplēdi uiribus pollet: amarum uerò, abstergit, dissipat, & sine rosione desiccatur, tineas occidit inductū, & potū, itē uiscera purgat cū ruta & pipere potum. nam cutis uitia extergit, tumores dissipat, cū oxymelite applicatū: syluestre autē amarius est & omni ex parte satiuo ualētius.

Thelypteris.

Thelypteris, quam nonnulli nympheam uel ptelin appellant, filici similis facultate, quæ cum uino pota latas & terebrentes uentris tineas interimit, foetum in utero corrumpit: folia ipsius manducata aluum emolliunt.

Thlaspi.

Thlaspi semen est uiribus acre, ut intestinos abscessus potu rumpat, mensis prouocet: ab inferioribus partibus inectum coxarum dolores finit, cruenta uacuans, ac alioquin supra infraq; biliosa instar acetabuli potum, expurgat.

Thridax, lactuca.

Lactuca olus est non summè frigidum humidumve, sed pro fontanæ aquæ temperamento, quapropter calidis inflammationibus

mationibus conuenit, præterea sicim potu restinguit, & genituræ fluorem uenerisquæ in somnia cohibet: Syluestris lactuca hac minus & refrigerat & humectat, uerū succulentior existit.

Thymus.

Thymus in tertio ordine calefacit & desiccet, glutinosos crassosque humores incidit.

Thymbra, satureia.

Satureia agrestis quidem eadem quæ thymus præstat, hortensis aut in omnibus quidē imbecillior, sed ad cibū laudatior.

Thymelæa.

Thymelæa, unde granū cniidū fit, simileis ei uires obtinet.

Quæ ab I incipiunt.

Idæa radix.

Idæa radix gustu acerba & uiribus, sanguinis eruptionibus & rheumaticis affectibus, tum pota, tum extrinsecus imposita accommodatur.

Hidros, sudor.

Svdor per se contrahere efficax est, miscetur autem in palæstris exercitantium sordibus, quibus astringend uis duntaxat inest, ac redditur totum discullorium. Mammis igitur inflammatione tentatis efficax est remedium, & feruori ipsarum restinguendo: benefacit etiam bubonibus: at si fuerint succiores, cum cyprino, aut rosaceo emolliri debent.

Ixos, uiscum.

Viscum calefacit cū acrimonia, humores ex alto ualidè elicit, & thapsiæ modo discutit, hac tamē multo est ignauius.

Ion, uiola.

Violæ folia aquea frigidaq; substantia præpollenti constāt.

Ios, ærugo.

Aërugo acrem gustu qualitatem præ se fert, item discutit, consumit, inciditq; non teneram modò, sed duram quoque carnem: at si momentum ipsius cerato copiosiori misceas, medicamentum fiet quòd citra rofionem absterget.

Hippocampus.

Hippocampus marinum animal est, cuius concremati ci-

nis cum liquidapice alopecias explet.

Hippolapathum, grandis rumex.

Hippolapathum in palustribus locis nascitur, lapatho confimile.

Hippomarathron, grande fœniculum.

Hippomarathrum cachryi proximum, magis quàm fœniculum desiccatur, unde & aluum, fluentē sistit, & calculos confringit, mensēisque mouet semen ipsius coriandro simile, respondet quidem ei uiribus, sed imbecillius est.

Hippopotamus.

Hippopotami quod est equi fluuiatilis, testiculus aridus potus ad serpentium morsus efficax est.

Hipposelinon, grande apium.

Hipposelinon cum apio domestico uirtute conuenit, nisi esset imbecillius.

Hippuris, cauda equina.

Hippuris astringentem cum amaritudine qualitatem possidet, eoq; ualenter simul & sine rosione desiccatur, ac uulnera maxima committit, intestinorum ramicibus opitulatur, & utiis fluidis cum uino pota medetur.

Hippophaes, lappago.

Hippophaes, quod alii hypophyes uocant, quo uesteis expoliunt furculosus frutex est, è cuius radice thapsiæ modo liquor colligitur, qui cum erui farina instar drachmæ datus, bilem ac pituitam purgat: item totus ipse frutex siccatus ad purgationes accommodatur.

Iris.

Iris affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantia, tussis utilis, humores in pectore contumaces faciles ad excretionem facit, torsionibus uentris medetur, sordida ulcera purgat, eum mulsæ pota aluum inanit.

Isatis glastum.

Isatis domestica qua tinctores utuntur, siccandi uireis & astringendi habet. his etiam magna uulnera in duris glutinat corporibus, sanguinem erumpentem compescit, laxos cedenteq; tumores discutit, ac omnibus malignis ulceribus resistit. Syluestris autem quum magis rodat, magisque ideo siccet, ualentius

tius aduersus humiditas putredines pugnat, ad cætera deterior.
ut quæ mordeat : cæterum ob uirium uehementiam lienosis
quoque utiliter adhibetur.

Ifopyron, aut phasolum.

Ifopyrum phasolumve semen amarum ac modicè acerbum
occupat, ob quod crassos glutinososq; humores & abstergit
& incidit, sic ut corpora contrahat stringatq; , hinc etiã quæ al
tè defident expurgat, excreationibus sanguinis nō aduersatur.

Itea, salix.

Salicis & folia & flos facultate constant quæ citra rosionem
siccet, habent etiã nonnullam astrictionem, cortex autem
paulo siccior est cuius perusti cinis ex iis habetur quæ uehe
menter exiccet, quippe clauos & myrmecias, cū aceto exterit.

Ichthycolla, gluten piscium.

Ichthycollæ uis est opplere & siccare. rectè miscerur em
plastris capitis & glutinantibus, & iis quæ ad lepras tollen
das & erugationem faciei conficiuntur.

Quæ à C incipiunt.

Cancanus.

Cancaui radix modicè siccatur, & sine rosione ad opplendum
infarciendumq; accommodata, quare ex uino linctâ man
sâque tragacanthæ & dulcis radiculæ modo, arteriæ scabri
ciem iuuat.

Cancamum.

Cancamum lachryma est arboris in arabia, myrrhæ similis,
odore grato, qua etiã ad suffitum utuntur. uis eius est ob
esos extenuare, abstergere, & aperire obstructa.

Cadmia.

Cadmia utraq; siccatur, sed quæ botrytis, quasi acinosa appel
latur, tenuioris est substantiæ, placitis autem dicta crassio
ris. Cæterum concremata cadmia sine morfu desiccatur, abster
git, caua ulcera tum in oculis tum in toto corpore explent, &
præsertim humidiora in naturis mollioribus, in durioribus
efficacium magis usus est.

Cacalia.

Cacalia uinibus & usu cum cancano conuenit.

Capnion, secundum alios capnos, fumaria.

FVmaria inde nomen sortita est, q̄ succus ipsius copiosas la-
chrymas eliciat, etenim oculorum facit claritatem: acris
amaraq; est, unde urinas biliosas liberaliter prouocat, iocinoris
obstructioni languoriquē medetur, stomachum confirmat &
aluum emollit.

Capparis.

CApparis radix extergit, probè purgat, incidit, discutitq; tū
amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate cōtrahit, strin-
git & densat, quapropter lienes induratos & pota & extrinse-
cus imposita, iuuat, mensis promouet, pituitam per os edu-
cit, maligna ulcera sanat, dentium dolores sopit, tumores discu-
rit, & utiligines, quas alphos dicunt, aurium uermes enecat;
folia autem & fructus similem quidem, sed imbecilliozem uim
possident.

Cardamomum, nasturtium.

Nasturtij semen sinapis modo urit, unde etiam inductum
ruborem in cute excitat: cæterum crassos humores, cum
aliis potum incidit, herba uerò arida uiribus respondet, humi-
da moderatior, ideoq; crudam ipsam assument,

Cardamomum.

Cardamomum acre quidem & ipsum est, uerum, nasturtio
cīnualidius: cōpos est etiam nonnullius amaritudinis, qua
tineas alui interimit, & scabiem cum aceto exterit.

Caris.

Caris in pollinem detrita & cum radice bryoniæ pota ti-
neas occidit.

Canceri.

Cancrorum cōcrematorum cinis, fluuiatilium sanè siccet,
erinaceorum & cochlearū modo, at torius substantiæ pro-
prietate, canis rabidi moribus potu mirabiliter efficax est: ut
in aliis dictum est, marinorum cinis eximia donatus siccitate
his quidem non conuenit, sed ijs qui magis siccari desiderant,
proficit. fluuiatilis cancer tritus si inducatur, spicula & acu-
leos eiicit.

Caros.

Cari semen & siccet & calescit in tertio serè gradu, status
I 3 discutit,

discutit, urinam mouet, idq; non semen duntaxat: sed etiam tota planta.

Carpesium.

CArpesium odoratum est tenue, uiscera obstructionibus liberat, urinas mouet, & renes calculo laborantes purgat,

Carya, nuces.

NVx arbor tum in coliculis tū in foliis aliquid habet astringens, plurimum autem in nucū coriis existit. succus itaq; eorum decoctus cum melle, stomaticum fit medicamentum: interius inde putamen carinatum usum extenuandi uim acquirit & sine rosione siccatur, quod in eo clauditur edendo aptū, natura oleosum, facili in bilem conuertitur, confectumq; ex eo oleum extenuandi tumores, & putredines, quas sepedonas dicunt, discutiendi uim obtrinet. Flacciscentes autem uerustate nuces, cutis uicia abstergunt. At auellanæ, quas & ponticas uocant & leptocarya, frigidiores sunt & austeræ, in cæteris, inglandibus æquales.

Caryophyllon.

CAryophyllon, quasi dicas nucifolium, non eam habet substantiam quæ nomine prætenditur, sed ex India ueluti flores cuiusdam arboris festucacei & nigri sunt, longitudine ferè digitali, odorati, acres, subamari, calidi & sicci in tertio prope modum ordine: qui multiplicis usus sunt, tum ad obsonia, tū ad alia multa medicamenta.

Cassamum.

CAssamum hoc nonnulli balsami fructum esse dicunt, de quo supra egimus.

Cassia.

CAssia calefacit & siccatur in tertio ferè abscessu, tenuis abundè, acris & modicè astringens. incidit igitur simul & discutit, roburq; instrumentis adiicit, postremo & mensis euocat.

Castorium.

CAstorium calefacit siccaturq; cum extenuandi uiribus eximiiis, quibus præter alias actiones, etiam neruorum qui ex copia humorum malè habent, affectibus, congruit, & refrigeratos facili recalcacit, & extrinsecus applicatum & potui datū, idq; ita, ut nullam aliam offendant particulam etiam si medio-

criter

criter febris affigat, quemadmodum in uerernis & lethargis, sed & menibus retentis proficit, & secundas expellit, at in cerebri & pulmonis uitii etiam sufficus castorii inspiratu haustus, præclare opitulatur.

Caucalis.

CAucalin alii daucum syluestrem appellant, nam dauci modo calefacit, siccatur, urinam mouet, & salsamento ad repositionem conditur.

Cenchros, milium.

Milium refrigerat in primo abscessu, siccatur, in secundo habet etiam modicam extenuandi facultatem extrinsecus igitur in sacculis ad fouendum & cataplasinatis modo adhibendum, desiccare consuevit.

Cedrus.

Cedrus & quæ fruticosa est iunipero similis, & quæ arbor, calefaciunt, siccantq; in tertio ordine, confectum ex eis oleum quod cedream appellant, etiam quartum attingit, subtilis admodum substantiæ. hinc teneras carnes expedit & citra dolorem exedit, duras autem præsertimq; demortuas siccatur & à putredine asserit, pediculos, pulices, ascaridas, & aurium uermes interficit, aliaq; plura facit.

Centaurium.

Centaurij maioris radix acris, calida, & terræ astrictionis compositus est, mensis itaq; promouet, foetus corrumpit, eijsq; uulnera glutinat, sanguinem spuentibus, & reliquis pectoris uitij præsens est remedium. Minoris centaurij radix inefficax, est, coliculi ualide & citra morsum siccant. unde non solum ad quæ maius centaurium ualet, sed etiam coxendice labosantibus, ipsius decoctum inferius iniectum, biliosa uacuat, nonnumquam & cruenta, ac ualide proficit.

Ceras, cornu.

Cornu caprillum hircinumq; concrematum denteis nitidos reddit, gingiuas nimia humiditate flaccidas composit. Cerui autem cornu cum uino maceratum tritumque, deinde circumlitum mobileis sistit denteis. Crematum, mox lotum, dysentericis, celiacis, sanguine expuentibus, & arquaticis, duorum cochlearium instar auxiliatur: miscetur etiam oculariis medicinis. Taurinum cornu cum aqua potum, sanguinis eruptiones cohibet.

Cerasia.

Cerasia dulcia quidem citius per aluum descendunt, austera stomacho utiliora sunt, acida uerò ob incidendi uim quam habent pituitosis excrementosisq; stomachis profunt, gummi uerò cerasi arboris arteriam exasperatam læuigat, & calculo laborantibus cum uino potum succurrit.

Ceratonia arbor.

Ceratoniae fructus quæ ceratia dicuntur, siccandi & astringendi uirtutis, nonnullus etiam dulcedinis particeps est.

Cephalæ capita.

Menarum sale conditarum capita cremata, uim siccandi non admodum acrem acquirunt, hinc sedis rimas & guttur diu induratum Scyro sanant. Smaridis caput totum combustum ad alopecias cum adipe urino proficit. Idem præstat etiã muris caput crematum cum melle. Milui aridum sine plumis, modo qui tribus digitis comprehendi queat, cum aqua potum antidolores finit. Lacertæ uerò caput aculeos educere tradunt, myrmecias, uerrucas, & clauos exterere.

Cecis, Galla.

Galla, omphacitis, quidem medicamentum est assatim astringens, eamq; ob causam siccatur, fluxiones repellit contrahitque, laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectibus accommodata est: ponitur autem in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium. Altera quæ flauo colore, inanis magnaq; est, non tantam in siccando & astringendo habet efficaciam, sedis inflammationes & procidentias excocta iuuat: gallæ uerò combustæ & aceto restinctæ, sanguini supprimendo sunt.

Cepæa.

Cepæa portulacæ similis est, folia ipsius contra uesicæ scabies utiliter bibuntur, radix cum asparago, quem myacanthinum, hoc est, corrudam appellant, pota, urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

Cera.

Cera quum temperata sit, reliquorum medicamentorum materia efficitur, ipsa uerò per se ex ijs est, quæ laxiter obsterunt, nam & discutientem & calidam uim exiguam obtinet.

Ceryces,

Ceryces, buccina.

BVccinorum testa concremata excellenter desiccatur citra resolutionem, unde ulceribus maleficis accommodatur, at in ijs quæ putredinem experiuntur, cum aceto, aut uino, aut oxyme lite ipsis utendum est, oleum in quo ueluti caro ipsorum adhuc uiuentium excocta sit, aurium dolores si instilletur, discutit.

Cici, ricinum.

Ricini fructus quemadmodum purgat, abstergit, discutit, sic etiam folium, sed imbecillius: de oleo tractatum est.

Cinnabaris.

Cinnabaris acris mediocriter uires habet, item non nihil etiam astringit.

Cinnamomum.

Cinnamomi uis est summe tenuis, non item æque calida, sed tertii ordinis, nihil autem ex iis quæ parem ipsi calorem referunt adeo siccatur, propter substantiæ tenuitatem. Cinnamomis autem ueluti inualidum quoddam cinnamomum est, quod nonnulli pseudocinnamomum uocant.

Circæa.

Circææ radix calida est & odorata, quæ cum uino pota femininarum locos purgat: semen in sorbitione sumptum lac generat.

Cissaris, pumex.

Pumex absterforius est præsertim dentium, non modò uiribus, sed etiam scabritie, coniiicitur autem in medicamenta quæ carni ulceribus inducendæ sunt, item in ea quæ cutis labes exterunt, Crematus tenuior quidem, sed mordax redditur: lotus, id quod mordet, deponit.

Cisthos.

Cisthos, aut Cissaros frutex est astringens & modicè frigidus uirtute, folia ipsius & germina adeo siccant, ut etiã uulnera conglutinent: at flores quum in secundo ferè gradu sicciores sunt, dysenterijs, alijsq; fluidis uitijs accommodati sunt: extrinsecus illiti, putrida ulcera compescunt.

Cissos hederæ.

Hederæ contrariis constat uiribus, ut quæ astringat & refrigeret. Item acris est & calida, aqueæ substantiæ & tepidæ quum

quum uiridis est, particeps : cuius folia uino incocta uulneribus glutinandis, ampuftis, & lienosis falutariter adhibentur, fucus ipforum naribus ad pituitam educendam infunditur. item diuturnis aurium defluxionibus fuccurrit : lachryma hederæ, ut quæ acrior fit, pediculos enecat, & pilos abolet.

Citrium, quod & malum medicum dicitur.

Ciprij medium acidum, aut qualitatibus expers est, in quo semen tertij refrigerantium ficcantiumq; ordinis habetur, cortex ficut in fecundo quidem abfcessu, sed non item refrigerat, acri uirtute præditus, caro ipsius crassi succi est pituitæ generandæ apta, & frigida : semen discutit, & in fecundo ordine deficcatur, folia arboris ficcandi discutiendiq; uim repræsentant.

Cichorium, intybus syluestris.

Cichorium picrisue tanquam syluatica feris est, refrigerans ficcansq; in primo abfcessu : habet etiam uim astringendi, qua ad hepaticas dysenterias conuenit.

Clematis.

Clematis quibusdam daphnoides, aliis myrsinoides, nonnullis polygonoides, sarmenta habet oblôga, crassitudine iunci quem holoschœnum dicunt, folium uero lauri, ficcandi uirtute pollet, quæ alui fluores, quam diarrhiam dicunt, dysenteriam, & dentium dolores finit : contra uenenatorum morsus rectè imponitur.

Clematis altera.

Clematis altera arboribus similacis modo circumuoluitur, acri & caustica facultate donata, huius semen cum aqua potum, pituitam & bilem per inferiora educit, folia autem ad lepras arcendas inducuntur.

Clinopodium.

Clinopodij uis est calida siccaq; nondum uero adurens, sed tertij ferè ordinis.

Cnicus.

Cnici semine ad purgandam aluum duntaxat utimur, si quis extrinsecus eo utatur, tertij ficcantium ordinis erit.

Conchylia.

Conchylia buccinis facultate proxima sunt.

Cælia, uenter.

Venter mergi, aut recens coctus, aut inarefactus, esu stomacho utilis esse dicitur: similiter etiam gallinarum interior alui membrana sicca potui data: uerum Galenus experimēto falsum utrunq; se inuenisse scribit. Palumbi uerò auis uentrem paulatim potum calculos per urinam elice, testis est Dioscorides. Mustelæ alius pota contra quolibet uenenata amuletum dicitur.

Coccus cnidios, granum gnidium.

Granum gnidium semen est thymelæ, non chameleæ, ut quidam opinati sunt, acri & adurenti facultate præditum, hoc epotum, per inferna aquas detrahit.

Coccus baphicos, granum tinctorium.

Granum tinctorium leniter siccet, unde magnis & neruorum uulneribus, cum aceto aut oxymelite læuigatum, cōmodè imponitur.

Coccymlæa, prunus.

Pruni fructus uentrem subducit, recens magis, aridus minus: decocto ipsius, gutturis inflammationes utiliter coluuntur. Gummi quod ex arbore destillat, incidendi uim extenuandi; testatur, ob quod nonnulli frangendis uescicæ calculis esse cum uino potum affirmant: ex aceto, puerorum impetigines persanare. Syluestrium prunorum baccæ euidenter astringunt, uentremq; reprimunt. Nominatur hæc planta in Asia prumnum. Domestica uerò pruna siccata apparent, quæ nunc Damascena appellantur, quemadmodum Galenus memorie mandauit.

Colla, glutinum.

Gluen quod ex simila & polline conficitur, emplasticam uim & concoctricem repræsentat.

Colocyntha, cucurbita.

Cucurbita humidi, frigidiq; in secundo abscessu temperamenti est, unde tota si applicetur, calidas refrigerat inflammationes.

Colocynthis, cucurbita sylvestris.

Cucurbita sylvestris ualidam purgandi uim obtinet: uiridis ipsius succus infricatus, coxendicum doloribus auxiliatur.

Comaros,

Comaros, arbutus.

ARbutus, & arbor, & fructus acerbæ qualitatis est, uocant eñ in emyrcoelon: caternm stomacho aduersatur, & capitis dolorem facit.

Commi, gummi.

Gummi siccante ui & emplastica pollet, & nimium asperitatibus medetur.

Conia, lixiuium.

Lixiuium ueluti cineris lotium nominatur: omnium maximè absterforium & siccans est, quod ex fici & tithymalli cinere præparatur, ac ferè iam exedens: q̃ si calx etiam cineri addatur lixiuium redditur adurens: quod iam etiam prothetion nuncupant, clysterium potissimum medicinis miscetur. Vehementissimū uero omniū est, quod ex sola calce cōficitur.

Conyza.

Conyza utraq; siccatur & calefacit in tertio ordine, hinc etiā Coleum in quo decoquitur rigores febrium circuitu remeātes discutit: flores idem præstant, quorum decoctum menscis citat, & foetus extrahit: quæ uero in humidis regionibus nascitur, odore grauior & inefficacior est.

Copros, stercus.

Stercus quodlibet calefacit, maximè siccatur & discutit: uariæ autem pro animantis quod ipsum reddit temperamento, & uictus ratione. itaq; canum quum ossa uorauerint finus inarefactus, dysenterias cum scisso lacte, quod Græci schiston uocant potius, sanat: idem uetusta ulcera reficit, si medicamenti in ea efficacibus misceatur. Hoc angina, tonsillarumq; inflammationes cum melle inunguntur. At puerorum qui uictu non superfluo educati sunt stercus, huic malo magis prodest. Luporū quod & ipsum candidus in fructibus reperitur, coli doloribus strenuè succurrit, non potum modò, sed corpori etiam adalligatum: alligeretur autem ex lana ouis à lupo enectæ, aut pelle ceruina. † Caprillum stercus acius, magisq; discutiens, scirrhosos tumores applicatum dissipat, præsertim in duris corporibus: crematum uerò ualentius abstergit, extenuatque: Bubulum extrahendi quandam uim obtinet, ideoq; uespasum & apiam iectibus medetur: quinetiam toti corpori in sole oblitum aquas inter cutem præclare inuat. Ouium uerò cū acetō myrmecias,

myrmecias, actochordonas, furunculos & clauos, per sanat. Columbarum syluestrium, quas palumbes latini dicunt, aliis longè acrius cum nasturtij semine cutem exulcerat. Gallinarum ex oxymelite, aut aceto, aut mulso potum, uomitione strangulantes fungos educit, præsensq; est remedium: hoc quoq; colico dolore conflitantibus potui quidam exhibebant. Nonnulli uerò & ciconiarum simum orthopnoicos potum auxiliari affirmant. Murium simus reliquis abstergit efficacius, eosq; alopecias curat, & infantium sedi appositus, ad excretionem proritat. Sturuiorum qui oryza passi fuerint, abstergendi uini præ se fert, qua cutis asperitates, quas ephelidas Græci uocant, extērit. Terrestrium crocodilorum simu, uirilignes, quas alphos dicunt, extergit: quemadmodū fluuiatilium, oculorum albugines extenuare creditur.

† In Cod. antiquis, hoc uerba ita leguntur, κὸς πρὸς αἰγῶν, σπύραθαι δὲ ἰδίως ὀνομάζονται, δις μείας καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δύναμews τῆς σκιῶς ἐκ μέρους ὀγκοῖς ἀρμόττεισθαι, οὐ σπληνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μερῶν. ἐγὼ γὰρ ἐπὶ γόνατος ἐχόντος ὀγκον χρόνιον, δις λυτον, ἐχρησάμην αὐτῇ δι' ὀγκοῦ αὐτῆς καταπλάττεισθαι κελεύσαι ἀλδύρον κρίνιν ἐμβαλλομένης τῆς κόπρης. Quæ uerba qm̄ conuersa sunt in latinum sermonem ab interprete Aetij, ex quo huc tralata, tu apud eum auctorem lege.

Corallium.

COrallium ueluti arborea planta est in lapidis duritiē coalescens, crescit non in terra, sed in alto maris, colore rubrū, lapidi simile, siccandi ualidam, astringendi mediocrem uim, possidet, ideoq; cruentis spuris, & dysentericis utile.

Coris animal, cimex.

CImex acri uirtute pollet. Scribunt igitur quidam cum aceto potum hirudines eiicere.

Coris herba.

COris herba, quam alij uocant hypericon, acris est, & odorata, semen eius ad urinam & menses ciendos bibitur: succurrit & phalangiorum moribus, item ad opisthotonon cum oleo inungitur.

Corianum seu corium, coriandrum.

Coriandrum ex contrarijs uiribus compositum est; tenuis substantiæ, terrenæ, amaræ, aquosæ autem humiditatis tepidæ

pidæ particeps, habetque, modicam uim astringendi, quapropter inflammationibus, erysipelatis non admodum fetuentibus conuenit, tumores molliusculos cum quodam in id efficaci discutit. Semen modicè quidem cum passio bibitum, tineas pellit: liberalius autem sumptum mentem tentat.

Corydos, aut corydallus, Galerita siue alauda.

ALauda auis simplici iure elixa, coli cruciatibus opitulatur: assumi autem continuè & sæpe cum ipso iure debet.

Coronopus, pes cornicis.

Coronopodis radix & ipsa ad colicos cruciatus proficere manducata creditur.

Costus.

Costus modicum quidem amaritudinis, plurimū uerò acris & calidæ qualitatibus habet, unde in quibus uel calefacere particulam quampiam cogites, uel ex alto in summa humorem aliquem elicere, ad costum confugiendum est: urinam igitur & menseis ducit, tineas enecat. Quum uerò & flatulenti cuiusdam particeps sit, uenerem cum mulso potus stimulat, coxendicum doloribus, resolutis, febrium rigoribus ante accessiones, cum oleo infricatus, conducit.

Cotyledon, acetabulum.

Acetabulum refrigerat, repellit, abstergit, & dissipat: folia ipsius cum radice manducata calculos comminuere, & urinam ciere creduntur.

Cochlea.

Cochleæ concrematæ impense siccant, & mediocriter calefaciunt, conferunt dysenterijs, quas nondum putrelago obedit, si misceantur harum partes quatuor, piperis albi pars una, gallarum partes duæ. At quæ ignem non sunt expertæ, si cum tegumentis in pollinem coactæ uentri imponantur, aquâ subter cutem exinaniant, profunt item articularijs doloribus applicatæ, quoad sua sponte deciderint: in uniuersum humorem altè insertum ualidè desiccant.

Crania, cornus.

Corni arboris fructus acerbus, si edatur, ualidè uentrem astringit. folia autem & germina acerlitate uehementer siccant,

siccant, adeò ut etiam maxima durorum corporum uulnera conglutinent.

Crambe, brassica.

B Brassica quæ edendo est siccat, & manducata, & à foris imposita, non tamen acrem conspicuè uim ostendit, eoq; uulnera glutinat, & dolosa malignaq; ulcera, ac tumores solui cõ tumaces persanari: habet etiam nonnihil absterforium, quo lepras exterit. Semen ipsius potum tineas occidit, præsertim Aegyptiæ: caulium crematorum cinis adurente ui cõstat, cum adipe longis laterum doloribus utilis. Syuestris autem brassica, sãtiua in omnibus ualidior est, unde nec intra corpus citra noxã sumitur. Marina, subfalsa leuiterq; amara, aluuũ solent.

Cratægonos.

C Ratægoni herbæ semen & acre gustanti apprehenditur & frigidum, milio simile.

Crethmon.

C Rethmon falsum est simul & amarum, sed modicè, quare & uis ipsius est asterforia & desiccans.

Crithe, hordeum.

H Ordeum refrigerat siccãtq; in primo abscessu, uerum non nihil etiam extergit: cæterum fabarum lomento siccitate præcellit, minus flatulentum est, polenta hordeo multo magis siccata, præsana præterquàm quod largius humectat, etiam † abstergit uehementius.

† In altero manu scripto his uerbis hæc sunt adscripta, οἱ δὲ ἐκ τῶν κριτῶν γινόμενοι ἄρτοι ἀτρεστώτεροι τῶν ἐκ τῶν πυρῶν ὄντων, i. panes qui ex hordeo conficiuntur, minus alunt quàm qui ex tritico. Quæ huc traducta sunt ex Aetio.

Crimnon.

Quod in tritici & zææ & farina crassius est, crimnon appellatur, ualidius nutriendum quàm polenta: ægrius autem conchitur.

Crinon, lilium.

Lilij flos temperamento mixtus est, ex tenui substantia, terrefacti & nonnulla aquosa temperata: quapropter oleum quo iue ex eo confectum discutiendi uireis, molliendiq; repræsentat, uulgu inflammationibus accommodatum. Radix ac folia

ac folia ficcant, abstergunt, discutiuntq; mediocriter, quò fit ut ambullis conferant: succus ipforum, & neruorum uulneribus cum oxymelite prodest.

Crocodilion.

Crocodilij semen & succus calidam, siccam & discutiētem uim præ se fert, urinas itaque & menses mouet: radix excreationes è pectore iuuat, item sanguinem per nareis ducit.

Crocus.

Crocus ad secundum calefacientium ordinem, primum siccantium refertur astringit & concoquit.

Crommyon, cepa.

Cepa ex quarto calefacientium ordine habetur, substantiæ crassioris, quam obrem hæmorrhoidas appositu aperit: item abstergit: uirilignes, alphas dictas, cum aceto extert, & alopecias oculus alcyonio pilos restituit, succus oculis suffusus aut crassi humoris uitio hebetibus auxiliatur.

Cyamos, faba.

Faba non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando: caro ipsius nonnullius etiam absterforiæ qualitatē est, excreationibus è thorace & pulmonibus utilis: quum autem cortex fabæ nonnihil quoq; astringat, tota ipsa faba in posca decocta cœliacis, & dysentericis conducit, inducta uero cataplasmatē modo inflammationibus & tumoribus medetur, lac in mammis extinguit.

Cyanos,

Cyanos acrem habet uim detrahendi, & discutiendi maiorem quàm cinnabaris, astrictiōis quoq; particeps est.

Cyclaminus.

Cyclaminus uarias uireis habet: etenim extergit, incidit, aperit, attrahit, & dissipat: succus itaque ipsius hæmorrhoidas sedi admotus aperit, duritias cum aliis discutit: cum melle, suffusus proficit, per nareis purgat, abdomini inunctus aluum subducit, foetus corrumpit: radix autem tota succo quidem est imbecillior, & sed & ipsa uehemens adeò est, ut cum mulla instar trium drachmarum pota, interanea expurget: cæterum cutis uitia extert. Altera cyclaminus, quam etiam cissanthemon uocant,

uocant, radice donata inutili, semen habet efficax, ut potum priori similia faciat.

Cyminum, cuminum.

CVminum in tertio ordine calefacit, urinam mouet, & flatus discutit.

Cynosbatos, rubus caninus.

RVbi canini fructus non instrenuè astringit: folia id præstât mediocriter. at quod in fructu lanæ speciem præ se fert, ceu arteriæ inimicum caueri debet.

Cyparissus, cupressus.

CVpressi galbuli & turiones siccandi uiribus pollent, nullo calore conspiciuo: quapropter uulnera magna in duris corporibus conglutinant, & superfluis putridinibus in alto fixas humiditates, citra noxam depascuntur, intestinorumque ramificibus opitulantur.

Cyperus, iuncus angulosus.

IVncus angulosus calefacit siccâtque: citra morsum, hinc etiam humidioribus ulceribus cicatricem mirabiliter inducit, ac oris ulcera per sanat: habet & uim quandam incisoriâ, qua calculos comminuit, urinam & menstrua promouet.

Cypros.

CYpri folia & surculi mixtis constant uiribus, discutiente & astringentia, tum ea quæ sine offendiculo & morsu siccet: ideoque decoctum ipsorum ambustis superfusum prodest, ac igneis inflammationibus congruit. Item oris eruptiones, quas aphthas uocant, commanducata, per sanat: item medicinis leni dicatis miscetur.

Cytisus.

CYtisi folia discutiētis leniter, & tepidæ naturæ sunt, quemadmodum & maluæ.

Conium, cicuta.

CIcutæ uires summè refrigeratorias esse omnibus constat.

Conos.

COni cortex & folia, pinum uiribus repræsentant, sed aciora efficacioraque sunt: fructus, quem etiam strobilon appellant, uiridis, amarum quiddam & acre, cum humiditate possidet, quare thoracis affectibus ad facilem excrementum accom-

modatur esculentus in aqua maceratus ut acrimoniam exuat
temperatus redditur, rosionis expers, opplens obstruensque;
ut etiam asperitates læuiget.

Quæ ab L ordiuntur.

Lagopus.

Lagopus siccae facultatis est, qua alui fluores desiccat.

Ladanon.

Ladanon à cistho ladone dicta gignitur, quam depascentes
capellæ barbis suis & uillosis cruribus succulentum & pin-
guis ex herba deferunt, quod congestum ladanon est medica-
men præstantissimum, in secundo ferè abscessu calidum, natu-
ra tenue, emolliens mediocriter, discuties & concoquens, eoq;
uteri affectibus peculiariter conuenit: habet præterea nonnul-
las astringendi uireis quibus defluos capillos confirmet.

Lathyrus.

Lathyrin & ipsam rithymali speciem esse dicunt, quod eius
succus, illius modo purget, semen autem huius præcipuam
purgandi uim habet.

Lapsana.

Lapsana māducata stomacho nocet, inducta uero cataplas-
mate nonnihil abstergit discutitque.

Lapathum, rumex.

Rumex mediocriter discutit: acuta rumex, quæ oxylapa-
thum dicitur, præter id etiā pauxillum repellit: semen aut
præsertim oxylapathi, astringēs, alui profluvia, diarrhoeas dicūt
& dysenterias persanat, folia uerò semini cōtraria faciunt: hæc
etenim comesta aluū mouent, illud potū ipsam comprimit.

Lemonium.

Lemoni fructus: austerus cum uino cœliacis, dysentericis, &
sanguinem spuentibus datur item ad fluorem muliebrem
acetabuli mensura.

Lichen herba.

Lichen herba in petris nascens muscum representat, uis ei
est exterendo purgare, mediocriter siccare, & refrigerare:
impetigines sanat, inflammationes arcet, & ut Dioscoridis uer-
bis utar, sanguinis eruptiones sistit.

Lichenes

Lichenes equorum.

Lichenes equorum triti cum aceto, comitialibus, & omnium uenatorum moribus mederi feruntur.

Leontopetalon.

Leontopetali radix & sicca & calfacientis in tertio ordine facultatis est, necnon discussoria.

Lepidion.

Lepidion, quam & hiberiada uocant, ex quarto calefacientium gradu est, nasturcio proximum uiribus, minus autem eo deficiat.

Lepis, squama.

Squama omnis ualide siccatur, astringit, nec ignauiter mordet. Sed æris amplius siccatur, extenuaturque, cui nonnihil æruginis adest, magisque ea quæ ex Cypriis clauis raditur, quam propterea etiam helitum quasi clauarem appellant. At ferri squama, liberalius astringit, atque hac magis stomomatis, quapropter ad contumacia malignave ulcera præstantior est, sed æris, carnem magis purgat & consumit.

Leucacanthum.

Leucacanthi, quod alii polygonatum, alii ischiada uocant, radix incidit quidem, & in tertio ordine siccatur, in primo autem calefacit.

Leucas.

Leucas calfacit siccaturque in tertio ordine, acrimonia uero præpollet.

Leucoion, uiola alba.

Albæ uiolæ totus frutex abstergerendi extenuandi que uireis possidet, magis autem flores, & ex eis, sicciores; idcirco & mensis stimulant, sætus corrumpunt expelluntque; ac si quis aquæ mistura uim ipsorum obtundat, etiam inflammationibus conducunt, præsertim uteri: radices eadem præstant, crassiore magisque terrestri natura præditæ: aceto inflammationibus in scirrhum indurescentibus imponuntur.

Leuce. populus alba.

Populus alba aquosa, tepida, terrestri que constat substantia, uiribus absterforiis.

Libanotides , rosmarinus .

Libanotides tres numeratur, una sterilis, duæ fructum ferentes, vires illis extergendi, incidendi, discutiendi, & emolliendi, succus earum oculis & humorum crassitie hebetibus salutariter ex melle imponitur: coronariæ uerò libanotidis decoctæ ius regio morbo laborantibus rectè bibitur.

Libarotos, thus .

Thus in secundo ordine calefacit, in primo siccatur, habet & modicam quandam vim leuiter astringentem: cortex ipsius manifestò astringit, siccaturque in secundo abscessu absolutè, crassior thure & minus acris, hinc sanguinem spuentibus, dysentericis, coeliacis, & stomachicis, tum foris impositus, tum intro assumptus, salutaris est. Surculus ipsius calefacit siccaturque tertio in abscessu, atque nonnihil extergit: quocirca oculorum ulcera, & purgat & explet.

Lygnis, fuligo .

Fuligo specierum quarundam concrementarum, nempe thuris, myrrhae, terebinthi, styracis, picis liquidæ, cedri, ueluti tenuissimus quidam pulvis est, qui Græcis æthale dicitur, cum fumo ascensum obtinet quidam siccantem & terrestrem tenuemque substantiam particulares autem ipsius differentiae secundum materiae combustionis rationem sunt. Utuntur ea potissimum in medicinis oculariis, & ad honestandas palpebras accommodatis. at thuris fuligo omnium est utilissima, ut quæ mitior: contra pini, conis, & piceæ ualentiore est, quo fit ut ad glabrescentes palpebras, destillantes & erosos oculorum angulos, illachrymantesque, rectè adhibeatur.

Ligusticum, ligusticum .

Ligustici & radix & semen adeò calefaciunt ut mensis contentent, flatusque probe discutiant.

Lithargyros, argenti spuma .

Argenti spuma medijs inter metallica ordinis est, eoque; cuius materie ipsa alijs medicinis mista subinde utimur, siccatur tamen mediocriter, abstergit & astringit: inde femorum attritus per sanat.

Litthi, lapides .

Lapides omnes terræ modo desiccant, sed hamatites astringit & abundè siccatur. quare etiam oculorum asperitates extertit,

exterit, quum quidē inflammatione carent, ex aqua: quum uerò illa tentantur, ex ouo: cæterū ad spura cruenta bibitur utiliter; ulcera supercrescentia compescit. Schistos lapis superiori quidē consimilis est, sed imbecillior, mox galactites, i. lactarius sequitur. Melicites cuiusdam ē calor compos est. Moroxus, quem etiā, leucographida uocant, quò prædictis omnibus minor est (nullas. n. habet uireis efficaciores) eò moderatior, magisq; dolorē lenit, eamq; ob causam in teneris corporibus cū cerato ad cicatricē ulceribus obducendam illo utuntur. Iaspis qui subuiridi colore est, quū efficacior sit, oculorū cicatrices & pterygia extenuat: uiridis autē Iaspis ad alligatus & in anulo gestatus stomachū adiuuat. Iudaicus dictus, renū calculos conterit, unde ē recentiores tecolithon appellāt. Pyrites ex eorum numero est, qui ualidē discutiunt tumores, sanguinemq; in grumos concretū: cuius quum facultas nō est, molari utuntur. Phrygius præter quam q̄ ualenter desiccet, non nihil etiā astringit roditq; unde & repellere & discutere potest, eoq; oculariis miscetur remediis. Ageratus astringendi discutiendiq; uirtutis cōpos, gutturis inflammationē iuuat. Asiæ petræ hōs tam subtilem naturā habet, ut carnes humiditate flaccidas citra rosionem absumat. Gagates affatim siccans inflammationibus præsertim diuturnis expedit. Magnes, quem & Heraclīū lapidē uocant, æquales hæmatiti uireis repræsentat. Arabicus ebori similis, siccandi detergendiq; uireis habet. Alabastriz combusti cinerem stomachicis nonnulli bibendum exhibent. Smyris extergit, dentibus purgandis accommodatus. Qui in spongiis inueniuntur lapilli, renum calculos frangūt. Similes his uireis habent qui in Argæo Cappadociæ monte nascūtur. Similiter & ophites dictus, qui ad alligatus contra uiperarū morsus confert. Ostracites, hoc est, crustaceus, & geodes à terra quam intra se cōplectitur appellatus, abundē siccare feruntur, ideoq; inflammatis tumoribus mederi. Naxiæ cotis detrimentū refrigeratorium esse dicunt, ut & uirginum mammas & puerorum testiculos ne crescant, reprimat. Quod uerò ex olearia cote detritum fuerit, abstersoria uī donatum alopecias explet. Hieracin & Indicum lapidem alligatum contra hæmorrhoidas ualere perhibent. Sapphyrus potus, scorpionum ictibus aduersatur. Aphroselenes, comitialibus potui datur. Armeniacus, inferiore uentrem purgat, sed stomacho nocet.

Lithospermon.

Lithospermon, quod alij Liosporon, alij heraclion uocant, herbæ aetonychi dictæ, semen est lapidosum, album, quod cum uino albo potum calculos frangit, & urinas eijs cit.

Linospermon lini semen.

Lini semen ex primo gradu calidum est, inter humectantia siccantiaq; medium manducatum flatibus creandis est, etiā si frictum fuerit.

Linozostis, herba mercurialis.

Herba mercurialis aluum liberaliter subducit, inducta cata plasmatis modo discutit. Sciendumq; est eius semen infricatum corporis excrescētias præter naturā, quas uulgus uocat naphia, abolere, sicut experientia cōprobatū est. Sed uiride semen esse oportet, & frequenter ipsum tuberculis illis infricare.

Litrum, nitrum.

Litrum mediū inter aphronitrii & salem uirtute est: crematum magis extenuat discutitq;, & si intro sumat, crassos viscososq; humores plus cæteris incidit & extenuat. Chalastreū uerò (est aut Calastra Thessaliæ locus) acri⁹ siccātiusq; ē, quare ad capitis destillationes & articulares cruciatus eo utūtur.

Lenchitis.

Lenchitidis, cui semen triangulum est, cuspidis modo, radix dauco æqualis urinam mouet: eius uerò quæ scolopēdio respondet, folia uiridia, uulnera glutinant, sicca uerò cum aceto pota lienibus scyrrho induratis, medentur.

Lycopsis.

Lycopsis radix quum sit astringentia, cum polenta admota in cataplasmate. Erysipelatis auctore Dioscoride cōuenit: si læuis cum oleo iungatur, sudores elicit.

Lycium.

Lycium ex diuersis genere substantijs constat, calida, tenui, & discutiente, terrestri uerò frigida & leuiter astringente, ut in secundo abscessu desiccet, calefaciendo refrigerandoque medium est, hac de causa ceu absterfio, in oculis obscuratis eo utuntur: tanquam astringenti, in celiacis, dysentericis, & maleficijs ulceribus; at contra inflammationes, ut discutiēt: cæterum primas obtinet Indicū.

Lysima-

Lysimachum.

Lysimachum uim habet excellenter astringentiā, qua & uulnēra glutinat, & sanguinem compescit, tum ipsum, tum ipsius succus, dysentericos & potum & ab inferioribus partibus iniectum, sanat.

Lychnis.

Lychnidos coronariæ semen calidum est & siccum in secundo abcessu, eoq; absoluto.

Lotus herba.

Lotus domestica, quam nonnulli triphyllon appellant, absterforias uireis obtinet & modicē siccantēis, calore temperata est. At sylvestris loti semen ad secundum calefacientium ordinem refertur, habet autem nonnihil etiam absterforium. Aegyptiæ semen in panes quoq; effingitur.

Lotus arbor.

Lotus arbor extenuat, siccāt, & mediocriter astringit, quā de causā ad fluxum muliebrem, aluit fluores pota cū uino aut aqua, aut ēt in aluū data, salutaris est, pilos defluos confirmat.

*Quæ ab M auspiciantur.**Macer.*

Macer cortex est q. ex India importat, tertio ordine siccāt inter calorē & frigiditatē mediū obtinet: est etiam astringens tenuisq; unde cœliacis & dysentericis auxiliariis habetur.

Malobathron.

Malobatri foliū æquales spicæ nardi uireis representat.

Malache, malua.

† Malua sylvestris mediocriter discutit & emollit: hortēsis autem, ceu humidior, etiam imbecillior est: semen tantō uiribus præstat, quanto & siccius est.

† Huic capiti addita sunt quædā in ueteribus manuscriptis de dendromalache, quæ quia totidem uerbis apud Aetium leguntur, adscribenda non putauī.

Mamiras.

Mamiras ueluti radícula herbæ cuiusdam est ceu geniculis frequētib; nodosis, quæ cicatrices & albugines extenuare creditur, exterendi nimirum facultate prædita.

Mandragoras, mandragora.

MAndragora tertii refrigerantium ordinis est, mala ipsius caliditatem quampiam & humiditatem referunt, unde soporem grauem homini possunt accersire: at radicis cortex uehementissimus, non refrigerat modo, sed etiam siccatur: interior eius pars imbecillior est.

Manna thuris.

MAnna thuris simileis thuri uireis habet, sed remissas & sensim astringentes.

Marathron, fœniculum.

FOeniculum calefacit in tertio ordine, in primo siccatur. hinc etiam lacti generando est, & suffusus auxiliatur.

Mastiche.

MAstiche, Chia quidem calefacit, siccaturq; in secundo abscessu, cæterum compositæ est facultatis, astrictioris simul & emollientis: hanc ob rationem stomachi, uentris, intestinorum & iocinoris inflammationibus cõuenit. Aegyptia, nigriore colore quodammodo, siccatur magis & discutit, minus astringit, hinc furunculos quoq; dissipat.

Melan, atramentum Indicum.

Atramentum Indicum auctore Dioscoride in genere leniter astringentium est, quæ inflammationes laxosq; tumores, œdemata uocant, rumpunt, ulceraq; purgant.

Melantheria, creta sutoria.

CReta sutoria impensè astringit extenuatq;.

Melan, atramentum scriptorium.

Atramentum quo scribimus abundè & ipsum desiccatur, solum uerò posca ambustis si illinatur, præsentis est remedio.

Melanthion.

MElanthion in tertio ordine calefacit & desiccatur, est etiam tenui natura præditum unde destillationibus in fauces, olfactu prodest, intus assumptum discutiendis flatibus singulare: est etiam amarum, unde tineas interficit: abstergit & incidit, hinc orthopneis quoq; conuenit, item lepras exterit, myrmecias eiicit, & menstrua incitat.

Meli, mel.

MEl calefacit & siccatur ordine secundo, abstergitq; insigniter coctum

coctum uerò minus quidem acre redditur, deterforium, & uen-
tri subducendo accommodum, sed magis nutrit. Amarū mel,
sicut & id quod in Sardinia fit, mistas habet uireis, terrestrem &
calidam. At mel, sachar quod ex felici Arabia conuehitur, mi-
nus dulce nostro est, sed æqualeis uireis obtinet, præter q̄ qđ
nec stomaco noceat, nec situm faciat, quẽadmodũ hoc Noltras.

Melia, fraxinus.

FRaxinus nota arbor est, folia eius pora uiperarum moribus
succurrunt, cortex crematus, illitusq; ex aqua lepras sepa-
rat, ligni uerò ramenta si bibantur, lethalia esse ferunt.

Melilotes, scutula Campana.

Scutula campana mixtis facultatibus pollet: astringendi, di-
scutiendi & concoquendi.

Melissophylon, apiastron.

Apiastrum uiribus marrubio per omnia respondit.

Memacylos.

Memacylos arbuti fructus, in litera C comprehensus est.

Mespila.

Mespila, alii triocca quasi trigania uocāt, fructus est affatim
acerbus, & uix esculentus, aluumq; continēs: germina fo-
liaq; mespili impensè acerbata sunt.

Medion.

Medij radix uireis semini contrarias præ se fert, quippe au-
stera est & fluxiones comprimit, ideoq; muliebrem fluxū
sistit: semen quum tenuis incidentisq; sit facultatis, menseis
quoq; proritat.

Neccon, papauer.

Papauer multiplex est, hortensis quidem, quod etiam thyla-
citin ceu utricularium uocant semen est esculentum, si cū
pane assumatur, mediocriter somnum concilians. Arthroas ap-
pellatum, inde q̄ semen ipsius celeriter defluat, ualidius hor-
tensi est: manducatur itaq; non per se, sed momentum copio-
siori melli mixtum. Quod ueluti decidenti, ac depressio calyce
est, nigrum semen habet, & medicatum, nimis quàm frigidum.
Quod prolixiore & proceriore constat calyce, medicacius quā
cetera omnia existit, ut etiam stuporem inducat, quousq; inte-
rimat. Nā & ipsum & eius lachryma, quam per excellentiam
opion

opion nuncupant, quarto refrigerantium abscessui ascribuntur. Cornicularum papauer abstergendi uireis fortitur, ideoq; radices ipsius decoctum potu iocinorosis auxiliatur: folia autē & flores perquam sordida ulcera expurgant, crustasq; tollunt. Heraclion & aphrodes, id est spumosum papauer dictum, semē habet pituitæ purgandæ accommodatum.

Mela, mala.

MAlis omnibus frigida & excrementitia inest humiditas: & quæ in eorū censu resoluta & aquosa sunt, frigiditate cæteris & humiditate præstant: dulcia, aquosa quidem, non tamē manifestè frigida sunt austera dulcibus quidem frigidiora, sed minus humida: acida frigida quidem & ipsa, uerum incidendi humores uentriculo inhærentes uim testantur: acerbæ, cuiusmodi cotonea & struthia sunt, frigido & terrestri donata temperamento, uentrem supprimunt, uulnera glutinant pari modo folia, succi, & cortices arborum inter se differunt.

Melea, malus, persica.

MAli persicæ surculi & folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; umbilico imposita, tineaꝝ enecant: fructus autem ipsius nempe persicum hoc esculentum, in secundo ordine frigidum humidumq; existit.

Melea, malus Armeniaca.

MAli armeniæ fructus, quæ nunc uocant mala præcocia, consimiles persicis uireis refert.

Meon.

MEi radices in tertio ordine calefaciunt, in secundo siccant, ideoq; urinam & menses cient: liberalius meon assumptum, capitis facit dolores.

Milax.

MIlax tam læuis, quam aspera, arbores amplexa, calidam acremq; facultatem possidet.

Misy.

Misy medicamentum est ex ijs quæ crustam faciunt & adurunt, ualenterq; astringunt, minus autem quam chalcitis erodit, quoniam tenuius ea est: cæterum chalcitis & fori uetustate in misy mutantur, ut ait Galenus; à superficie incipiente statim mutatione.

Molibdena,

Molybdena, plumbago.

Plumbago argenti spumæ uireis habet à medio temperamento ad frigidius digressa.

Molybdos, plumbum.

Plumbum refrigeratoriæ uirtutis est, habet & humidæ substantiæ plurimum, quod ex frigore coaluerit. Quod si id perfundatur ceraturq; aut uino, aut immaturo oleo, aut quodam succo refrigerante, ad naturalium & sedis ulcerosas inflammationes excellentissimum erit remedium: lamina uero plumbæ super lumbos gestata, ueneris insomnia cohibet. Item bractea tenuis ganglio imposita, ipsum dissipat. Concrematum plumbum ualidius quidem siccat, sed & acrimoniæ non nihil obtrinet: si eluatur, tum sine rosione siccat, tum maleficis ulceribus præsentaneum est remedium.

Moræa, morus.

Mori fructus maturus quidem aluum subducit, & medicamenti stomaticis aliis quæ moderatam requirunt restrictionem utiliter miscetur, immaturus ubi exaruerit, per quàm obstruens fit medicamentum: cortex autem radice arboris etiã amaritudinis cuiusdam particeps, purgare potest, eoq; latas uentris tineas occidit: foliorum autem surculorumq; uis, subducentium & comprimentium media quodammodo existit.

Myagros.

Myagri semen pingue est, quod in eo oleosum habetur, opulendi uireis repræsentat.

Myaces, mituli.

Mytuli cõbusti, eundẽ cū buccinis effectum præstant, propriè uerò eloti palpebrarũ asperitatẽ & albugines cum melle exterũ, caro ipsorũ canũ moribus utiliter imponitur.

Myaron.

Myaron, quam alij melampycnon appellant, herba ferulacea est & pinguis, uidetur autem ip̃us pinguitudo corporis asperitates læuigare.

Myclos, med ulla.

Medula facultatis est quæ indurata ac in scirrhum concrementa corpora emollit. Laudatissima est ceruina, moruitulina: taurina uero hircinaq; acrior est, magisq; siccat, & quæ

quæ in artubus continetur, pinguior est magisq; emollit: quæ de spina elicitur, durior squalidiorq; est.

Mycetes, fungi.

FVngi frigidi & humidi admodum temperamento sunt: nonnulli ipsoꝝ manducati, etiam exitium adferunt, præsertim qui inter ipsos natura constant putridæ qualitatis participi.

Myosote, muris auriculu.

MVris auricula dicta est asine.

Myxa.

MYxa arboris fructus est minor quidem prunis, facultate uero consimilis.

Myrica, tamarix.

TAmarix incidit extergitq; ita ut manifestè non siccet, habet autem astrictionem nonnullam, quæ de causa decoctũ ipsius potum lienes adiuuat, item dẽtium doloribus medetur: fructus autem & cortex ipsius gallæ uirtute proximus est, cinis arboris uehementius exiccat.

Myriophillon, millefolium,

MIllefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera conglutinet.

Myrrha, uel myrrhis.

MYrrha in secundo ordine calefacit, ac nonnihil etiam extenuat, radix ipsius odorata dulcisq; est, mensibus mouendis, & humoribus & thorace & pulmone repurgandis idonea.

Myrrhine, seu myrsine, myrtus.

MYrtus ex diuersis cõposita est substantiis, pollet in ea terrestris frigiditas, quæ ualenter siccatur: at myrtula quæ soboles myrti est, tuberosa, caudicem ipsius & ramos amplexa, uehemẽtius astringit & siccatur. iam uero & folia aridiora uiribus magis siccant: item fructus succusq; tum foris applicatus, tum intus assumptus persimileis uires præ se fert.

Moly.

MOly, quod nonnulli rutam syluestrem, alii zarmalam dicunt, Syrijs besafam, tertio calefacientium ordini adnumeratur, substantia tenuis, hic crassos humores uiscososq; incidit, discutit & urinam promouet.

Quæ

Que ab N incipiunt.

Nascaphthon.

NAscanthon, sunt qui nascaphthon dicūt, Indicū est odōramētū, qđ ad astrictos fœminarū locos sufficit uaporetur.

Napy, sinapi.

SInapi calefacit siccātq̃ue in quarto abscessū.

Nardostachy, spica nardi.

SPicæ nardi radix calfacit in primo, siccāt in secundo ordine; particeps est etiā astringentis cuiusdam qualitatis, acris, & subamaræ, locinori igitur prodest & stomacho extrinsecus ad morā & ebibitā, urinā mouet & interaneorum fluxiones de siccāt: sed Indica ualentior est quā Syriaea, & nigrior.

Nardus Gallica.

NArdus gallica superiori uireis habet similes quidem, sed imbecilliores, præterquam ad urinā ciendam: calidior enim est quā illa, minusq̃; astringit.

Nardus montanus.

NArdus montana, quæ nonnullis thylacitis, pyritisq̃ue dicitur, commemoratis est infirmior.

Nartex, ferula.

Ferulæ semen extenuat calfacitq̃ue medulla ipsius uiridis adhuc, astringit, eoq̃ue sanguinem spuentibus & coeliacis accommodata est.

Narce, torpedo marina.

TOrpedo marina uiuens capiti imposita dolores eius arcet, idq̃; forsā eodem illo torpore quem membris eam contingentibus inducit: oleum in quo uiua decocta fuerit, ad aciores articulorum cruciatus leniendos inungitur, eadem torpedo anum procidentem coercere apposita fertur.

Narcissus.

NArciisi radix adeò desicc at, ut maximis uulneribus sit glutinandis, imò etiā tendinum præcisionibus confert, cæterum abstergendi & attrahendi uim quandam habet.

Neuras, seu poterion.

NEuras, quod alij poterion uocant, sine rosione desiccāt, ut & ipsa neruos præcisos glutinet: radices autem potissimum hunc effectum præstant, & impositæ, & potæ.

Nerion

Nerion, aut rododaphne.

Nerion extrinsecus applicatum uim refert discussoriam: si
intus assumatur, occidit.

Nymphaea.

Nymphaea uireis habet sine rosione siccas, quibus & uentrē
reprimunt, & genituram arefaciunt: uerum alba radice donata
ualentior est, eoque fluxum muliebrem cum uino nigro & au-
stero pota per sanat: quæ nigram refert, deterforia quoque ui
nonnulla pollet, eaq; utiligines, alphas dictas cum aqua exte-
riori alopecias cum pice liquida illita replet.

Quæ ab X ordiuntur.

Xanthion, aut phasganion.

Xanthion phasganumve fructum fert discutiendi uiribus
præditum.

Xiris, aut Xyris.

Xiris naturæ tenuis est, discussoriæ, & extrahentis, ac nimi-
rum siccatoriæ, præcipuè semen, quod & urinam cit, & lie-
ni in scyrrhum indurescenti medetur.

Xiphion, gladiolus.

Gladioli radix trahit, discutit, & siccatur.

Quæ initium habent ab O,

Oe, sorbus.

Sorbus arbor cuius fructus oa, à nonnullis & dicitur, astringen-
di uim obtinet, sed minorem mespilo.

Othonna.

Othonnam, alii herbæ esse succū in Arabia ad Aegyptū na-
scentis affirmant, alii lapidem Aegyptium: detergit autem
eroditq; omnia quæ claritati oculorum officiant, exterens.

Oenanthe.

Purimus sanè usus syluestris uitis: florem abundè astringen-
tem esse fatetur: & uentrem potissimum corroborare.
Dioscorides autem aliam describit oenanthem contrariis dona-
tam uiribus, unde secundas eam eiicere, & urinæ stillicido, mor-
boque regio mederi tradit.

Oenos, uinum.

Vinum ex ijs est, quæ in secundo ordine calefaciunt, siccantq;:
quod

quod admodū uetustum est, in tertio: Mustum uerò in primo.

Oesypus, lanæ pinguitudo.

OEsypus in sermone de lanis explicata est.

Olynti, grossi.

GRossi acrem & discussoriam uim obtinent, liquoris gratia qui in ipsis continetur. coeli igitur duros tumores dissipant: crudi myrmecias & thymos exterunt.

Olostium.

Olostium siccatur astringitq;: hinc eo ad rupta utuntur.

Omphacium.

Omphacium succus est uuæ immaturæ, astringens egregiè & siccans in tertio abscessu: eoq; fluidis affectibus & præsertim stomachicis, accommodatur.

Onagra.

ONagra, quā nonnulli onotheram, alii onothurin dicunt, frutex est arboreus, cuius radix inducta, ferocientia ulcera mitigat.

Onoma.

ONoma, uel onomis, uel phlomitidis, uel ononis, acrem, amarāq; uim obtinet, eamq; ob causam folia eius cum uino pota foetus occidunt expelluntq;.

Onobrychis.

ONobrychis ui rarefaciendi & discussoria, tubercula, quæ phimata dicuntur, dissipat, urinæ stillicidio medetur, & sudores prouocat.

Oni, asini seu multipedæ.

Multipedæ quæ sub aquarijs uasis agunt, & in orbem se con duplicant, discutiunt siccantq;: potæ cum uino urinæ angustis & arquato medentur, anguinæ itidem cum melle iisdem illinuntur. Item detritæ cum rosaceo calfactæq; in mali punici cortice, auribus dolentibus salutariter, instillantur.

Onyches, conchulæ Indicæ.

ONyches conchyliorum Indicorū opercula sunt, quæ suffutu, strangulatione uuluarum concidentis fœminas excitant, item comitiales: potæ uerò aluum turbant.

Ononis.

ONonis radice constant quæ in tertio ferè gradu calefaciunt,

cortex

cortex ipsius extergit, & incidit, unde etiam calculos conterit.

Oxos acetum.

ACetum mixtae est naturae frigidae & calidae, sed utriusque; tenuis, frigida tamen calidum excellit. cæterum in tertio ordine siccatur.

Oxiacanthos.

OXycanthus arbor piro sylvestri & figura & uiribus similis est, habet & subtile quippiam coniunctum: sed fructus ipsius myrti baccis respondet.

Opos, liquor.

Liquores, & Cyrenaicus, & Medicus, & Syriacus per excellentiam dicuntur, calidi naturae, & spirituosius insigniter: uerum Cyrenaicus cæteris est calidior tenuiorque.

Origanum.

OMnia origani genera incidendi, extenuandi, siccandi, & calefaciendi uireis in tertio abscessu ostendunt.

Oreoselinum, apium montanum.

APium montanum uiribus domestico æquale est, sed inualentius.

Orobanche.

Orobanche sicco & frigido temperamento est, secundum primum ordinem.

Orobos, eruum.

Eruum calefacit in primo gradu, siccatur in secundo, amarumque est, quapropter incidit, detergit, obstruata aperit: liberalius sumptum sanguinem per urinam expellit.

Orminon.

Orminon marrubio specie simile est, calidum, mediocriter siccum & abstergens, uenerem igitur stimulat, & oculorum crassities cum melle repurgat, tumores laxos quæ œdemata uocant, discutit, & extrahit aculeos. Sylvestre domestico est ualentius.

Oryza.

Oryza uim quandam astrictoriam præ se fert: quæ etiam uentrem mediocriter cohibet.

Orchis herba.

Orchis herba (nominatur autem etiam cynosorchis, id est, testiculus

testiculus canis,) radicem habet bulbosam & duplicem: uis autem maioris, humida & calida, eoque ueneri incitanda est: minoris, calida & sicca, contra igitur uenerem coarctet.

Orchis, serapias.

Orchis, quæ & Serapias dicitur, aliis triorchis, priore ualentius desiccatur, quare laxos tumores cedentesque dissipat, ulcera sordida & putredini obnoxia repurgat, herpes abigit in arefacta autem magis siccatur. Quoniam uero substringere idonea est, aluum quoque cum uino pota retinet.

Osyris.

Osyris, ex qua medicamenta ad exterendam, laxigandamque cutem, Græci coremata uocant, fieri solent, amara est, & iecoris laxandi uireis habet.

Ossa, ossa.

Ossa concremata uehementer discutiunt siccantque: præsertim id facere dicuntur humana: atqui sui illis talus com bustus inflationibus & circa umbilicum torsionibus mederi dicitur, quinetiam ossa cremata si potui quis exhibeat, morbum comitalem, & articulares dolores abigunt. Bubulus talus uisus, mobileis firmare dentes prædicatur, cum melle potus teretes tineas educit, cum oxymelite lienem consumit, & uicilignes, quas uocant leucas, illitus abolet, item ad uenerem commendatur: femora bouis cremata potu sanguinis eruptiones, & alui fluxum compescunt.

Ostraca, testæ.

Testæ fornacium tritæ siccant exterguntque, hinc dentifricis accommodantur, illitæ cum aceto prurigini, pustulis, quæ appellantur exanthemata, conferunt, cerato exceptæ strumas discutiunt.

Ostrea.

Ostreorum testa cremata æqualem buccinis uim, sed minus crassam repræsentat, abstergit igitur faciei labes, & dentibus nitorem conciliat: elota rosionem amittit, ad carnem cicatricemque humidis ulceribus inducendam accommodata.

Ouron.

Vrina quælibet calida est & acris, sed humana omnium aliorum animalium, exceptis maialibus, infirmior est. cæterum

uehementer abstergit, quapropter nonnulli, potione eius in pelle usi, mortem euaserunt, eadem lepras, ulcera putredinem experta, capitisq; manantia ulcera, quæ uocantur achores, & furfures perlanat. item pedum attritus, nondum inflammatio ne occupatos. At pueri uenerem non experti urina omnium efficacissima est, unde etiã chrysocolla conficitur. Mulorum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & chamelorum, aluum deiicit. ideoque contra aquam subter cutem bibitur.

Quæ à P incipiunt.

Pancration.

Pancration & specie & uiribus seyllæ simile est, uerum imbecillius.

Paliuron.

PAliuri folia & radix astringunt, eoq; aluū fluentem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutunt: Semen eius tam uehementi incisoria uirtute ualet, ut & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxilietur.

Panaces.

PAnaces Herculeum est ex quo opopanax dictus cōficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans, emolliens, discutiensque: radicis cortex liquore imbecillior, habet nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneū: semen ipsius mensis quoque citat. Asclepion panaces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus ipsorum & semine ad malefica ulcera & phymata utuntur.

Papyrus.

PApyrus ignem non experta, materia quædam efficitur: uista, siccatur chartæ crematæ modo, uerum papyri cinis uiribus inferior est.

Paronychia.

PAronychia inde nomen accepit quòd digitorum reduuiis, quæ græcis dicuntur paronychis, medeatur, uis eius est extenuare & siccare, idque citra rosionem.

Pentaphyllon, quinquesolium.

Quinquesolium in tertio ordine desiccatur, minimè acre, eoque in multos usus accommodatur.

Peplon,

Peplon, herba.

PEplon nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

Peplion.

PEplion quoque liquorem habet & magna ex parte maritimis locis nascitur, cætera quidem inutile, semen autem ipsius feruidi saporis ut peplum expurgat.

Peperi, piper.

PIPERIS radix costi uireis refert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidius natura & calidum: fructus ueluti acerbus immaturusque, album est piper, nigro acrius, ut quod impendio magis assatum sit: utrumque uerò & calefacit & desiccatur.

Pepon.

PEPON absterforiz facultatis est, inde ueluti caro ipsius ephelidas & consimilia faciei uitia exterit, semen renes obstructione liberat.

Periclymenon.

PERYCLIMENI folia & semen incidendi simul & calefaciendi uireis obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad sex dies pota: semen autem ad quadraginta dies potum lienosos & ægregiè spirantes adiuuant.

Peristereon, uerbenaca.

VERBENACA adeò desiccatur astringiturque, ut uulneribus glutinandis, † & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

† Totus hic locus in antiquis sic legitur. περιστερέων ἐστὸ σῆτον ἐν ἑρμείνῃ τε καὶ σίφει ὥστε δύνασθαι κολλᾶν τραύματα, ὁ δὲ ἐπὶ τῶν κακονθῶν τε καὶ φαγιδαίνικων αὐτῷ χρωταί. Id est. Peristereon usque adeò siccatur & adstringit ut possit glutinare uulnera. Itaque eo utuntur in malignis ulceribus & ad partes uicinas serpentibus.

Persæa seu persica.

PERSÆA arbor est, Aegypti, cuius folia & siccant & astringunt eoque sanguinis eruptionem compescunt.

Petasites.

PETASITES tertio siccantium, ordini ascribitur, unde & malefica & phagedenica ulcera eam usurpant.

uehementer abstergit, quapropter nonnulli, potione eius in pelle usi, mortem euaserunt, eadem lepras, ulcera putredinem experta, capitisq; manantia ulcera, quæ uocantur achores, & furfures perlanat. item pedum attritus, nondum inflammatione occupatos. At pueri uenerem non experti urina omnium efficacissima est, unde etiã chrysocola conficitur. Mulorum, articularibus doloribus congruit. Caprarum & chamelorum, aluum deiecit. ideoque contra aquam subter cutem bibitur.

Quæ à P incipiunt.

Pancration.

Pancration & specie & uiribus seyllæ simile est, uerum imbecillius.

Paliuron.

Paliuri folia & radix astringunt, eoq; aluū fluentem sistunt, tubercula, quæ dicuntur phymata, non nimis calida discutunt: Semen eius tam uehementi incisoria uirtute ualet, ut & calculos conterat, & excreationibus è pectore auxilietur.

Panaces.

Panaces Herculeum est ex quo opopanax dictus cōficitur, in tertio ordine calefaciens, in secundo siccans, emolliens, discutiensque: radicis cortex liquore imbecillior, habet nonnihil & abstergens, & carni ducendæ idoneū: semen ipsius mensis quoque citat. Asclepion panaces & Chironium priori calidiora sunt, hinc floribus ipsorum & semine ad malefica ulcera & phymata utuntur.

Papyrus.

Papyrus ignem non experta, materia quædam efficitur: uista, siccata chartæ crematæ modo, uerum papyri cinis uiribus inferior est.

Paronychia.

Paronychia inde nomen accepit quod digitorum reduuiis, quæ græcis dicuntur paronychiz, medeatur, uis eius est extenuare & siccare, idque citra rofionem.

Pentaphyllon, quinquefolium.

Quinquefolium in tertio ordine desiccatur, minimè acre, eoque in multos usus accommodatur.

Peplon,

Peplon, herba.

PEplon nonnulli papauer spumeum dicunt: & hic frutex liquorem habet, & tithymalorum modo purgat.

Peplion.

PEplion quoque liquorem habet & magna ex parte maritimis locis nascitur, cætera quidem inutile, semen autem ipsius feruidi saporis ut peplum expurgat.

Peperi, piper.

Piperis radix costi uireis refert: fructus nuper quidem germinantis arboris, oblongum est piper, humidius natura & calidum: fructus ueluti acerbus immaturusque, album est piper, nigro acrius, ut quod impendio magis assatum sit: utrumque uerò & calefacit & desiccatur.

Pepon.

PEpon absterforiz facultatis est, inde ueluti caro ipsius ephelidas & consimilia faciei uitia exterit, semen renes obstructione liberat.

Periclymenon.

Peryclimeni folia & semen incidendi simul & calefaciendi uireis obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad sex dies pota: semen autem ad quadraginta dies potum lienosos & ægregiè spirantes adiuuant.

Peristereon, uerbenaca.

Verbenaca adeò desiccatur astringiturque, ut uulneribus glutinandis, † & sanguinis eruptioni sistendæ sit.

† Totus hic locus in antiquissimis legitur. περιστερεὼν εἰς τὸν αἶθρον ἐκβαίνει τε καὶ αἴθει ὥστε δύνασθαι πολλὰν τράυματα, ὁ δὲ ἐπὶ τῶν κακῶν θῶν τε καὶ φαγιδαινικῶν αὐτῷ χρώνται. Id est. Peristereon usque adeò siccatur & adstringitur ut possit glutinare uulnera. Itaque eo utuntur in malignis ulceribus & ad partes uicinas serpentibus.

Persæa seu persica.

Persæa arbor est, Aegypti, cuius folia & siccant & astringunt eoque sanguinis eruptionem compescunt.

Petasites.

Petasites tertio siccantium, ordini ascribitur, unde & malefica & phagedenica ulcera eam usurpant.

Petroselinon.

Petroselini semen calidum siccumque est in tertio abscessu, ui incisoria præditum, urinam, menseisque copiosè trahit, flatibus discutiendis accommodatissimum.

Peucedanum.

Peucedani liquore & succo affatim calefacienti, discutienti, extenuantique utimur, tum naribus admoto, tum in potione assumpto, ad pulmonum & pectoris uiria ex humorum crassitudine contracta: item ad lienem scyrrho induratum: dentibus autem perforatis impositus, dolorem protinus sopit, nervorumque affectibus idoneus est: radix squamas ossium separat, malehæcis ulceribus succurrit, in tertio ordine & calefaciens & desiccans.

Peuce, pinus uel pinaster.

Pinus piceæ uiribus respondet, sed moderatior est.

Peganum, ruta.

Ruta sylvestris ad quartum calefacientium siccantiumque ordinem refertur: satiuæ, ad tertium, cuius uis est crassos lentosque humores incidere, & dissipare, urinam mouere, attenuare, & flatus discutere, unde & uenerem coercet.

Pissa, pix.

Pix arida quidem in secundo abscessu desiccat, minus calefacit: liquida e contrario, imò etià extergit, maturat, discutit, acrisque est, eamque ob causam unguentis scabros educit, impetigines exterit, tumores maturat. Valentior autem est liquida, ut etiam suspirosis & purulenta excreantibus, lincta subueniat: sed arida uulneribus magis glutinandis est.

Pisselæon, oleum picinum, seu pici flos.

Picinum oleum ex liquida fit pice, qua natura tenuius existit.

Pistacia.

Pistaciorum fructus esus stomacho mediocriter conducit, piceur oblitusctum laxat, præcipuè summi & odorati eorum operimenti ex uino decoctum, prosunt etiam contra serpentium morsus.

Pityides.

Pitides fructus sunt picearum, mistæ facultatis, astrictoriæ & acris, quam ob rem reiectionibus pectore opitulantur.

Pityocampæ,

Ptytocampæ, picearum erucæ.

PIcearum erucæ eiusdem sunt uirtutis quam cantharis & buprestis obtinet.

Pityos plæos, piceæ cortex.

PIceæ cortex astringendi uim eximiam possidet, qua intertrigines & ambusta illitus per sanat, uentrem potius reprimat: folia etiam uulnera conglutinant.

Pityusa.

Pityusam quoque nonnulli tichymalli speciem affirmant, quoniam & liquorem habet, & perinde ut illæ purgat.

Platanus.

Platanus ui humidior & frigidior pollet, eaq; de causa folia uiridia ad inflammationes nascentes proficiunt: cortex & pilulæ quoniam mbiore siccandi potentiam habent, in aceto decoctæ dentium dolores sopiunt, ambusta cum adipe per sanant. Cortex autem crematus siccatur uehementius & abstergit, eoq; lepras pellit, & humidis ulceribus medetur.

Pneumon, pulmo.

Pulmo agninus, suillusq; attritus pedum ex calceis curare credit: uulpinus sale inueteratus si bibat, suspitiosis proficit: marinus recēs detritus podagris & pernionibus succurrit.

Polemonium.

Polemonium, quod aliis phileterion dicitur, tenue est, & siccandi uiribus donatum, inde nonnulli contra coxendicis dolores, dysenterias, lienem scyrrho induratum, radicem eius, cum uino propinant,

Polium.

Polium minus, quo & in antidotis utimur, tertii calefacientium siccantiumq; ordinis est, itaq; omnia uiscera obstruata laxat, urinam mensisq; trahit: uiride adhuc, magna glutinat uulnera, aridum maleficis inspersum ulceribus proficit.

Polygalon.

Polygalon folia habet gustu mediocriter acerba: potum, lac quoq; generare putatur, calidi humidiq; temperamenti compos.

Polygonaton.

Polygonatum uariæ particeps est facultatis, astrictoriz,

acris, amaræ, & cuiusdam gustu ingratae, quæ uerbis neque ac-
 exprimi: quapropter in multiplicibus usus haud est accommo-
 datum: radicem ipsius nonnulli uulneribus inducunt, & faciei
 labes, quas pilos dicunt Græci, eo abstergunt.

Polygonon sanguinaria.

Sanguinaria habet sanè uim quandam astringendi, sed humi-
 ditas in secundo ordine frigida in ea præpollet, stomachi fer-
 uori frigida inspergitur utiliter, erysipelatis, inflammationibus-
 que calidis illinitur, ac talis quum sit, fluxiones repellit, atque
 hac ratione siccatoria esse putatur: foemina autem mas effica-
 cior est.

Polycnemon.

Polycnemon in secundo ordine calefacit & desiccatur, eoque
 uulnera glutinat.

Polypodium, filicula.

Polypodium siccatur abundè citra morsum: potum, inferius
 purgationem molitur.

Pompholyx.

Pompholyx sine rosione siccatur, ideoque cancriosis ulceribus
 aliisque maleficis opitulatur, item cum oculariis medici-
 nis miscetur.

Porphyræ, purpuræ.

Purpuræ crematæ testis similem uim sortitæ sunt, opercu-
 la ipsarum cum oleo incocta pilos fluidos confirmant, cū
 aceto pota lienes tumidos sanant: suffitu foeminas locorum
 strangulatu concidentes excitant secundasque eijciunt,

Potamogeton.

Potamogeton refrigerat & astringit, perinde ut herba san-
 gualis ipsdem uirtutibus præditum.

Poterion.

Poterij, quod alij phrynion dicunt, radices, concisæ neruos
 præsectos & uulnera conglutinant, decoctum ipsius epotū
 neruorum affectibus auxiliatur.

Prasion, marrubium.

Marrubium in secundo ordine calefacit, amplius autē sic-
 cat, iecur lienemque obstructū laxat, excreationes è thora-
 ce & pulmonibus, mensēisque promouet: in cataplasmate uerò
 inductum

inductum extergit, discutitq; præcipua extensoria incisoriaq; ui præditum,

Prason, porrum.

POrrum mali succi est & acris. ut autē Dioscorides memorizæ prodidit, grauiā facit insomnia, aluumq; bonam iurinā ciet, & extenuat: habet & abstergendi uim aliquam, quā pectoris excreationes elicit pituitiæ incoctum, semen uerò ipsius nephriticis temperatur medicinis: folia etiam non nihil astringunt, ac eam ob causam succus ipsorum sanguinem suppressit.

Prinos, ilex.

Ilex simileis quercui uireis habet, sed multò ea est ualidior.

Propolis.

Propolis calefacit quidē in secundo abscessu, abstergit autem mediocriter, tenuisq; naturæ est, & meatuū apertoriq;

Ptarmicæ.

PTarmicæ folia sternutamenta mouent, totus autem frutex uiridis sugillata, liuoresq; alios dissicit, est enim herba calida & sicca, uiridis secundi ordinis, arida tertii:

Ptelea, ulmus.

Vlmus siccare nalet & abstergere, eoque uulnera glutinare, cortex autem magis, si recens fasciolarum modo uulneribus circumuoluatur, cum aceto lepras quoq; tollit: radices idem præstant, si ossa fracta quæ solidari topaciā cicatrice, quā porron dicunt, desiderant, decocti ipsarum iure perfundantur.

Pterix, filix.

Filix uim siccandi & amaram repræsentat, eaq; foetus corrumpit, latasq; tineas enecat, instar quatuor drachmarum cum mulla pota: quoniam uerò modicè cōstringit, ulcera citra rofionem desiccare potest.

Pycnocomon.

Pycnocomon discutiente ui extrahēti acriq; donatum est, folia igitur panos & furunculos dissipant, semen præterea infixa corpori spicula extrahit, radix flauam bilem purgat.

Pyrethron.

Pyrethri radix adurentem potestatem occupat, dentiū qui frigori patuerunt dolores lenit, item ad febriū rigores ante accessionem infricatur cum oleo, adhæc iis quorum corpo-

ta stupent, & resoluta sunt, efficacissimiq; adhibetur.

Pyros, triticum.

Triticum in primo ordine calefacit, uerum siccando humectandoq; medium est, nonnihil etiam glutinosum, & obstruendi efficax obtinet.

Pytia, coagulum.

Coagulum omne naturae acris est, tenuis, discutientis, & nimirum siccantis sed leporinum comitiales sanare cum aceto potum, literis mandarunt: fluoremq; muliebrem emendat, lac in uentre concretum soluit, similiter etiam sanguinem nonnulli uero cruentas pariter e thorace excreationes cohibere ipsum tradunt, equinum uero coagulum coeliacis & dysentericis prodesset; phocae autem castorii uireis praeseferre.

Quae ab R incipiunt.

Rhacos, attrita uestis fragmentum.

Atritarum est lana uestium fragmenta concremata, simileis acidem lanæ uireis representant. Linei autem panniculi quum adhuc uruntur, tenuem ex se fumum reddunt, qui etiam destillationes in guttur liberet, & uuluae sursum recurrenti salutaris sit: cremati iam ad lanæ uirtutem accedunt.

Rhamnus.

Rhamnus siccatur in secundo, refrigeratur in primo abscessu, quare herpetibus & erysipelatis non admodum calidis medetur, sed teneris eius folijs utendum est.

Raphanus.

Raphanus in tertio abscessu calefacit, in secundo siccatur: syluestris efficacior est, in ambobus autem semen ualentius. itaq; sugillata, aliosq; liuores disijcit.

Rheon, rha.

Rheon, quod alij rha dicunt compositum est ex terrestri frigida & tenui substantia, aereaq; calida & leniter acris, eaq; ob causam conuulsis, ruptis, orthoproteis opitulatur: quod discutienti uim habeat, liuores emendat: quod alitricoriam, cruentas excreationes, coeliacos, & dysentericos sanat, utaq; uero facultate, iocinorosos iuuat.

Rhetina, resina.

Resinae omnes & calefaciunt & desiccant, uerum terebinthina

china principatum obtinet, discutientis naturæ, emolliētis, tenuis & absterforiæ, eoq; scabiem corrigit: & latex huiusmodi est. Quæ uerò è pinu destillauerit, atq; hac magis adhuc strobilina, acrior est, non tamen aut discutit magis, aut attrahit: medium inter ipsas locum tenet, & quæ de picea, & quæ de abiète raditur.

Rhoda, rosa.

Rosæ mixta constant substantia, aquosa scilicet, calida, astringenti, & amara: flos autem ipsarum magis adhuc astringit, eoq; desiccatur.

Rhodia radix.

Rhodia radix calefacit in secundo abscessu, tenui & discutiente ui prædita.

Rhæa siue rhoe, malum punicum.

Malum punicum omne astringendi uireis eximias habet, quibus refrigerat siccantq;: uerum dulce aliis minus: austerum magis refrigerat siccantq;: est & stomacho amicum, acidum refrigerat quoq;, & maiorem quandam incidendi uirtutem repræsentat, uerum acini succo magis astringunt siccantq;: efficacius his adhuc malicorium quod sidion Græci uocant: huic uirtute respondet mali flos qui cytinus appellatur.

Rhus.

Rhu coriariæ à medicis dictæ fructus præcipuæ & succus magno in usu sunt, quum illa astringendi siccantq; uim ex tertio ordine habeat, detergendi è secundo.

Rypos, sordes.

Sordes ex statuis æreis, aut uasis in quibus multum olei in hærescit, detractæ sicut nonnihil æruginis admixtum sit, discutendi uireis habent, siccantq; mediocriter & emolliendi, eiusq; immatura phymata discutit. At de sordibus quæ in palæstris habentur, quas nonnulli etiam patos uocant, in sudore dictum est. Aurium sordeculæ reduuiis mederi dicuntur.

Quæ ab S incipiunt.

Sagapenum.

Sagapenum, ceu ferulæ liquor est, calidus & tenuis, cui & absterforia quædam uis inest, qua & oculorum cicatricibus & suffusionibus prodest.

Salaman-

Salamandra.

Salamandra ustae cinerem nonnulli medicinis exedentibus, tum iis quae ad lepram & scabiem componuntur, admiscet.

Sampsuchum.

Sampsuchum calefacit siccaturque in tertio abscessu, est etiam tenuis naturae & discussoriae.

Sandaracha.

Sandaracha adurentis est facultatis, quemadmodum & auripigmentum.

Sandyx, uel siricum.

Sandyx, aut siricum extenuat & siccatur, non tamen calefacit.

Sapotes, caries lignorum.

Lignorum caries, praesertim ulmi, humentia purgat ulcera & explet.

Sapo.

Sapo abstergendi uim habet.

Sarcocolla.

Sarcocolla persicae arboris lachryma est, opplendi & citra resolutionem siccandi uireis sortita, a quo ideo uulneribus est glutinandis.

Saxiphages, saxifraga.

Saxifraga urinam mouet, & calculos conterit.

Satyrion, trifolium.

Satyrion, aut triphylion humidi est temperamenti & calidi, item flatuosum, unde ueneris appetentiam facit: nonnulli opisthotonis cum uino austero potum salutare esse tradunt. Galenus in commentario de theriaca trifolium ait hyacintho simile esse, quum aere inturgescens, semen syluestri cnico aquale habet: decocti ipsius ius superfusum phalangii, aut uiperarum morsus sanare: sano idem potui datum, similem animalium horum ictibus affectum conciliare.

Saura, lacerta.

Lacertae iecur & caput suo loco exposita sunt: totum autem caput dissectum impositumque scorpionum ictibus medetur.

Selinon, apium.

Apium tanti caloris est, ut & urinas & menses eliciat: ceterum

rum flatus discutit, præsertimq; eius semen.

Seris, intybum.

Seris subamarum olus est, admodum refrigerans humectasque, habet etiam nonnihil astringentis.

Seriphum.

Seriphum calefacit quidem in secundo, siccatur autem in primo ordine, consimile absinthio, minus tñ eo astringit, magis calefacit, aialia uentris occidit, mediocriter stomacho aduersatur.

Seseli.

Seselis radix magisq; semen insigniter calefacit, tenuisque substantiæ est, urinam quoq; ciet, comitialibus, & orthopnææ accommodatum.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa persimilis est ostreo quod ad uireis attinet, sed tenuior substantia & abstergens, eoq; in cinerem redacta, unguis cum sale fossilio extenuatur: ignem non experta si infriçetur, sicut exierit, & cutis labe abstergit.

Sesamoides.

Sesamoidis albi semen calefacit, detergit, & rumpit.

Sesamum.

Sesamum non parum lencoris, pinguisq; obtinet, idcirco opspere, mollire, & mediocriter calefacere idoneum est.

Seps.

Seps, quam nonnulli chalcidicam lacertam dicunt, in uino spora, propriis moribus succurrit.

Sialon, salina.

Salium hominis ieiunii maxime discutit & abstergit, eoq; infantium impetigines illita exierit & furunculos cum tritico, nimirum manso imposita, maturat, & sugillata delet, seris hominem occidentibus maxime aduersatur.

Sideritis.

Sideritis Heraclia & helxine dicta est, Achillea autem sideritis illi quidem consimilis est, sed magis astringit, eoq; fluidis affectibus accommodata.

Sideros, ferrum.

Ferrum aqua restinctum subinde, uehementem desiccandi uim

uim aquæ conciliat, quæ pota lienosis conducit: uinum autem in quo id restinctum est celiacis, dysentericis, cholera infestatis stomacho resolutis, auxiliatur.

Sicyos, cucumis.

Cucumis esculentus quidem uiridis, refrigerat humectatq; in secundo ordine, caro ipsius feruidas solatur inflammatio- nes, semen abstergendi incidendiq; uirtute præditum, urinas mouet, & corpus nitidum efficit, aridus ficit in primo ordine, magisq; abstergit, & semen, & radix.

Sicyos agrios, cucumis syluestris.

Cucumeris syluatici seminis succus elaterium dictus est, qui autem è radice & foliis premitur, elaterio similis est, sed imbecillior: radix detergit, dissipat, emollit: succus siccandi uir- reis habet.

Silybon.

Silybon spinosus frutex est, albo chamæleoti per similis, esui accomodatus: radicis liquor drachmæ pondere cum multa potus, uomitiones excitat.

Silurus.

Silurus sale conditus si edatur arteriam humectem expurgat, applicatus corpori spicula educit.

Silphe, blatta quæ in pistrinis inuenitur.

Blattæ quæ in pistrinis inuenitur interanea decocta contritaq; aurium dolores per sanant.

Silphium, laferpitium.

Laferpitium probè calefacit, flatulentum est etiam & concoctu per uicax: à foris corpori applicatum efficacius deprehenditur, magisq; liquor ipsius, extrahendi potens, item & superexcrecentia amoliendi uim quandam obtinet.

Sison.

Sison calidus est, urinam mouet, concoctionem adiuuat, menses educit, & uiscera obstructa aperit.

Sion.

Sion calidum, urinam citat, & discutit, renum calculos frangit, menses euocat.

Sisarum, sifer.

Siseris radix cocta stomacho utilis est, & urinæ ciendæ, calida in

da in tertio ordine : semen tenue est, discussorium , ualidum
 que, ideo ijs quos singultus & torsiones circa umbilicum
 malè habent, cum uino exhibetur .

Sisymbrium .

Sisymbrium sunt qui cardaminem uocant, cardamo, hoc est,
 nasturtio assimilatum: aridum quidem calefacit siccaturque in
 primo abscessu: humidum autem in secundo .

Scammonia .

Scammonia calfacit, discutit, & biliosa extergit, magisque
 eius liquor, qui iam & phymata dissipat, foetus appositu cor-
 rumpit, lepras exterit, diuturno capitis dolori cum oxyrhodi-
 no superfunditur: radix autem cum ipsa, tum decoctum eius po-
 tum, purgat: cum aceto autem & farina hordeacea decocta, co-
 xendicum doloribus applicatur .

Scandix .

Scandix syluestre olus est, calefaciens siccansque in secundo
 gradu, urinam propellit, & uiscera obstructione liberat .

Scingos, terrestris crocodilus .

Scingi carnes renibus proximæ, naturalibus arrigendis bi-
 buntur . rursus semen lactucæ cum aqua potum eadem con-
 traria uirium lege uidetur remittere : item lentis decoctum
 cum melle .

Scylla .

Scylla incidit, calefacit & desiccatur in secundo ordine: præstat
 autem eam assam aut elixam sumere .

Scolopendra marina .

Scolopendra marina in oleo elixa inunctuque pilos abolet,
 uita etiam pruritus excitat .

Scolopendrium .

Scolopendrium asplenon est .

Scolymon, carduus .

Scarduus calfacit, siccaturque in ordine secundo, radix eius
 uino decocta, urinas foetidi odoris liberaliter educit, & ala-
 rum toriusque corporis graueolentias corrigit .

Scordium trixago palustris .

Scordium uarijs pollet facultatibus, ut quod amarum, acer-
 bũ, & acre sit, purgat igitur simul & calfacit uiscera, urinas
 & menstrua

& menstrua cōcitat, refrigerata omnia excalfacit, uulnera glutinat, repurgatq; : aridum inspersum cicatricem inducit.

Scordon, allium.

Allium calefacit siccataque in quarto abscessu : at syluestre allium quod ophioscordon, quasi anguinum allium, & agrioscordon dicitur, domestico ualentius est.

Scordoprason.

Scordoprason porri & alij mixtas habet uireis, & gustatum.

Scorpioides.

Scorpioides excalfacit abscessu tertio, siccatur secundo.

Scorpius.

Scorpius terrestris crudus impositus, aut tostus in cibo, proprius ictus remedium efficitur: marinus autem fel habet oculorum suffusionibus utile.

Scoria, recrementum.

Recrementum omne ualide exiccat: ferri stercus alijs amplius, quod excoctum & in tenuissimum pollinem detritum cum aceto auribus suppurantibus mirifice proficit, item iis qui aconitum biberunt: cum oxymelite potum remedio est. Plumbi recrementum eidem respondet, sed magis astringit.

Smilax, aut cactus arbor taxus.

Smilax uel cactus arbor est uirosae uirtutis.

Smyrna, myrrha.

Myrtha è secundo calefacientium siccantiumq; ordine est: capitis igitur uulnera inspersa glutinat, item amarā uim obtinet, qua tineas; & foetus occidat: adhuc abstergit, eoque ocularijs medicinis temperatur, & humores pectori infixos expurgat, ita ut guttur non exasperet. Boeotica myrrha uireis habet calefaciendi, emolliendi, & dissoluendi.

Smyrnion.

Smyrnion, quidam hipposelinon, quidam apium syluestre nominat, calefacit & siccatur tertio ordine, apio quidem fortius, petroselino autem inualidius, urinæ & mensibus educendis accommodatum.

Sonchus.

Sonchus astringit, & manifestè refrigerat, tū corpori admodum, tū manducatus: exarefactus autē mediocriter calefacit.

Sparganium.

Sparganium.

Sparganium siccandi & hoc uireis refert.

Spartos, genista.

Sparti quo uireis ligant, & semen & flos cum mulla instar
quinque obolorum pota, per superiora purgāt, ueratri albi
modo sine periculo: semen autem per inferiora quoque pur-
gat: uirgulæ ipsius ad coxendicum dolores proficiunt.

Specularium, lapis specularis.

Specularium, alij per ph scribunt spheclarium, quo nonnulli
loco uitri in fenestris utuntur, eoque diaphanes à perspicui-
tate appellatur, substantia gypseum, uireis habet concrematiss
testis aut ostreis simileis.

Spongos, spongia.

Spongia recens quæ marinū odorē adhuc reseruat, si cū aqua
aut uino, aut posca imponatur, uulnera glutinat, cremata
acris est uirtutis, & discussoria: cum bitumine autem & pice li-
quida uita, appositaq; ex igne, sanguinis eruptiones cōpescit.

Spodium, cinerula.

Spodium pompholygi uiribus æquale est.

Staphylinus, pastinaca.

Pastinaca urinas mouet, mensis proritat, præsertim semen
ipsius & radix, folia autem abstergendi uiribus prædita pha-
gedænicis affectibus congruunt, & uiridia cum melle: sylue-
stris autem pastinaca ad omnia ualentior est domestica.

Stachis.

Stachys marrubio similis frutex tertium in calefaciendo or-
dinem occupat, mensis itaque excitat, fœtas occidit, & se-
cundas expellit.

Steata, adipēs.

Adeps omnis humanum corpus & humectat, & calefacit,
sed pro diuersis animalium temperamētis uirtus eius eua-
riat. Suillus igitur omnium humidissimus est, ut ad olei natu-
ram accedat, unde etiam rosiones obtundit. Caprillus, siccior
est, & celeriter concrefcit, eoque ijs qui in longanone rosio-
nes experiuntur, ab inferiori parte inicitur. Anserinus cali-
dior est, maioremq; tenuitatem obtinet. Inter utrunq; hunc
gallinærum; gallorumq; adeps consistit. Leoninus calore om-
neis,

neis, & tenuitate superat, & propterea etiā ui discussoria. Bulbus inter suillum & leoninum medius temperamento existit. Vrsinus alopecii medetur, vulpinus aurium doloribus, quemadmodū uiperinus pilos abolere, & oculorū suffusiones impedire fertur. In omni autē adipū specie calidior, sicciorque est mariū, atq; ex his eorū animalū quæ testes habent, magis quā illorū quibus hi sunt exēti, & uigentiū ætate efficacior quā aliorū cæterū uetustate omnis adeps redditur calidior.

Stimmi.

Stimmi præter quā quodd siccat, etiā astrictiōem habet, ob quā ocularijs collyrijs miscetur.

Stæbæ.

Stæbæ semen & folia in tertio ordine desiccant, ui ribus donata astrictoriis, eamque ob causam uulnera magna conglutinant: decoctum ipsorum dysenteriiis, sanguinis eruptionibus, auribus pirulentis auxiliatur: folia applicata oculis ex ictu suffulis conferunt,

Stæchas.

Stæchas adaperit, extenuat, detergit, & uiscera omnia; totumque corporis habitum confirmat.

Stratiotes.

Stratiotes aquaticus frigidus est natura: terrestris etiā astringendi uim habet, qua ulcera committit: nonnulli eo & ad sanguinis eruptiones & ad fistulas utuntur.

Strychnon, solanum.

Solanum hortense esculentumque astringit, & in secundo ordine refrigerat. Solanum halicaccabum hortensi simile; urinæ ciendæ idoneū semen habet acino uux æquale. hypnotici, id est, somnifici solani radicis cortex, cum uino de narij ponere potus, somnum conciliat, semen habet ad urinā mouendam accommodatum, ex tertio refrigerantium ordine: unde corymbi eius plures duodecim poti furorē accersunt. Quartum uerò genus solant intus assumptum, inutile est, à foris autem applicatum ulcera depascentia curat, refrigerando, siccandoque ad secundum ordinem relatum.

Stypteria, alumen.

Alumen omne, maximè acerbum est, substantiaque crassum
tenuius

tenuius autem reliquis est quod uocatur scissile, mox rotundum, & astragaliote. Crassum admodum est liquidum, & quod placites & plinthites appellatur.

Styrax.

Styrax calefacit, emollit, & concoquit: tussi, destillationi in fauces, & grauedini utilis, menseis idem & potus, & appositus extrahit.

Syca, ficus.

Ficus aridæ in secundo ferè ordine siccant: pingueis autè duos tumores magis maturant, acriores detergunt, discutiunt quæ, decoctum ipsarum mellis speciem referens, quod iam non nulli siræon appellant, uiribus melli respondet: uirides autem ficus, imbecillioris uirtutis sunt, utraq; tamen & uirides & aridæ aluum subducunt. At ficus caprifici, acres & discussoriæ sunt, quemadmodum ex domesticis grossi.

Syce, ficus arbor.

Ficus arbor calidi tenuisque temperamenti est, adeò ut liquor & foliorum succus non rodat modò, aut abstergat uehementer, sed etiam exulceret, ora uenarum aperiat, & myrmecias extergat: iam uerò & purgandi uim obtinet. At syluestris ficus, quam caprificum uocant, in omnia efficacior domestica est.

Sycomorus.

Sycomori fructus nullius nutrimenti est, & stomacho noxius: liquor arboris ui pollet emolliendi, glutinatoria uulnere, discussoria tumorum: bibitur inungiturque ad serpentium morsus, lienes scyrrho induratos, stomachi dolores, & in accessionibus febrium horrores sanat.

Symphytum petraeum.

Symphytum petraeum contrariis constat uirtutibus, habet. n. saliquid quod incidat, pus in thorace & renes expurget: habet etiam aliquam contrahendi uirtutem, qua sanguinis excretionibus medeatur, conuulsis, ruptis, mulierum fluori rubro, in testinorum ramicibus item calida quædam humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriarum asperitates sanat. Symphyton, alterum nempe magnum, uiscosum quippiam & quod pruritus excitet, representat, scyllæ simile. Vtuntur eo, ut superior i.

Spondylion.

Spondylii semina & radix uirtute acri & incisoria, suspiriosis, comitialibus, & arquatis succurrunt, radix autem circumrassa, fistulisque imposita illarum callos tollit, succus è flore ipsius expressus, uterrimis aurium ulceribus instillatur.

Schinos, lentiscus.

Lentiscus in omnibus sui partibus siccatur secundo ordine ab soluto, calefaciendo autem & refrigerando medius est, adeo astringens, ut ad hypocistidis succum astrictione accedat.

Schæni anthos, iunci odorati & rotundi flos.

Iunci odorati & rotundi flos modicè calefacit, minus astringit, tenuem naturam sortitus, qua urinam mouet & menses trahit, obstructaque referat in fomentis, potu & cataplasmatis adhibitus: radix adhuc magis flore astringit, sed ille calidior.

Schænos elia, iuncus palustris.

Palustris iuncus duplex est, sed eius qui uocatur oxyshænos, semen est somnificum: holoschæni autem dicti, minus idem & capiti dolorem facit. utriusque semen frixum si cum uino bibatur, alui fluores desiccatur, & mulierum fluxiones cohibet.

Sori.

Sori uiridis misce equalis obtinet, longè illo natura crassius. Quæ à T incipiunt.

Torichos salsamentum thynni.

Conditaneum thynni caro acris est & desiccatoria: morsis igitur à uiperis, quam præsterem dicunt, quamplurimum eius esui datur, uinumque superbibitur liberalius, & uomitus excitatur: eadem ad acrimonias esitatorum ualet, item rabidorum canum aliorumque serpentium moribus utiliter applicatur.

Taurocolla, glutinum bubulum.

Taurocolla aliis xylocolla dicitur, ex bouum coriis confecta, uim habet insigniter absterforiam, eoque aceto subacta, impetigines & summæ cutis lepras exterit: ambustis, si aqua calida solutur, inflammationem oboriri non sinit: eadem oxymelite soluta uulneribus accommodatur.

Tellinæ.

Tellinæ conditaneæ crematæ, adurentem cinerem reddunt, qui cedrino liquori mistus euulsio radicibus palpebrarum pilos,

pilos, si instilletur nasci iterum prohibet.

Terminthos, terebinthus.

Terebinthus calefacit in ordine secundo, siccatur autem si uiri-
dis est in primo, si aridus secundo, fructus ubi inaruerit, ad
tertium siccantium ordinem refertur. hac igitur ratione & uri-
nam mouet, & lienes adiuuat.

Tettiges, cicada.

Cicadae crudae siccatae ad colicum dolorem potui dantur, aut
tres, aut quinque, aut septem, cum toridem numero pipe-
ris granis. quidam costas contra uesicae dolores potui exhibent.

Teutlon, beta.

Beta nitrosam uim habet, qua abstergit, discutit, & per na-
reis purgat, sed alba elixa plenius, inflammationi arcenda
fit idonea, & modice discutit.

Teucrion.

Teucrium calefacit in secundo, siccatur in tertio ordine, ut inci-
soria tenuisque, lienibus medetur.

Tephra, cinis.

Cinis non omnis idem exacte habet temperamentum, sed
pro materiae combustae differentia euariatur: acerbarum sane
arborum cinis, nempe quercus & ilicis, astringendi uim non mo-
dicam obtinet, qua sanguinis eruptionem compescit, quam nul-
lius alterius datur facultas: acrium uero, puta lici & tithymali
cinis, acrior & magis deterforius efficitur.

Telephion.

Telephium in primo abscessu calefacit, secundo autem desic-
cat: est itidem asterforium, quapropter ulceribus putredi-
nem expertis conuenit, & uirilignes, tum leucas, tum alphas,
cum aceto abolet.

Telis, fenugracum.

Foenugracum ex secundo ordine calidum est, è primo sic-
cum, idcirco feruidas inflammationes irritat: minus autem
calidas & induratas scyrro magis discutiendo per sanat.

Tithymalus, herba lactaria.

Tithymali omnes è quarto calefacientium ordine sunt, acri-
moniae & ualidae amaritudinis participes: sed radix quum
sit quodammodo imbecillior, aceto incocta dentiū erosorum

dolores finit: liquores uehementiore donati uirtute, dentium cauis imponuntur, reliquum corpus si attingant, adurunt, quare etiam pilos modicè delitos auferunt, item myrmecias, uerrucas & huius generis alia tollunt: & cutis labes abstergunt, maligna ulcera, & phagedænica, curant. Cæterum ex septenario ipsorum numero ualidissimi sunt, appellati characias, myrsinites, & qui in petris arboris modo nascitur: hos sequitur qui uerbaleo similis est, & cyparissias, deinde paralius, quasi dicas maritimus, postremò helioscopius.

Titanus calx.

† **C**Alx uiua, quidem uehementer adeò urit, ut crustâ inducat: restincta uerò crustam quidè subito excitat, sed post diem unū non amplius, calefacit tamen & consumit carnes: si lauetur, idq; aqua marina, ualidas discutiendi uireis acquirit.

† Hæc uerba sic leguntur in ueteribus libris, *τίτανος ἡ μὲν ἄσβετος καὶ σφοδρῶς, ὥστε καὶ ἰσχαρῆν, σβηθεῖσα δὲ παραχρῆμα μὲν ἰσχαρῆ, μετ' ἡμέρας δὲ ἐκέρτι, διεσπένει δ' ὅμως καὶ διατῆκε τὰς σάρκας, εἰ δὲ πλυθῇ, ἀδνηκτος γίνεται, καὶ μάλιτα, εἰ τλεονάκῃς πλυθῇ, διαφορητικὴ δὲ ἰκανῶς γίνεται, θαλάσσει πλυθεῖσα.* Id est. Calx uiua urit multum, ut crustam inducat, extrincta autem statim crustam efficit, sed post aliquot dies uis eius remittitur, calefacit tamen & tabefacit carnes: Si aut leuetur sine morfu redditur, præsertim si sæpius loca fuerit: marina uerò aqua abluta uim digerendi habet. Qua esse huius loci uerâ scripturâ, ex Galeno & Aetio facillè intelligi potest.

Tragacantha.

Tragacantha per similes gummi uires repræsentat.

Tragium.

Tragium frutex est in Creta lentisco similis, uirtute calida in terro abscessu, attractoria, discutiente, & tenui: aculeos igitur educit calculos cōnuinit, mensesque citat, instar dracmæ potum. Sed alterum tragium, hoc amarius est, scolopendrio assimile, nascitur multis in locis, tanta astringendi uirtute præditum, ut fluidis affectibus commodè faciat.

Tragoriganum.

Tragoriganum origani uirtutes habet, & nonnullâ etiam astringentiam.

Tribolos,

Tribolos, tribulus.

TRibulus mediocriter refrigerat: sed terrestres siccando ualentior est, aquaticus leuiter et humectat: uterque contra inflammationum generationes, omnesque influxus conuenit: terrestres fructus quum tenuis existat, renum calculos conterit.

Trigoſitodes, tragus frumentaceus.

TRagus frumentaceus zæ respondet, sed difficilius in stomacho conficitur, & aluum emollit.

Trigle, nullus.

MVllus piscis continuè eius claritati oculorum nocet, crudus dissectus & impositus marini draconis, scorpionis, & araneorum moribus succurrit.

Tripolium.

TRipolij radix calida est in tertio abscessu & acris.

Triches, crines.

Pili combusti persimilem lanis concrematis uim obtinent.

Trigon, pastinaca marina.

Marinæ pastinacæ aculeus impactus denti infirmo, ipsum conterit excutitque.

Tryx, fax.

FAex uini ignem non experta compositis uiribus constat, ut quæ abundè desiccet discutiaturque, astringentia autem facultas ei ex uini unde confit specie, accedit. Utendū igitur est ea tum in humidioribus, tum in fluidis affectibus, phygerhla discutit, lac, mammis eo refertis imposita, extinguit: cremata uerò quæ etiam spheclen appellant, adurentem uim acquirit, quapropter & medicamentis quæ adurunt, ipsam miscemus, unguentis igitur scabros cum resina eijcit: pilos cum oleo lentiscino per noctem totam inuncta, flauos efficit. Lota oculorum medicinis absterforijs temperatur. Aceti fax in omnibus ualentior est iam dicta, magisque astringit.

Troglodytes, passer.

TRoglodites passer est, omnium auium excepto regulo minimus, in sepibus potissimum degens, qui & tostus & crudus salsus manducatus renum calculos conterit: cremati ipsius cinis epotus, idem præstat.

Tyros, caseus.

Caseus recens & mollis repellendi uim obtinet, leuiter refrigerans. quare & uulnera impositus conglutinat: at qui oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam. possidet, magisq; uulnera conglutinat: uetustus, isq; pinguis magis discutiendi uirtutem præ se fert, qua articulariorum quoq; tophis accommodatus est, præsertim cū suillæ carnis & salis & pinguis decocto.

*Quæ ab Y incipiunt.**Hyacinthus.*

HYacinthi radix bulbi speciem representans, primi in siccando ordinis est, secundi refrigerando, pueros itaq; impuberes diu conseruare cum uino inducta creditur: semen leuiter abstergit astringitq; idcirco arquatis cum uino datur, ut qd̄ deficcet magis quàm refrigeret.

Hyalos, uitrum.

Vitrum lique cum uino tenui & albo potum, uescicæ calculos comminuere dicitur.

Hydnon, tuber terræ.

Tuber terræ terrestri constat substantia cum modica quadâ uirtute tenui.

Hydrargyros, argentum uiuum.

Argentum uiuum in medicinæ usum non adedò accommodatur, quòd uenenum representet: nonnulli uerò concretum ipsum in cinerem, mixtumq; alijs speciebus, colicis & iliosis potioni exhibuerunt.

Hydropeperi, aquaticum piper.

HYdropiper, herbula est calida, sed non piperis, modo, uiride cum semine suo inductū, sugillata, & tumores scyrtho induratos discutit.

Hydor, aqua.

Aqua præstantissima & alterius substantiæ experts, refrigerat, humectatq; ex peculiari sua natura: ubi autem ascititium calorem assumpserit, quamdiu eum seruat, calfacit: frigida autem facta, refrigerat. Porro quæ nonnihil mixta est, ut nitrosa aut bituminosa, adiunctæ substantiæ uireis acquirit. Pluuiialis autem nonnihil etiam astrictionis habet, ob quam ocularijs

larijs miscetur medicinis. Qualem uerò conueniat laudatissimam esse aquam, in primo libro comprehensum est.

Hyoscyamus, altercum, seu herba Apollinaris.

Altercum cuius semen nigrum est, item cuius flauum, uenenum est: accommodatissimum uerò curationibus, quod & semē & florem candidū habet ex tertio refrigeratiū ordine.

Hypericum.

Hypericum duplex est, alterum quod androsæmon & ascyrrhon appellatur, expositum est: alterum uerò calefacit & siccatur, tenui substantia præditū, eoq; urinas elicit & menstrua citat, totū ipsius semen, q̄ si cum folijs inducatur uiride, cicatricem uulneribus obducit, † arida uerò folia inspersa ulceribus medentur, dantur etiam potioni aduersus coxarum dolores.

† Hic locus ita descriptus est in ueteribus libris, ξηρὰ δὲ ἐπιπαττόμενα τὰ πλατάρα τῶν ἐλκῶν ἰῶνται, id est, sicca autem inspersa, præhumida ulcera sanant.

Hypocoon.

Hypocoon refrigerat in tertio ordine, papaueri uiribus proximum.

Hypoglossum.

Hypoglosson frutex pulillus est, cuius radix & succus emolliendi uirtute pollent.

Hypocistis.

Hypocistis eorū quæ ad radices cisti & cistari appellati subnascuntur, nempe dytinorum, succus est, medicamentum ad omneis fluidos affectus efficacissimum, ut quod particulas siccet corroboretq̄ue.

Hypophæston.

Hypophæston species est spinæ fulloniæ, quemadmodum & hippophaes, ex huius capitulo, folijs, & radicibus, succus expressus siccatusq; trium obolorum pondere, cum mulsâ pituitâ & aquam euacuat, maximè congruit orthopnœis, comitialibus, & neruorum affectibus.

Hyssopum.

Hyssopum in tertio ordine & calefacit & desiccatur, tenuisq; substantiæ est.

Quæ à Phausplicantur.

Phaci, lentes.

Lentes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatæ, sed astrictiōnis quoq; non nihil habent Totum uerò lentis corpus siccatur, aluumq; sistit: decoctum ipsius proritatur, ideoq; prior aqua defunditur, quum comprimendi gratia lentes assumuntur.

Phacos, lenticula, palustris.

Lenticula palustris humectat refrigeratq; in scdō abscessu.

Phalaris.

Phalaridis succus, folia, & semen pota, uescit doloribus auxiliantur, habet eadem herba & tenuem quandam uim, naturamq; calidam.

Phalangites.

Phalangites q̃ phalangiorum moribus medeatur, nomen hoc inuenit: est & tenuis naturæ compos, qua torsionibus circa umbilicum auxiliari putatur.

Phellos, suber.

Suber præsertim ex uinorum cadis, combustum, cinerem reddit siccando uehementissimum, qui medicinis addysenterias inscriptis admiscetur.

Philyras, tilia.

Tiliae arboris folia, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris ulcera iuuantur, eorumq; decocto colluuntur: quod etiam potum & urinam & menses trahit.

Phlomos, uerbascum.

Verbasci genera plura sunt, inter quæ est & dicta tryalis: cæterum folia omnium siccantem & mediocriter astrictoriâ uim referunt: præcipuè eius quod aurei coloris est, & quod acerbæ sint, fluidis conferunt affectibus: nonnulli & dentes ex eis colluunt.

Phœnix herba.

Phœnix, aliis rhu, herba est lolio consimilis, astringendi uiribus donata, in uino austero pota, omneis fluidos affectus sistit.

Phœnix

Phœnix arbor, palma.

Palmæ fructus qui iam ematuruit, calidus mediocriter est, uisceribus roborandis & stomacho idoneus, tum intus assumptus, tum foris applicatus: reliqua palmæ portio uehementer astringens est, quamobrem stomachicis, & hepaticis medicinis temperatur: longè magis, astringit quod fructus enascens ueluti inuolucrum est.

Thermion.

Thermion tenuis, absterforiæ & attractricis facultas est: semen igitur cum melle albugines extenuat, & spicula e corporibus extrahit.

Thu.

Thui radicem habet nardi persimilem, quæ tamen ad pleraque infirmior sit, sed urinas magis quam ea elicit, nardi gallicæ modo.

Phyllum folium.

Phyllion, Malabathri folium est, de quo in illius capite diximus.

Phycos, fucus.

Phycos refrigerat, siccaturque in securneo abscessu, ac mediocriter etiam astringit.

Phylites.

Phylites cum acerba quadam prædita sit qualitate non immerito alui profluuijs pota auxiliatur.

*Quæ d Ch auspicantur.**Chalbane, galbanum.*

Galbanum calore tertium ferè ordinem accedit, siccitas secundum, molliendi & discussoria ui donatum.

Chalcitis.

Chalcitidis uires astrictoriæ, acres, adurentesque sunt, & crustam inducunt, tenuitate media inter misy & sori consistit, uita tenuior redditur.

Chalcanton, atramentum sutorium.

Chalcanthum aqua est in Cypri metallis coalescens, ualentissimæ astrictionis cum calore non ignauo: quod omnium efficacissimè humiditas carnis conseruat suo condimento desiccaturque.

siccatur; longiore temporis processu in chalcitidem mutatur.

Chalcos, æs combustum.

AEs combustum acre quiddam habet & astrictiōis particeps est, quapropter ad cicatricem ulceribus obducendam in siccioribus corporibus præstantissimum est: si eluatur, teneris utilius est, quam illorum.

Chalcu anthos, æris flos.

AÆris flos tenuioris naturæ est, quam æs cōcrematum, eiusque squama: mixtus itaque collyrijs palpebrarum & asperitates, & sicus exterit.

Chamædrys.

Chamædrys in tertio ordine calefacit siccaturque; lienes igitur consumit, urinas & menstrua elicit, uiscerum obstructions expurgat.

Chamæcissus, hedera terrestris.

Hederæ terrestris flos quum amarus insigniter existat, iecoris meatus aperit, item contra coxendicum dolores exhibetur.

Chamæleuce.

Chamæleuce in tertio abscessu calefacit, in primo desiccatur.

Chamæleon.

Chamæleontis nigri radix calefacit siccaturque; propemodum in tertio ordine, est & absterforiæ facultatis particeps, quæ cutis labes exterit, item duros tumores dissipat emollicque, & phagedenica ulcera admota in cataplasmate persanat: si autem intra corpus sumatur, ueneni loco est. Albi radix superiori proportionem respondet, sed amarior est: quæ si cum uino austero instar acetabuli bibatur, latas uentris tineas enecat: facit etiam ad aquam inter cutem.

Chamæmelon.

Chamæmelon siue anthemidis calefacit siccaturque in primo abscessu, præterea uirtute tenui, discussoria, laxanti, & odorata constat.

Chamæpitys.

Chamæpitys secundo gradu calefacit, tertio desiccatur, quam ob causam & purgare & abstergere uiscera, potissimum iecur potest, item urinas mensurisque trahit, magnam uulnera cōglutinat,

glutinat, putredinem expertis medetur, duritias discutit, decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus salutare est.

Chamædrops.

Chamædrops, quiddam & hoc chamedryn uocant, alii etiā teucrion, uiribus chamedryi respondet.

Chamæsyce, humilis ficus.

Chamæsyce absterforia & acri facultate pollet, quapropter & surculi ipsius & liquor myrmecias, uerrucasq; abolent, crassas oculorum cicatrices cum melle abstergunt, hebetudini, & suffusioni incipienti medentur.

Chamelæa, oleago.

Oleago absterforia facultate, sordida ulcera & crustas cum melle purgat.

Chelidonium, herba hirundinaria.

Chelidonium in tertio ordine calefacit, ualenterq; abstergit: succus ipsius claritati oculorum utilis est: radix arquatos cum uino & aniso pota, obstructione liberat: māducata dentium doloribus auxiliatur. Minus chelidoniū quarto calefacientium ordini ascriptū, acrius est, ut in ductum cutem exulceret: ungueis scabrosos eiicit: succus autem ipsius per nareis purgat.

Chelidones, hirundines.

Hirundinum crematarum cinis cum melle illitus, anginarum inflammationes persanat: idem oculorum claritati benefacit.

Chole, fel.

Fel omnium aliorum animantis humorum calidissimum est, colore tamen inter se differt: siquidem quod flauum, pallido calidius: & flauo, æruginosum. præterea uariat pro animantium quæ id habent ratione, quatenus suillum omnibus aliis infirmius est, eoque citra rosionem aurium ulceribus medetur. Ouillū maioris acrimoniæ est quàm suillum, & ouillo caprillū efficacius. caprino æqualia urforū & boum existūt. taurinum uehementius: hoc, fel hyænx superat, rursus hyæna uincitur à pisce callionymo dicto, & scorpione, cuius animantis fel suffusionibus oculorum, hebetudini, & albuginibus accommodatur: item marinæ hirundinis. ac capræ syluestris fel etiam lusciosis conferre dicitur. cæterum omnium uolucrum fel, tum
acrius.

acrius, tum siccando uehementius est quam quadrupedū: inter has ipsas autem gallorum & perdicum alius est præstātius: accipitrum & aquilarum acrimonia & rosione quodammodo superat, æruginoso colore, nonnunquam etiam nigro.

Chondrilla.

Chondrilla intybi species subamara gustu est, propterea etiam maiorem siccandi uim quam illa obtinet.

Chondrus.

Chondrus tritico persimilis est, nisi quod glutinosior.

Chryfocolla.

Chryfocolla altera in metallis reperitur, altera in rubri æris pyla ac tali pistillo in urina pueri uenerem non experti, sub caniculæ æstu contrita, præparatur. hæc igitur abstergit, discussoria, siccanteque ui prædita maiore, quam ea quæ in metallis inuenitur, ut etiam carnem absumat citra rosionem: ob quod ulceribus maleficis accommodata est: concremata uero minus erodet.

Chryfocome.

Chryfocome, quæ etiam chryfitis dicitur, radix acris simul & astringente ui existit, quare non multi in medicina usus est, quanquam peripneumonici & iocinorosis in mulso elixa exhibeatur: cæterum mensis educit.

Quæ à Ps ordiuntur.

Pseudobunium.

Pseudobunium bunii speciem repræsentat, calefacit, discutit & abstergit: torsiones igitur circa umbilicum, stillicidia & laterum dolores soluit: strumas etiam cum sale & uino inductum dilucit.

Pseudodictamnion.

Pseudodictamnion imbecillis dictamni uires habet.

Psimmythion, cerusa.

Cerusa refrigerat & opplet.

Psyllium, herba pulicaris.

Herbæ pulicaris semen secundi refrigerantium ordinis habetur, siccando humectandoque medium est.

Psoricon.

P Soricon, chalcitide duplicata, argenti spumæ mixta, efficitur, utrisque tamen aceto prius detritis, ac in recentem ollam coniectis, quæ diebus quadraginta sub fimo delitescet: sic enim maiorem siccandi uim, tenuiorem & minus rodentem quàm chalcitis, acquiret.

Quæ ab O magno incipiunt.

Oon, ouum.

O Vi candidum & tenue, nullius planè rosionis compos me diocriter refrigerat, utendum igitur eo in oculis, pudendorum ulceribus, alijsque omnibus malignis: miscetur etiã medicamentis emplasticis, quæ sanguinem supprimunt: luteum uerò pari facultate præditum medicamentis temperatur ad inflammationem arcendam efficacibus: tostum uerò magis siccatur, minus lenit. Porro totum ouum aceto incoctum si assumatur, uentris fluxiones desiccatur: si acerbum aliquod adiunxeris, ut, gallam, aut rhum, aut balauitium, ac frixeris, multò redditur efficacius: ambustus autem crudum impositum, protinus auxiliatur. Sorbile assumptum, pectoris uicia concoquit lenitque, & arteriæ asperitates leuigat. Præponetur autem recens uereri: & gallinaceum reliquorum animantium ouis.

Ocimum.

O Cimum secundo calefacientium ordini ascribitur: habet & humiditatem quandam excrementitiã, propter quam neque utile est intus assumptum: extrinsecus autem inductum discutit, & concoquit.

Ocimoides.

O Cimoides, nonnulli phylæxterion nuncupant, inutilis quidem radix est: semē uerò tenue est, & sine rosione siccatur.

De medicamentis simplicibus quæ flauæ bili purgandæ sunt.

Cap. IIII.

A Loes drachma, cū aqua mulsa mane datur. qui uesperam exhibent, aut secundum cibum, noxam inferunt, quippe alimentū in membra digerit, flauam bilem uacuat minus, trium obolorum instar assumpta, ut quæ crassiora tantum excrementa abundè educat. Cæterum quā omnia purgantia medicamina stomacho aduersentur, sola, aloc condu-

cit. qui uero amaritudinem eius non sustinent, in cataportia coactum assument. Sciendum uerò est, medicamenta ea non simplici quodam temperamento, uerbi gratia, caliditate purgare, (omnia siquidem calida, quale piper est, uacuatione molirentur) uerum totius substantiae proprietate, quo modo lapis magnes ferrum attrahere demonstratus est. Porro ex purgantium medicaminum numero ea quæ uentrē duntaxat emolliunt, primo libro sunt exposita: efficacioribus autem utimur uel ad materiam deriuandam, uel ad affectum induratum agitandum remouendumque, aut ad corpus resciciendum, mutandumque ipsius temperamentum, aut ad noxium humorem eliciendum. Iam uerò sunt nonnulli etiam mixti ex prædictis modi, inuicem connexi. Cæterum purgationibus hos uti conuenit qui uiribus pollent, & mente constant, primosque ætatis limites euaserunt, nondum uerò ad extremos peruenerunt item qui stomacho robusto sunt, & copiosam materiam inutilem in corpore collegerunt, non multi aded, sanguinis compotes. Tempus autē purgationis, si nulla urgeat necessitas, uertum maximè & autumnale opportunum est;

Quæ bilem uacuent.

Quæ bilem educūt, quouis anni tempore præterquam in hyeme rectè usurpantur: ætate uerò florida; & declinante: habitu sicco, musculofo, nigri coloris, uel rubri: uiris magis quàm mulieribus: item in quibus cibi continuè corrumpuntur, aluus astricta est, amara bilis redundat, iracundis, paucam urinam reddentibus, cibo usis sicco & calido. In affectibus, arquato, iecoris imbecillitate, pleuritide, phrenitide, angina, insania, cephalæa, lippitudine, erysipelate, lepra, febris, & quibus bilis superat. Datur aloë capite grauatis, lippientibus, siticulosis, & qui per somnum imaginibus torquentur sine febris, adhæc qui horroris discursum in corpore sentiunt, flatus acreis ædunt, intestinis roduntur, quibus stomachus immodicè æstuat, aut nausea humoribus os eius rodentibus euerctitur postremo, quibus ob recrementorum abundantiam clyster nequit iniici: abundè siquidem inanit, sic ut totū corpus non commouet, nisi copiosa admodum fuerit exhibitæ: bilem autem in testinis, aluo & stomacho inhaerentem educat. Veratrum conuenit & acuto & longo morbo laborantibus, qui medicamentum bili ducegdæ idoneum requirunt, quales suat qui insania,

nia, altera capitis parte (heterocranici dicuntur) humorum impetu in oculis decumbente, & pectoris affectibus torquentur: accommodatissimum est uisceribus, uteri & uesicæ uitis medicina in requirentibus. Laudatur etiam ad longam asperæ arteriæ affectionem, arquatam, eruptiones quæ exanthemata dicuntur, impetigines, uel herpetas, uel erysipelata, uel lepras. Veratrum nigrum bilem flauam potissimum è toto corpore citra molestiam educit, quam ob causam iis qui non grauiter sebricitant, magisq; febris carentibus instar drachmæ exhibetur, radicibus in mullâ & aqua maceratis, aut cû melle catapotiorum modo: uerum ita exhibetur, ut ieiunium præcesserit. Sunt qui misceant ei pulegiû, uel satureiam, uel aliquod ex iis quæ subito transeunt, stomacho non inimica. Scammonia perinde ut ueratrum purgat, magis flauam bilem: ceterû inter omnia quæ purgationem moliuntur, aduersissima stomacho est. datur igitur iis, qui febris carent & stomacho sunt meliori, ad pòdus quatuor obolorum cum sale aut pipere, aut zingibere, aut quodâ stomacho utili, quod protinus corpus permeet, aut etiam cum melle: item cum gûmi quoq; sunt catapotia. Colocynthidis, hoc est, cucurbitæ syluestris medulla bilem potissimû uacuat, & mucosa non à sanguine tantum trahit, quemadmodum ueratrum & scammonia, sed etiâ à neruis & neruosis partibus instar drachmæ in aquæ mullæ cyathis duobus, quibus & ruta in cocta sit, epota: læuigetur autè accuratè, quoniam asperitates ipsius interaneis adhærentes, ulcera concitant, & neruos confortii lege afficiunt. Exhibetur rectè, capite dolentibus, nempe quû cerebri membrana, uel ea quæ caluariam cingit, uitiata fuerit, ut, uertiginosis, heterocranicis, cephalæa infectatis comitialibus, apoplecticis, conuulsis, ut in ueramlibet partem deprauata sit facies, qui cynicus spasmus dicitur, diuturno in oculos fluxu uexatis, orthopnoicis, suspirosis uetusta tussi fluctantibus, præterea iis quos articulares dolores, & renum uesicæ affectus malè habent. Elaterium scammonia modo euacuat deligèdû uerò porraceû, leue, & anno non uestustius, triobolari pondere cû lactis hemina læuigatum exhibetur. Tithymalus bilem elicit, non aliter quàm elaterium & scammonia dantur liquoris guttæ quatuor aut quinq; cum polenta macerata, quæ statim deglucientur. Nam in ore diu retentæ, linguâ exulcerant, eiusq; uicinam. Lathyrides bilem purgant sicut ueratrum

ueratrum & scammonia : offerentur igitur septem octove , & usque ad quindecim : robustis sanè & qui liberaliore indigent purgatione, manducari præcipe, imbecillioribus & malo prædictis stomacho, integras ipsas deuorare. Peplii turionum qui semper sicci existunt, instar octo obolorum in mulsâ datum bilem educit, ueratri modo, & flatu difficit. Agaricum simileis cucurbitæ syluestri uireis habet, tardum ad functionem obeundam, non autem stomacho admodum inimicum: datur læuigatum drachmis duabus cum mulsâ, sit autem albissimum, uehementer fragile, non adèò lignosum, neq; teredinibus obnoxium. Inisillyrica simili modo purgat octo obolorum instar ex mulsâ assumpta. Sit autè nec uetusta, nec teredines experta. Centaurium minus b li & mucis purgandis aptum, coxendicū doloribus peculiariter cōuenit: ius ipsius drachmæ & semissis pondere in aquæ hemina decocti ad dimidias bibitur. Tragorigani flos cum semine instar duarum drachmarum ex mulsâ datur, quibus etiam ueratrum nigrum, uerum flos ille, gravior quidem stomacho existit quàm ueratrum, minus autem purgat. Chamælææ drachmæ quatuor in mulsæ heminis duabus ad quartas decoctæ, per inde ut ueratrum, purgant. Nonnulli uero chamælææ & absinthii dupla portione carapotia fingunt, exhibentq; . Aristolochiæ clematidis, hoc est sarmetariz seminis drachma in mulsâ pota, colocynthidis more purgat. Polypodii radix arida, si læuis mulsæ inspergatur, aut cum ea conteratur, eundem quem colocynthidis effectum præstat.

Quæ bilem atram uacuent.

Medicamentis atram bilem ducentibus utemur præcipuè in melancholicis, furibundis, iracundis, hominum consortia exosis, aut secessu gaudentibus, item in his qui dum à morbo reficiuntur, purgationem desiderant, autumno feruidiore, habitu sicco & parum muscoloso. Epithymū laudatissimum est remedium inter ea quæ atræ bili uacuandæ sunt. dantur ipsius drachmæ quinque læuigatæ ex lactis hemina. Epithymbrum quod thymbræ supernascitur, ut epithymum similiter euacuat, sed imbecillus est. Pulegium atram ducit bilem instar acetabuli in mulsâ potum. Tragorigani heracleotici idem modus, uti pulegium uacuat, cæterum ambo desiccant. Alypi semen inferius atram purgare bilem pari epithymo mensura cum sale & aceto dictum est, intestina uero si fidem Dioscoridi

di accommodamus, leuiter exulcerat. Est autem meo iudicio, quæ nunc alypias uocatur: exhiberi debet in mulsâ. Parthenium similiter siccum si poterit eadē solet extrahere. Alysson cum sale epotum non aliter quàm superiora expurgat.

Quæ pituitæ uacuandæ sint.

Eorum quæ pituitam educunt usus est in habitu frigidiorē & senio confectis perque hyemem, in resolutis, apoplecticis, inturgescens tumore laxo fungosusq; quod œdema dicunt, insuper in his qui multum pituitæ in uentriculo, aut pectore, aut stomacho collegerunt, & in mulierum fluore. congruunt etiam copiosa emungentibus, crassa excreantibus fastidiosis, & coxendicum cruciatu detentis, quum mucii articulis incubuerint, aut elephantiasis: maximè autem conueniunt iis qui aqua inter cutem laborant, cui nomen est anasarca. Styraeis albi drachmæ pondus cum resina terebinthina æquali modo deuoratum, pituitam euacuat. Oleæ radice cortex drachmæ instar cum uino aut aqua. Pyrethri oboli nouē ex aqua. Lychnidis seminis drachmæ duæ. Cyclamini radice drachma cum hydromelite. Scordij drachmæ duæ cum melle Chamæpytis in pollinem detrita, exhibitaq; in catapotiiis. Squamæ Cypriæ drachma semis cum resina pari in catapotiiis ualentius purgat pituitam. Lauri foliorum uiridiū lesquidrachma. Cucumeris syluestris radice cortice oboli duo. Ricini grana quadraginta, crotones dicti, putaminibus detractis eduntur, similemque effectum præstant. Apii dimidium quod ad radicem est manducatum: nonnulli id chamæraphanon appellāt, hoc est humilem raphnum. Bdellij drachmæ duæ ex hydromelite. Peculiariter autem gummi oculis defluentibus idoneum.

Quæ aquam educant.

Aquam elicientibus uti conuenit in his quos aqua subter cutem, ab utre ascites dicta, malè habet, in mulieribus albo fluore infestatis, item in ijs quos ulcera fluida torquent. Squamæ Cypriæ drachma cum mulsâ pota aquam educit: acciti uerò momentum superforbere oportet, ne par uomitum reddatur. Coccum gnidium cortice detracto læue cum mel se cocto potum ne fauces attineat, aquas trahit. dantur autem grana aut uiginti, aut uiginti quinque, aut triginta: ualentior-

bus quadraginta . Euphorbij drachma cum melle cocto pota pituitam emolitur, magis autem aquas . Lonchitidis seminis oboli octo cum mulla aquas purgât . Cneoron similiter aquas trahit cum: polenta potum . Cnici seminis drachma quinque læuigata prisanæ incoquantur cum salis momento, sorbentur quæ . Ammoniæ suffiminis drachma in mulla pota educit . Nonnulli uerò lienosis id cum posca exhibent . Sambuci corticis radices succus instar unciarum duarum potus cum uino aquas educit .

De compositis medicamentis purgantibus. Cap. V.

Catapotia ex aloe .

COlocynthis medullæ pars una , absinthij succi pars una, aloes partes duæ, scammoniz partes duæ: ex aqua granula ad eui magnitudinem finguntur . dantur undecim numero .

Oxymeli Iuliani .

RUtæ, origani, singulorum , quadrans , thymi cometriens , anethi fescuncia, iridis uncia , mandragoræ radices fescuncia, agarici sextans, cedarum pinguium uncia duodecim, cocci gnidij triens, lathyridum, alypiadis, singulorum quadrans , polypodii sextans, phylli, costi, spicæ nardi singulorū uncia, rheu pontici fescuncia, scillæ, sambuci turionū, canopi, (qui est sambuci cortex) singulorū quadrans, asari uncia, pulegii quadrans, epithymi, ueratri, acori, singulorum sextans, sij, amomi, hyperici, cumini, singulæ uncia, anisi sextans, aceto sextarij decē, mellis sextarij quinq; : herbæ per triduum in aceto madescunt, deinde excoctis dum amplius dimidio consumptum fuerit , mel adijcitur ubi unita fuerint , & illis abiectis admiscentur lathyrides, costus, coccum gnidium , spica nardi læuigata , & si uoles postquam perfectè coctum fuerit oxymel, illa impones . Modus summus est uncia, aut prout iurium ratione : benefacit podagricis affectibus & comitialibus , ac in quibus uacuare simul & crassos humores educere opus est .

Purgatio ad ducendum aquas quæ constat caryophyllo .

ALoes, epithymi, caryophylli, cocci, gnidii, petroselini, rheu pontici, singulæ semuncie , euphorbii scrupuli , quatuor , mellis quod satis est . datur cochlearis mensura .

Purgatio

Purgatio ex rhodomelite confecta, Alexandri.

Rosarum succi sextarii duo, mellis sextarius, scammoniz unciz quatuor. summus modus est quinque cochlearia: leuior, duo: medius tria. **A L I T E R.** Mellis libra, rosarum succi libra, piperis drachmaz duz, scammoniz drachmaz octo, mastiches drachmaz quatuor, zingiberis drachmaz duz **A L I O** modo, quo ego utor, Spicz nardi, asari, epithymi, singulorum semuncia: macerantur in aquz hemina per triduum: ubi medietriter incoxeris, misceto aquz rosarum succi sextarii dimidiũ, mellis tantundem. Postquam adusque spissitudinem fuerint incocta, scammoniz fescuncia admiscetur.

Purgatio ex malis cotoneis.

Malorum cotoneorum tostorum unciz quatuor, piperis unciz sex, scammoniz drachma, mellis unciz quinque: trita exhibentur cochleario instar unciz, aut pro uiribus.

Compositio dia citriu, quod est, ex malo medico, stomacho utilis.

Mali medici corticis, carnisq; pondo in aquz sextario uno & dimidio ad tertias decoquitur, mellis sextarius dimidias adiicitur: ubi mellis spissitudinem ex coctione acceperint, inspergitur læuigati piperis longi uncia, scammoniz tostz in fermento tantundem.

Buccellatus purgans.

Scammoniz tostz uncia, piperis, apii semini, singulorũ scrupulum, sceniculi, anisi, singulaz uncia mellis libra: tosta medietriter instar unciz dantur in condito.

Oliuæ purgantes.

Scammoniz uncia, piperis tantundem, epithymi, cumini torrefacti, petroselini, rutæ, soliorum menthæ uiridis, singulorum drachmaz quatuor, laserpitii drachma, palmularum unliæ quinq; , mellis tantundem, aceti heminz duz, oliuarũ cymbadum sextarius, scissarũ uidelicet: quidam & gari momentum addunt. Modus est quinq; scrupula aut septẽ aut nouem.

Castillus purgans.

Scammoniz drachmaz quatuor, euphorbii tantundem, phylli, piperis, singulorum drachmaz duz, mellis libra. datur instar unciz.

Fusca purgans, & stomacho grata.

CVmini, foeniculi, singulorū uncia, pulegii, apii, anisi, singulorum semuncia, epithymi, scammoniae, singulorum uncia, salis unciae duae. Summus modus datur scrupulis duobus in posca, nonnulli etiam euphorbij scrupula quatuor adiiciunt.

Vinum purgans in hydropicis.

SCillae tres unciae, apij seminis unciae sex, piperis drachma, scapparidis radicis drachmae quatuor, cocci gnidii cortice ex utraque drachma, folii malabathri galbuli duo, uini heminae duodecim, mellis sextarii tres. Scilla contusa uino superfunditur, reliqua laeuigata miscentur.

Habatia, quasi dicas ex sale confecta, purgatio.

SAlis communis torrefacti drachmae sex, api seminis, zingiberis, panis siccis, singulorum scrupula sex, anisi, piperis singulorum semuncia, scammoniae, epithymi, singulorum uncia datur circiter cochleare.

Compositio dia Hermodactyli, ad podagram.

Hermodactyli quadrans, anisi, cumini æthiopici, ameos, thymi summatum, piperis albi, zingiberis, singulorum scrupula tria, epithymi semuncia: exhibentur scrupulis quatuor. quidam scrupula sex dant mane cum condito, aut mulsæ, aut aqua calida. **ALITER** eadem purgatio. Hermodactyli uncia, cumini æthiopici, anisi, agarici, zingiberis, singulorum scrupula sex, mastichæ, spicæ nardi, singulorum scrupula duo, musci siliqua, enici scrupula duo, datur quatuor scrupulis cum hydromelo, Scammonia, quod stomacho sit inutilis, auersatur. Si autem liberaliore uacuatione opus sit, scammoniae siliquas treis mensuræ admiscebis: lorn exhibetur.

Catapotia quæ constant lapide armenico, arthriticis potissimum exhibenda.

ALoes unciae quatuor, scammoniae semuncia, agarici uncia, epithymi tantundem, lapidis armenici scrupula duodecim, cassiæ uncia, spicæ nardi uncia, scillæ tostæ sextas, croci scrupula duodecim: rhodomelite excepta duobus scrupulis exhibetur.

Compositio

Compositio dia Coronopodii, ad eadem efficax, ad quæ ex Hermodactylo confecta stomacho utilis.

Zingiberis scrupula duo, piperis scrupulum, agarici scrupula decem, cnici partis interioris scrupula quatuor, coronopodij radices scrupula sex. dantur scrupula tria: quibus alius est difficilis siliquæ uiginti tres, quæ faciunt omnino obolos septem, aut ferè octo: ubi uenter inanitus est, ad lauacrum duces inde ouis & pane enutries.

Medicamentum ex Cyrenaico liquore ad febrem quartanam.

Lactis cyrenaici, piperis, zingiberis, rutæ foliorum, singulæ drachmæ, datur ad nucis auellanæ magnitudinem.

Puls ad purgandum, tumoribus laxis, & elephanticis singulariter efficax, & in quibus humorem crassum glutinosumque emoliri uoles.

Cucurbitis duabus syluestribus circuncisis semen eximitur, interiore ipsarum carne relicta, dulci oleo ipsas replebis, & propriis operculis obtectas pernoctare sines, in sequenti die uacuato oleo cucurbitas in aqua decoques dum tabescant, deinde ipsis proiectis oleo aquæ temperato nigri ueratri triobolum adiunges, scammoniz drachmam: ubi iam cum his puliculam è simila, aut panem siccum læuigatum incoxeris, inde ægroto dabis tenui pridie uso uictu, ad nucum auellandarum, octo aut decem, aut plurimum quatuordecim magnitudinem, & portioni aquam calidam exhibebis.

Quomodo eos qui purgantur tueri conueniat, quidque faciendum ubi medicamentum purgans assumptum nihil profecerit, Cap. VI.

Symmatim in omni purgatione efficaci, medicamentum homini quem certa prius uictus ratione alueris, ieiuno & coctione obita trades, ac à somno quoad in totum purgatus fuerit, arcebis, motu mediocri si fieri potest adhibito, cibo omni & potu abstinere usque ad consummatam purgationem compellet.

Ex commentarijs Philagrii.

At si inediam non tulerit, aut quod uentriculi os ad bilem contrahendam expeditum ex longa penuria præcedente

habeat, aut alia eiusmodi de causa, dabitur ipsi panis ex uiuo aquoso, aut prisanæ cremor aut chondri, idq; nōdū incepta uacuatione, (ut ne cibus corrumpatur) sed protinus ubi medicamentum fuerit epotum, sic enim nōnunquam ad celerem medicaminis motionem pondere suo opitulatur. Si uerò quocunque medicamento ad aluum emolliendam assumpto quis non purgetur, neque uacuetur, nullo accedente periculo nihil moriendum est. At si magnitudo morbi urgeat, aut æger uellicetur, distendatur, & lancinationem expertus fuerit, clyster statim necessariò iniicietur. Si ne sic quidem uenter respondeat, corpore rosionem & ueluti euerfionem sustinente, lauare liberaliter, inungendo oportet: ubi repletū est grauaturq; sanguinis dimissio congruet, præsertim ubi multi compos sanguinis homo fuerit, oculos rubros habeat, & emissitios, nō ex natura, sed acquisitò ex medicaminis potione. Vbi horū nihil infestat, sed morsus & uellicatus affligit, à balneo cibū protinus offeres, uinū liberalius potui dabis, atq; interea clysterem inferes, nisi subsistat cruciatus, rursusq; lauabis. Esto aut oleū quod in aluū dabis rutaceum, aut ex alio quopiam status experte præparatū.

Si purgatio modum excedat. Cap. VII.

Si purgatio maior sit impendio, cutis infricari debet, & lauari calida: ante balneum uinum tenue, fuluum & flauū dari, tale siquidem celerrimè in totum corpus distribuitur: item panis ex eo madens, & malum punicū. Quod si euacuatio perseueret, artus uinculis excipientur, quæ è summo deorsum distributa, constringant, & nonnihil sanguinis & spiritus excipiant: dabiturq; potui theriaces ex carnibus uiperarum momentum. deducit enim in cutem subitoq; reuellit humorum in uentriculum confluxum, obtunditq; medicinæ purgantis quod ceu uirosū est & medicatum: huius penuria pastillos theriacos, præterea compositionem diaspermaton, & Philonium appellatam: imò etiam cucurbitulis supra stomachum, & cataplasmatibus ex polenta & mulso uti, prodest, deinde epithematis astringentibus: maximè uerò ex totius corporis frictione, & medicaminum potu, adiuuantur. Aer ipsis uitandus qui frigidus nimium aut calidus existat: ille siquidem materiam à foris intro compellit, fluoremq; auget: hic discutit, & uireis resoluit. At si ex intestinorum quæ medicamento

irritantur

irritatur, erosione, uacuatio augeatur cataplasmatibus obducere
cōmemorata oportet, & in aluū dare quæ acrimoniā retundūt,
adipem anserinū scilicet, uinum dulce, nardum & cōsimilia.

De Hieris antidotis.

Cap. VIII.

Hiera Antiochi.

CHamedryos, agarici, colocynthidis medullæ, stœchados, singulorū drachmæ decē, opopanax, sagapeni, petroselini, aristolochiæ fermentaceæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, croci foliorum, singulorum drachmæ quatuor, mellis quod satis est, **A L I T E R** Colocynthidis carnis drachme uiginti, scillæ tostæ, agarici, ammoniaci thymiamatis, ueratri nigri corticis, scammoniæ, hyperici, singulorum drachmæ tres, epithymi, polypodii, aridi, bdellij, aloes, chamedryos, marrubij, calliæ, singulorum drachmæ octo, myrrhæ troglodytidis, opopanax, sagapen, petroselini, piperis communis & longi & albi, cinnamomi, croci, castorii, aristolochiæ longæ, singulorum drachmæ quatuor mellis, quod sufficit.

Hiera Iusti.

Epithymi drachmæ duodecim, marrubij, stœchados, chamædryos, ueratri nigri, scammoniæ, agarici, piperis longi, scillæ tostæ, singulorum drachmæ sedecim, euphorbij, colocynthidis carnis, aloes, croci, gentianæ, petroselini guttæ ammoniaci, sagapeni, singulorum drachmæ octo, opopanax, pollij, cinnamomi, myrrhæ, spicæ nardi, iunci odorati floris, pulegij, singulorum drachmæ quatuor, aristolochiæ longæ & rotundæ, utriusque drachmæ duæ, mellis quod satis est, datur scrupulis duobus, aut tribus, aut quatuor cum mulsâ & sale.

Hiera Galeni.

Chamædryos, piperis longi, piperis albi, stœchados, ueratri nigri, scammoniæ, spicæ nardi, scillæ tostæ, (nonnulli etiā epithymi) singulorum drachmæ sedecim, myrrhæ, croci, ammoniaci suffiminis, euphorbij, singulorum drachmæ octo: excipiuntur melle.

Hiera Ruffi.

Cveurbitz syluestris, quæ sicyonia uel colocynthis dicitur, carnis, drachmæ octo, chamædryos drachmæ decem, sagapeni drachmæ octo, petroselini, aristolochiæ rotundæ,

N 4 piperis

piperis albi, singulorum drachmæ quinque, cinnamomi drachmæ quatuor, uel cassiæ octo, spicæ, croci, polij, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor, mellis, quod satis est.

Hiera Archigenis.

MAttubii, agarici, chamædryos, colocynthidis carnis, stœchados, singulorum drachmæ decem, opopanax, sagapenum, petroselinum, aristolochiæ rotundæ, piperis albi, singulorum drachmæ quinque cinnamomi, spicæ nardi, myrrhæ, polij, croci, singulorum drachmæ quatuor. arida tunduntur simul & incernuntur, opopanax autem, sagapenum, & myrrha confusa, mulsæ per noctem unam in pila macerantur, deinde læuigantur, & sicca his admiscuntur: melle optimo excepta reponuntur in uitreo uase aut plumbeo. hæc ratio omnium hierarum communis est. Summus ipsarum modus est drachmæ duæ: assumatur & salis drachma, mellis heminæ duæ, aquæ quantum satis est. Quod si uehemētiores ad purgandum uoles efficere, quibus scammonia non inest, iniicietur, & his singulis ex illa obolus.

Quæ sedi & umbilico illita purgent. Cap. IX.

Illito sedis ad flatus excutiendos.

Ruta cum melle in tenuissimum pollinem redigitur, ut unus succus fiat, & penitissimè intra sedem delinitur. Efficacissimū uerò est si cumini momentū & nitri assumat, uel cyclamini succum: stупpa exceptum imponitur, aut glandis forma melle appposito, flatu liquidem multi erumpunt, uentrem leuantēs.

Peruntio sedis uentrem mouens, Chezanance.

ALumen cum melle læuigatum coquitur quoad fuluū reddatur, atque hoc sedes perungitur, facili enim copiosa citra laborem subducit.

Medicamentum quod umbilico illinitur epomphalium dictum, ad aluum subducendam.

Cyclamini drachmæ quatuor, nitri drachmæ tres, ueratri nigri & albi, singulorum drachmæ duæ, colocynthidis drachmæ tres, scammonia drachmæ duæ, elaterii succi drachmæ quatuor, cocci gnidii totidem, caricarum pinguium uncia duæ, felis taurini uncia.

Aliud

Aliud laudatissimum.

E Laterij, lathyridis, galbani, cyclamini, ueratri nigri singulorum drachmæ quatuor, colocyntidis carnis drachmæ octo, cucumeris syluatici recentis, scammonia, cocci gnidi, tithymali, singulorum drachmæ duæ, terebinthinæ drachmæ tres: excipito hæc felle taurino, & unguinis modo uritor. Quidam uerò ad unguentes faui uncias sex tem & sicyonij quod satis est, emplastri modo imposuerunt.

Quæ medicamenta uomitum citent, & quomodo ueratrum exhibetur. Cap. X.

Vomitum utuntur & sani, qui ciborum humorumve copia grauantur: & acuto morbo laborantes quum à pituita aut eiusmodi quodam infestantur. At medicamentis uomitum facientibus neq; sani, neque acuta ægritudine occupati uti permittentur: sed in longis prosunt affectibus & præsertim induratis, quæ ualidâ commotione desiderent, qualis est podagra, morbus comitialis à stomacho originem trahens, elephantia aqua subter cutem, melancholia, & persimiles. Aduersatur uomitus sanguinem excreantibus, malo præditis stomacho, & ijs qui suffocationibus opportuni sunt. Promptissimum igitur ad uomitum ciendum est Cyprinum, digitis aut pinnis id intinctis, demissisq; in guttur. item nardi gallicæ radicum drachmæ septem ex mulsa potè sursum ualenter purgant: similiter etiam radicum betonicæ, quæ cestron dicitur, quinq; aut sex drachmæ cum mulsa sumptæ & daphnoidis tria folia uiridia in læuoram coacta comestaq;. Item elaterii obolus in aqua assumptus sursum pituitam & bilem expurgat: & herbæ pediculariæ grana quindecim cum mulsa crassiore, ex bulbis autè qui manducari solent, si crudi assumantur. Narcissi autem elixir sursum per uomitum purgant. idem facit apii radice pars superior, æri proprior comesta, uocant eam nonnulli chamæraphanon, inferior autem pars per inferna purgat, tota uero sumpta ntrinque: raphani prædictis minus quidem purgant, sed utilius: cæterum conuenit ipsas acris & recentis adhuc minutim concisas, ante duas tres uel horas in oxymelite maceratas quam fieri potest multas, assumere, ter quater uel à cœna uomitu excitato: semel autem ieiuni uoment, & sæpe oxymel absorbeant: ubi duabus horis inambulauerint, egelidam bibentes.

recolligere, aliisq; ut uerisimile est superuenientibus casibus, eadem accommodare oportet. At multa facta inanitione, cibis dari somnusq; permitti debet, & alia sicuti in his qui nimium purgatur diximus, facienda sunt. Si perseveret uacuatio, cucurbitulas stomacho defigere, & artus uinculis excipere conuenit: sin aut pro ratione facta sit, mulsæ iusta portio propinabitur, qua superfluitates è medicamēto reliquæ eluantur: mox cibus boni succi offeretur. Iā uerò in iis qui medicamenta per os abominantur, omnino aut hellebore potionē requirunt, Antyllus huiusmodi quodā uisus est clystere: hellebore albi drachmæ duæ in aquæ sextario per diē & noctem unā macerantur, sequenti die ueratrū in aqua ad dimidias coquitur, inde in aluum datur, ut uomitum concitet, superius purgat paulò imbecillius quàm ueratri potio. Vbi abundè purgatum est, glande acri imposita, aluus irritatur, ut quod iniectum est reddatur, & æger nō amplius uomat. Facta excretionē, mulsæ semel bisve intestinis abluendis iniicitur. ipse uerò Antyllus tradit fieri etiam glandem ex hellebore albo tuso cribratoq; deinde cocto melle excepto, ac clysteris modo ex hellebore præparati, superiorem uentriculum purgare, uerum hic est modus probatior. Nam purgationē parire in uices nobis licet: pondus igitur sit ueratri drachmæ duæ, cæterū glans circumaptetur aut uinciatur stappa solidiore, cuius initiū extrinsecus per sedem recipiatur, quò glandem ubi satis purgando profecerit, auferre possimus. hic inodus purgat, quidem absolutissimè, non autem suffocationem aut aliud quoddam periculum inducit.

De differentia antidotorum. Cap. XI.

PRæratio Galeni de antidotis in hunc modū habet. Medicinas quæ non extrinsecus imponitur, sed intra corpus assumptæ affectibus medentur, antidota ueteres nuncupant: cæterum triplex ipsorum est differentia, quædam enim lethalium medicamentorū gratia offeruntur, quædam ob bestias uirus iaculanteis, quas Græci *ἰωβόλες* appellant, quædā uerò morbis ex prauo uictu cōtractis auxiliatur: nōnulla treis hos usus promittunt, que madmodū etiā quæ theriaca dicitur.

Hedychroi quod theriacen ingreditur, confectio.

ASpalathi radicis corticis, calami aromatici, costi, asari, xylobalsami, phu, amaraci, mastiches, singulorum drachmæ sex, carpobalsami drachmæ duæ, mari drachmæ sedecini

styrace, acacia, & opopanace, mellis momentū instillatur, confusaque dissoluuntur, deinde uino superfuso, ut illa superet per triduum madescunt: inde reliqua confusa in unitatem coguntur, mel despumatum: cæterū in argenteo aut uitreo uase non adeo pleno medicamentum reponitur, frequenter operculum aufertur. Vfus eius est quum urget necessitas in iis qui à feris commorſi sunt & uenena assumpſere, post annum ætatis septimum, sic ut instar nucis auellanae, cum tribus uini cyathis, quotidie bis bibatur. Similiter facit ad eos qui ex quadam latente causa periclitati sunt, corruptela quæ corpus conficit, lethalis medicamenti qualitatem imitata, quemadmodum in pestilentia correptis potissimum accidit, semel quotidie. in alijs uero affectibus à decem annis usq; ad uiginti, usus eius celebratur in tussi, thoracis, doloribus aut laterum, si febris abest, cū mulso: si illa urat, cum hydromelite, sub noctem ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem exhibetur. Sanguinem autem excreantibus omnibus, si morbus recens est, ex posca: si uetustior, ex symphyti decocto, quantum faba Aegyptia explet, idque manè, & uesperī. At quos inflationes & torsiones circa umbilicum, aut morbus cœliacus malè habet, ex aqua calida ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem mane assument. cæterum appetentiā uehementem excitat, rigores, perfrictionem, & bilis uomitum, præsumptum ante accessiones discutit, menstrua ducit, & fœtus mortuos eiicit, fabæ Aegyptiæ instar potum ex mulsa, aut passo in quo ruta aut dictamnū decoctum sit. Item ad uocē abscissam ualet & per se, & cū duplicato tragacantho ex mulso aut passo potum, atque sub lingua retentum eliquatumq;: lienolis, iocinorosisq; ex posca, scyrthus adest, ex oxymelite, aut aceti scillini sesquicyathos: in nephriticis cum mulso circa fabæ Aegyptiæ magnitudinem: dysentericis tantundem cum decocto rhus, mane & uesperī. Ad lippitudines autem summè etiam in hunc modum temperatum facit: antidoti & opobalsami uncia duæ, mellis cyathus mixta paulatim unguntur. Itē denteis abstergit. pleriq; uerò ut sanitatē ab iniuriis uindicet, noua Luna ad Græcanicæ fabæ magnitudinē ex eo sumunt, concoctione benè obita cū uno mellis cochleari, & duobus aqua cyathis. Similiter etiam in peregrinationibus eo utuntur, quum prauī cuiusdam aeris aut aquarum in itinere suspitio nem habent.

ciebam, atque hac ratione longè præstantissimi euaserunt.

Antidotum Mithridatis, dia scincu.

MYrrhæ troglodyticæ, zingiberis, cinnamomi, singulorum drachmæ decem, spicæ nardi, thuris, thlipsis, opobalsami, iunci odorati floris, costi, stæchados, fœfelis, galbani, resinæ terebinthinæ, piperis longi, castorei, hypocyttidis succi, styracis, malabathri foliorû, singulorû drachmæ quatuor, cassiæ nigre, polii, piperis albi, scordii, dauci seminis, carpobalsami, cyphios bælli, nardi gallicæ, gummi, petroselinii, opii, cardamomi, fœniculi seminis, gentianæ, foliorû rosæ, singulorû drachmæ octo, dictamni, anisi, acori, phu, singulorû drachmæ tres, niu athamantici, acaciæ, alui scinci, hyperici seminis, singulorû sesquidrachma, uini & mellis quod satis est Preparatur theriacæ modo. Galenus tradit ad eadem hoc ualere, ad quæ illa, præterquam ad uiperæ morsus, in eos enim Theriace efficacior est.

Antidotum dia hæmaton, hoc est ex sanguinibus, ad omnia uenenata, & lethalia medicamenta.

PIPERIS albi & longi, costi, acori, phu, anisi, dictamni cretici, singulorum drachmæ duæ, amomi, opobalsami, rutæ sylvestris seminis, fœniculi seminis, cumini æthyopici, anethi, anatis masculi sanguinis sicci, hædi sanguinis, anserini sanguinis, anatis fœminæ sanguinis, napi sylvestris seminis, singulorum drachmæ tres, gentianæ radicis, trifolii, iunci odorati floris, lachrymæ thuris, rosarum siccarum, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ duæ, scordii drachmæ octo, petroselinii, polii, myrrhæ, nardi, singulorû drachmæ sex, cassiæ drachmæ tres, lactis cyrenaici totidem, stæchados drachmæ quinque, asari drachmæ duæ, guttæ ammoniaci drachmæ tres, meu athamantini drachmæ duæ, agarici tantundem, carpobalsami grana uiginti, mellis cocti quod satis est.

Oxymeli simplex.

ACETI quàm acerrimi albi sextarius, aquæ sextarii duo, mellis sextarius, ad liquidioris mellis spissitudinem incoquantur, sic ut mel interea dispumetur.

Acetum scillites.

SCILLÆ albi coloris in taleolas concisæ libræ sex, quadragesima diebus in umbra siccantur, deinde ubi rursus purgatæ fuerint, in aceti generosi sextariis duodecim, diebus

sexaginta

chrymæ papaueris drachmæ decem, croci drachmæ quinque, pirethri, euphorbij, spicæ nardi, singulæ drachmæ, mellis atticici uel alterius generosi probè cocti quantum sufficit. datur pro uectioribus ad nucis auellane magnitudinem: minoribus fabæ instar: pueris, ciceris. Medicamentum est, quod dolorem sopit, & somnum accersit.

Athanasia dolorem leniens, pleuriticis accommodata, auctore Oribasio.

CAssiæ drachmæ octo, spicæ nardi, amomi, croci, opij, styracis, myrrhæ, costi, singulorum drachmæ quatuor, mellis de spumati quod satis est. datur quemadmodum Philonium.

Medicamentum ex duplici pipere, eiusdem effectus.

CArdamomi, castorei, opij, singulorum drachmæ tres, myrrhæ, costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum drachmæ tres, croci totidem: excipiuntur melle decocto, & ad fabæ magnitudinem exhibentur.

Medicamentum dia codion, id est, ex papaueris capitibus, & sapa.

CApita papaueris uiridia minimè aquosa octo decem uel, die postquam decerpta sunt incoquantur cum dulcis radicis unciâ, madefacta in sapæ sextatio rursus incoquantur dū tabescant, ubi mediocris spissitudo facta est, ab igne sublata defunduntur: usus medicamenti est in febribus ubi sopire opus est, & quum tenuis defluxio à capite in thoracem deferatur.

Medicamentum ex capitibus papaueris & melle.

CApita papauerum, ut dictum est, & dulcis radicis unciâ, in aquæ pluuialis aut puteanæ sextario donec intabescant excoquantur. ubi expressa fuerint, semisextarius mellis decocto inijcitur: excocta usque ad spissitudinem, dantur in quibus præterquam quod dolorem lenire, & somnum cōcialiare oportet, etiam purgatione opus est, & abstersione eorum quæ in pectore aut pulmonibus renibusque inhærescunt.

Dia codion, compositum.

AQuæ, in qua papauerum capita decocta sunt ad prædictā commodè rationem, sextarius, uini dulcis heminæ duæ, mellis libra, croci, hypocistidis succi, singulorum drachmæ

quatuor, coquuntur usq; ad spissitudinem, uerū stomacho uti-
lus est medicamentum ex melle, capitum papaueris decocto,
& malis cotoneis præparatum: efficacius si præter capita, seru-
la campana & dulcis radícula aquæ incocta fuerint.

*Eclegma ex marrubio, simplex, tabidis maxi-
mè accommodatum.*

M Arrubii comæ libra in aquæ heminis sex decoquitur ad
tertias, inde herba proiicitur, adiicitur autem aquæ mel:
ea incoquuntur utque ad mellis spissitudinem instar cochlea-
ris exhibetur.

Ex marrubio, compositum.

M Arrubii comæ, iridis illyricæ, hyssopi, pulegii, dulcis radicu-
læ, apii, singulorum sextans, caricarum pinguū quadrans,
nuclei pini resinati tantundem: crassius contusa, arida cum ca-
ricis in aquæ sextarios tres demerguntur, coquunturque usq;
ad tertias, illis exemptis, aquæ, mellis libræ duæ induntur, & ad
crassitudinem melleam incoquuntur.

Medicamentum ex eruiis.

A Mygdalarum amandarum sextans, faringæ erui triens, hyssopi
tantundem, iridis semuncia, nucleorum pini torrefacto-
rum uncia duæ, mellis sextarius, uel quod satis est.

Medicamentum dodecatheon.

I Ridis Illyricæ triens, erui triens, hyssopi, urticæ seminis, dul-
cis radiculæ, fœnugræci, singulorum sextans, bulborum, se-
minis lini torrefacti, singulorum triens, melanthii scrupula
octodecim, pulegii scrupula sex, nucleorum pini torridorum
sextans, piperis scrupula sex, mellis quantum sufficit.

Antidotum, soteria.

S Picæ nardi scrupula trigintanouem, myrrhæ scrupula uigin-
ti septem, croci scrupula triginta septem, castorii scrupula tri-
gintanouē, opii scrupula triginta sex, petroselinii scrupula qua-
draginta quinque, anisi scrupula nouem, apii scrupula septem
iunci odorati floris scrupula triginta sex, calliæ scrupula duode-
cim, piperis longi totidem, sinonis seminis scrupula sex, styra-
cis scrupula octodecim, amomi scrupula duodecim, seselis toti-
dem, hedychroi, costi, asari, singulorum scrupula octodecim,
mellis quod satis est.

Ex styrace beehicon, hoc est, tussi efficax.

A Momi, cassiæ, singulorum sextans, styracis, spicæ nardi, singulorum fescuncia, croci, piperis albi, singulorum uncia, mellis sextarius: exhibetur cochlearium.

Medicamentum Philoxeni, purulentis & longa defloxiōe infestatis idoneum.

R Esinæ terebenthinæ drachmæ uigintiocto, nardi drachmæ sedecim myrrhæ stillatitiæ drachmæ sex, cardamomi, bulborum tantundem, croci drachmæ duodecim, galbani drachmæ sedecim, amygdala amara octoginta, mellis hemina: ex aqua potatur, quantum faba Aegyptia explet.

Esdra, multiplicis usus, uehementer enim desiccat.

A Momi scrupula sex, croci scrupula octodecim, dauci seminis scrupulum unum & dimidium, scæniculi seminis scrupula tria, cassiæ sesquiscrupulum, iunci odorati floris scrupula quatuor & dimidium, cinnamomi scrupula tria, hypocistidis succi scrupula quatuor & dimidium, sulfuris uncia quinque, papaueris seminis scrupula quinque, pyrethri scrupula tria, petroselinis sesquiscrupulum, iridis illyricæ scrupula septem & dimidium, alterci seminis scrupula tredecim & dimidium, spicæ nardi scrupula septem & dimidium, rutæ seminis sesquiscrupulum, anethi scrupula tria, cardamomi uncia tres, rosarum siccarum scrupula quatuor & dimidium, nerii floris sesquiscrupulum, est aut ueluti libra ex qua oritur rosa, rhododaphanes & rosæ ipsius singulorum scrupula tria, rheu scrupula sex, gentianæ scrupula sex, hedychoi sesquiscrupulum, tragacanthæ scrupula quindecim: lycii scrupula sex, citri arboris foliorum scrupula sex, oxi mi seminis sesquiscrupulum, anisi scrupula tria, costi, myrrhæ, singulorum scrupula sex, bdellii scrupula sedecim, artemisiæ succi scrupula tredecim, rhu syriaci scrupula uiginti quinque & dimidium, asari, uteri mergi, lapidis iaspidei, singulorum scrupula tria, piperis scrupula quindecim, cattorii sesquiscrupulum, cimolizæ scrupula sex, sisonis scrupula nouem, styracis totidem, opobalsami scrupula duodecim, seselis herbæ sesquiscrupulum, mellis, uncia uigintiocto, uini quantum satis est.

M *Medicamentum ex malorum cotoneorum carnibus.*

Alorum cotoneorum purorum libræ tres, coquantur in

uini pernetusti sextarijs tribus, deinde conteruntur: quibus, piperis, anisi, significii, singulorum contritorum uncia admiscetur. Nonnulli etiam zingiberis semunciam induunt. quidam in bicem uini, aceto usi sunt.

Medicamentum ex succis malorum, ad appetentiam abolitam & agram concoctionem probatum.

Malorum cotoneorum maturorum succi sextarij duo, mellis laudati tantundem, aceti sextarius, zingiberis uncia tres piperis albi uncia duae incoquantur ad spissitudinem. hoc Galenus ad eos qui perfrixerunt preparatum quibus autem bilis redundat, sine pipere & zingibere conficitur.

Quomodo paretur melaplacontium.

Malorum cotoneorum purorum librae sex in uino coquantur quousque intabescant, inde exemplar conteruntur. nonnulli mellis libras octo adiiciunt, coquantque igne lento, ferula agitantes. ubi tam spissum totum euaserit, ut manus quodam modo non inquinetur, etiam tunc addunt contusi piperis uncias tres, anisi tantundem, petroselini unciam. Sunt qui zingiberis unciam & mastiches tantundem misceat: deinde mixta instar semunciae formant, & cum lauri foliis componunt.

Cydonatum contusum fragmentis saluis.

Malorum cotoneorum purorum frustulati concisiorum librae octo, in uini sextariis totidem incoquantur temperate, ut non dissoluantur, deinde mellis despumati librae octo, piperis uncia octo, petroselini, anisi, singuli quadrantes. zingiberis quincunx, spicae nardi sescuncia, caryophylli uncia, ipsi admiscantur: omnia contusa ac modice incocta usque ad iustuli spissitudinem auferuntur, quibus refrigeratis fragmenta si mul cum iure componuntur.

Medicamentum diatrion pipereon ex triplici pipere.

Piperis communis, albi, & longi, singulorum drachmae septem, zingiberis, anisi, thymi summitatum, singulorum drachmae duae, mellis quod satis est.

Aliud, Oribasii.

Piperis albi uncia duae, piperis nigri, & longi, spicae nardi, cinnamomi, ameos, caryi, hyslopi, fefelis, dauci, petroselini, singulae unciae, zingiberis drach. quatuor, mellis librae tres.

Aliud.

Aliud.

Piperis communis quadrans, albi uncia, longi tantundem, petroselini, cinnamomi aut cassiæ duplicatæ, zingiberis, singulorum uncia, mellis uncia una & uiginti, uel quod satis est. ego etiam thyni comæ unciam miscui.

Diospolites.

CVmini aceto macerati torrefactique uncia piperis, zingiberis, singulorum uncia duæ, rutæ uiridis sescuncia, nitri drachmæ duæ, & semis: melle excipitur.

*Medicamentum dia Calamynthes, id est,
ex Calamintha.*

Petroselini, pulegii, seseleos, calaminthæ, singuli quadrantes, apii, seminis uncia.

*Medicamentum dia citriu, hoc est, ex malo medi-
co, tardè concoquentibus efficax.*

ACeti heminæ tres, mali medici carnis libra, hyssopi, rutæ, singulorum fasciculus: per noctem in aceto madefacta ad tertias decoquuntur, expressæque; proiciuntur: aceto miscetur: mellis sextarius, rursusque; incoquuntur ad mellis spissitudinem: ubi incrassata fuerint, insperguntur asari, meu, piperis albi, singuli sextantes: exhibetur cochleare mane, & dormituro.

Picra, hoc est amara, compositio Galeni.

ALoes drachmæ centum, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinnamomi, singulorum drachmæ sex. Qui-
dam addunt etiam iunci odorati floris & cassiæ utriusque; drachmas sex. exhibetur drachma ex hydromelite.

*Picra ex oxymelite, ad stomachicos, uterum,
& aquam inter cutem.*

ALoes uncia quatuor, phylli uncia duæ, costi, cassiæ, amomi, iridis singulorum drachmæ, fœniculi radice corticis libra, mastiches, nardi gallicæ, zingiberis singulorum drachma, piperis drachma, meu drachma, aceti, mellis, utriusque sesquiseptarius: fœniculum in aceto prius excoctum proicitur, dein de mel additur. Vbi usque ad melleam, spissitudinem incoeris, reliqua detrita insperges.

Medicamentum ex lupino iecore præstantissimum.

Gentianæ, chamæpityos, petroselinii, marrubii, succi arctii, sinapis, scolopendrii radices, panacis, minii, erythrodani, brasseæ seminis, aristolochiæ longæ, piperis albi, spicæ nardi, costi erucæ seminis, eryngii radices, polii, echii, eupatorii, baccarum iuniperi, lupini iecoris, helenii, pares modi: melle discocto excipiuntur, mulsoque probè cocto, ad nucis auellanz magnitudinem dantur.

Theodoretus dia anacardion.

Anacardiorum fescuncia, croci, crassiæ, philly, spicæ, nardi, cariophylli, meu, agarici, iunci odorati floris, rheu, epithymi, singulorum drachmæ quatuor, acori, piperis, singulorū fescuncia, aloes uncia tres, saxifragæ, mastiches, iris illyricæ, singulorum fescuncia, myrobalanorum uncia, mellis libræ sex, uel quantum sufficit.

Theodoretus altera dia anacardion.

Aloes drachmæ sexaginta, agarici drachmæ uigintiquatuor croci, cassiæ, rheupontici, acori, cinnamomi, mastiches, singulorum drachmæ decem: costi, rutæ seminis, piperis albi, singulorum drachmæ octo, spicæ nardi drachmæ tres, xylobalsami, asari, chamædryos, meu, singulorum drachmæ quatuor, mellis quodd satis est. Nonnulli hic quoque addunt anacardiaz duo, datur drachmis binis cum mulla.

Medicamentū cyphoides, ad iecorosos & pectoris uitia.

Vuæ passæ carnis drachmæ uigintiquinq; croci drachma, calami odorati drachmæ duæ semis, bdellii drachmæ duæ & semis, cassiæ sesquidrachma, cinnamomi tres oboli, spicæ nardi totidem, iunci odorati drachmæ duæ semis, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, singulorum drachmæ quatuor, aspalathi ramenti oboli duodecim, mellis drachmæ sedecim, uini quantū sufficit.

Aliud cyphoides, Alexandri.

Croci, cinnamomi, bdellii, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, calami aromatici, singulorum, drachmæ duæ, aspalathi, iunci odorati floris, singulorum drachmæ tres, cassiæ, nardi, singulæ drachmæ, terebinthinæ resinæ drachmæ sedecim, uuæ passæ carnis drachmæ centum sexaginta, mellis sesquihemina, uini Chii quod sufficit.

Dia

Dia bacanu medicamentum, Hepatis accommodatum.

BAcani uncia, costi tantundem, phylli scrupula octo, piperis albi scrupula sex, spicæ nardi totidem, mellis quod satis est, datur cochlearium cum temperatura conditi.

Medicamentum Zopyrios.

MYrrhæ drachmæ quinque, croci, cassiæ, singulorum drachmæ quatuor, cinnamomi drachmæ tres, spicæ nardi drachmæ duæ, iunci odorati floris tantundem, piperis albi sesquidrachma, thuris drachma, costi drachma, mellis quod satis est.

Compositio pæonia.

STyracis calamitis drachmæ sex, thuris, amomi, croci, singulorum fescunciâ, spicæ nardi drachmæ sex, phylli drachmæ duæ, piperis albi drachmæ sex, & communis octo, myrrhæ uncia, costi tantundem, mellis quod satis est.

Catapotia Dositei ad iecur inscripta.

ALoes uncia, spicæ nardi, phylli, cocti, singulorum scrupula duo, agarici scrupula octo, mastiches scrupula tredecim, epichymi scrupula quatuor, rheu scrupulum.

Oxymeli splenicum, hoc est, lieni dicatum.

CApparis radicū corticis, scolopēdrii, spicæ nardi, asari, iridis iunci odorati floris, iunci quadrati floris, anisi, cumini, fœniculi, acori, ericæ fructus, singulorū uncia, myricæ foliorū, salicis foliorū, apii radicis, thuris arboris, scillæ, singulorum uncia, aceti sextarii tres, mellis tantundem, guttæ ammoniaci unc. tres. præparatum modo scillini, duobus cochleariis exhibetur.

Oxymeli, calculosis efficax.

SAxifragæ, betonicæ, graminis, adiathi, spicæ nardi, carpesii, asari, eryngi, singulorū unc. petroselini macedonici, rutæ seminis, singulorū semuncia, fœniculi uiridis, iridis, scillæ tostæ, chamædaphnes, singulorū unc. duæ, capparis, capparis radicū corticis unc. tres, si unc. duæ, aq. aceti, mellis, singulorū sextarii duo.

Phusca, ad conterendum calculos.

PVlegii, mastichēs, apii seminis, menthæ siccæ, singulorum uncia, salis communis torrefacti libra, coriandri seminis. spicæ nardi, anisi, ameos, singulorum scrupula sex, phylli scrupula quatuor, piperis albi semuncia, uel communis uncia, lithosperi mi uncia sex, betonicæ totidem, aceti sextarii

sextarii quinq; omnia contusa, cribrata, & in tenuissimū polli-
nem detrita, per triduum aceto madescunt, deinde diebus qua-
draginta insoluantur: ubi usus inciderit, nigrum cicer, aspara-
gi radicem, apium, & adianthū decoquis, in huius decocti mi-
sturam heminas duas aceti superinfundis, & ægro in calido bal-
neo folio propinas. Nonnulli uerò pulueris ex prædictis spe-
ciebus, scrupula duodecim cum posca dictarum herbarum iuri
temperata exhibent, & nihilo minus medicamentum proficit.

Conditum calculos confringens.

Piperis albi, saxifragæ, spicæ nardi, lithospermi, betonicæ,
singulorum uncia, petroselini, phylli, singulorū sescuncia,
rutæ sylvestris seminis semuncia, mellis sextarius, uini a scalo-
nitis sextarii sedecim.

Medicamentum ex sanguine hircino.

Quum uua inceperit maturescere, hirci ætate florentis
sanguinis in sole siccati cochlearia duo calculosis exhi-
beto cum passo cretico. Quidā uerò amomi & phylli, utriusq;
treis uncias miscent. Alii etiam myrrhæ quatuor scrupula.

Excicadis medicamentum nephriticum.

Lithospermi, raphidis piscis combusti, seselis, singulorū un-
cia, ameos, cucumeris satiui, seminis, saxifragæ, uue passæ
acinis exemptis, altheæ seminis, phaseoli albi, lycurii, singulo-
rū semuncia, spicæ nardi, phu, meu, lapidū ex spongiis, singulæ
drachmæ, adianthi, paliuri seminis interioris, si sicci, rubi radi-
cis, graminis, polypodii: singulorum drachmæ tres, hircini san-
guinis desiccati ut dictum est, scrupula sex, cicadærum siccarū si
ne capite, pennis, & pedibus, triens, piperis drachmæ sex, mel-
lis probè cocti quod satis est, datur instar nucis auellanz in con-
dito tribus obolis, aut decocto saxifragæ, aut sii, aut radice a-
sparagi, aut rorismarini, aut quinq; folii, aut struthii radice.

Medicamentum ex lithospermo.

Lithospermi, betonicæ, saxifragæ, petroselini, piperis albi pa-
res portiones cum melle excipiuntur.

Medicamentum ex marrubij semine.

Piperis albi & nigri, dauci cretici, cucumeris satiui, seminis,
foeniculi, seminis, marrubii seminis, petroselini macedoni-
ci, pyrethri, zingiberis, phylli, singulæ uncia, mellis qd satis est

Medicamentum

Medicamentū ex lapide Iudaico, qui tecolithos dicitur.

Spicæ nardi, hyssopi, lapidis Iudaici, singulorū scrupula octo piperis scrupula duodecim, zingiberis, petroselini, costi, saxifragæ, singulorum scrupula sex, cassiæ, apij seminis, singulorū scrupula tria, cyperi scrupula sex, ramenti eboris scrupula quatuor, cardamomi ligni scrupula sex, seminis lini scrupula quatuor, mellis quantum sufficit.

Medicamentum ex sylvestris maluæ semine.

Cucumeris domestici seminis drachmæ duodecim, alterci seminis drachmæ sex, cicutæ seminis drachmæ tres, (alijs sex) opij, foeniculi, maluæ sylvestris seminis, croci, singulorum drachmæ tres, apij seminis drachmæ sex, cassiæ drachmæ quatuor, amygdala basilica decem, nuces auellanae totidem, asari drachmæ quatuor: passio cretica excepta dantur tribus obolis, si febris abest, cum sapa. Nonnulli melle excipiunt.

Medicamentum ex bellarijs nephriticum, vesicæ & renum exulcerationi idoneum.

Vuæ passæ albæ cui acini sint exempti, nucleorum pini recentium, singulorum uncia duæ, cucumeris seminis cortice exuti, baccarum myrti nucleo ablato, amygdalarum amararum, pulmarum pinguium, apij seminis, papaueris seminis: croci, singulorum drachmæ, myrti uncia duæ instar drachmæ ex passio ieiuno propinatur.

Satyriacum antidotum.

Zingiberis, satyrii superioris, singulorū drachmæ octo, scinci caudæ, meu, asari, petroselini, cardamomi, seselis, singulorum drachmæ quatuor, erucæ seminis, cinnamomi, singulorum drachmæ tres, hormini, piperis albi, cnici seminis, singulorum drachmæ duæ, iunci odorati floris, spicæ nardi, singulæ drachmæ, sanguinis hircini mystrum. datur drachma imbecillioribus cum lacte.

Catapotia ex xylomacere, dysentericis utilia.

Xylomaceris, opij, rhei, singulorū scrupula sex, gallæ, myrrhæ, singulæ uncia, excipiuntur uino spathis.

Podagrica

Podagrica remedia.

Medicamentum ex corallio, quod diacoralliu uocatur, podagricis idoneum.

Rheu barbarici, pæoniæ, myrrhæ troglodytidis, spicæ nardi, singuli sextantes, phylli uncia, caryo phylli grana quindecim, anagallidis phœnicei coloris quam uocant corallion, semuncia, aristolochiæ longæ uncia quatuor, & rotundæ totidem, datur instar scrupuli quotidie, concoctione probè defuncto. Incipiendum uerò est ab æquinoctio autumnali, quod circa uigesimumquartū mensis septembris diem accidit, capiendumque deinceps ad dies quinquaginta, deinde relinquetur quindecim dierū interuallo, atque sic facere oportet quousq; dies quibus assumitur abscreuatur treceti sexagintaquinq; Sub caniculæ ortu omnino abstinendū est, hoc est, à uigesimo quarto die Iunij usq; ad Augusti finem. Vitari debet uenus, carnes præsertim suillæ, salsamentum, garum, betæ, daucum, menta, & lactuca non cocta, peponesq; , piscium capita, cammori, tum qui molli, tum qui testacea cute præditi sunt, legumina omnia, & summatim quæ crassi succi sunt, uinum nigrum & liberalius. Balneum conuenit & quotidianum exercitium, uel pedibus, uel equo, uel gestatione obitum. Qui uerò habitu sicciorē sunt, etiam si plenius nutriantur, non offenduntur.

Agapeti compositio ad podagram.

Phylli, reu barbarici, croci, spicæ nardi, myrrhæ troglodytidis, costi, chamædryos, singuli sextantes, aloes hepaticæ quicunx, hyperici, pæoniæ, singuli quadrantēs, aristolochiæ longæ, phu, meu, damafonij, anagallidis, singuli trientes: utendi modus idem est qui in compositione dia coralliu.

Compositio atactos ad podagram.

Phylli, meu, damafonii, anagallidis cui flos est cæruleus, erythrodani, mastiches, croci, cassiæ aloes hepaticæ, gentianæ, chamædryos, singulorum uncia, caryophylli, asari, piperis albi & nigri, singulorum semuncia, spicæ nardi, myrrhæ, reu barbarici, pæoniæ radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia due. Similis usus est.

*Procli compositio, podagra & coxendicum do-
loribus accommodata.*

CHamedryos unciz nouem, centaurij unciz octo, aristolochiz, unciz septem, gētianz unciz sex, hyperici unciz quinque, petroselini macedonici unciz quatuor, meu unciz tres, agarici unciz duz, phu uncia una, mellis attici heminz duz.

Medicamentum ex rebus septem constans, ad eadem,

Hyperici, aristolochiz longz, singulorū uncia, cētaurii, chamæpityos, agarici, singulorum tres unciz chamædryos unciz sex, gentianz unciz quinq;. Nonnulli etiā petroselini unciam addunt, mellis drachmas quinq;. datur instar drachmæ.

De pastillis.

Cap. XII.

Pastilli græcè trochisci à figura rotularum nominantur. Tres sunt eorum species, alij nanq; sunt portabiles, alij in aluum dantur, alij delinuntur. Ex his igitur qui portantur, alij comprimunt aluum, aut sanguineum, aut aliam quampiam fluxionem, refrigerando, aut astringendo, aut opplendo, aut desiccando eā cohibētes: quemadmodū qui cōstat. spina ægyptia, & q. seminibus, cōsimilem q;: alii dolorē sopiūt, uel q. sensum obtupefaciunt, ut crocodes dictus, uel q. humores diffundāt, ueluti ex aromatis cōfecti: alii lienem, aut renes, aut iecur obstructione liberāt, ut qui ex amaris amygdalis confit. Eorū uerò qui in aluū indūtur, nonnulli acrimoniam obtundūt, ut in dysenterijs, quemadmodū ex pompholyge, amylo, tetrasamia, cū cremore ptisanæ aut eiusmodi aliquo iniecti, nonnulli alui aut sanguinis profluuiū astringūt, sicuti qui alumine, acacia, & omphacio cōstant, qualis est qui Philippo ascribitur, uel ex spina Aegyptia, cū rosarū succo, aut plātaginis inditi: nonnulli adurentes, dysenteriz quā ulcera depascētia exerce, idonei: ex sandaracha, auripigmēto, calce: charra cōbusta, cōfecti. Inferentur aut cū succo lēticulæ aut oryzæ, sic ut intestinū prius muria elotū sit, ægerq; cibū & potū antea assumpserit, ne aliquid medicamēti uirtutis reliquū, ad stomachū rapiatur. Ceterū utiles sunt pastilli qui ab inferioribus partibus iniiciūtur, ad affectus potissimū qui infra umbilicū infestant. Nā superius uis ipsorū peruenire nō pōt. At q. delinunt simileis illis uireis obtinēt: uerū astringētes, in herpete, papulis, q. dicunt exāthemata, intertriginib. sāguinis eruptionib. & fluidis ulcerib. pficiunt: cuiusmodi

modi est Andronius & Polyidæ qui uero obtundūt, carbūculis & maleficis ulceribus expediūt: utpote Leucus dictus. & dialotarion. urentes, sicut iam comprehensi, cuius generis habentur, & Faustiani, serpentibus naturalium & sedis ulceribus, & te rygijs, & carnosis narium uitiis accommodantur.

Pastillus aster dictus.

CRoci, opii, castorei, spicæ nardi, cassiæ, myrrhæ, lemnis crete, mandragoræ corticis, singulorum triens, dauci, apij, anisi, fœnelis, alterci, seminis, styracis, singulorum drachmæ octo: uino læuigantur.

Pastillus trigonus.

APij seminis, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ, anisi drachmæ quatuor, opii drachmæ duæ, anisi drachmæ quatuor, opii drachmæ tres: aqua teruntur.

Pastillus à seminibus diaspermaton dictus.

ANisi, ameos, fœniculi seminis, singulorum drachmæ quatuor, apij seminis, opii, alterci seminis, singulorum drachmæ duæ: aqua læuigantur.

Pastillus crocodes. hoc est croceus.

ANisi, dauci cretici seminis, singulorum drachmæ quatuor, myrrhæ, castorei, singulorum drachmæ duæ, croci, opii, singulorum drachmæ tres, apij seminis, styracis, singulorum drachmæ quatuor, alterci seminis drachmæ sex: ex aqua deteruntur.

Pastillus diarhodon.

ACaciæ, gummi, rosarum floris, balaustiorum, hypocistidis succi, gallarum, singulorum drachmæ tres, rosarum uiridum succi, plantaginis seminis singulorum drachma, lycii Indici tantundem.

Pastillus dia coralliu.

AAlterci seminis, thuris, singulorum drachmæ octo, terræ samis, corallii, minii Sinopici, opii, singulorum drachmæ quatuor, amyli, balaustiorum, singulorum drachmæ duæ: succo populi excipiuntur.

Pastillus dia electru, hoc est, ex succino.

Herbæ pulicaris uncis quinque, mastiches uncis quatuor, succini scobis, iridis, croci, singulorum uncis quatuor, opii uncis duæ.

Pastillus ex spina Aegyptia.

SPinæ Aegyptiæ, rhu, thuris, acaciæ, aluminis scissi, hypocistidis, succi, gallæ, lemnis cretæ, corallii, symphiti, terræ samis, aloes, ladani, pares portiones: uino subiguntur.

*Alius pastillus, quem Galenus aphrodisiasti-
con calidion scribit.*

SAtiæ punicæ floris, spinæ Aegyptiæ, balaustiorum hypocistidis succi, acaciæ, singulorū drachmæ sex, lycii, rheu pontici, opii singulorū drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ duæ, excipiuntur uino myrteo, uel rosarū baccarum uel myrti decocto,
Clidion Oribasii, ad dysentericos & celiacos.

GAllæ omphacitidis drachmæ octo, opii drachmæ quatuor. ex aqua singuntur catapotia. dantur terna aut quaterna.

Pastillus ex cornu ceruino dysentericis & sanguinem excreantibus salutaris.

COchlearū drachmæ duodecim, cornus ceruini cōbusti gallæ torrefactæ, acaciæ inaresactæ singulorum drachmæ quinque oboli duodecim, baccarum myrti nigre drachmæ quindecim, opii siccati, hypocistidis succi singulorum drachmæ quinque, abruscæ floris drachmæ sex mandragoræ radice succi, terræ samis quæ asper dicitur, singulorū drachmæ duodecim, rhu obsoniorum drachmæ quatuordecim, malicorii torridi drachmæ septem, thuris drachmæ octo, picæ corticis exaresacti drachmæ quatuordecim, alterci seminis siccati drachmæ decem, rhu coriarii sextarii duo, uini nigri quantum rhu incoquendo ut unum fias crassissimum, satis est, atque hoc percolato reliqua excepta in pastillos coguntur.

Pastillus amazonum.

APii seminis, anisi singulorum drachmæ sex, absinthii comæ drachmæ quatuor, myrrhæ, piperis, opii, castorei, singulorū drachmæ duæ, cinnamomi drachmæ sex aqua subiguntur.

Pastillus ex amygdalis amaris.

ANisi, apii seminis, asari, amygdalarum amararum, absinthii comæ, paria pondera: ex aqua singuntur pastilli, qui drachmam pendeant: dantur febri catentibus ex mulso: febricitantibus cum hydromelite.

Pastillus ex erica, lienī dicatus .

ERicæ fructus drachmæ quatuor, piperis albi, nardi syriacæ, suffiminis, ammoniaci, singulorum drachmæ duæ: ammoniacum aceto soluitur, aridisque admiscetur. finguntur pastilli qui singuli drachmam expleant. exhibentur singulatim cum oxymelitis cyatho .

Pastillus ex uesticarijs, diaphysalidon uocant .

CVcumeris satiui excorticati seminis uncia quatuor, alterci seminis, cicutæ, singulorum uncia duæ, sceniculi, rumicis seminis, croci, nucleorum pini, amygdalorum amarorum, opii, singulæ uncia, uesticariæ sextarii tres, uini quod sufficit .

Pastillus Philippi, ad dysentericos .

BAlaustiorū, acaciæ, hypocistidis succi, opii, rhu thuris, myrrhæ, croci, gallæ, aloes, rheu pontici, malicorii, baccarum myrti, singulorum drachmæ quatuor: excipiuntur uino austero, formanturque pastilli triobolares . dantur si febris abest, cum uino: febricitantibus, cum hydromelite ,

Pastillus musæ .

ALuminis, aloes, myrrhæ, atramenti sutorii, singulorum scuncia, mali corii, croci, crocomagmaris, singulorū drachmæ sex . excipiuntur uino .

Quomodo crocomagma paretur .

CRoci uncia duæ, rosarū, amyli, myrrhæ, aloes, thuris, gummi, singulorum uncia, costi, spicæ nardi, singulorum drachma: uino subiguntur . At in capite de oleo crocino alia quoque crocomagmatis confectura dicetur .

Pastillus neræ ex Heræ commentarijs .

MYrrhæ, aloes, croci, singulorum drachmæ octo, aluminis scissi drachmæ centum: aqua excipiuntur .

Polyidæ sphragis .

ALuminis scissi drachmæ tres, thuris drachmæ quatuor, myrrhæ drachmæ octo, atramenti sutorii drachmæ duæ, floris sativæ punice drach. duodecim, fellis taurini drach. sex aliās drachmæ sedecim, aloes uncia uino austero excipiuntur .

Passionis Pastillus .

SQuamæ aris drachmæ duodecim, aris combusti, salis ammoniaci, aluminis rotundi, æruginis rasæ, thuris, singulo-

rum drachmę octo, uini quod sufficit.

Pastillus Andronius.

Satię punice floris drachmę decem, gallę drachmę octo, myrrhę drachmę quatuor, aristolochię rotundę drach. quatuor, atramenti sutorii, croci, aluminis scissi, crocomagmatis, misyos, thuris, singulorum drachmę duę: læuigantur in uino astringenti, uel aceto.

Pastillus Faustini.

Auripigmēti drachmę duodecim, sandarachę drachmę sex, calcis uiuę drachmę octo, chartę combustę drachma: myrti baccarū succo uel decocto excepta, in pastillos redigito, & cū myrti baccarū, lenticulę, & rubi radicum decocto immittico.

Pastillus ex charta, dia chartiu appellatus.

Chartę combustę triginta duę, calcis, auripigmenti, sandarachę, singulę uncia: succo plantaginis excipiuntur.

Pastillus cui nomen est thronus Marcellius.

Chartę combustę drachmę decem, sandarachę, auripigmenti, squamę æris, aluminis scissi, singulorum drachmę quatuor, balauſtii drachmę tres, opii drachmę duę, calcis non restinctę drachmę tres, omphacii drachma, hypocistidis succi drachmę tres: uino myrteo excepta coguntur in pastillos qui drachmas quatuor pendeant: ubi decoxeris in uino malicoriū, myrti baccas, & rosas usque ad tertias, dato pastillum unum aut in totum quatuor, ex sex uini cyathis.

Pastillus à subere, dia phellon dictus.

Gallę, chartę, fæculę uini, panis, singulorum concrematorum drachmę quindecim, in alio habetur etiam cornu cerui uini cōbusti drachmę quindecim, auripigmenti drachmę duę, sandarachę, calcis, utriusquę drachmę quindecim, acacię, cerusę, singulorum drachmę quique, argenti spumę drachmę tres: uino læuigantur.

Bitbrynus.

Malicorii drachmę decem, cadmię uncia tres, aristolochię gallę, panacis radicis, iridis, atramenti sutorii, aluminis scissi, chalcitidis, misyos, squamę æris, manę thuris (nonnulli etiam costi) singulorum sescuncia: aceto subiguntur.

Pastillus

*Pastillus dia castorii, ad ulcera, nomas
& defluxiones.*

CRoci aloes, thuris, singulorū uncia, florū mali punice, alu-
minis scissi, castorii, mannæ thuris, æruginis rasæ, singulo-
rum uncia, minii sinopici libra: excipiuntur uino ueteri.

Pastillus dia castorii, colicis efficax.

MYrrhæ, castorii, singulorū scrupula sex, croci, opii, singulo-
rum scrupula nouem, anisi, apii, seminis, dauci seminis, sin-
gulorum semuncia, alterci seminis scrupula octodecim.

*Pastillus dia ænelæu, hoc est, ex uino & oleo mix-
tis, sedis & naturalium uitijis utilis.*

Ceruse uncie decem, argenti spumæ uncie quinque, thuris,
recrementi plumbi, aluminis scissi, singulorum uncie duæ
uino marine experte læuigantur. in usu uino & rosaceo aut
uino & myrteo soluuntur.

*Pastillus ex lepide phrygio, naturalium
uitijis accommodatus.*

Lapidis phrygii combusti restincti que ter primum butiro
uel rosaceo, deinde uino, postea melle, uncie duæ, rosarum
floris uncie quatuor, malicorii uncia.

*Pastillus dialotarion, quod est ex loto syluestri,
ad sedis & naturalium uitia.*

Ceruse, amyli, glaucii, croci, aluminis, æquales portiones: te-
runtur succo loci syluestris, aut uino.

Pastillus leucas.

Terræ samie triens, pompholygis, cerusæ, amyli, singuli sex
tantes, opii scrupula quatuor: aqua subiguntur.

Pastillus dia alicacabu, hoc est, ex uesicaria.

Spumæ argenti drachmæ uiginti quatuor, cerusæ drachmæ
duodecim, aut una & uiginti, uesicariæ drachmæ octo, atra-
menti sutorii drachmæ quatuor, aluminis scissi tantundem, mi-
nii quod ad colorem satis est: aqua excipiuntur.

*Pastillus ex duplici ueratro, idem uerò
ex duabus acacijs.*

ACacie nigræ & fuluæ, glutini fabrilis (in alio piscium gluti-
nis) singulorum uncie quatuor, guttæ ammoniaci, glaucii,
aloes,

aloes, singulorum unciz duæ, thuris masculi, ueratri nigri & albi, singulorum uncia: a ceto scillino excipiuntur, quum usus incidit eodem uel communi soluta, ante balneum, & rursus post id inunguntur.

Pastillus Criogenes.

MYrrhæ, æris combusti, aristolochiæ rotundæ, æruginis rarsæ, squamæ stomomatis, uerbenacæ rectæ, aluminis rotundi, singulorum uncia, aceti quantum satis est. decerpi autē debet uerbenaca, quum Sol est in ariete. Fit etiam emplastrum in hunc modum: pastilli, ceræ, colophoniz, olei, par mensura, aceti quod ad læuigandum pastillum sufficit.

*Pastillus à nigro uiridique colore dictus
melanchlorus.*

MYrrhæ, aloes, squamæ æris combusti, auripigmenti, aluminis scissilis, & rotundi, iridis, chalcitidis, misyos, salis fossitii, atramenti sutorii, cerusæ, nitri, argenti spumæ, panacis radicis, cadmiæ, malicorii, gallæ, aristolochiæ rotundæ, squamæ stomomatis, æruginis rarsæ, singulorum uncia, aceti quod satis est. Fit etiā hoc modo emplastrum: pastilli unciz duæ, colophoniz, ceræ, olei, singulorum unc. sex, aceti qđ pastillo subigendo satis est.

*Pantolmius ad chironia malignaque ulcera,
& defluxiones.*

CAssiæ, æris cremati, cerusæ, argenti spumæ, æruginis rarsæ, aluminis scissi, rotundi, liquidi, & lateritii quod plinthitis dicitur, panacis radicis, aristolochiæ longæ & rotundæ, malicorii, atramenti sutorii, portulacæ, iridis astragalitidis, chalcitidis, misyos, guttæ ammoniaci, salis ammoniaci, æruginis ferri, squamæ æris, aloes, diphrygis, thuris gallæ, sarcocollæ, plumbi cremati, foliorum oleæ, sorios, myrrhæ, cretæ sutoriz liquidæ, balaustiorum, spinæ Agyptiæ, sulfuris ignem non experti, nitri, rhu rubri, rhu syriaci, chrysocollæ, rhus coriarii, acaciæ, salis spumæ, omphacii, auripigmenti, singulorum pares modi: cum aceto diebus triginta, sub caniculæ tidere læuigantur.

Pastillus Nymphodoti.

APhronitri uncia, nitri Alexandrini, saponis gallici, singulæ unciz, salis cappadocii, mastiches, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, foliorum rosæ, amomi, amyli, singulorum uncia,

phylli drachma, aluminis scissilis, costi, singulorum drach. duar, uini myrtei quod satis.

Pastillus ex thapsia, hemicranico dolori efficax.

Succi thapsiæ drach. sedecim, myrrhæ drach. octo, opopanax, euphorbii, singulorum drach. sex, nitri, liquoris pathenici, singulorum drachmæ quatuor, piperis, sagapeni, singulorum drach. duar, aceti quantum sufficit. Vbi utendum est, aceto inunctum post horas sex abluito: at si uoles remissione uti, cerato pari exceptum illinito noctemque finito.

Pastillus qui ano subiicitur, hypotheton dictus, ad dysenteriam, & ani dolores.

Terræ samiæ, amyli, singulorum quadrans, croci sextans, acaciæ, tragacanthæ, singulæ unc. castorii, thuris, lycii, siagulæ semunciæ: in calidioribus, etiam opii semuncia adicitur: herbæ pulicaris succo excipiuntur, singunturque pastilli.

De medicamentis quibus aridis utimur, & smegmatis. Cap. XIII.

Aridorum medicamentorum quæ sanè & cataplasmata ab inspergendo, uocantur, alia ulceribus congruunt, alia cuti applicantur: ex iis quæ ulceribus faciunt, quædam cauis carnem inducunt, quædam ex crescentia reprimunt, quædam cicatricem generant, quædam urunt exeduntque, nonnulla sanguinem coercent. Quæ igitur carni generandæ sunt, uel repurgando sordida, carnem creant, ut quæ constant ex eruo, aristolochia, iride, panace, myrrha, thure, aloë: uel humiditatem circumfluam desiccando, uel uti quæ fiunt ex ære, diphryge, squama, charta combusta, piceæ cortice, & spina, quæ & ipsa cicatricem obducunt: uel acrimoniam rosionemque obtundendo, qualia sunt ex pompholyge, amylo, cerusa, fece combusta, ostreis crematis, terra samia, & consimilibus, & quæ compositorum ex his uireis habent. Ex reprimentibus lenia quidè sunt, quæ constant squama æris, quæ misy, chalcitide combustis, & galla: ualentiora sunt, quæ atramento sutorio, ærugine, misy, chalcitide, ignem non expertis. Vrentia uerò excedentiaque fiunt ex calce, auripigmento, sandaracha, & facie uini combusta, quam uocant speclen, hoc est sæculam: atque hæc omnia componuntur, cæterum in tenuissimum redacta pollinem, si ulceribus inspergantur

inspergantur minus rodunt: si spissiora, magis, idque urendo faciendūq; crustā. Sanguinē reprimētia aut astringendo, aut refrigerando, aut siccando, aut opplēdo illum coercent, quorū materiam capite de pastillis sumus exequuti. At eorum quę cuti admouentur, alia abstergunt exteruntq;, ut ex cimolia, pumice, lomento, fermento hordei, peponū carne, & salis flore confecta: alia extenuant & discutunt, qualia sunt ex ueratro, alycyonio, sulfure, herba pediculari, sinapi, pyrethro, semine rorismarini, terra lemnia, sepię testa: atq; hęc, assumpta calce & auripigmento cū liquore aliquo, pilis abolēdis idonea, & smegmata fiūt. Quzdam capiti admouētur, ut fluxū ex eo ruētē desiccēt, cuiusmodi sunt ex nitro, sale, galla, malicorio, & id genus aliis præparata. oia uerō smegmata cuti nō inūctæ accommodari debēt.

Cephalicus paluis, capiti conueniens.

ERuorum quincunx, iridis fescuncia, manne thuris fescuncia, aristolochiæ, squamę æris, singulorum fescuncia.

Alius.

Picę corticis drach. sex, thuris drach. quatuor, pumicis tantundem, iridis drach. duæ, resinæ siccæ drach. sex, aristolochię drach. duæ.

Ex aloe, dia aloes, dicitur.

Aloes drach. sex, erui drach. octo, manne thuris drach. quatuor, gallæ drach. tres, aluminis scissi drach. duæ.

Diaspexles. hoc est, ex face uini combusta, Mannethonis.

Cadmix combustæ & illorū nncia, terrę samię uncia, fæcis uini combustæ unc. quatuor, lapidis specularis unc. quatuor, thuris unc. quatuor, quidā & amyli uncias quatuor addūt.

Melitera Oribasii.

Chalcitidis, squamę æris, gallæ, balaustiorum, aristolochiæ longæ singulorum uncia, malicorii, aluminis scissi singulorum semuncia.

Medicamentum ex ostreis, dia ostreon dicitur.

Cadmix, thuris, singulæ uncia ostreorum combustorum uncia tres:

Medicamentum ex thure, dia Libanu.

Argenti spumę, thuris, squamę æris, mali punici, amyli, cerusę, pares modi.

P 2 Aphroditarium.

Aphroditarium.

T Huris, squamæ æris, mali punici, amyli, cerusæ, patiz pondera.

Rhodia, ad suppressendum sanguinem, ulcera depascentia, & excrefcentia.

G Allæ crudæ drachmæ sex, gallæ cōbustæ restinctæq; uino arde drachmæ duodecim, squamæ æris nigri, si non sit, rubri, drachmæ octo, atramenti sutorii, drachmæ uigintiquatuor, aluminis scissi drachmæ uigintiseptem; teruntur diebus sat multis.

Medicamentum xanthon, hoc est, flauum.

C Halcitidis combustæ drachmæ quadraginta, atramenti sutorii uisti drachmæ uiginti, misyos cremati drachmæ decem, æris uisti drachmæ quinque.

Medicamentum à murino colore psaron dictum.

M isyos quincunx, gallarū triens, chalcitidis sextās, squamæ æris tantundē, atramenti sutorii uncia, æruginis rasæ sextās.

Medicamentum heliocæ, adurens.

A Vripigmenti libra, calcis uiuæ libræ duæ; aqua læuigato per dies caniculæ, deinde siccatis utitor.

Antheron.

C Yperi drachmæ octo, myrrhæ drachmæ duodecim, sandarachæ drachmæ tres, rosarum floris drachmæ duæ, croci drachma, crocomagmatis, aluminis scissi, iridis illyricæ. singulorum drachmæ duæ.

Medicamentum ex charta, quod Græci dicunt dia chartu ad nomas oris potissimum & naturalium ulcera.

A Eris squamæ, chartæ combustæ, singulorū drachmæ octo, auripigmenti, sulfuris uiui, singulorū drach. duodecim, plumbi cremati drach. sex. Ad humidiores quidē sepedonas, sicco utitor; ad siccas, rosaceo macerabis, nōnūquā & melle cū rosaceo.

Medicamentum ex myrto syluestri, dia oxymyr-sines appellatum, ad eadem.

R hus coriarii uncia duodecim, myrti syluestris foliorum, sandaraches, singulorum drachmæ octo, salicis foliorum ficcorum, malicorii, singulorum drachmæ sex, aluminis scissi, chrysocollæ, aloes, chalcitidis crudæ, squamæ, auripigmenti, sal-

lis communis, singulorum drachmę quatuor.

Medicamentum Massalioti.

Nitri, opii, chrysocolle, lapidis alii, sandarachę, misyos, chalcitidis, aluminis scissi, diphrygis, æqualia pondera : sicco utitor.

Smegma aridum, quod asclepios dicitur.

Baccarum lauri, nitri alexandrini, salis torrefacti, salis cappadocici, stillę ammoniacę, aphronitri, pumicis, singulorū libra, ueratri nigri, herbę lanarię, pyrethri, sæculę quę est uini fœx cōbusta, herbę pedicularię, sinapi, iunci rotundi, aluminis scissi, iunci quadrati floris, iridis, gallę, singulorum uncie sex, sampfuchi libra, urticis seminis, pulegii, fatinę fabarum, & lupini, singulorum uncie sex, chamæleuntis nigri, sulfuris, gummi, thuris, piperis, cucumeris syluestris radicis, matrubii, cimolizę, pronię, sepizę testę, fœnugręci, phylli, costi, cumini, euphorbii, spicę nardi, singulorum uncie tres. Alexander autē præter hæc adiicit salis ex nitri fontibus, salis Tragasei, singulorum libram, adarces uncia, aluminis liquidi. nardi gallici, cnici, cocci gnidii, graminis aridi, brionię siccę, singulorum treis uncias.

Smegma peponatum.

Thuris, mastiches, stillę ammoniacę, singulę uncie, tragacanthi fescūcia, succi uuę acerbę dodrans, peponis seminis recenti, quadrās, similę sextarii quinq;, ouorū unius & uiginti albumina, iridis triens quidā & ueratri nigri sextantē miscent.

Aliter Critonis.

Lomenti modius, similę sextarii quatuor, trifolii, glandis unguentarię, iridis illyricę, singulorū librę quatuor, guttę ammoniaci, costi, singulorum libra, ouorum tenuia aquata, peponū carnis sextarii duo, uuę acerbę succi tantundē: macerantur: redactaq; in pastillos siccantur, deinde contrusa in cretaq; in usum adhibetur. **ALITER.** Tragacanthę, thuris, mastichę, guttę ammoniaci, singulorū drachmę decē ompahcii drach. quinque, similaginis sextarii quinque, candidi ouorum liquoris uncia, peponū carnis uncie decem: præparatur ut suprà dictū est.

Smegma quod capitis defluxiones exticet.

Nitri Alexandrini rubi uncie quinq;, salis communis torrefacti fescūcia, salis cappadocii uncia: hæc aceto quā acer

rimo macerata in patinam fictilem coniiciuntur, atq; in furno uruntur, dum redigantur in carbones: inde refrigeratis leuigatisque ad abstergendum utor, uinum in balneo instillans.

Sapo Constantini.

Rosarum siccarum, aloes, gallæ, malicorii, malabathri, sarco collæ, singulorum tres unc. balaustiorum, myrrhæ, sandarachæ, spicæ nardi, singulorum unc. duæ, costi uncia, saponis gallici libra, excipiuntur iure lupinorum.

Pulvis pilos abolens, unde psilotrum dicitur, ad podagram.

Mastiches, thuris masculi, herbæ pediculariæ, ueratri albi spumæ argenti, singulorum unc. tres, phylli, amyli, ueratri nigri, lapidis abi floris, singulorum uncia, alcyonii, pumicis costi, cimoliæ, sampsuchi, singulorum unc. tres spicæ nardi uncia. Nonnulli etiam aloes, unciam addunt. contusum in uase puluerem reseruato: ubi necessitas inciderit, oryæ cremor & ptisanæ in ollam coniicitur: postquam inferbuerit, pulueris, saponis, gallici, auripigmentis, aluminis scissis, sandarachæ, singulorum, sciscuncia additur, calcis uiuæ recentis libra. Vtitor unguento mense ter. nono uidelicet lunæ die, decimonono, & uigesimalonono, idq; usque ad annum: post hunc, semel mense, quum uigesimalononum luna diem agit.

De medicamentis liquidis quæ illinuntur, ad oris uitia unde stomatica dicuntur, ac guttur accommodatis. Cap. XIII.

Quanto rarior molliorq; est summa oris tunica, cute quæ corpus totum obtegit, tanto est magis stomaticorum medicaminum usus euariet. Quum igitur inflammatio incipit, ea requiruntur medicamenta quæ humoris influxum repellant, cuiusmodi sunt, arida quidem, omphacium galla omphacitis, succus rhu, hypocistidis, aluminis, cortex piceæ, & thuris, balaustia, & generatim omnia quæ astringunt, ita ut insuauem ingratamq; & lethalem uim non representent: liquida uero, succus mororum tum quæ batina, tum quæ sycamina dicuntur, item nucum uiridium corticis, & mali punici, præsertim acidi, & malorum cotoneorum, mustum aminatumq; mel autem per initia solum ut medicamenta adhaereant temperatur. at quum humor subliterit, misceri debet quæ con-

coquant

coquant & mediocriter dissipet, cuius generis est crocus, myrrha, & dulcis radiculae succus at per totum id temporis quod statum & declinationem intercedit, recte usurpatur mixtum aliquod ambobus, repellente puta & discussorio: & per initia quidem superbunt repellentia, deinde discutientia: in morbi declinatione solis uti discutiētibus absque astrictione oportet, qualia sunt nitrum aphronitrum, origanum, hyssopum, thymus, nepita, ins, belsa, confimilaque. liquor tunc sapa esto, tum quae ex mulso decocto, tum quae ex caricis & palmulis conficitur, ipsumque dulce mustum cum melle ubi uero ueluti reliquiae quaedam inflammationis remanserint, etiam sulfur igne non expertum miscebimus: succum autem primum cum melle incoquamus, dum liquidioris mellis spissitudo fiat, inde sic arida in tenuissimum pollinem pertrita inspergemus, postea modice coquimus, quoad omnia, exacte in unitatem cogantur, quo facto in uitreum uas medicamentum transfundemus.

Dia moron simplex.

Mororum succi sextarii tres, prius excoquantur dum tertia portio fuerit absumpta, adiectoque mellis sextario, rursus incoquantur ad melleam spissitudinem.

Dia moron compositum.

Mororum succi heminae sex, usque ad strigmenti crassitudinem coquantur, deinde admixto laevis croci drachma, myrrhae duabus, succi uuae acerbae una, aluminis scissi ternis obolis, mellis hemina, quousque spissescant incoquantur.

De moris batinis, quae rubi fructus sunt.

Item quod ex moris batinis constat, eodem modo praeparatur maiore uel astrictoria praeditum.

Dia caryon, quod est ex nucibus, simplex.

Viridium nucum corticis contusi succi heminae quinque, mellis hemina, coquantur ad dimidias.

Dia caryon compositum.

Per initia quidem & in uigore oris inflammationum, misceri de sceri debet croci, & aluminis, singulae drach. myrrhae duo, in declinatione uero ad discutiendum, nitri drachma, sulfuris tantundem, cum praedicta nucum corticis succi, & mellis mensura.

Medicamentum ex succo mali punici.

Mali punici cui nuclei sunt adempti dulcis succi sextarii qua-

tuor, mali punici acidi succi sextarii duo, mellis sextarius, myrrhæ amineæ drachmæ octo, crocomagmaris, gallæ singulorum drachmæ octo, aluminis scissilis drachmæ quatuor, iridis illyricæ drachmæ octo, omphacij drachmæ octo: conficitur quemadmodum quod moris constat.

Aliter idem,

MAli punici dulcis cum corio suo combusti succi sextarii sex, mellis generosi sextarius, aluminis scissi uncia, myrrhæ semuncia.

Medicamentum è musto, dia gleucous dicunt.

MVsti sextarii sex, gallæ, aluminis scissilis, singulorū drachmæ duæ, croci, myrrhæ, singulæ drachmæ. Si lenire uoles, dulce esto mustum: si repellere, austerum. quod autem neutrum est, mediam inter hæc uim obtinet.

Aegyptia stomatica.

MEllis pondo, olei bes, resinæ terebinthinæ sextans, croci drachmæ quatuor: in cacabo liquefiunt.

Medicamentum dia besafa, ex ruta syluestri.

ANisi seminis, apii seminis, iunci odorati floris, ameos seminis, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafa, quod nonnulli har-mala uocant (est autem ruta syluestris) cinnamomi, myrrhæ troglodytidos, croci, gallæ, singulorū uncia, aristolochiæ longæ cassiæ, crocomagmaris, rosarum siccarum, singulorum uncia, costi, hirundinum cineris recentis, singulorum unciæ tres, nardi Indicæ, amomi, singulorum semuncia, mellis quod satis est.

Dulces, utilesque potiones.

DUlcium simul & utilium potionū aliæ ex uino conficiuntur, coniectis in id quibusdam speciebus, exempli gratia, pipere, absinthio, casamo, aliisq; compluribus, unde etiā appellationem nonnunquā sortiuntur, aliquando melle admixto, in terim nō: aliæ ex aqua in qua decoquantur mala, uel rosæ, uel similia quædam, nempe uua acerba, mala punica, myrti baccæ, eoq; mel optimū despumatum miscetur, tum quod firmum sit, tum quod dulce, interdum etiam utile: si illud excipias quod à cibyrā in paruis uasculis asportatur, asterum: item hydromalum uinosum, quod etiā sine melle fieri nouimus. quemadmodum apomeli ex melle solo, & aqua, citra alterius cuiusdā substantiæ

stantiæ misturam. Imo etiam ex uino confectæ poriones, quas & propomata Græci nominant, mellis despumati sextarium unum, ad uini quaternos recipiunt, componunturq; citra coctionem. At quæ ex aqua & liquore sunt, siquidem coquantur unū mellis ad treis liquoris, cuius duæ fere partes inter coquē dum sint absumptæ, sextarios assument: sin minus, unum mel lis ad binos liquoris, cæterū quæ non coquantur, diu satis insolare prorsus oportet, & præsertim omphacomeli. Ex aqua uerò temperatus poriones coquere conuenit, quod propter imbecillitatē facillimē mutantur. omnes autē in fictilia uasā exigua oblita transfundēdæ sunt, iisq; tutō operculatis in apricis locis usq; dum excoquantur reponendæ attenuantibus aut & probè aqua temperatis uti conuenit. Omphacomeli postquā multi modo inferbuerit crassūq; euaserit, tunc operiri uas debet. his igitur quæ uino constant, quū febris abest, potissimū utimur uel solius uoluptatis gratia, præter eas quæ scāmonia aut grano gnidio aut eiusmodi purgātibus medicamentis componuntur, uel propter eiusmodi affectus in quibus & medicamentis in illas coniectis, per os uti licet. Ex aqua aut aut succo aliquorū confecturæ febricitantibus cōueniunt, inter dum ceu hedysmata hoc est dulciaria, quū morbus uino uti nō permittit: interdū ceu affectui cōmodæ, quæadmodū apomeli ad siliuam educendā, aut urinas citandas, aut aluū emolliendā, aut extenuandū humorē: hydromalū autem & hydrososatum siticulosis, febre ardēti pressis, resolutis, & stomacho uitiosis. Omphacomeli, myrtites, rhodostacton, hoc est, mel rosaceum, & rhoetes, coeliaco affectui, dysenterijs, uomitionibus, alijsq; fluidis uitijs congruunt. Iam uero his collutionibus subinde in stomaticis affectibus utimur.

Hydromalum ex malorum cotoneorum succo.

Malorum cotoneorū nucleis exemptis cōtusorū succi sextarij duo, mellis sextarij tres, aquæ sextarij sex, incoquantur despumando ad tertias. *A. L. I. V. D.* Malorū cotoneorū frustulatim concisoriū nucleis ablatis pondo quinq; in aquæ fontanæ sextarijs decē incoquūtur dū intabescant: ablata ab igne, refrigeratāq; eximuntur, expressioq; succo proiciuntur, aquæ modo dimidia mellis mensura temperatur, iterumq; incoquitar despumādo, quoad octaua portio absumpta fuerit. Nōnulli uerò

li uerò ex dulcibus etiā malis similiter hydromalū cōponunt.

Hydrososatum.

Rosarum unguibus exemptis lib. quatuor, aquæ sextarii quinque mellis sextarii duo.

Rhodomalum.

Succi malorum cotoneorum sextarius, rosarum trepondo, mellis sextarii tres, aquæ sextarii quinque. Verum quoniā rosæ non eodem tempore cum malis inueniuntur, conuenit eas cum melle quando colliguntur componere, ac ubi mala prouenerint, totam compositionem moliri.

Omphacomelitis preparatio.

Væ acerbæ succi sextarii, tres mellis sextaris: mixta diebus quadraginta insolantur, uel discoquantur.

Quomodo myrtites fiat.

MYrti baccarum succi sextarii tres mellis sextarius, ad tertias decoquantur.

Apomeli ex commentarijs Philagrii.

FAuorum melle scatentium alborum pondo, aquæ fontanæ trepondo & dimidium. contractis fauis unitisq; aqua cum melle incoquitur, dum & spuma ipsius & id quod ueluti cerosum supernatat, particulatim relinquatur, atque tunc refrigerta diligenter transfunduntur.

Rhodostacti compositio.

Rosarum quibus ungues sint exempti succi sextarios duos mellis sextarium incoquito desputans quoad quarta pars fuerit absumpta.

Rhætis confectio.

MAli punici succi sextarii tres, mellis unus, ad tertias decoquantur,

De collyrijs & ad glutinamentis. Cap. XVI.

VAria oculariū medicamētōrū materias existit, etenim liquores, succi, semina, fructus, particulæ stirpium, & metallica his inferuntur. ex quibus alia acrimoniā leniunt, & ueluti oppolent ostruuntq; utpote pompholyx, spodium, amyliū, plumbū, terra samia, quæ aster dicitur, cadmia, ea quæ omnia lota, & cādidus oui liquor. Quibus ita utendū est, ut caput prius uacuationem experiatur: nam si repletū fuerit, metus

metus est ne oculorū tunica humoribus distentz perrumpatur. Alia contraria his natura obtinent, nempe aerē, recludendis uacuandisq; iis quæ diu impacta fuerūt accōmodata, quæadmodū liquores Cyrenaicus, Medicus, sagapenus, euphorbiū, & consimilia. Nonnulla sordidis ulceribus abstergendis conueniunt, qualis est squama eris, psūmq; æs, chalcitis, misy, fori, flos æris, stimmi, concremata omnia. Quædā his uicina sunt, sinectica ab exterēdis sordibus appellata, cuiusmodi est aur. pig. mentū, sandarachā, & lapidis asij t. os. Sunt & astringētia, atq; ex his quæ mediocriter id faciunt uehementē lippitudini, ulceribus, & defluxionibus cōducunt, nēpe rosārū folia, flores, fructus, spicæ nardi phyllū, crocus, glauciū, & hypocistis. Quæ uementiorē astringēdi uim repræsentāt, oculorū claritati conducunt potissimū medicinis miscētur, cuius generis est omphacium acacia, balauistiū, satiuæ punice flos & galla. Alia concoquūt discutiuntq; ut myrrha, crocus, castoriū, lachryma thuris, scēnugræci succus. Porro ex compositis oculorū remedijs, alia delinuntur, simplicemq; appellationē habēt, alia hygrocollyria, alia hygrocollyria uocantur. Quæ igitur delinuntur, omnem cōprehensam materiā recipiunt, omnibusq; conferūt affectibus: cæterū uere præsertim præparari debent, ætate siquidem uirtus ipsoꝝ perspirat euanescitq; hyeme species gelu rigidæ temperari nequeunt. Conterere autē ea oportet liquore non copiose affuso, ne metallica subsidant, aromata supernatent, uerū modicē, ut sordiū modo cōterantur. Aqua uero pluuialis erit, tum quò tenuis sit, tū quòd modicē astringat. Si quidem uino aut succo aliquo læuigare oportet, ipsā quoq; terenda sunt, metallica sanē longo tempore, quæ autem succo constant, exiguo demū nbi satis læuia euaserint, gummi adiicietur in formam redacta, ualis maximē æris aut uitreis reponentur. Cæterum iis quæ ē succo conficiuntur, protinus ut ilicet: metallica uetustate reddūtur meliora. Porro inter collyria arida quædam cōsumunt exteruntq; callos, ficos, ungueis, scabiosaq; uitia, ē chalcitide, ærugine & misy composita: quædā lachrymas mouent, obstructionibus & hebetudini accōmodata, quæ tum ex his tum ex pipere & spica nardi fiunt. Sunt quæ præferuent, tueanturque oculos ab humorum influxu, cuiusmodi ex lapide phrygio, sarcocolla, glaucio, aloe, cadmia, stimmi, croco: omnia in tenuissimū pollinem coacta oculis applicātur.

At liquida collyria fiunt ex melle arctico, opobalsamo, oleo ob uetustatem tenui, foeniculi succo, diuerforum animalium fel- le, liquore cyrenaico, alijsque compluribus. Conferunt hebetu dini, suffusionique incipienti, medicamenta quae extenuent, ca- lesfaciant, purgentque. Utendum his est, & omnibus acribus, ubi caput repletionem caret, sub dio, aere, puro, austri- no, non nimis frigido, neque item calido nimium. At agglutinamenta quae anacolemata graece dicuntur, ex medicamentis praeparan- tur quae obstruunt, opplentque, glutinant, stringunt, aut refrige- rant, aut astringunt, siccantve, qualis est farinae pollen, manna, terra samia, myrrha, cochleae, acacia, opium, cum candido oni- liquore. glutinantur fronti in quibus humor non intra calua- riam delitescit, sed extrinsecus affligit.

Collyrium, quod protinus dolorem sedet monohemeron appellatur, ad incipientem uetustamque lippitudinem.

A Caciae drach. triginta sex, gummi drach. triginta duae, cad- miae drach. viginti quatuor, aeris cremati & eloti drachmae octo, opii, drachma: uino austero laeuigantur. Medicamen- tum discutit & siccatur.

Chiacum collyrium.

M Inii suopici, gallae omphacitidis, croci, rosarum recentiu-
unguibus exemptis floris quem thylaca uocamus, gummi, singulorum unciae quatuor, opii, uncia: uino aminaeo, aut saler- no, aut chio austero teruntur. Sit autem uinum marinae expers.

Cygnarium.

C Admixtae elotaeque unc. sex, cerusae lotae unc. quatuor, pompholygis tantundem, amyli unc. duae, tragacanthae, opii torrefacti, gummi, singulorum unc. duae: aqua pluui- ali laeuigantur.

Rubens cygnus.

C Admixtae crematae elotae sextans, terrae samiae quae aster di-
citur tantundem, cerusae triens, pompholygis bes, amyli sextans, opii sextans, acaciae, tragacanthae, singulae unc. gum- mi triens: aqua coelesti subiguntur.

Albus cygnus.

C Admixtae unc. quindecim, cerusae unc. septemdecim, opii
drach. octo, thuris dra ch. septem, amyli unc. septem, gum-
mi

mi drachmæ tredecim : aqua cœlesti teruntur .

Pelargon ad ulcera .

CAdmiæ, cerusæ, singulorum drach. uigintiquatuor, acaciæ, opii, singulorum drach. octodecim, gummi, tragacanthæ, amyli, singulorum drach. noueni, myrrhæ drach. tres, æris, croci singulorum sesquidenarius: aqua conteruntur .

Phæon ad oculos sanguine suffusos, & magnos affectus.

CAdmiæ teneræ drach. uigintiquatuor, cerusæ drach. sedecim æruginis rasæ drach. duodecim, stimmi drach octo, aluminis scilli drach. tres chalcitidis ustæ drach. tres, nardi Indicæ drach. quatuor, omphacii drach. duæ, æris drachmæ, squamæ æris drach. octo, ericæ fructus drach. tredecim, lachymæ papaueris drach. uigintiquatuor, croci drach. quatuor, castorii drach. tres, myrrhæ drach. sex, lycii Indici, acaciæ, gummi, singulorum drach. quatuor, rosarum recentium drach. duæ & semissis: uino falerno aut surrentino, aut aminæo, aut chio austero perteruntur. inungitur per triduum, aquæ instar dilutum ex fœnugræci succo instillatum, deinde ex ouo aut lacte, postremo aqua crassius .

Collyrium ex decoctis, diazematō dicitur .

CAdmiæ unc. sedecem, cerusæ unc. octo, amyli, opii, tragacanthæ, acaciæ, singulorum unc. duæ, gummi unc. sex: læuigantur decocto rosarum siccarum, meliloti, capitum papaueris dulcis radiculæ, pari singulorum modo ,

Collyrium diahydrias, repellens.

Liquoris qui in uasis cerealibus topi modo concretus reperitur, libr. tres, cædmæ ustæ & elotæ libra, cerusæ, pompholygis, terræ samiæ, qui aster dicitur, singulorum elotorum unc. sex, thuris uncia, myrrhæ tantundem, succi lini seminis, herbæ pulicaris, ptisanæ, fœnugræci, singulorum libra tragacanthæ unc. sex, gummi libra.

Collyrium Ilambonis .

CAdmiæ unc. octo, pompholygis unc. quatuor, cerusæ libra, tragacanthæ, gummi, opii, singulorum unc. quatuor: aqua pluuiatili teruntur .

Cinereum,

Cinereum, quod spodiakon dicitur, ad inflammationes, defluxus, & chemosin.

T Huris, stimmi, singulorum drach. centum, cadmix, cerusæ, utriusque drach. uigintiquatuor, terræ samiz, papaueris la chrymæ, singulorum drach. tres, gummi drach. quindecim: læ uigantur oleæ coliculi succo. fit autem is in hunc modum: teneriora oleæ folia elota contunduntur in mortario, paululo aquæ superfuso, per linteolum exprimuntur.

Collyrium ex oleæ turionum succo tenerum, dia thalias uocatur.

T Huris drach. quatuor, stimmi drach. quindecim, cadmix drach. uigintiocto, cerusæ drach. quadraginta nouem, terræ samiz drach. octodecim, opii drach. sex, gummi drachma, plumbi usti elotiq; drach. octo: excipiuntur oleæ turionū succo.

Dia thalias, ruffum.

A Eris cremati drac. duodecim, sandycis unc. uigintiquatuor, foliorum oleæ unc. duæ, opii tantundem, gummi unc. decem, uino spathite uel aminæ excipiuntur.

Dia smyrnon claudiacum.

G Laucii, sarcocollæ, singulorum drach. quadraginta octo, croci drach. uigintiquatuor, opii, myrrhæ, lapidis hæmatitis, singulorum drach. sex, tragacanthæ drach. quadraginta octo, gummi drach. sedecim: uino Italico subiguntur usus est ex ouo.

Aliud dia smyrnon ad rhyadas & agylopas.

C Admix lotæ, lapidis hæmatitis eloti, singulorum drach. uigintiocto, myrrhæ, spodij Cypriz, singulorum denarii uigintiquatuor, opii drach. octo, croci drachmæ quatuor (alij octo) piperis albi grana triginta: gummi drach. sedecim: uino Italico teruntur, ex ouo adhibetur collyrium: si uitium sit recens, aquatum.

Stacticum Prosechij.

C Admix, gummi, singulorum drach. uiginti, stimmi, atramenti sutorij, singulorum drach. octo, opii drach. quatuordecim, æruginis rasæ drach. decem, piperis albi drach. sex, croci drachmæ octo, misyos crudi tantundem, opobalsami drach. quatuor: aqua conteruntur.

Hygidion

Hygidion Ammonij.

CAdmix, æris, singulorum drach. sedecim, cerusæ, castorii, aloes, croci, singulorum drach. quatuor, squamæ drachmæ quinque, rosarum floris, plumbi usti, singulorum drach. octo, lycij drach. tres, lapidis schisti drach. quatuor, opii drachmæ decem, acaciæ drach. quadraginta, gummi drach. quadraginta octo: aqua excipiuntur.

Olympos seu olympiacum.

ACaciæ, spicæ nardi, thuris, singulorum drach. octo, æris cremati elotiq; stimmeos usti & loti, cerusæ concremataæ lotæque, cadmiæ, singulorum drach. duodecim, myrrhæ, opii arefacti, singulorum drach. quatuor, croci drach. quinque, æruginis rasæ drach. tres, lapidis schisti, squamæ rubræ, lycii Indici, omphacii, singulorum drachmæ, castorii, rosarum floris, singulorum drach. duæ, phœnicobalanorum drach. quatuor, similiter ossæ palmularum ustarum ligna numero quinque, gummi unc. quinque aqua pluuiiali superfunduntur, in aqua commadescent tres dies totidemque noctis, calami odorati, alterci feminis, rosarum siccarum, singulorum drach. quatuor, phylli drachma.

Nardinum.

CAdmix, croci, gummi, singulorum drach. triginta sex, æris usti drach. octodecim, stimmi, acaciæ, singulorum drach. triginta, nardi syriacæ drach. duodecim, opii, singulorū drach. sedecim: aqua subiguntur.

Theodotium minus.

STimmi, acaciæ, singulorum drach. uiginti, æris usti drachmæ octo, cerusæ drachmæ quatuor, myrrhæ totidem, æruginis drach. duæ, aloes, succi papaueris, lyci, singulorum drachma: pluuiatili aqua læuigantur.

Rhinarium.

LApidis hæmatitis, lapidis schisti, singulorū drach. sedecim, æris conibusti, cadmiæ, æruginis, singulorum drach. octo, opii drach. quinque, chalcitidis drach. duæ, gummi drach. octo, uino excipiuntur.

Xyster.

PVmicis, misyos, ostreorum, singulorum crematorum unc. sex, cadmix, opii, chalcitidis ustæ, croci, aloes hepaticæ, castorii, phylli, singulorum drach. duæ, stimmios, acaciæ, singule unc. æris combusti unc. quatuor, myrrhæ troglodytidis drach. quatuor, spicæ nardi drachma, cerusæ drac. octo, gummi drach. quatuor: aqua cœlestis superfunditur. Nonnulli etiam vinum miscent.

Hecatombe, ad cicatrices crassas.

CAdmix ustæ lotæque, æris cremati & eloti, uniuscuiusque drach. octo, stimmios combusti, acaciæ rubentis, gummi, singulorum drach. quindecim, aloes, gallæ, æruginis vermicularis, castorii, lycii, spicæ nardi, croci, opii, myrrhæ, cerusæ, hebeni ramenti, chalcitidis, singulorum drachma, rosarū drach. sexaginta: aque pluuiæ teruntur.

Collyrium ex cornu, dia ceratos dicitur, Galeni.

PLumbi combusti, cornus ceruini cremati, singulorum unc. duæ, cerusæ, squamæ æris, amyli, thuris, sepiæ testæ combusti, æruginis, myrrhæ, gummi, singulorum uncia: aqua pluuiæ li excipiuntur.

Collyrium è thure, dia Libanu nuncupatur.

Thuris uncie sex, cadmix, pompholyg's, terræ samie quæ aster dicitur, amyli, gummi, singulorum unc. tres, cerusæ unc. sex, squamæ æris unc. quatuor, tragacanthæ unc. tres, opii unc. sex: aqua cœlestis adiicitur.

Libanium.

CAdmix elotæ, amyli, singul. denarii duodecim, cerusæ tantundē, spodii, pompholygis, terræ samie quæ aster dicitur, plumbi usti & loti, tragacanthæ, singul. denarii octo, opii denarii duodecim, gummi denarii quatuor: aqua pluuiæ additur, & ouorum uiginti albumina. Sunt qui etiam myrrhæ denarios

Aster magni.

POmpholigis, cadmie, cerusæ, singulorum drach. sedecim, plumbi drach. octo, amyli drach. octodecim, thuris drach. decem, terræ samie quæ aster dicitur drach. duodecim, myrrhæ drach. duæ, tragacanthæ gummi, singulorum drach. octo: aqua additur.

Vranium.

Vranium,

TErræ samig piperis singulorum unc. tres, spodii eloti uncia, gummi unc. quatuor, stimmios cremati elotique unc. duæ, squamæ lotæ uncia, opij drach. sex, cadmiæ combustæ & elotæ drach. duæ: aqua pluuiatilis admiscetur. Carnem inducit, repellitque.

Collyrium ex succo fœnugraci.

CAdmiæ, tragacanthæ, singulorum unc. octo, cerusæ unc. triginta, amyli tantundem, opij uncia: leuigantur succo fœnugraci.

Collyrium Cleonis.

POmpholygis, plumbi, singulorum unc. quinque, croci fescuncia, squamæ æris quod stomoma dicitur uncia, gummi unc. duæ: aqua pluuialis additur, aquatum illinitur.

*Dia rhodon, hoc est, ex rosis, quæ septuaginta
duas uncias pendunt.*

Rosarum uiridium unc. septuaginta duæ, cadmiæ & ustæ & elotæ drach. uigintiquatuor, æruginis rasæ drach. duæ, spicæ nardi drachma, squamæ æris elotæ drach. duæ, stimmios combusti elotique, opij, myrrhæ, singulorum drach. tres, croci drach. octo, amyli drach. duæ, gummi drach. uigintiquatuor: aqua pluuialis admiscetur.

Album dia Rhodon.

CAdmiæ crematæ & lotæ, cerusæ elotæ, singulorum libra, amyli, opii, tragacanthæ, singulorum unc. tres, aloes fescuncia, gummi unc. tres, croci fescuncia, rosarum unguibus detrahitis unc. sex: aqua miscetur.

Callyrium ex aloe, dia aloes nuncupatur.

CAdmiæ, cerusæ, aloes, singulorum unc. decem, rosarum uiridium unc. sex, amyli unc. tres, opii uncia, tragacanthæ unc. duæ, gummi unc. tres: aqua pluuiatilis adijcitur.

Crocium dia rhodon.

SPicæ nardi, rosarum siccarum, aloes, singulorum drach. duæ, alterci albi sesquidrachma, croci drach. quatuor & semillis, glaucii sex, sarcocollæ tantundem, opij drach. duæ, tragacanthæ uncia: aqua pluuialis additur.

Nili dia Rhodon.

Rosarum tenerarum drach quatuor, croci drach. duæ, papaveris obolus, gummi drachmæ quatuor: aqua cœlesti excipiuntur.

Lynceus ad claritatem oculorum.

CAdmix, æris, cōbusti, guttæ ammoniacæ, singulorū drach^o duodecim, myrrhæ, lapidis hæmatitis, opii thebani, singulorum drach. sex, aloes hepaticæ, fellis raurini, galbani, sagapeni, singulorum drach quatuor, æruginis rase, opopanax, salis ammoniaci, singulorum drachma, gummi drach. sex: aqua pluuiali teruntur.

Proteus ad idem, cicatricesque extenuat.

CAdmix, cerusæ, chalcitidis crudæ, singulorum denarii quadraginta, piperis sesquidenarius, liquoris cyrenæici drach. octo, croci denarij duodecim, opij thebani denarij decem, sagapeni denarii duodecim, oliuæ æthiopice denarii duodecim, auripigmenti, aluminis scissilis, singulorum denarii octo, myrrhæ denarii duodecim, suffiminis ammoniaci denarii xx. opopanax denarii sedecim, opobalsami denarii decem gummi denarii uiginti: aqua pluuiali excipiuntur.

Collyrium ex succo fœniculi.

CAdmix drach. septemdecim, atramenti Indici drach. sedecim, piperis longi drach. tredecim, & albi duodecim, liquoris cyrenæici drach. octo, opobalsami drach. sex, spicæ nardi drach. sex, sagapeni, opopanax, singulorum drach. quinque, opii drach. quatuor, euphorbii drachma, gummi drachma: succo fœniculi læuantur.

Collyrium ex opobalsamo.

CAdmix, cerusæ, singulorum drach. octo, omphacii drach. quatuor, piperis albi unc. sedecim, opii drach. quatuor, opobalsami, gummi, singulorum drachmæ sedecim: aqua pluuialis additur.

Thalasseros.

CAdmix unc. octo, æruginis unc. duæ, atramēti Indici unc. octo, piperis albi unc. quatuor, liquoris medici uncia, opobalsami unc. duæ gummi unc. sex: aqua adiicitur.

Harmation.

Harmation.

GVttæ ammoniaci, æris combusti, corticis thuris, singulorū drach. quatuor, æruginis drachma, gummi drach. quatuor aqua cœlesti excipiuntur.

Collyrium malabathrinum, quod & Isotbeon dicitur.

CAdmixæ drach. sedecim, gris usti & eloti drach. quatuordecim, opri, lycii Indici, malabathri, nardi Indicæ, croci, aloes, singulorum drach. duæ, cerusæ drach. octo, castorei drach. duæ myrrhæ drach. quatuor, acaciæ, stimmi, singulorum drach. quæ draginta: aqua teruntur usus ex ovo.

Crassus ex uino.

CAdmixæ, lapidis hæmaritis, & schisti, singulorum drach. quæ draginta, gris usti drach. triginta, chalcitidis drach. trigintaduæ, papaueris seminis drach. tredecim: papaueris semen aqua decoquitur, succus expressus aliis adiicitur, quæ læuigantur uino spathite uel aminæo.

Aliud ex uino.

AEris combusti, cadmixæ placitidis, singulorum unc. nouem, lapidis hæmaritis eloti unc. sex, croci, myrrhæ, aloes, suffiminis ammoniaci, singulorum unc. tres, lycii Indici, spicæ nardi, singulorum fescuncia, piperis albi grana centum quinquaginta, acaciæ rubentis unc. nouem gummi unc. tres: uino falerno aut aminæo teruntur.

Collyrium ex duobus lapidibus ad aspritudinem.

LApidis hæmaritis, schisti que, cassiæ, singulorum drach. octo & decim, æris, cadmixæ, opii, æruginis rasæ, singulorum drach. nouem, gummi tantundem, chalcitidis ustæ drach. sex: aqua reruntur.

Aridum collyrium Galeni, quod oculos tuetur.

LApidis phrygii minutim contusi usti que in ollula quousque incandescat, & restincti butyro non ueteri, deinde iterum similiter cremati, extincti que uino falerno, ac tertium usti & extincti que melle siccati que libra, æris cremati, piperis albi, phylli, singulæ unc. iæ, stimmi fescuncia: omnibus in læuorem detritis quum medicamentum ab igne auferetur, liquoris balsami non crassi (id enim arefcere medicamentum

prohibet) sed lucidissimi unclam iniicies. Vti autem eo conuenit in palpebris duntaxat, sic ut specillo illato tunicæ non attinguntur, sed ut solum medicamentum palpebris apertis illinatur. Inungi autem debet non semel, uerum sæpius, tum ante cibum, tum secundum ipsum, magisque ubi iam lippitudo sentitur. Mirum enim est, quàm omni alio medicamento securius ab iniuria uindictet.

Aridum dia crocu.

S Arcocollæ drach. octo, croci drach. quatuor, glaucij tantundem inungitur frequenter die. Nonnulli uerò aloen quem scent.

Aliud aridum ad siccam lippitudinem quæ xerophthalmia dicitur, sycosin sepedonas, carnis excrecentias.

C Admiæ drach. decem, chalcitidis drach. uiginti, piperis grana quindecim, nardi gallicæ drachma: teritur cadmia & chalcitis cum uino: ubi inaruerint, reliqua adiciuntur, cogunturq; in tenuissimum puluerem.

Hygra, hoc est, liquidum collyrium, ex Caucalide.

C Aucalidis succi, chamædryos, coronopodis, interdum & othonnæ succi par mensura. Est autem othonna magnum chelidonium.

Aliud ad syconsin, quæ est ueterrima palpebrarum asperitudo encanthidas, & excrecentiam carnis.

M Isyos tosti drach. sex, atramenti sutorii drach. quatuor, mellis attici sextarius.

Erasistrati panchrestos hygra, mirifica est in ocularijs uitijs, consillis pudendis & auribus suppurantibus.

A Eris drach. sex, misyos tosti, myrrhæ, singulorū drach. tres, croci sesquidrachma, piperis drachma, uini chii & passi cretici, utriusque sesquihemina: omnibus in uino læuigatis, dum inaruerint, passum superfunditur, & usque ad melleam spissitudinem incoquantur.

Agglutinamenta oculorum qui defluxionibus infestantur.

T Erræ samiz, mannæ thuris, myrrhæ, pares modi, oui aquato excepti, in lintheumq; illiti fronti imponuntur. **ALVD**

Alterci

Alterci seminis drachma, opii tantundem, myrrhæ drach. duæ
croci drachma, farinæ pollinis drach. quatuor, ouorum tosto-
rum lutea duo, albumine oui excipiuntur.

*De emplastris, & medicamentorum quæ in illa mittun-
tur coctione, tum qui ceræ modus cū oleo esse debeat,
ex commentarijs Antylli.* Cap. XVII.

Medicamentum quæ emplastra ingrediuntur, alia sunt
terrestria, utpote metallica, lapidumq; terræ species,
flores, cinis, & conchyliæ, alia sunt oleamenta, alia la-
chrymæ, alia liquari possunt: quædam liquores, quædam succi
sunt: semina uerò, herbas, & radices pauca recipiunt. Cæterū
ex ipsis emplastris nonnulla sunt uulneraria, quæ enema græ-
cis quod cruentis iniiciantur: colletica, q̃ glutinent: & catag-
matica, quod fracturis accommodentur, appellamus. Constare
autem ex siccantibus non summè, uerum secundi ordinis abso-
luti, & tertiū incipientis, oportet cuiusmodi sunt salix, quercus,
cupressus, piceæ & pini cortices, myrrhæ, thuris lachrymæ, bitu-
men, aloë, aristolochia, cinis sarmentaceus, cerusa, spuma argen-
ti, & pleraque ex metallicis. Coqui debent quousq; manus nō
amplius inquinent. Porro quæ cicatricem ducunt emplastra
& ipsa ex siccantibus componuntur, uerū efficacioribus quàm
glutinatoria, quod genua est, æs combustum, squama tū æris
tum ferri, ærugo, chalcitis, æris flos combustus, alumen, galla,
plumbago, cadmia, pumex, & ostracea. Discutientia uerò & ca-
lesfacientibus & siccantibus modicè fiunt, nempe aristolochia,
thapsia, oleo ueteri, & raphanino, melle, opobalsamo, picæ, resi-
na terebenthina, galbano, sale cōbusto, salis flore. Quæ emol-
liunt, ex argenti spuma, adipibus, medullis, oleo ueteri, propo-
li, ammoniaco, styrace galbano, bdellio, mastiche, resina tere-
binthina, uel radice althææ & cucumeris syluestris, præparan-
tur. Siccantia, ex sulfure, nitro, sale, cinere, & bitumine. Ad ex-
trahendum accommodata, fiunt ex sale, nitro, propoli, ærugi-
ne, fermento, stercore, sulfure, terebinthina. Quæ concoquunt
ex cera, ladanu, uua passa, amomo, croco, thure, picæ, mastiche,
Aegyptia, styrace, myrrhæ, galbano, butyro, æsypo, adipe, ærugi-
ne. Pus mouentia, ex hydrelæo, polline, pane tritico, chon-
dro, butyro, adipe suillo & uitulino, thure, picæ, resina. Quæ ue-
rò leuiunt, argenti spuma constant, cerusa, oleo, anetho, cha-

mæmelo, amylo, cera alba. Iam uerò enæma dicta, recentibus adhuc uulneribus & fracturis iniici debent, adjuuariq; è summa spleniorum parte spongiis posca madentibus simul illigatis, solui tertio quoq; die, & rursus eadem splenia non alia accommodari oportet. At quæ emolliunt, extrahunt, discutunt, concoquant, & pus præterea mouent, post cataplasmatum ceratumque usum adhibentur. Quæ leniunt etiam per initia statim, luminis potissimum partibus applicantur. Cæterum quo modo coquantur, deinceps exequemur.

Basilicum tetrapharmacum.

Ceræ, resinæ colophoniz, picis, seui taurini, pares portiones.

Emplastrum ex succo lini seminis discutiens detergēsq;.

Olei ueteris depondo, ceræ unc. uiginti, resinæ colophoniz, adipis suilli, singulorum pondo & dimidium, argenti spumæ pondo, cerusæ unc. sex, succi lini seminis tantundem, farinæ pollinis uncia, thuris unciz quatuor.

Emplastrum ex melle, dia melitos dicitur.

Argenti spumæ, ceræ, olei, singulorum lib. quatuor, terebinthinæ resinæ lib. duæ, mellis, adipis suilli, singulorum libra.

ALIVD. Argenteæ spumæ lib. sex, olei lib. quinque & semissis, resinæ colophoniz lib. septem & semissis, ceræ lib. tres & semissis, mellis lib. tres.

Emplastrum à succo dia chylon dictum.

Argenteæ spumæ pondo sex, olei, ætate quidem pondo septem, hyeme uerò pondo nouem, fœnugræci semisextarius, lini seminis tantundem, althææ tee pondo: althæa, seminaque in uiginti aquæ sextariis discoquantur, quousque paululū ex ea relictum fuerit, inde succi pondo quatuor, exprimuntur miscenturq; oleo ac incoquantur dum ebullire desierint, post hæc argenti spuma in tenuissimum pollinem detrita inspergitur, postremo omnia igne non acri excoquantur usque dum digitos intinctos non inquinent.

Emplastrum ex polline farinaceo, dia gyreos appellatū.

Farinacei pollinis, guttæ ammoniaci, singule lib. resinæ è picea de rasæ, ceræ, adipis suilli, singulorum lib. duæ, succi lini seminis quod satis est.

Emplastrum

Emplastrum ab herbis botanicum dictum.

L Apathi rhepelæi, anchusæ chærospelethi, hoc est, onocleæ, heptanueri, plantaginis, singulorum unc. tres, olei lib. sex, adipis suilli tantundem: herbæ oleo excoctæ proiciuntur, reliqua cum oleo eliquantur.

Emplastrum ex hastula regia, dia asphodelu dicitur.

H Astulæ regis radice succi libra; rosacei, chamæmelini, adipis anserini, singulorum unc. duæ, adipis suilli unc. tres, ceræ unc. quatuor.

Emplastrum è fermento abscessus rumpens.

F Ermenti, axungie, singulorum unc. sex, salis unc. quatuor, piceæ resinæ unc. tres, ceræ unc. quatuor, aphronitri uncia, guttæ ammoniaci unc. duæ, mellis unc. sex, saponis unc. duæ.

Emplastrum dothiene.

S Vffiminis ammoniaci pondo, nitri Alexandrini unc. sex, aphronitri tantundem, adipis suilli pondo duo, ceræ totidem resinæ terebenthinæ pondo, olei ueteris uncia aceti quod satis est.

Emplastrum ex radice lanaria, dia struthiu dicitur, strumas discutiens.

A Rgenti spumæ, radice lanariæ, aristolochiæ singulorum triens, galbani, squamæ æris, aloes, singulæ unc. mannæ thuris sextans, stillæ ammoniacæ selibra, resinæ è picea unc. sex, aceti scillini sextarii quatuor, ad aridorum læuigationem.

Smilion ad abscessus.

O Lei ueteris sesquilibra, argenti spumæ, nitri rubri, salis ammoniaci, lixiuij è sicu cui calx sit admista: aprotostactos dicitur, resinæ, singulorum libra, galbani, guttæ ammoniaci, singulorum unc. tres, atramenti futorij unc. quatuor, ceræ unc. sex, æruginis, opopanacis, singulorum uncia, aceti quod satis est: argenti spuma & ærugo in oleo coquuntur dum manus non inquinent, deinde reliqua admiscuntur.

Emplastrum dia scorodon, hoc est, ex alijs ad rumpendum.

C Eræ unc. sex, resinæ colophonis unc. quatuor, resinæ pityinæ

pityinæ hoc est ex picea arbore unc. tres, seui taurini unc. quatuor, nitri rufi fescunica, allia pura uiginti, olei dimidium sextarii: allia in oleo excocta proiciuntur, reliqua miscentur.

Emplastrum dia apyranu ad discutiendum.

A Dipis anserini, & fabanorum, singulorum uncia tres, olei ueteris uncia uigintis sex, herbe pulicaris uncia tres, urticae seminis radices apyrani uiridis, singulorum libra, cereæ albæ uncia decem, emplastri quod dia chylon inscribitur uncia duæ, resinæ terebinthinæ uncia. Radix apyrani minutim concisa cum herba pulicari in oleo madescit, semenque urticae per noctem & diem: ac ubi excocta fuerint, ipsa quidem proiciuntur: quæ liquari possunt, oleo mixta soluuntur.

Emplastrum pyrine, & ad duritias & scirrhus.

A Lthææ, palmularum, aut dactylorum qui nicolai dicuntur, singulorum libræ duæ, scœnugræci, lini seminis, singulorū sextarii dimidium, chamæmeli, melilori, palmularum corticis singulorū unc. sex, uini aminæi sextarii dimidium, spumæ argenti libra, cerusæ, resinæ colophonix, singulorum libræ duæ, cereæ resinæ, terebinthinæ, singulorum libra, olei ueteris libræ quinq; aquæ libræ duæ, panis aridi contusi cribratiq; lib. quinque: herbæ in uino decoctæ exprimuntur, succo, panis immadescit, sequent die læuigatur, argenti spuma, cerusaq; in aqua, deinde oleo iniecto incoquantur, dum medicamentum digitos non coinquinet, inde reliqua adduntur, sublatis ab igne panis inditur, ualideque rudicula agitur. adiunguntur etiâ æruginis rasæ, & salis floris, singulorū unc. sex, iridis, aristolochiæ, singulorum unc. sex, terebinthinæ resinæ libra.

Pelarion ex scorïa argenti, dia elcysmatos dicitur, ad similia abrasis.

Ceræ, seui taurini, singulorum unc. quinque, scorix argenti unc. sex, resinæ colophonix unc. quatuor, picis, olei, singulorum unc. duæ, scorïa argenti arida læuigatur uino uel succo scœnugræci: quod si scorïa desideretur, plumbagine utimur.

Emplastrum ex althæa, podagricis alijsque duritijs accommodatum.

Succi scœnugræci, & lini seminis, & althææ, singulorū trepondo, olei dupondo: incoctis usq; dum succus absumatur, colophonix

phoniz resinæ pondo adiicitur, item terebenthinæ resinæ pondo, hederæ lachrymæ quadrans: ubi soluta fuerint, & ab igne sublata, ceræ pondo inicitur, galbani triens: utraq; simul confusa solutaq; rudicula agitantur.

Cissinum ad neruorum uulnera, punctus, & maxime diuturna.

Quamæ rubræ unc. quatuor & semissis, thuris uncia, misyos sciscuncia, chalcitidis drach. quatuor, aceti sex: læuigantur æstiuo sole usq; dum acetū fuerit consumptum, deinde solutis ceræ uncias octo, olei octodecim misce to. Si autem diuisus fuerit neruus & nudus sit, in uicem galbani, resinæ terebenthinæ unc. duæ, induntur.

Melanchlorum ad eadem, & cruentis aptum.

Malicii, æris combusti, gallæ, aristolochiæ rotundæ, salis ammoniaci, squamæ eris, aluminis scissi & liquidi, (alii uice liquidi rotundum ponunt) iridis, misyos, atramenti sutorii, chalcitidis, eruginis rasæ, cadmiæ, aloet, myrrhæ, thuris, pannacis radicis, argenti spumæ, cerusæ, pares omnium portiones, teruntur in sole æstiuo cum acato diebus pluribus, singunturq; pastilli. Emplastrum uerò fit hunc in modum: medicamenti uue duæ, ceræ unc. sex, olei unc. octo, in neruorum uulneribus ueteris, in aliis communis, remuerantur.

Emplastrum ex fenetione, quod dia erigerontos dicitur.

Enetionis succi lib. duæ, olei ueteris sesquilibra, cyprini olei unc. quatuor, axungia ueteris libra, resinæ terebenthinæ uncia, galbani semuncia, resinæ piceæ sex, æruginis, thuris, hyssopi medicamenti, singulorum uncia, squamæ æ is scrupula octo, ceræ unc. decem, apochymatis unc. quatuordecim: oleum & succus ad sordium spissitudinem incoquitur cum adipe suillo: arida cyprino læuigantur, galbanum cū cera contunditur & cacaabo demittitur, apochyma si quidem siccum fuerit, læue incretum ponderato inspergitoq;: q; si in læuorē deteri nequeat, portione olei solutum excipiat, atq; tūc omnia misceantur.

Emplastrum Mnasei discutiens.

Ceræ, axungia porcina, singulorum libra, resinæ colophoniæ unc. sex, argenti spumæ lib. duæ: uini generosi lib. quatuor adiiciuntur.

Ariobarzanion,

Ariobarzation, ad eodẽm affectus.

ARgenti spumæ fescuncia, cerusæ libra quincunx, aquæ marinæ unc. uiginti quinque, olei ueteris sesquilibra, buccinorum concrematorum unc. septem & semis, ceræ rusæ unc. nouem, resinæ terebentinæ unc. sex, thuris unc. tres, scrupula tria & dimidium.

Emplastrum ex dracunculo.

CEræ, resinæ colophoniz, picis aridæ, axungiz, resinæ, singulorum lib. quatuor, guttæ ammoniacæ lib. duæ, dracunculi radices lib. quinq; : radix arida læuis aliis solutis inspergitur.

Psitacium.

CEræ, resinæ colophoniz, adipis suilli, alterci foliorum tenerorum, uel succi eorum, æqualis modus. In Alexandria autem ceræ lib. duæ semis, alterci lib. duæ, axungiz lib. duæ semis, colophoniz resinæ lib. decem miscentur, magisq; discutit medicamentum.

Myrsinatum.

ARgenti spumæ, cerusæ, sandicis, plūbi cōbusti & eloti, singulæ unc. ceræ unc. sex, olei myrtei libra, uini quod satis est.

Emplastrum ex cerusa, uel ouis.

CEræ tractæ unc. sex, rosacei sesquilibra, argenti spumæ unc. duæ, cerusæ tantundem, amyli unc. tres, ouorum quibusque aquata.

Emplastrum, quod liquidum sit parygrum uocatum, Oribasii.

ARgentæ spumæ fescuncia, cerusæ tantundem, ceræ triēs, pinguis suilli septunx, resinæ colophoniz dodrans, lini seminis succi, olei, singuli dextantes: mirificè facit ad calcanei rimas, in ulceribus aut (inquit) uitant, nā ea tetri odoris reddit.

Emplastrum dia Cadmias, cicatricem inducent.

Chalcitidis ustæ unc. dug, cadmiæ, mannæ thuris, singulorum uncia, ceræ, resinæ colophoniz, olei myrtei, singulorum libra, uini quod satis est.

Palmulatum, phœnicine dicitur.

AXungiz ueteris lib. duæ, olei ueteris lib. tres, argenti spumæ tantundem, chalcitidis crudæ unc. sex: primum chalcitis cum oleo in pila cōmodiore læuigantur, uel in sole: ubi for
dium

dium spissitudo facta fuerit, etiam spuma argenti prius detricta superiniicitur, postea adeps: postquam probe in polliuem redacta fuerint, leni igne incoques, quoad digitos non inquinent, palmarum radícula agitans.

Emplastrum ex Anchusa, ambustis efficax.

Ceræ albæ unc. nouem, rosacei unc. octodecim: his liquatis porphyritidos anchusæ radicis siccæ læuissimæ uncias quatuor inspergito. **ALIVD.** Anchusæ radicis uiridis, marrubii, gūmi, singulorum unc. tres, decoctæ in olei uncis nouem proiciuntur, oleo ceræ albæ unc. quindecim superiniiciuntur, omniaque soluuntur.

Emplastrum ex Pompholyge, pompholygeron appellatū.

Pompholygis unc. duæ, argenti spumæ unc. tres, læuigantur cum lini seminis succo, adiiciuntur ipsis liquatæ refrigeratæque ceræ unc. sex, adipis anserini uel gallinacei unc. duæ, chamæmelini unc. sex.

Thylocotiche, dolorem leniens, ad sedem utilis.

Thuris unc. septemdecim, myrrhæ unc. septem, opii drach. quatuor, aluminis scissilis drach. quatuor, aluminis scissilis drach. duæ butyri drach. quatuor, ouorum tenuium lucea quatuor, cadmiæ crematæ & elotæ drach. quatuor, pompholygis drach. sex, ceræ tyrrenicæ drach. octo, adipis anserini drach. sedecim, medullæ ceruinæ drac. undecim, plumbi cremati elotiæque drach. nouem, lapidis hæmatitis drach. hyssopi liquidi drach. quatuor: arida læuigantur cum uino Italico quæ liquari possunt, admiscuntur.

Emplastrum Amithæonis, ad articulos recenti cicatrice contractos, conuulsoque, est etiam ad extrahendum efficax.

Ammôniaci, ceræ, bdellii, singulorum drach. octo, resinæ terebinthinæ, iridis illyricæ, galbani, singulorum drach. uiginti:

Emplastrum Aristophanium emolliens.

Picis lib. quatuor, apochymatis lib. duæ, ceræ libra, opopanax uncia, aceti hemina.

Emplastrum ex plumbagine ad calidas affectiones.

Plumbaginis unc. quatuor, spumæ argenti unc. duæ, cerusæ tantundem,

fescuncia, aristolochiæ, æruginis rasæ, singulorum unc. duæ & semis, dictamni tantundem, colophonix pondo, mannæ thuris unc. tres, guttæ ammoniaci unc. sex, propolis unc. duæ, ceræ unc. sex & semis, primum oleum cum argenti spuma incoqui debet dum incrassescat, nec digitos inquinat, deinde lebetē deposito æruginem & squamam iniicies, rursus incoques, dum manum non inficiant, iterumq; cacabum ab igne tollens, resinam & ammoniacum in cretum adicies mouens, donec ferue re desinant, mox in ignem repones, ac ubi modicē inferbuerint, æs & diphryges admiscebis, ac rursus coques usq; dum firma spissitudo facta fuerit, deinde ceram iniicies, eaq; discotta ut digitos non coinquinat, propolin immittes, his abundē refrigeratis, mox aloen, mannā thuris, dictamnū, aristolochiam, gentianā, singula læuissima insperges.

Barbara, emplastrum quod cruentis protinus uulneribus inijcitur, & fracturarum callos firmat.

Bituminis Iudaici, picis aridæ, ceræ, resinæ, singulorum libra terebentinæ unc. duæ, argenti spumæ, uncia, cerusæ fescuncia, mannæ thuris unc. duæ, opopanacis unc. duæ, zingiberis unc. duæ olei unc. tres, aceti quantum sufficit.

Emplastrum ex salicibus, diaiteon appellatur, glutinans, cruenta excreantibus, & purulentis efficax: thoracis impositum.

Misyos, chalcitidis, æruginis, cerusæ, gallæ, aluminis scissilis & rotundi, cretæ sutoriæ, singulorum unc. sex, ceræ lib. duæ, resinæ piceæ lib. duæ, picis tantundem, malicorii unc. sex, bituminis, lib. duæ, salicis foliorum totidem, olei rosacei unc. quatuor, atramenti sutorii unc. sex, aceti quod satis est. sunt qui terebentinæ uncias nouem addant.

Emplastrum Nicolai ad recentia uulnera, & sinus glutinandos aptum.

Squamæ æris unc. quatuor, æruginis rasæ fescuncia, argenti spumæ tantundem, aristolochiæ longæ & rotundæ, singulorum uncia, aluminis scissilis & rotundi, singulorum uncia, atramenti sutorii uncia, sulfuris uiui uncia, gallæ omphacitidis unc. quatuor, salis ammoniaci uncia, misyos uncia, origani unc. cha mæleotis uncia, cadmiæ botrytidis uncia, ueratri albi uncia, peucedani

peucedani unc. tres, apii seminis unc. duæ, symphyti radice scuncia, cerule scuncia mandragoræ succi semuncia, chalcitidis scuncia, terræ samiae, quæ alter dicitur uncia, thuris masculi uncia, aloes uncia, bdellii unc. duæ, opii thebani tantundem, zingiberis troglodytici semuncia, stillæ ammoniacæ uncia, fenugræci unc. sex, perdicii herbæ succi unc. sex, ceræ flauæ unc. tres, resinæ colophonis lib. duæ, resinæ pityinæ hoc est è picea libra polentæ tantundem, mastiches unc. sex, picis nigre lib. duæ, olei ueteris libra styracis unc. opopanax scuncia, aceti quod satis est.

*Ictus ad strumas, abscessus, lienem, articulos,
& coxendicum dolores.*

Argenti spumæ denarii ceneum uiginti, olei ueteris sextarii duo, aceti sextarius, æruginis sesquidenarius, piceæ corticis denarii octo, chamæleontis radice, euphorbii, hypocistidis succi, propolis, zingiberis, heleni, pyrethri, singulorum denarii sedecim, ceræ lib. tres.

Emplastrum Neronis, ad ictus, omnemque particularum carnosarum dolorem.

Olei ueteris sesquilibra, argenteæ spumæ libra, ceræ resinæ piceæ, singulorum unc. septem & semissis, guttæ ammoniaci unc. quatuor, cerule tantundem, galbani, mannæ thuris, zingiberis, thuris, singulorum uncia.

Oxera, multiplicis usus.

Picis aridæ lib. duæ ceræ libra, guttæ ammoniacæ uncia, resinæ terebinthinæ selibra, galbani unc. duæ, mannæ thuris unc. duæ, aceti sesquiseptarius.

Aceratos, hoc est ceræ expers, emplastrum Galeni, glutinat, concoquit, ulcera ad suppurationem perducit, ex ricinino aut ueteri oleo, medicaminis in linteolos illiti modo, solutum.

Argenti spumæ trepondo, olei ricinini, aut ueteris pondo quatuor, aceti quàm acerrimi dupondo, æris squamæ nigre chalcitidis, æruginis, singuli sextantes: argenti spuma cū oleo incoquitur, dum strigmenti fiat spissitudo deinde metallica compluribus diebus ex aceto laugata adiciuntur.

Emplastrum

Emplastrum ex metallicis .

Chalcitidis uncia , misyos unc. duæ, squamæ æris unc. tres, thuris tantundem, colophonix unc. duæ, galbani sescuncia, ceræ libra, olei quincunx, aceti quod satis est.

Armenia , fracturis accommodata .

Chalcitidis unc. quatuor, squamæ æris un. duæ semis, æris cremati uncia, thuris unc. duæ, olei lib. aceti tantundem: coquuntur metallica in oxelæo, dū manū nō inquinēt, inde thus adicitur.

Melæne Serapionis .

Spumæ argenti libra, ceræ unc. septem, guttæ ammoniaci unc. tres & semis, galbani, æruginis, singulorum denarii novem, resinæ colophonix unc. septem, myrrhæ drach. olei sesqui hemina: argenti spuma cum oleo incoquitur quousq; digiti in tincti non inquinentur, deinde adiciuntur reliqua .

*Anicetos , ab insuperabili vi appollatum emplastrum ,
glutinat, discutit, squamas separat, & ad articu-
los recenti cicatrice contractos ualct .*

Baccarū lauri, iridis aridæ, thuris, singulorū drach. sexaginta, æris cōbusti drach. uiginti, nitri, salis, ammoniaci, singulorū drach. uiginti, pyrethri, herbæ pediculariæ, seminis roris marini, grani gnidii, sinapis, columbarū stercoreis, aristolochiæ, cumini, æruginis, iunci quadrati, erucæ seminis, singulorū drach. octo, aceti hemina duodecim: læuigātur sub æstu caniculæ, quousq; acetū cōsumatur, deinde decocti caricarū crassissimi unc. nouē adduntur, quibus mixtis pastilli fiunt, siccantq; ubi utendum est, pastillorum ipsorum unc. duæ læuigatæ aceto miscentur, resinæ unc. tres, ceræ tyrrenicæ unc. duæ, olei tantundem.

Emplastrum ex lolio, dia arcu dicitur .

Picis lib. duæ, resinæ picæ unc. nouem, ceræ tyrrenicæ unc. quinque, olei uncia tres, bituminis increti unc. duæ, lolii farinæ sextarius, aceti quantum sufficit .

Emplastrum ex liquore sycamino .

Argenti spunæ, picis aridæ, seui taurini, singulorum unc. octo, terebinthinæ unc. tres, ceræ unc. quinque, æruginis rasæ, opopanacis, galbani, singulorum uncia, olei ricinini, aut susini, aut admodum ueteris hemina, picis liquidæ tantundem, liquoris sycamini cuius fructus sycomoræ dicuntur, hemina .

Emplastrum

Emplastrum à duplici colore dichromon appellatum.

Aeris combusti, aluminis scissilia guttæ ammoniacæ, singulorum uncia, ceræ libra, resinæ colophoniz libra, seui suilli libra, aceti, quod satis est.

Inde conglutinans ad ulcera quæ serpendo depascunt, & sanguinis sputum.

Ceræ, resinæ fricæ, picis aridæ, bituminis liquidi, zacynthi, singulorum libra, cerulæ, chalcitidis, misyos, cretæ sutoriz, aluminis scissilis & rotundi, gallæ omphacitidis, singulorum unc. sex, aceti quod satis est.

Emplastrum ex cinere aspidum, discutit strumas & podagras.

Resinæ terebinthinæ, lapidis hæmatitis, bituminis Iudaici, singulorum drach. trecentæ sexaginta, ceræ, baccarum lauri, guttæ ammonicæ, aphronitri, seui uitulini, singulorū drach. trecentæ quadraginta, lapidis pyricis, calcis uiuæ, singulorum drach. centum quadraginta, cineris aspidum totidem, olei ueteris heminæ duæ: refrigerato medicamento cinis inspergitur. sit etiam sine cinere, quod nonnulli eum auersentur, & nihilominus etiam efficit.

Leana, siccatur discutitque.

Sssiminis ammoniaci, plumbaginis, singulorum drach. centum, sinapis drach. octo, chamæleontis radice drach. sedecim, resinæ colophoniz drach. centum, squamæ æris, lanariæ radice, singulorum drach. quinq;, euphorbiæ, æruginis, singulorū drach. octo, aristolochiæ drach. sedecim, pyrethri drach. octo, olei ueteris hemina, raphanini quantum sufficit.

Aliter leana noxia educit in superficiem, humoris que euacuat.

Atramenti sutori unc. duæ, auripigmenti uncia, ueratri nigri, thoracum cantharidum, singulorum, sesquidrachma, sandarachæ unc. tres, ceræ sesquilibra, resinæ frictæ libra, olei heminæ duæ.

Macedonium.

Ceræ, resinæ colophoniz, picis, seui taurini, lachrimæ thuris, pares portiones: eliquatis, ac sublatis ab igne lachrima thuris inspergitur.

Sphæxion

Spherion ad ardores.

CErusæ, argenti spumæ, calcis niuæ, singulorum unc. tres, ceræ fescuncia, aluminis berenicarij, rosacei, singulorum uncia: liquefacta aridis superfunduntur, ac orbiculi formantur, quum usus incidit, olei uncias sex liquato cum duabus ceræ, adiectoq; medicamento uncia & agitato: refrigeratū ex aquæ uncis nouem contundito, ego etiā ternas rosacei uncias addo.

Emplastrum ex ochra, inflammationem arceat, tum sponte, tum in iudicio tortis idoneum.

OChræ atticæ lib. duæ, cretæ libra, argenti spumæ unc. octo, uino læuigatæ ceræ, resinæ colophoniz, picis, resinæ piceæ, singulorum libra, resinæ terebenthinæ unc. octo, olei lib. duæ, hunc in modum soluntur: ceræ libra, olei ueteris lib. tres, medicamento libra uino contunduntur.

Emplastrum ex cedria glutinat, discutit, abstergitque.

CEræ, picis aridæ, singulorum libra, resinæ colophoniz unc. octo, cedrini liquoris unc. sex: liquata simul incoquantur, dum digitos non coinquent.

Aliud emolliens.

CEræ, picis, singulorum unc. octo, resinæ colophoniz drach. uiginti quinque, propoleos drach. septemdecim, cedrini liquoris drach. uiginti.

Emplastrum ex punice. ad cicatricem ducendam.

MYrtei, lib. duæ, ceræ libra, pumicis cremati uinoq; restincti drach. sex, squamæ ferri quod stomoma dicitur drach. sex, gris uusti, cimoliæ, singulorum drach. quinque: super linamentum spongiamq; ex aqua accommodato.

Emplastrum paula, strumis & bubonibus efficax.

CEræ, resinæ colophoniz, nitri, singulorum libra.

Emplastrum ex nitro ad carbunculos.

NItri tosti unc. tres, ceræ, olei, resinæ colophoniz, singulorū sesquidrachma, liquoris cyrenaici aut medici drach. decem: imponitur in linteolis, solutum.

Emplastrum ex anemone.

ANemone ungibus detractis uncia duæ, ceræ unc. quinque, olei uncie quatuor, resinæ uncie quinque & semis,

PAULI AEGIN.

R colopho-

colophoniz resinæ libræ duæ & semis .

Emplastrum Macherionis uiride, ad coxendicum cruciatus, articulos infarctos, & abscessus .

O Popanacis, galbani, æruginis, myrrhæ, iridis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, singulorum uncia, resinæ terebinthinæ, ceræ, olei omphacini, singulorum unc. sep tem .

Viride aliud simplex .

R Esinæ lib. tres, ceræ libra, æruginis rasæ scilicet libra, thuris drac. uiginti quinque, aceti quod satis est .

Aliud uiride, ad humida uitia, & carnis excrescentias .

R Esinæ colophoniz unciæ sex, æruginis rasæ scilicet uncia, ceræ unciæ duæ, salis cappadocii uncia, rosacei unciæ duæ, aceti quantum sufficit .

Pegana ad pleuriticos .

R Utæ uiridis pondus, butyri sesquipondo, resinæ terebinthinæ pondo & quadrans, hyssopi medicamenti tantundem, opopanacis quadrans, galbani tantundem, anethi pondo .

Emplastrum dia stactes, hoc est, ex lixiuio, coxendicum doloribus, articularijs, & tumoribus

œdema referentibus utile i

C Eræ, olei ueteris, lixiuii quod habet calcem admistam, singulorum libra, resinæ frictæ, nitri alexandrini, nitri albi, resinæ terebinthing, singulorum unc. sex, utrumque nitrum lixiuio teritur .

Emplastrum è nitro ad abscessus, scyrrhos, & tumores .

O Lei ueteris, ceræ, aphronitri, saponis, lixiuii, singulorum lib. resinæ, terebinthinæ unc. sex, galbani, propolis, guttæ ammoniaci, singulorum unc. præparatur quemadmodum superius .

Emplastrum ex sale, dta halon dicitur .

C Eræ unciæ quatuor, olei libra, salis communis unciæ quatuor, aphronitri tantundem, cerusæ unc. octo, aceti unc. duæ, ad arida conterenda. **ALITER.** Salis communis, nitri, singulorum unc. quatuor, ceræ, olei ueteris, singulorum unciæ sex, aquæ marinæ quod satis est .

Emplastrum dia pternes, ex perna, tophos soluit .

P Ernæ suillæ ueteris pinguis, guttæ ammoniaci, casei ueteris uaccini

uaccini aut caprilli, seui taurini, apochymatis quæ est nauiis ratura, singulorum libra, medullæ ceruinæ uncia octo, hyssopi cerati unc. tres, cyprini olei unc. sex, uini Aegyptii quod satis est.

Emplastrum diacinnabareos, hoc est, ex cinnabari adtophos aliosque omnigenos tumores induratos, dicitur pamplethes.

Argenti spumæ libra, olei ueteris sextarius, squamæ eris uncia, æris usti tantundem, cinnabaris scrupula octodecim, lapidis magnetis uiui uncia, lapidis phrygij drach. sex, lapidis pyritidis, cadauæ, æruginis rasæ, thuris, singulorum uncia, diphyrgis unc. duæ, aloes sescuncia, galbani tantundem, lapidis onitis scythici scrupula octodecim, lapidis hæmatitis uncia, propolis libra scrupula uintiocto, ceræ unc. septendecim, lapidis perdiciis uncia, (in alio perdiciati habet) betonicæ uncia scrupula octo, gentianæ uncia, aristolochiæ longæ & rotundæ drach. quatuor, chamæleontis nigri uncia, dictamni scrupula quadragintaduobus, resinæ aridæ libra, seui struthiocameli libra: lapides cum spuma argenti teruntur seorsim, adiectis salis floris libris duobus, donec totum absumatur.

Emplastrum ex auellanis, dialeptocaryon dicitur, ad articulorum tophos probatum.

Lixiuii quod calcem habet adiectam unc. sex, auellandarum partis interioris unc. duæ, aphronitri unc. sex, olei ueteris libra, saponis gallici unc. quatuor, mellis unc. octo, ouorum sex aquata, ceræ unc. decem, resinæ terebinthinæ unc. duæ: læuigantur ex lixiuio.

Diaurpanes ceratum ad podagram, dolorem leniens mirabiliter.

Quinto Martii mensis, die, olei cõmunis sextarios, duos lebeti in domo subterranea infundito, coquitoque lignis e uite: ubi inferbuerit, turpenæ marini piscis libram adiecito, asphalacis animantis, quod nonnulli madamudam uocant, sanguinis uncias quatuor, incoquitoque dum carnes piscis dissoluantur aut correfiant, deinde exemptis illis, olei & ceræ inomentum adiecito in spissitudinem, ut mollißimum fiat ceratũ, quod linereo illitum impones.

R 2 **Emplastrum**

Emplastrum ex urina muli, podagricis utile.

VRinae muli sextarii quatuor, argenti spumae lib. duae, olei ueteris mystrum, trita diu omnia ut strigmenti spissitudo fiat, incoquito donec digitos non inquinent.

Emplastrum ex lapidis asij flore philagrii ad scyrrhos.

Pucedani radices, asij lapidis floris, si non adsit, salis, guttae ammoniacae, lanarum succidarum crematarum, singulorum uncia, aristolochiae rotunda, pumicis, canini stercoreis, æruginis rase, squamæ æris, misyos, singulorum scrupula octodecim, castorij tantundem, myrrhae unc. tres, aceti quàm acerri mi tantundem, ceræ unc. duodecim, & semis, resinae e picea, piceis brutiae, singulorum unc. octodecim, semis scrupula sex, olei ueteris quod sufficit.

Ex eodem Galeni.

Ceræ, resinae terebenthinae, singulorum libra, lapidis asij, mannae thuris, singulorum tres unc. cyprini unc. duae, aquae liniuæ quantum satis est.

Emplastrum ex salis flore, articularijs in declinatione accommodatum.

Resinae terebenthinae, resinae frictæ, resinae e picea, ceræ, singulorum libra, picis aridae, aluminis scissilis, salis floris, singulorum selibra: coquuntur in lebece.

Emplastrum quod nutriendæ ulcerum carni est.

Rosacei, resinae terebenthinae, mellis, singulorum unc. duae, cerusæ, butyri, singulorum uncia, alii etiam thuris unciam addunt.

Emplastrum Italicum ad purgandum sordida, inducendumque carnem.

Erinæi (dico autem sylvestris ficus) tenerum corticis oleo excoctum prolicito, ceræ rufæ quantum satis est in oleo liquesfacito, in linamenta illito utitor.

Entaticon, quasi dicas intensorium.

Satyrii, pudendi ceruini, scisci caudæ, singulorum drach. duae, særucæ seminis, pyrethri, seminis rorismarini, ceræ, singulorum drach. quatuor, resinae terebenthinae drachma, oua passerum troglodytarum tria, stelliones transmarini tres, olei lauri uel irini quod satis est: macerantur uini in aceto stelliones

ad dies

ad dies triginta, uase cui insunt in fimo defosso.

Cbryse, cruentis uulneribus accommodata.

Thuris, aluminis scissilis singuli sextantes, colophoniz resinæ libra, olei quadrans auripigmenti sextans, aceti cum oleo mixti, quod satis est.

Catagmatice quod est fracturis idoneum medicamentum, Oribasii.

Picis brutiz libra, unc. quatuor, argenti spumæ tantundem, thuris unc. octo, resinæ terebinthinæ unc. quinq; , seui taurini libra, unc. quatuor, galbani, opopanacis, singulorum uncia, ceræ unc. quatuor, olei ueteris libra, aceti unc. quinque.

Catagmatice ad fracturas cum uulnere citraque id factas, ex commentarijs Heracliti.

Picis aridæ mina, argenti spumæ tantundem, mannæ thuris minæ dimidium, seui uitulini mina, ceræ tyrrhenicæ uigintifex, opopanacis unc. octo, æruginis rasæ, æris cyprii, singulorum minæ quinq; & decima eius portio, resinæ terebinthinæ sesquimina & quinta portio, æris uncia, recinini, aut olei ueteris hemina, aceti hemina semissis.

Liquidi hyssopi medicamenti præparatio.

Sertulæ campanæ nnc. quatuor, cardamomi unc. duæ, lanarû bene sordidarum unc. sex: macerata in uini duobus sexrariis ad triduum incoquito, dum paululû fuerit reliquum, his ablatis miscentur uino olei unc. tres, coquanturq; dum exiguum supersit, atq; uino etiam tunc adiiciuntur resinæ colophoniz unc. decem, terebinthinæ tantundem: nonnulli uerò & ceræ dextrantem miscent, hyssopi herbæ unciam, aliisq; incoquunt: alii lanas uino eluunt: ubi desiccant, uinû cum sordibus lanarum addunt, quas pinon etiam appellant quum usus incidit; treis ex eo uncias mittunt, tum reliqua ut comprehensum est,

De Malagmatis & epithematis. Cap. XVIII.

Inter ea quæ malagmata dicuntur, alia mediis corporis partibus iniiciuntur, longa inflammatione conflantibus, aut induratis, aut æstu flagrantibus, aut perfrictionem fluxionemve expertis: alia articulis quibus humores sint impacti uel neruis refrigeratis, uel etiam aliis particulis scirrho obsessis

R 3 congruunt.

cōgruunt de his igitur tum in capite de emplastris tractatū est
 tum ubi ad acopa uentum erit differetur. Porro inter malag-
 mata mediis corporis regionibus accommodata,) epithema-
 ta propriē nuncupantur) quæ quidem stomacho, & iocinori ad-
 mouentur, qualiacunq; illa fuerint roborantem ex astringenti-
 bus uim postulant. Sine his etenim uitæ aliquod discrimen in-
 tulerint, cum illa nempe stomachus & iecur communes alia-
 rum partium alimentis, sint officinæ. Quamobrē eiusmodi me-
 dicamenta ex aromatis potissimum conficiuntur. Stomacho
 igitur iniici debent, si non concoquit, aut infirmatur, aut infla-
 tione laborat, malagmata ex seminibus, meliloto, aloë, absin-
 thio, samfuchio, nardo, & mastiche. Iecori autem ex myroba-
 lano confecta, ammoniaco, pinguibus, & chamæmelino. At lie-
 ni applicantur, quæ constant calce diua, auripigmento, cappa-
 ri, salicibus, cardamomo, ærugine, ammoniaco, & aceto: iis au-
 tem qui alui fluore laborant, ex cœnanthe, alumine, melino, &
 aliis astringentibus præparata. atq; hæc etiam per abusionem
 communiter malagmata nominant, & si diuersam à mollien-
 do uim repræsentet. Si uerò ardor uiscera urgeat, in febribus
 ardentibus, ex croco competunt malagmata, rosaceo, succo li-
 ni seminis, aut intybi, aut herbæ seminalis, adipe suillo, & spu-
 ma argenti: si perfrixerunt, ea quæ opobalsamum, phyllum, ca-
 samum, & piper recipiunt. Pectori, quum sanguis eiicitur, pro-
 sunt astringentia siccantiaque, ex alumine, salice, & bitumine.
 In tabe quæ phthisis dicitur, conducunt ex baccis lauri, marru-
 bio, cardamomo, & lixiuio confecta.

Malagma ex sertula campana, dia meliloton dicitur.

CRoci, nardi gallici, iunci angulosi, cardamomi, iridis, myr-
 rhæ, singulorum unc. duæ, sertulæ campanæ libra, stillæ
 ammoniacæ tantundem, ceræ lib. tres, resinæ terebinthinæ li-
 bra, olei cyprini lib. tres, gleucini lib. duæ, bdellii unc. sex, non
 nulli etiam cyphi uncias duas addunt, uini quod satis est.

*Polyarchion ex commentario Galeni de composi-
 tione medicamentorum secundum locos.*

CEræ, resinæ terebinthinæ, bdellii suffiminis ammoniaci, car-
 damomi, iunci quadrati, singulorum mina, sertulæ campa-
 næ, amomi, nardi Indice, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamo-
 mi, singulorum drach. uiginti quinque, olei cyprini hemina,
 uini

uini Italici quod satis est: præparato ac utitor, interim meracō, interim cerato quod ex cyprino fit, soluto.

Aliter polyarchion.

XYlobalsami, costi, iridis, iunci quadrati, myrrhæ, iunci rotundi floris, cardamomi, thuris, spicæ nardi, mastiches, styracis, bdellii, amomi, phylli, croci, cassiæ, pyrethri, aristolochiæ longæ, singulorum uncia, guttæ ammoniacæ fescuncia, resinæ frictæ tres unc. resinæ terebinthinæ libra medullæ ceruinæ uncia dux, ceræ lib. dux, opobalsami unc. sex, uini uncia octo.

Philagrianum.

CRoci fescuncia, aloes, ammoniaci thymiamatis, bdellii, styracis, singulæ unc. adipis anserini sextans, hyssopi medicamenti triens, palmularum sextans, ceræ libra, nardi selibra, melini unc. sex, uini quod sufficit ad sicca læuiganda: per triduum macerantur mouenturque rudicula ter die, deinde incoquantur oleo, secundo die cardamomum aqua pridie maceratum, tertio autem crocus, uino. Nonnulli cum croco etiam alias quinque myrrhæ uncias adijciunt: illis autem exemptis, oleū purum reponunt, omni uero specierum fæce in pastillos coacta siccataque id habent quod crocomagma, dicitur.

Mendesium.

DIctum est Mendesium quod in Aegypto reperiatur, ubi & Mendes, hoc est, caper colitur. Recipit autem olei balani libram, alias sextarios decem, myrrhæ, cassiæ fistulæ, singulorum uncias treis, resinæ terebenthinæ libram, in alio, sextarios decem, cinnamomi uncias treis: hoc non decoquitur, sed aridis inditis diebus sexaginta agitatur, inde liquefacta terebinthina in partem olei mittitur, postea rursus diebus aliis septem mouetur, atque sic reconditur.

Marciatum.

MAstiches, ceræ, styracis, singulorum unc. tres, hyssopi medicamenti semuncia, opobalsami fescuncia, nardini, gleucini, olei omphacini, singulorum unc. tres, medullæ ceruinæ fescuncia, terebinthinæ uncia.

Iniectio prima dia omphacos.

ASpalathi, rudiculæ palmarum, fertulæ campanæ, iridis, iunci rotundi floris, xylobalsami, rosarum siccarum, calami aromatici, singulorum uncia tres, olei omphacini

lib. decem, uuz immaturæ succi tantundem .

Iniectio secunda, ex caryophyllo .

Ammoniaci, spicæ nardi, costî, caryophyll , cassiæ, casami, singulorum nnc. tres, in alio etiam habetur arabo unc. tres uini quod sufficit .

Iniectio tertia .

Thuris, guttæ ammoniaci, styracis, bdellii, myrrhæ, mastiches, singulorū unc. tres, uini quod satis est, ceræ albæ unc. quinque , opobalsami unc. sex, nonnulli uncias octo . Primæ iniectionis medicamenta, pridie in uuz acerbæ succo oleoque macerantur , secundæ seorsim in uino aminæo aut alio ueteri, ac odorato, mouenturq; quotidie rudicula palmea : tertiæ ad triduum, post quod in cacabo nitente primum in ectonis primæ medicamenta incoquantur, quousq; pauxillum succi uuz acerbæ relictum fuerit : mox secundæ iniectionis species cum uino immittuntur , rectius aurem fiet si prius aliis exemptis , puro deinde oleo ipsæ adiiciantur , coquanturq; donec paululum uini super sit, ne aduratur oleum: sublata ab igne eximito, superque adiecto rursus oleo puro tertiæ iniectionis medicamenta, prius ex uino in pila soluta præter styracem quemadmodum prædixi, hic enim cum aliis inditus promptè soluitur. Coques autem carbonibus quousque bene habere tibi uideantur: sublata ab igne refrigerari finito , insequentî die exceptis diligenter ex oleo calfactisq; abundè super ignem ceram adiecto, inde sublata rudicula agitato , ubi refrixerinto, pobalsamum admisceto, & uitreis uasis reponito .

Gleucinum, iniectio prima .

Olei sextarii decē, musti aminæi sextarii sex . aspalathi unc. quatuor , palmæ fructus operimenti quod spathe dicitur unc. sex, iunci rotundi floris tantundem, sertulæ campanæ unc. quatuor, rosarum uncia, myrrhæ unc. tres, foliorum lauri unc. duæ, arboris thuris unciz sex, xylobalsami totidem, inulæ campanæ unc. sex, ariltochiæ longæ unc. tres, iridis tantundem: hæc macerantur in musto .

Altera iniectio .

Nardi gallicæ unc. quatuor, casami, qui est balsami fructus unc. duæ, cyperi, cassiæ, spicæ nardi, asari, amomi, costî, samfuchi, singulorum unc. tres , calami aromatici , caryophylli, phylli,

phylli, singulorum uncia, cardamomi unc. quatuor, balsamum uino odorato madefcit.

Iniectio tertia.

Mastiches triens, myrrhæ troglodyticæ, bdellij, singuli sextantes, ladani quadrans styracis liquidi, thuris masculi, singuli trientes, opobalsami selibra, nonnulli & croci sextantē addunt, præparatur quemadmodum medicamentum ex uua acerba, nisi quod ceram non recipiat, hic autem septem diebus oportet species duarum iniectionum macerari.

Nardus cizicine, iniectio prima.

Olei primi meriti sextarij decem, aspalathi, cypiarum inulæ campanæ, iridis, xylobalsami, aristolochiæ, cardamomi, iunci rotundi floris, singulorum unc. sex, sampfuchi unc. quatuor, herbæ sabini unc. duæ, nonnulli & calami odorati uncias duas immittunt: hæc in uini odorati sextarijs quaternis commadescunt.

Alter a iniectio.

Cassia, casami, arnabo, singulorum unc. duæ, spicæ nardi unc. tres, caryophylli uncia, costi, amomi, singulorum unc. duæ nonnulli etiam nardi gallicæ uncias duas addunt, atq; hæc in uino macerantur.

Tertia iniectio.

Myrhæ troglodyticæ, aloes, thuris, singulorum unc. duæ, styracis unc. tres, mastiches unc. quatuor, opobalsami unc. sex, quidam & croci uino læuigati unciam miscent. præparato & hoc sicut comprehensum est.

Decamyron.

Spicæ nardi, phylli, euphorbij, piperis, costi, adarces, singulorum uncia, mastiches fescuncia, opobalsami unc. sex, nardini libra, ceræ lib. tres.

Pentamyron.

Styracis uncia, mastiches unc. duæ, ceræ albæ unc. tres, opopanacis unc. quatuor, nardini unc. quinque.

Euodes, à grato odore dictum.

Croci, aloes, mastiches, absinthii, styracis, cœnant hæ, casami, caryophylli, singulorum unc. tres, nardi libra, ceræ tantundem, melini unc. sex, palmulæ, duodecim, uini quod satis est.

Baion.

Baion.

Cardamomi, cassiæ, ænanthæ, nardi gallicæ, balaustiorum, propolis, singulorum scrupula octo, herbæ sabinae, casami, amomi, singulorum scrupula sex, iunci rotundi floris scrupula octodecim, iridis scrupula quatuor, caryophylli sesquiscrupulū, suffiminis Crinati unc. duæ, thuris, myrrhæ, singulorū uncia, ladanū unc. sex, bdellii, mastiches, aloes, nardi, olei lentiscini, singulorum semuncia, resinæ acernæ quæ zygia dicitur, resinæ piceæ, resinæ terebinthinæ, singulorum unc. tres, opobalsami uncia, guttæ ammoniaci scrupula sex, ceræ unc. sex: ænanthino liquida læuigantur, aridaque tontuta in alio exemplari piperis quoque scrupula octodecim inuenio: nonnulli & moschi scrupulum unum addunt.

Galenium.

CRoci semuncia, aloes uncia, mastiches tres unc. absinthii seminis scrupula octo, ænanthes tantundem, palmulæ maiores tres, ceræ unc. tres olei melini unc. sex.

Erythrium.

STyracis unc. quinque, malorum cotoneorum unc. uiginti, masuchæ uel masuphii, croci, singulorum drach. decem, psichæ, cyphios, singulorum drach. quinque, ænanthæ unc. duæ semis, casami, absinthii, singulorum drach. decem, caryophylli scrupula quindecim, guttæ ammoniaci scrupula decem, opobalsami scrupula sex & semis, nardi unc. quinque, resinæ colophonix, gleucini, melini, singulorum unc. decem, rosacei drachmæ decem, propolis unc. quinque, resinæ terebinthinæ unc. decem, mellis cochlearia decem, phylli drach. decem, spicæ nardi tantundem, ceræ unc. septem & semis: uino falerno aut amaro conteruntur.

Malagma Nili ad lienem, omnemque duritiem.

Ceræ pondo, guttæ ammoniaci pondo, olei cyprini pondo, croci semuncia, secundum alios unc. aceti quantum satis est.

Citrinum.

Ceræ resinæ, colophonix, singulorum libra, suffiminis ammoniaci, auripigmenti, calcis, aluminis, aceti, singulorum cyathi octo, læuigantur arida in aceto.

Malagma

Malagma quod ad Cureum autorem refertur.

Picis aridæ libra, ceræ, resinæ piceæ, guttæ ammoniaci, nitri, baccarum lauri aridarum, seu taurini, singulorum lib. duæ farinæ fœnugræci sextarius, pollinis frumentacei tantundem, chamæleontis nigri radice sicæ libra.

Malagma ex stercore caprillo Oribasii, ad lientos, hydropicos, & iecur in duratum.

Cypri, aut vetustissimi olei lib. tres, ceræ lib. duæ semis, si mi caprarum, baccarum lauri cortice detracto, iridis illyricæ, singulorum sextarii decem, resinæ terebinthinæ libra, sinapis, nitri, cyperi, raphani seminis, capparis radice corticis, singulorum unc. tres, cucurbitæ sylvestris carnis unc. duæ, fœnugræci uncia: interim arida excipiuntur liquidis, interim aceto macerata: quod si alius profluat, cucurbita iniici non debet.

Ex fimo caprillo sphongion, hydropicis efficax.

Picis brutæ lib. duæ semis, nitri libra una, cucurbitæ sylvestris carnis, pyrethri, opopanacis, cocci gnidii, singulorum unc. tres, capparis radice corticis, thuris, iridis, adpis taurini, elæterii, squamæ æris, apii seminis, lathyridum, singulorum unc. sex, baccarum lauri sextarii dimidium fœnugræci farinæ semina, fellis taurini unc. duæ, olei cyprini sextarii dimidium, ceræ libra, resinæ frictæ lib. tres, caprilli stercoreis montani, cachrys, cyper, cardamomi, singulorum unc. sex.

Ex baccis lauri.

Ceræ, resinæ, picis, baccarum lauri, seu taurini, singulorum libra, nitri, guttæ ammoniacæ singulorum unc. sex, aceti quantum sufficit.

Medicamentum dia spermaton, hoc est, ex seminibus.

Cardamomi, cyperi, herbæ sabinæ, nitri, baccarum lauri, cassiæ, sertulæ campanæ, fœnugræci, nardi gallicæ; apii seminis, sampsuchi, anisi, panacis radice, thuris, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, singulorum unc. tres, mellis, ceræ, nardi, singulorum libra, seu taurini tantundem.

Malagma à fædo odore dysodes dictum, ad pleuriticos.

Resinæ piceæ libra ceræ, rutæ uiridis cyprini, singulorum uncia sex, sulfuris uiui, opopanacis, sagapeni, singulorum drach,

drach. quatuor, nonnulli & galbani tantundem addunt.

Malagma dia sampsychu.

CEræ pondo, resinæ terebinthinæ pondo duo, sampsuchi, bacarum lauri, scœnugræci, singulorum sextarius, nardini quod satis est.

Malagma apollophanis ad iecorosos.

CEræ drach. octoginta, resinæ terebinthinæ, mannæ thuris, singulorum drach. quadraginta, mortario irini sedimento uncto contunditur.

Copton ad duritiem Stomachi & iocinoris.

Propolis unc. sex, styracis unc. duæ, mastiches uncia, resinæ terebinthinæ semuncia, fecis nardini quantum satis est.

Malagma ex ænanthe.

OEnanthæ, aloes, croci, acaciæ, aluminis scissilis, rosarum siccarum, absinthii succi, gallæ, omphacii, thus syriaci, mannæ thuris, singulorum drachma olei myrtei, ceræ, utriusque libra, palmulæ magnæ quinque, uini quod sufficit.

Antylium.

Aluminis scissilis semuncia, aloes uncia, mastiches scrupulum, ænanthes scrupula, sex, omphacii scrupula octo rosarum siccarum tantundem, rhu syriaci scrupula decem, spinæ Aegyptiæ totidem, balaustiorum scrupula uiginti, gallarum scrupula quindecim, ceræ unc. quinque, olei melini quod sufficit.

Malagma ex uinaceis, dia gigarton dicitur.

CRoci, sandycis, labruscæ, singulorum uncia, aluminis sicci unc. quatuor, balaustiorum, omphacii, rosarum floris, myrtorum siccorum, singulorum unc. duæ, ceræ albæ libra, olei melini lib. duæ, malorum cotoneornum unc. quatuor, dactyli qui nycolai dicuntur decem, uini aminæi quod satis est, uinaceorum aridorum unc. octo in usu, medicamenti unciis tribus ceræ unam misces.

Anethine.

ANethi uiridis unc. sex, sertulæ campanæ unc. duæ, chamæmeli tantundem, capitum papaueris uiridium decem excoctorum iuris lib. tres, & olei quod sufficit: ubi uerò consumptum fuerit ius, adipis suilli recentis lib. duæ adduntur, tritisque priuatim scilicet tostæ interioris unciis duabus & medul-

læ ceruinæ totidem, omnia miscentur.

Ambrosia ad febreis arcendas apta.

ARgenti spumæ libra, adipis suilli recentis unc. sex, lini feminis succi tantundem, ceræ albæ uncia nouem, rosacei libra, mellis unc. tres, croci uncia, nonnulli etiam ouorum decem lutea cruda addunt.

De acopis, inunctionibus, dropacibus, & sinapismis. Cap. XIX.

ACopa inde nouem sortiuntur, quod præcipuè ad lassitudinis, quæ copos græcè dicitur, nempe tensuæ ulcerosæ & eius quæ ossa defatigat, sensum cōueniāt, quam aliis quoq; morbis compluribus sint ex usu. † Alia liqui dem ipsorum calefaciendi uim habent, alia emolliendi. Quæ calefaciunt, pipere, pyrethro, semine rorismarini, & consimilibus constant neruorum uitiiis, perfrictionibus ualidis & quæ uix ullo calore possunt euinci, accommodata. Quæ emolliūt, durities, scirrhus, & infarctos articulorum sinus discutunt, quorum materies capite de emplastris comprehensa est. At emollientibus quæ adarce, semine rorismarini euphorbio, cocco guidio, & id genus aliis componuntur, in diu turnis affectibus, & qui ægrè possunt elidi, quibus etiam sinapismus congruit, utimur. Porro spissitudinem uniuersa acopa inter cerata, & emplastra mediam habere conuenit. Vnguina uero acopis similia, liquidiorē propemodum substantiam obtinent. At dropax duplicem recipit præparationem hanc emplastro, illam malagmati consimilem, nonnulli & calidum ipsum illi nunt: materiam uerò acopis & emplastris confinem. Ceterum usum cataplasmatīs exhibet, diuturnis affectibus iisdem quibus & sinapismus, utilis, ideoq; ante illum assumitur, quo corpus sinapi reddatur idoneum, à sinapismo adhibetur, ut affectus reliquias discutiat. Sinapismus materiam quidem uariam non habet, uerum diuturnis potissimum affectibus post deprehensam probatamq; aliorum præsidiorum uim, efficacissimus est, utilissimè autem applicatur capiti in eius dolore, quem cephalæam dicunt, & quum altera duntaxat ipsius pars affligitur. Græci heterocraniam uocant, in morbo comitiali, uertiginibus, & insania: pectori autem in suspirio, orthopnœa, hoc est, quū non nisi recta ceruice spiritus trahitur, & tulli lōga. At in diuturna

diuturna humorum è capite in fauceis destillatione, & caput & thorax sinapi oblini debet. Item stomachus & uenter, in longis isporum morbis eodem obducuntur. Iam conueniens est præsidium sinapi coxendicum & podagricis doloribus, omnique parti resolutæ, aut alio quodam modo perfrictionem expertæ, ut difficulter exalheri possit. At tunc profecisse satis id putato, ubi dolor subsequutus fuerit ualidus & caro liuidior at tiorque, euaserit, & postquam ablotum fuerit, mitius pustulæ eruperint. Quòd si etiam sensus perierit, animum adhibere ne gotio conuenit, parte quam oblineris sæpius detecta: nam si uel immodicè adurantur ita affecti non perferunt. Præterea in acutis morbis, utpote lethargo, profunda in somnum delatione (cataphora dicitur) & catocho, sinapi inducitur, per initia quidem, cruribus, ubi uerò materia radices egerit, capiti. Porro qui ita frigori patuerunt ut uix ullo modo queant incallescere, iis crura & inguina sinapi oblinuntur. In his autè qui continua febre laborant, ulcusque habent, tum in cartilaginosis, tum locis excarnibus, uitari debet sinapismus: nam partes carnibus uacuas si obducantur sinapi, uruntur, interim etiam nigrescunt.

† Hæc uerba ita leguntur in nostris codicib. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐπὶ δεσμωτικὰ τὰ δὲ μαλακτικὰ τὰ δὲ ἀμυκτικὰ. Oroscius tamen legendum putat ἀμυκτικὰ.

Bromion acopon.

CEræ, resinæ colophonix, singulorū libra, adipis suilli unc. quatuor, butyri unc. sex, althææ, scænuigræci, seminis lini, singulorum lib. duæ, olei libra, galbani unc. duæ & semissis, ex cocto succo cum oleo, quousque magna illius pars fuerit absumpta, reliqua cum cera & galbano adiiciuntur.

Acopon à uarietate pæcilon dictum.

SVcci althææ, scænuigræci, seminis lini, rutæ, cumini, singulorū lib. duæ, medullæ ceruinæ, olei ueteris, adipis anserini, opobalsami, nardi, singulorum libra, ceræ, colophonix & resinæ, singulorum sesquilibra, euphorbii, resina terebinthinæ, opopanaxcis, singulorum unc. sex, castorii unc. tres, herbarum unde succus exprimitur, singularum libra iniicietur: coques ut superius

Acopon Azanitzæ.

ADipis suilli lib. duæ, seui taurini, resinæ colophonix, hyssopi in medicamenti, ceræ, singulorum libra, galbani unc. tres.

Acopon

Acopon Basilij .

Altheæ, chamæmeli, fertulæ campanæ, lini seminis fœnugræci, singulorum sescuncia, amomi unc. tres. hæc macerantur in uini Alcalonii aut Cilicii sextariis octo, per triduum, coquunturq; ad melleam spissitudinem, deinde succi lib. quinque cum olei ueteris libris quatuor & semisse decoquuntur, quousque modicum succi fuerit relictum, adiciuntur butyri unc. sex, resinæ terebinthinæ unc. quatuor adipis anserini unc. quindecim, medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ unc. quinque, ceræ albæ lib. tres.

Lysiponium .

Piperis, castorii, styracis, mastiches, aloes, inulæ campanæ, iridis, singulorum unc. quatuor, euphorbii, costi, guttæ ammoniaci, myrrhæ, sampsuchi, thuris, cyperi, cassiæ fistulæ, semen rorismarini, singulorum nnc. tres, adarcæ, amomi, bdellii, xylobalsami, singulorum unc. duæ, malabathri, spicæ nardi, pyrethri, croci, singulorum uncia, opobalsami, libra, nardini, cypriini, gleucini, singulorum lib. duæ, ceræ libra.

Acopon à fædo odore dysodes appellatum, ex opere de compositione medicamentorum secundum genera.

Ceræ, resinæ, terebinthinæ, singulorum drach. uiginti quatuor, galbani, suffiminis ammoniaci singulorum drach. sex, olei ueteris heminæ duæ, medullæ ceruinæ drach. octo, aut tor mero & diluto.

Aliud dysodes .

Resinæ terebinthinæ drach. sedecim, ceræ drach. uiginti octo, æsypi, mellis, singulorum drach. sex, medullæ ceruinæ unc. sex, stillæ ammoniacæ, galbani, aphronitri, baccarum lauri, singulorum unc. sex, olei ueteris sextarius, uini cyathi duo, quidam etiam castorii drachmas treis admiscunt.

Barbaricum, dia euphorbiu, ad coxendicum dolores, & alia pleraque .

Opopanacis uncia, ceræ tyrrenicæ libra, resinæ terebinthino libæ duæ & semis, galbani uncia, stillæ ammoniacæ uncia duæ, euphorbii, castorii, piperis albi, singulorum uncia duæ, medullæ ceruinæ unc. quatuor, æsypi tantundem, lemnæ stidis (est autem adarcæ) semuncia, olei styracini, laurini, irini, amaricini,

amaricini, singulorum unc. sex, olei ueteris lib. duæ, hedicroi uncia sex.

Acopon cui nomen est pycis.

Refinæ colophonix sesquilibra, refinæ terebinthinæ uncia, octo, guttæ ammoniaci unc. tres, thuris unc. nouem, olei ueteris lib. duæ, succi lini seminis libra, lactis uaccini tantundem, adipis anserini unc. sex, butyri unc. octo, ouorum uiginti quatuor albumina, præparatum buxeo uase reponitur.

Acopon ex abiete Galeni.

Abietis seminis cocti modius Italicus, hoc est, sextarii duodecim, olei lib. quindecim, ceræ lib. quatuor, refinæ strobilinæ aut terebinthinæ unc. quatuor. Contusum abietis semen, oleo iniicitur. Vbi quadraginta diebus in eo sueris, expressum proiicito, mixtis reliquis utitor, ad labores spontaneos, resolutiones, & articulorum perfrictiones. At si necessitas urgeat, coquere oportet semen abietis cum oleo mixtum ne nimium aduratur, & aquæ sextariis quatuor, idque in podagricis & articulariis affectibus.

Aliud ad idem.

Olei heminæ uiginti quinque, id est, sextarii duodecim & semis. fructus abietis modius, hoc est, libra semis, refinæ abiegnæ lib. tres, strobilinæ uel terebenthinæ lib. tres, ceræ libra.

Acopon ex nigra populo, dia ægyros dicitur, ad eadem.

Loco fructus abietis, nigræ populi fructus æqua portio additur, & reliqua similiter illi præparantur.

Vnguentum zosimi ad tremulos celebratum.

Refinæ piceæ unc. sedecim, ceræ unc. quatuor, olei ueteris libra, opopanacis unc. duæ, adarcæ uncia, euphorbii tantundem, nitri unc. quatuor, aphronitri teneri totidem: nitri, euphorbium, adarce cum uino læuigantur, deinde adiicitur opopanax, simulque in læuorem teritur, scorsim autem quæ liquari possunt, cum anchusa ad colorem accipiendum eliquantur, refrigerata excipiuntur.

Dropax Gallus, Oribasii.

Refinæ colophonix quæ thus redolet, piceæ & lignosæ dictæ quæ sola in Italia nascitur, apochymatis, picis aridæ, ceræ, singulorum lib. quatuor, refinæ frictæ unc. quindecim, pi

cis brutiæ lib. duæ, nitri libra, bituminis, galbani, adarcæ, pyrethri, singulorum unc. sex, opoponacis, euphorbii, ueratri albi, piperis, singulorum unc. quatuor, sulfuris uiui unc. tres, castorii, ammoniaci, uuæ passæ syluestris staphis agria dicitur, singulorum unc. duæ, olei sicyonii libra opobalsami unc. sex.

Aliter simplex.

CEræ pondo, picis siccæ pondo, picis brutiæ pondo, resinæ picis sesquipondo, frictæ pondo & quadrans, loco prius nitro exterso imponitur.

Quomodo sinapismus fiat.

FIcus siccata pridie in aqua tepida macerari debent, die insequenti probè expressæ ualenter læuigari, deinde acre sinapi, cuiusmodi est syriacum ægyptiumque priuatim conteri, diluto illarum affuso, factaq; massa admisceri, & siquidem uehementem sinapismum uoluerimus inducere, parteis duas sinapis cum una ficuum temperabimus: sin imbecillem, e contrario: si mediocrem, æqualeis. Cæterum sinapi antequàm detegatur, aceto commadescens, ut nonnulli factitant, languidius euadit. At sinapi ablato, etiam balneum utile est. Si dolor uehemens ruborve accesserit, & pustulæ, linteolum succo maluæ aut fœnugræci cum rosaceo madefactum imponemus, deinde rosaceo cerato cum cerusa utemur. Verum in resolutis in quibus sensus labefactatus est, cura adhibetur, ut sæpius partem retegamus, inspiciamusq;: Quum enim admota non percipiant, sæpe immodicè exusti sunt. Item caprarum fimus cum aceto illitus sinapi est efficacior, & præsertim in coxëdicū doloribus.

Acopon ex atramento librario, cutis ruborem peculiariter inducens, idque potissimum in ijs, quibus altera capitis pars dolet, ex commentarijs Alexandri.

EVphorbij, atramenti libratij, singulorum drach. quatuor, myrrhæ troglodyticæ, crocomagmatis, piperis albi, singulorum unc. tres, croci drach. duæ, aceti quod satis est ad hæc probè læuiganda, utque spissitudo sordibus similis ipsi fiat: quo facto illines, à media superciliorum parte incipiens, ad usq; tempora tota, præsertim si æger pilis careat: ubi refrigerata fuerint rursus illines: & quum præsidium bene profecerit, in balneum hominem deduces.

*Quomodo diuersa olei & unguentorum genera
conficiuntur. Cap. XX.*

Inunctionum unguentorumq; uel olei generum quæ unguenta repræsentet, alia sunt simplicia, una olei specie iniecta, alia composita ex pluribus conflata. Ac simplicium alia ex floribus oleo incoctis efficiuntur, uerbi causa, rosaceû, chamæmelinum, lulinû. Quædam ex fructibus, & seminibus conficiuntur: quædã ex surculis quibusdã nempe rutæ, qui etiã simul cum oleo coquuntur. At cû nullus florum coctione recipiat, insolantur potius. uerû si ualidam odoris gratiã repræsentent, & pluribus diebus constantẽ, ex insolatu tenuius ipso rum oleû magisq; utile redditur, quemadmodû rosaceû & chamæmelinum. Qui inualidiores sunt faciliusq; diffari possunt, minus insolatum tolerant, ut quorum uirtus promptè euanescat, utpote lilium & uiola. Ex iis quæ fructibus & seminibus cõstant nõnulla illis integris oleo iniectis conficiuntur, ueluti melinû, nonnulla contulis uel læugatis, oleamine ipso se questrato, uel expressis ipsis in cõchulas: uel ex aqua calida, sic ut ipsa discernantur, exempli causa, caryinon, sesaminû, amygdalinum, lentiscinum, laurinû, ricininum, raphaninû, atq; eius notæ alia. Porro quæ ex stirpibus odoratis componuntur, præparari potissimum solent, illis, oleo incoctis cû uino uel misto, uel aqua, atq; eisdem deinde exemptis. Liquoribus autẽ quibusdã oleo temperatis, interim & adipibus uel medullis, ex huiusmodi aliquo exactam olei spissitudinẽ sortita, simplicium sermone unguenta uel inunctiones nominantur, ut gleucinum, nardinû, sicyonium & cyprinû. Sunt quæ acopa crassitudine repræsentent, ceram aut resinã aut eiusmodi quippiã recipientia, uocanturq; myracopa, ueluti decamyron, amaracinû, atq; his similia. Iam uerò aliqua una uice coquuntur, quæ non diuersam recipiunt materiã, sicuti metopion, mastichinum, sicyonium: aliqua duabus tribusue, & quatuor iniectionibus. Primum contumacioribus incoctis, ut aspalatho, spatha, thure arbore, lauro: inde aromatis, phyllo, spica nardi, amomo, herbasabina: postremo liquoribus, adipibus & medullis. Si autẽ eueniat, cera quoq; & resinis inditis. At balsami liquor neutiquã coquitur, sed post absolutam coctionẽ unguento mediocriter refrigerato instillatur. imò ex ipsis unguentis sunt quæ nullã coctionem

coctionem recipiant, sed tantū misceantur, quale est mendesium. Nonnulli uerò uiride unguentum reddere cogitantes, ubi ab igne sustulerint, in olei sextariū intingunt, æruginis rarsæ in exactum detritæ læuorē sescunciam immiscentes, quemadmodum in cyprino & amaracino. Cæterum simplicia quidem unguenta specierum quæ in ipsa mittuntur, naturam uel eorum ex quibus contusis facta sunt, obtinent, ut oleum ueluti materiæ rationem obtineat. At quæ uariam magis cōpositionem sortita sunt, tota eorum natura ad calidum inclinata est, sed quædā ualide calefaciunt emolliuntq; , ut etiam articulis recenti cicatrice obductis & sinibus eorum infarctis conueniant, ueluti metopium, mendesium, marciatum: mediocrius autem est pentamyron, quemadmodum decamyron ualētius ut etiam summa rodāt: mediocriter autem calida tenuiaq; dico. At uerò modicè calida extenuant leniunt & concoquunt, quale est sūsinum, amaracinum, irinū, crocinum, foliatinum. Alia præterquàm quòd calefaciunt, abundè siccant inciduntq; ueluti cyprinum & sicyonium. Alia calefaciunt quidem insigniter, sed uires magis confirmant, unde stomacho potissimū & uisceribus resolutis comperunt, qualia habentur mastichinum, nardinum, & gleucinū. Valētius adhuc corroborat, quod ex uua acerba conficitur. Iā nonnullis unguentis ob gratum duntaxat odorē utuntur, ut foliato, spicato, cōmogeno & quæ moschelæ, quasi dicas, ex musco & oleo cōfecta nuncupantur.

Rosacei confectio.

Rosarum rubrarum detractis unguibus marcescentium die nocteq; una, unciz tres, olei omphacini sextarius, urna diligenter constricta ne perspirent, insolabis sub dio diebus quadraginta, atque sic repones non in pauimento, sed assere. Aliqui uero uice insolatus in puteum urnam diebus quadraginta mittunt, ut ex frigiditate odoris gratia conseruatur. Alii uero ipsam sub terra defodiunt.

Chamæmolino.

Chamæmeli floris sine albis foliis marcescentis, per diem noctemque unam olei sextarius Italicus. uasē lintheo simplici contexto ut perspiret, insolatur, idque diebus, quadraginta, inde securè hoc percolatum repones.

Anethinum.

A Nethi uiridis comæ arefactæ uncia, olei dulcis sextarius Italicus. Simili modo insolantur, fiet autem & pio temporis ratione anethinum cum insolatus desideratur, sicci enim anethi comam decoquentes cum oleo in cacabo utuntur, & chamæmelino similiter: uerum hæc imbecilliora sunt iis quæ ex uiridibus fiunt & præsertim insolatis.

Liliaceum alijs susinum dicunt, quod in Susis forsan reperiatur.

F Olorum alborum liliorum similiter marcescentium unciarum duæ in olei sextarium Italicum, coniectæ exactè circumstringuntur, ne euaporent, & per triduum insolantur, inde primis exemptis proiectisque, aliæ duæ unc. iniiciuntur per triduum subsequens, atque sic reponuntur.

Susinum compositum.

O Lei sextarii tres, calami odorati lib. quinque, myrrhæ unc. quinque, cardamomi lib. tres, lilij foliorum unguibus ablatis arefactorum libra, cinnamomi unc. tres, croci cilicij unc. quinque: tota confectio tribus injectionibus distinguenda est. Primum myrrha & calamus odoratus, unum ad dies quinque macerata ter die mouentur, inde oleo modicè incoquantur, deinde cardamomum aqua maceratum triduo mouetur similiterque; rursum cum oleo ad horam unam incoquitur, inde exemptis illis tertiam liliorum partem oleo puro inferemus, tribus diebus post his quoque exemptis reliqua liliorum tertia portio immittetur, iterumque post triduum exemptis proiectisque primis, postremo tertia pars cum croco læuigata iniicietur. Secundum alios tres dies ablato oleo cinnamomum contusum indetur. Huius in uicem, Arnabo, aut carpesium, aut cassiæ duplicatum, atque reponetur.

Violaceum.

V iolaceum præparant, modò purpurearum, modò crocearum, modo candidarum uiolearum foliis ungue defecto, trium unciarum pondere coniectis in olei omphacini sextarios quinque Italicos: circumstricta exacte, ne perspirent, ad dies decem insolantur, tertioque eadem mutantur ad triduum, quemadmodum lilia: ad repositionem autem pauca iniiciunt exactè arida.

Melinum.

Melinum.

HOc efficitur ex malis cotoneis extrinsecus panniculo involutis, & in frusta cum suis corticibus dissectis, deinde unciis ternis illorum, in decem olei omphacini sextarios Italicos coniectis, atque quadraginta dies insolatis.

Sesaminum.

Sesaminum oleum fit, contusis uel læuigatis sesamis, expressisque per fiscellas in cochleis, oleo ipso ceu in aqua calida segregato, uasisque uitreis reposito.

Raphaninum.

Eodem modo fit raphaninum in Aegypto, ex semine raphani qui tenuem radicem habeat contuso segregatoque.

Ricinum siue cicinum.

HOc quoque similiter in Aegypto fit, ex semine ricini qui croton dicitur, pari modo contuso aut læuigato.

Aegirinum.

Verno tempore oleum fit Aegirinum; hoc est, ex nigra populo, quum resina circa semen copiosa existit: etepim grana populi contusa unciis quatuor in dulcis olei sextarium immittunt, diebusque quadraginta insolant, uel horis tribus in lebetecoquant, atque sic exempta reponunt.

Amygdalinum.

Conficitur hoc quoque sicut prædictum, amygdalis anariis uisisque puris, contusis, aqua modica irroratis separatisque, ut comprehensum est: Nonnulli tusa amygdala unciis duabus, dulcis olei sextario Italico immissa, in cacabo decoquant.

Amygdalinum, quod & metopion dicitur.

AEgyptii huius olei inuentores metopion ipsum nuncupant, quod galbanum recipiat: germen autem unde galbanum nascitur, metopion appellatur. Hæc recipit, olei omphacini sextarios uiginti, amygdalarum amararum libras duas, cardamomi libram, iunci rotundi floris, calami odorati, carpobalsami, singulorum libram, myrrhæ, galbani, singulorum uncias sex, resinæ terebinthinæ, libras duas, uini odorati ad arida imbuenda sextarios quatuor, mellis attici libras treis: resinam & galbanum in læuorem redacta ex olei parte soluta, reliquis incoctis adiciemus, necnon ipsum mel: Mixta uerò accuratè omnia

ab igne tollentes, quum tepidum est medicamentum eximimus, nam refrigeratum concrefcit.

Balaninon.

BAlaninum oleum perinde ut simplex amygdalinum præparatur, ex querneis glandibus.

Caryinum.

HOc quoq; ut fupra dictū ex uetuftis nucibus conficitur.

Laurinum.

PVrum quidem laurinum fimili ratio ne & lauri fructu confit, mixtum uerò hæc recipiet: maturarum oliuarum sextarium, cū duobus baccarū lauri mifcemus: terūtur omnia exprimunturq;. Nonnulli æqualē amborum portionem mifcent.

Lentifcinum.

LEntifcinum oleum laurini modo ex lentifci femine conficitur, idq; bifariam & per fe, & cum oliuis immaturis.

Maftichinum.

MAftichinum fimpliciffimū quidē fit, chix maftiches uncia, omphacini olei sextario Italico immiffa, excoctaque in cacabo. Nonnulli uerò abfinthii & ftyracis, fingulorum unciam adiungunt.

Maftichinum magis uarium.

OLei sextarii quinquaginta, inulæ cāpanæ libræ quinq;, xylobalfami libræ decem, iunci rotundi floris libræ quinq;, cardamomi libræ feptem, maftiches libræ quinq;, xylomaftiches libræ octo, refinæ terebinthinæ libræ tres, abfinthii comæ libræ, uini odorati sextarii quinq;, aquæ sextarii decem, arida uino ante tertium diem macerata oleo mifcentur, & aqua horis fex coquuntur, ac maftiche & terebinthina iniicitur: accuratē mixta excipiantur: refrigerata transfunduntur.

Sicyonium fimplex.

RAdix cucumeris fylueftris marcida duarum unciarum pun-
dere in olei sextarium Italicum mittitur, atque in lebece coquitur, fitq;ne ficyonium.

Sicyonium compositum.

OLei sextarii decem, cucumis fylueftris radice derafæ pondo, ferpylli, fertulæ campanæ fingulorum uncia fex, tedarum piceæ pinguium, althææ fingulorum uncia quinq;, fco-
lopendrix

Iopendriæ uncia sex, fœnugræci sextarii duo. Fœnugræcum aqua primum die uno prius commadescet, deinde exemptum inditur commemoratis unâ cum oleo, & uini sextariis duobus omnibusque incoctis adiiciuntur medullæ ceruinæ cum momento olei læuigatæ uncia quatuor, adipis gallinarum totidem, rursus exceptum oleum in aliud uas transfunditur. Nonnulli ipsum post coctionem diebus quadraginta insolant.

Aliud sicyonium efficacious.

E Laterii succi sextarii tres, aristolochiæ rotundæ & longæ, styracis, inulæ cāpanæ, hyssopi, iridis, cucurbitæ syluestris, pulegii, origani, cyperi, thuris arboris, centaurii, foliorum lauri, singulorum uncia duæ, olei sextarii quinque. Mistâ incoquâ to dum parum succi relictum fuerit.

Cyprinum ex commentarijs Posidonij.

O Lei sextarius, iunci quadrati, inulæ campanæ, iridis, singulorum libra, sampsuchi, hyssopi, uiridis seminis elelisphaci, singulorum uncia tres, iunci quadrati floris libra. Reliqua omnia pridie in uino macerata coquuntur cū oleo horis sex. Excepro oleo puro, iuncus quadratus inicitur. Siquidem adsit uiridis cum teneris uirgultis non concisis, sin minus, certè aridus contusus cum aquæ momento coquetur sesquihora. At si uoles ipsum tingere postquā ab igne fuerit ablatum, indico æruginis puræ sesquilibram. Posidonius autem acrimoniam æruginis uitans, à coctione (inquit) triduū dimittes oleū in cacaobo bene humido, & tingetur ita ut uirtus ipsius nō offendatur.

Alia scriptura cyprini.

Cyperii foliorum, lauri foliorum, iridis, cyperi, elelisphaci, singulorum quadrans, thuris arboris, aristolochiæ longæ, uiridis seminis, singulorum triens, inulæ campanæ, aspalathi, singulorum uncia sex, rutæ uncia duæ, cupressi uncia duæ, olei sextarii decem. Hæc prius uino madefacta, incoques oleo. ubi exemeris iniice, rursus xylobalsami, xylocaflia singulorum uncias quatuor, sampsuchi, cumini, myrti, styracis, malliches, singulorum uncias tres, opopanax uncias duas, iunci quadrati floris uncias sex, æruginis unciam.

Amaracinum.

I Nulæ campanæ pondo, xylobalsami libræ uiginti, cyperi libræ octo, iunci rotundi floris, aspalathi, herbæ sabinae singulorum

singulorum libræ octo, opopanax, amaraci seminis singulorum libræ duæ, olei primi meriti sextarii duo, uini odorati sextarii quinque. Alia omnia superius dicta primum injectionem habent uino prius macerata, secundam herba sabina, atque illa quidem horis sex incoquantur. hoc autem tribus nonnulli etiam hoc tingentes æruginis uncias tres iniciunt.

Irinum.

IRidis, aspalathi, cyperi singulorum libræ quinque, opopanax uncia tres, anchusæ unc. duæ, olei sextarii triginta, aquæ sextarii quindecim. Sunt qui adiciant iunci rotundi floris uncias sex, cassiæ uncias tres, xylobalsami uncias sex, nardi galliæ, tantundem, omnia confusa aqua pridie macerantur, inde oleo diebus quinque incoquantur in lebetes ad sex horas: reponiturque unguentum.

Crocinum, in quo & alterius crocomagmatis confectura explicatur.

OLei omphacini odorati libra, calami odorati, myrrhæ troglodyticæ singulorum uncia quinque, cardamomi uncia septem, croci cilicii uncia sex primum iniciatur calamus & myrrha uino læuigata, & ante unc. modo reposita, piperis albigrana quadraginta, myrrhæ troglodyticæ drachma, tunsa, cribrataque teruntur rursus in mortario adiecta olei nardini libra. ut autem medicamentum reddatur nigrius, nucum cortices combustos detritosque in mortario adiecto: inde opobalsami cochlearia tria, ceræ sesquilibram admisceto.

Ee ænantharijs.

Cap. XXI.

Non quod ænanthen, hoc est, labruscam habeant hæc, (nonnulli enim ne ænanthen quidem recipiunt) sed ex uino & flore liliorum nomen hoc sortita sunt. Vsus ænanthariorum apud quosdam odoris gratia duntaxat & delictiarum adhibetur, sic ut qui eis utuntur, à lauacro perfundantur: & mensæ ipsis per spongiam oblinantur. At apud eos qui rectè utuntur, etiam sunt præsidia tum in resolutis, tum in iis quos syncope premit, si roborantibus stomachi cataplasmatibus admisceantur. Item in iis, qui se à morbo præsertim febrili recolligunt, ubi lauacro egrediantur per totum corpus diffunduntur: naribusque admouebuntur, adhuc spirantibus. Trahitur enim in alium, & spiritum animale, uitalemque confirmat;

Adhuc

Adhæc utilia sunt ad morbum pestiferum uitandum, cum eius modi mutationem aer sullinet. Refertur autē huiusmodi unguentū ad Posidoniū authorē, à quo uocat̃ mesopotamenon.

Oenanthini confectio.

Cassia, myrrha, thuris, phylli, amomi, mastiches, costi, carpobalsami, opobalsami, singulorum unc. tres, styracis pinguis unc. quatuor, uini odorati aninxi, Italici sextarii decem contusa omnia, cribrataque, styracem uero minutim concisum composito in urnam oris ampli, cum folijs liliorum pridie refrigeratorum, è domo una in alteram & unguibus detrahis, sint autem lilia numero trecenta. deinde uinum adicitur, & opobalsamum, mista, commotaq; ante iniectionem, & constricto urnæ ostio quadraginta diebus insolantur. Balnei usus est in uirium ex morbo recreatione. Domus irrorabitur unguento, uasaque, & spongiæ intinctæ faciei admoventur.

Alia confectio, nostra.

Costi unc. tres, spicæ nardi, annabo, caryophylli, singulorū uncia, amomi unc. tres, cassiæ, ænanthes, calami, singulorum unc. nouem, styracis, opobalsami, singulorū unc. quatuor, lilia trecenta, iuni salerni sextarii decē. Simili modo pparatur.

De suffimentis & cyphi.

Cap. XXII.

Cyphis materia inter medicamenta quæ potuit dantur & antidota existit, usus est eius incensi ad odorem gratum conciliandum, quemadmodum & suffiminum. Interim naribus admouetur, ut destillationes ex capite in subiectas partes concoquat, grauedinesq; & obstructione liberet, purgetq; cerebri uentriculos, item pestilentialibus morbis euitandis. Iam per os quoq; assumitur, tum ad hæc, tum ac ea quæ pectori inhærescunt, concoquenda: necnon ad frigidiore iecoris affectus, unde & Cyphoide appellata Antidota ueteres inuenerunt. Miscetur autem compositis medicinis, præcipuè epithematis & antidotis.

Rosatum suffimen.

Costi, amomi, myrrha, cassiæ, singulorum uncia, styracis, chiaz, bdellij, conchulæ Indicæ, musci, ladani, singulorum drach. duæ, rosarum purarum uncia uiginti nouem, opobalsami modicum, uini quod sufficit.

Suffimen

Suffimen Iirinum, quod crinaton dicunt.

Liliorum ungue defecto libra, styracis primæ notæ, unc. nouem, spicæ nardi, uncia tres, costi, caryophylli, amomi, masticæ, conchulæ Indicæ combustæ, mellis, singulorum fescuncia, opobalsami uncia quinque, uini quantum satis est, læuigata coguntur in pastillos.

Cyphi magnum quod uocant solare, ex rebus triginta sex confectum.

Styracis, myrrhæ, ladani, aspalathi, inulæ campanæ, singulorum uncia sex, nardi gallici, phylli, cupressi seminis, guttæ ammoniaci, strobili, splanchni aut loco ipsius conchularum Indicarum maiorum, carpobalsami, singulorum uncia tres, cassiæ, iridis, seselis, sphagni, cyperi, cardamomi, calami odorati, singulorum uncia quinque, rosarum siccarum, croci, spicæ nardi, herbæ sabinæ, hastulæ regiæ radices (alii succi) singulorum uncia quatuor, lacaphthi, hoc est, piceæ corticis uel alterius cuiusdam arboris uncie nouem, costi, iunci rotundi floris, singulorum unc. duæ, iuniperi maiores quadraginta, minores quinquaginta, amomi, resinæ terebinthinæ, palmularum purarum singulorum libra, ficuû, siccatarû granis exemptis, uuarum passarum acinis ablatis, singulorum lib. duæ, mellis despumati lib. quinque. Posidonius etiam uini odorati sextarios treis adiicit.

Aliud cyphi, quod rebus uigintiocto constat lunare appellatum.

Bdellij, inulæ campanæ, singulorum uncie septem, iunci rotundi nunciæ duæ, sphagni uncia quinque, iuniperi minores quinquaginta, cardamomi, uncia quinque, aspalathi uncia septem, calliæ fistulæ uncia quinque, spicæ nardi uncia duæ, cyperi uncia quinque, hastulæ regiæ radices, herbæ sabinæ, singulorum uncia quatuor, cupressi seminis, nardi gallicæ, malabathri cum foliis, rosarum siccarum singulorum uncia tres, costi, croci, singulorum uncia duæ, ladani, myrrhæ, singulorum uncia septem, caricarum pinguium, uuarum passerarum, aciuvis exemptis singulorum libræ duæ, strobilorum uncia octo, resinæ terebinthinæ libra, styracis uncia septem, palmularum pinguium libra, mellis libræ quinque, uini odorati quantum satis est.

Confectio

*Confectio masuchæ, quod nonnullis masuaphion
uocatur. Cap. XXIII.*

MEliloti sextans, xylobalsami, aspalathi, herbæ sabinae, myrrhæ, amomi, iunci rotundi floris, foliorum lauri, myrrhæ stillatitiæ, styracis, calami odorati, sampschii, singulorum uncia duæ, iridis uncia quinque, phylli, croci, singulorum uncia, opobalsami semuncia, gummi libra, rosarum siccatum uncia sex, uini quantum sufficit.

Ex commentarijs Antylli, de pessis. Cap. XXIIII.

Pessi mulierum locis admoventur, cæterum generales ipsorum differentia tres existunt, alii siquidem emolliunt, alii astringunt, alii aperiunt. Emollientes inflammationibus uteri, exulcerationi, perfriktioni, strangulatiui, auersioni & inflationibus accommodantur. Fiunt autem ex cera tyrhenica, cyprino, susino, pinguedine anseris aut gallinæ, butyro infuso, resina deusta, medulla ceruina, fœnugræco & quæ sunt eius generis. Aperientibus utimur, quum purgationem suppressam irritate statuimus, aut uulvam conuenienter compressamve emendare. Præparantur hi ex melle, artemisia, dictamno, brailica, succo dulcis radiculae, porro, succo rutæ, scammonia, & similibus. Astringentes in contrarium aperientibus usum exhibentur, nam fluxum muliebrem cohibent, & adpertum contrahunt uterum, prolapsumq; reprimunt. Materia uerò astringentium prius in capite de collyriorum etiam modo comprehensa est. Cæterum conuenit pessi crassitudinem instar strigmenti & paulò spissiore facere, deinde lanam linamento tortilli similem, duplicatam in medicamentum inctam ori uulvæ condere, sic ut stuppam prælongam habeat alligatā, quo pessus faciliè possit extrahi, quando usum fuerit.

*Pessus crocoides, ad inflammationes, auersiones,
duritias & inflationes.*

Ceræ albæ, medullæ uitulinæ, singulorum drach. sedecim, medullæ ceruinæ drach. undecim, adipis anserini drachmæ octo, adipis gallinæ drach. octo, mastiches drachmæ quatuor, hyssopi medicamenti drach. tres, mellis drach. duæ, croci drach. mæ octo, rosacei qd̄ satis est, crocus lacte muliebri læuigatur.

Pessus

*Pessus ab aureo colore diætus chrysos emolliens
laudatissimus.*

CRoci drachma, æsypi tantundem, medullæ ceruinæ drach. duæ, resinæ terebinthinæ, ceræ, adipis anserini, singulorū drach. tres, ouorum testorum lutea sedecim, irini & rosacei quod satis est ex æquo.

Passus libanius, menseis euocans & uulue uitijs singulariter accommodus.

NArdini unguenti unc. sex, ceræ tyrrhenicæ unc. quinque, fusini unguenti unc. quatuor, adipis sui illi recentis uncia tres, anseris & gallinæ adipis, medullæ ceruinæ, amaracini unguenti, singulorum unc. duæ, seni taurini, resinæ terebinthinæ, æsypi, singulorū uncia: lebece eliquant, omnesq; reliqui pelli.

Enneapharmacus.

Rosacei unguenti, ricinini, resinæ terebinthinæ, ceræ, mellis, adipis anserini & bouilli, medullæ ceruinæ & butyri par res portiones.

Titianus emolliens.

Ceræ unc. sex, resinæ colophonix unc. quatuor & semis, seni taurini unc. quatuor, guttæ ammoniaci tantundem: ammoniacum aqua soluitur.

Pessus Aegyptia.

Mellis, resinæ terebinthinæ, butyri, rosacei uel fusini, croci, singulæ partes: in quibus autem inflammatio abest, & sordidis, æruginis dimidiam addunt.

Gone ad concipiendum.

Butyri unc. sex, hyssopi medicamenti, medullæ ceruinæ adiectis anseris & gallinæ, resinæ terebinthinæ, aloes singulorum unc. tres, ceræ tyrrhenicæ unc. sex, rosacei lib. duæ, myrrhæ, castis, singulorū unc. duæ, spicæ nardi uncia, mellis quod satis est.

Quomodo medicamenta quæ emplastra ingrediuntur coqui debeant.

Argenti spuma.

IN medicaminum coctionibus argenti spuma cum oleo decoquatur. Conuenit autem læuigatam rursus ex oleo conterere, ut sordidum fiat spissitudo, inde leni igne continenter excoquere,

coquere, mouendo, initio igitur intumescit & in bullas attollitur: ubi uero iam ferè satis incocta fuerit, colorem facii similiorem recipit. modus coctionis est, quum à tumore subsidet, & manus non inquinat.

Plumbago.

Plumbago similiter argenti spumæ excoquitur, sed eo usq; dum non modo digitos nō inquinat, uerū etiam ex igneo colore in rufum & uehementer floridum elanguescat.

Aes crematum.

Aes crematum non protinus ab initio ad coquendum iniicitur, sed ubi emplastrum semicoctum fuerit. finis coquendi est quum color ipsius, nisi admodum exiguum indatur, superet, & emplastrum rufum efficiat.

Sori & diphryges.

Sori & diphryges demittuntur & ipsa inter coquendum lebeti: diphryges autem sicut & squama, eousq; coquitur dum colore reliqua uincat. sori peculiarem coctionis finem non habet, sed is omnibus communis est, ut emplastrum spissum redatur, digitosq; non inquinat.

Chalcitis.

Chalcitis incoquit æris modo, coctionemq; ipsius metitur inde si emplastrum fuluum magis & phœniceum euaserit.

Flos æris.

Aëris flos similiter æri coquitur, sed eo modo qui communis esse coctionis solet.

Atramentum sutorium.

Atramentum sutorium in media coctione emplastro inditur, coctum uerò uehementiorem eius colorem efficit, & si alia ei non resistent, nigrum.

Misy.

Misy postremò adiicitur, quamdiu autem coqui debeat, propriè definitum non est.

Auripigmentum & sandaracha.

Auripigmentum & sandaracha in coctionis fine iniiciuntur.

Plumbumustum.

Plumbumustum in media coctione adiungitur.

Cerusa.

Cerusa.

Cerusa in alba emplastra postremò mittitur, sic enim colorem conseruat, magisque albescit: iu nigra autem, principio: cocta enim largius, nigrescit.

Aerugo.

Aerugo uiridibus emplastris post coctionem iniicitur. In quibus neutiquam ollæ inditur, sed cum aceto detritæ ipsæ manentiq; in pila reliqua superfunduntur. In melinis emplastris, quum semicocta est confectio immittitur: nam moderatam consequuta coctionem, melinum quasi mali coctonei colorem efficit. ac in his quæ diprosopa, & dichroma dicuntur, per initia statim æruginem incoquimus. in quibusdam enim per coctionem primum melinum colorem inducit, qui duplicem repræsentat, postremò fuluum.

Alumen.

Alumen plerunq; secundum coctionem additur, peculiarem uerò coctionis modum nullum habet.

Minium, cadmia & pompholyx.

Minium in fine admiscetur, cadmia & pompholyx per initia immittuntur.

Sal nitrum, sulfur.

Sal & nitrum in medio coctionis, sulfur, in fine adiicitur, coctio autem ipsius emplastra nigrefacit.

Terra & lapides, pumex, conchylia.

Terram omnem & lapides plerunq; ad coctionis finem iniicimus, item punicem & conchylia combusta.

Oleum & reliqua pingua.

Oleum si quidem per initia fuerit iniectum, resine aut pici liquidæ emplastrum non spissescit, quare ubi crassa euaserint incocta, rectè indetur, reliqua uerò pingua salis expertia, iuxta mediam coctionem adiungere conuenit.

Vnguenta.

Vnguentum irinum coctionem quidem fert, sed cyprinum & rosaceum minus: reliqua neutiquam. quare ad finem coctionis immittenda sunt.

Cera.

Ceræ priuatim sola non coquitur, ut quæ aduratur, neque cum

cum resina liquida, aut pice liquida, non enim coit spissaturq; ,
uerum superiniicitur, uel oleo puro , uel oleo socum quodam
metallico incocto, aut resinæ, aut pici prius incoctæ , ac prius
quàm reliqua quæ possunt iniici spissescet .

Resina .

Resina arida, cum cera immittitur: liquida ante gr̃a alia ipsa
priuatim decoquitur, nisi admodũ paululũ eius assumatur.

Pix .

Pix ante reliqua omnia additur. Modus autem coctionis, li-
quidæ, dum inspissatur: aridæ , maximè dum amplius non
amplius inter coquendum ebullit, neque inturgescit .

Apochyma pix nauibus derasa .

Apochyma læuigatum cribroq; ab excrementis suis secre-
tum, emplastro posteaquàm coctũ fuerit, insuper igitur. Si
autẽ molle fuerit, cum oleo soluitur, sed prima ratio coquendi
exactior est, quod scilicet in secunda pondus non conseruetur.

Bitumen .

Bitumen inter initia iniectum coquitur, non autem id in læ-
uorem deterere oportet, quoniam asperitudines fici oliua-
rumque granis interioribus simileis, obtinet . Quapropter in
crassiores particulas confringendum est, coquendumq; in ace-
to, sic ut non agiteretur usque dum ebullire desinat . Ego uero
(inquit Timocrates) in oleo decoquens, uoti compos euasi .

Propolis .

Propolin emollire & discoquere oportet. siquidem à coctio-
ne ne utiquã diffunditur . At si & cerã emplastrum recipiar,
propolin cũ illa quẽadmodũ & galbanũ, contusam iniiciemus.

Ammoniacum .

Ammoniacum circiter mediam coctionem iniicitur. detritũ
uero si potest fieri & in tenuem redactum puluerem insper-
gere conuenit: sin minus, cum liquore quodam læuigatum ini-
ciat: si emplastrum cruentis uulneribus adaptabitur, cum ace-
to aut uino: si fistulis aut strumis omnino cum aceto: at si mol-
le futurum est, qualia sunt quæ ano accommodantur, cũ aqua,
inde in sordium spissitudinem coactum aliis refrigeratis infun-
dere, ne effruescat .

Opopanax .

Opopanax.

Opopanax multò post ammoniacum inditur: omnino autem paucam coctionem requirit. Idem etiam ex uino, acetove prius læuigandus est.

Galbanum.

Galbanum neutiquam coctionem tolerat, uerum emplastro ab igne sublato, quo spiffefcat, sic ut digitos non inquit, emollitum inditur.

Sagapenuum.

Sagapenum tunditur in pila, & teneriusculum redditum cum emplastro ubi ab igne sublato fuerit, emollitur.

Aloe.

Aloe secundum coctionem inspergitur:

Lachryma papaueris.

Lachryma papaueris pridie in aqua modica maceratur, inde in pila læuigatur, mox etiã emplastrum ei superfunditur.

Thapsia.

Thapsia inspergitur postrema, uel liquore quodã læuigatur.

Bdellium.

Bdellium in læuorẽ pertritum, emplastro ab igne iam sublato inspergitur: at si pingue existat & læuigari non possit, sagapeno similiter ipsum contusum, ac in emplastri figuram coactum, post coctionem simul cum emplastro molliemus.

Thuris lachryma, & manna.

Lachryma thuris & manna coctione iam absoluta insperguntur, in sordium spiffitudinem coacta ex melle modico, aut aceto, aut aqua aut uino, si emplastrum liquorem recipiat.

Myrrha.

Myrtha ubi iam coctio finita est, inditur.

Semina, radices, & herbae.

Semina, radices, & herbae nullã coctionẽ sustinent? læuigatis igitur & in pila etiamnũ subsistẽtibus liquida superfunduntur.

Qui ceræ modus cum oleo esse debeat.

Quod si unguina quæ Græci à leuãda lassitudine acopa appellant, conficere constitueris, oleũ ceræ quadruplũ
inmittes:

immittes : at si liquidum ceratum, ut in fracturis præparamus, duplicatum. Si medicamentum quod emplastri figuram habeat efficere cogitauerimus, portionem olei ceræ æqualem miscébimus, si aer ambiens moderatus extiterit : at si cera uetus aut squalida, aer frigidus fuerit, oleum paulò copiosius quàm cera erit : quemadmodum & si cera pinguis, aer existat calidus, paulò minor olei portio erit, paulum autem hoc, medijs in utramlibet partem excessus duodecima erit portio, etenim undecim & tredecim olei uncias, ceræ libræ admiscebis.

De medicamentis inuicem succidaneis ex commentarijs Galeni. Cap. XXV.

IN Alexandria (inquit) muliere quadam morbo periclitante cum quæsissem lichnidem, nec eius fuisset data copia, nisi protinus uice lichnidis usus fuisset acanthij semine, perijisset mulier. Vnde rogatus ab amicis ad hanc succedentiũ inuicẽ medicaminum expositionem ueni, secundum literarum seriem exorsus.

VICE Abrotani, origanum.

Abinthij, abrotanum.

Acanthæ, Cerasiorũ acanthus.

Acanthij seminis, lychnis.

Aconiti, radix iridis syluestris.

Acori, asari radix.

Actes, hoc est, sambuci, acantha.

Adianthij, aphroselinum.

Adipis uulpini, adeps ursina.

Adipis ceruini, adeps anserina.

Adipis suilli, adeps uulpinus.

Aeruginis ferri, excrementum ferri.

Aethiopicæ oliuæ, lachrymæ acaciæ partes duæ.

Agatici, euphorbium.

Agriostaphidis, hoc est, syluestris uuæ passæ, dactyli Syriaci.

Alicacabi, semen Solani.

Aloes. Galenus Agalochi, centaureum, & impressus Pauli

codex, aloes Indicæ. aloes uiridis folia uel glaucium, uel lycium, uel centaureum.

Aluminis, sal fossilis.

Amianti, aphroselinum.

Ammoniacy thymiamatis, propolis.

Ammoniacy salis, sal Cappadocum.

Amyli, aridus pollen.

Amygdalarum amararum, absinthium.

Anacardii, psylla herba.

Anchusæ, hyacinthus.

Aracis, hoc est Cicerculæ, sesamum.

Aristolochiæ rotundæ, aristolochia longa.

Argemones, seriphion.

Armeni lapidis, atramentũ Indicum.

Asbesti, hoc est calcis uiuæ, adarce

- Afij lapidis, Gagates lapis, uel
 sal ammoniacus crenatus.
 Aspalathi, hoc est bituminis, pix
 liquida brutia.
 Aspal hiericæ semen.
 Asphodeli radice, betæ succus.
 Auripigmenti sandaracha.
 B
 Balsami liquoris, myrrha stacte.
 Bdelli, spagnus aromaticus.
 Buccinorum, ostrea.
 Buprestis, blatæ pedentes.
 Butyri, lac bubulum concretum.
 C
 Cadmiæ, leucographis Aegy-
 ptia.
 Calamintha, menta syluestris.
 Calami odorati, sphagnus.
 Cantharidum, phalangia.
 Capparis radice, radix ericæ, uel
 myricæ.
 Cardamomi, cyperis ammo-
 niaca.
 Casiæ, cinnamomum.
 Castorei, blattarum pedentium
 intestina.
 Cedri baccarum, ladanum.
 Ceraunii, leucographis.
 Ceræ lomentum cum propoli
 coquitur, & contunditur.
 Ceruini cornu, caprillu cornu.
 Cerusæ, recrementum plumbi.
 Chamædryos, rumicis syluestris
 radix.
 Chamæmeli, Anthenis.
 Cicios, hoc est, ricini sordes pa-
 læstrarum.
 Cicutæ, semen coriandri.
 Cinnabaris, rhodocides.
 Cinnamomi, casia duplum.
 Clinopodii, heliotropium.
 Cnidii seminis, semen uiticis.
 Colocynthis, semen ricini quod
 est crotonis.
 Colophoniæ, apochyma, seu pix
 derafa nauibus.
 Comaræ, ammoniacum rhy-
 miaman.
 Coralli, moly.
 Costi, cedrinæ baccæ. Galeus,
 costi, ammoniacum, baccarum
 cedri, baccæ lauri.
 Coryledonis, anacardium.
 Crinanthemi, aphrodisum.
 Croci, crocomagma.
 Crocodyli adipis, adeps canis
 marini.
 Croconiaginis, aloë Indica.
 Cymini, semen brassicæ.
 Cymini Aethiopici, melanthium.
 Cynosbati, haliacabi semen.
 Cyperi, Iuniperus maior.
 Cypheos, carica cremata.
 Cyrenaici liquoris, syriacus li-
 quor.
 Cucumeris, anchusa.
 D
 Dauici seminis, semen sij.
 Distamni, saluia.
 Diphrygis, lapis phrygius.
 Dorycnii, semen alterici.
 Dracunculi, apobrotimum. Ga-
 lenus addit Damasonii, eryn-
 gium.
 E
 Ebeni, lotinum aridum.
 Ebisci radice, folia moti.
 Elaterii succi, eiusdem herbæ
 succus.

succus.

Elelisphaci, hoc est, saluiz, nepita.

Hellebori nigri, radix papyri.

Eneaphylli, potamogiton.

Ericæ seminis, gallæ omphacitis.

Erini foliorum fimus ciconiæ.

Erysimi foliorum herba lanaria.

Eruce seminis, erysimi semen.

F

Feculæ uini combustæ, sandaracha.

Fellis cameli, fel ascalabotæ.

Fellis muris aranei, fel cameli.

Fellis hyenæ, fel perdicis.

Fellis uiperæ, fel ichneumonis.

Fici liquoris, liquor mori.

Fimi palumbini, fimus colubæ.

Fimi Aluri, fimus ichneumonis.

G

Galbani sagapenum.

Gentianæ radices, apii odorati radix.

Glycyrrhiæ succi, sycamini succus.

Gongilidis, hoc est rapæ, heliotropium.

H

Hederæ succi, persici liquor.

Hippuris, chamæpytis.

Hormini, lini semen.

Humidæ picis, succus panacis.

Hyacinthi, Ros Isateos

Hyenæ adipis, uulpis adeps.

Hyenæ fellis, fel perdicis.

Hysseyami, quod est alterci, rubi cani semen.

Hyperici, anethi semen.

Hypocystidis succi, acaciæ spinæ succus.

I

Iridis Illyricæ, helenium odoratum.

Innci odorati, cardamomum.

L

Lachrymæ papaueris, succus mædragoræ.

Ladani, sampsuchum.

Lanariæ radices ueratri nigri radix.

Lapathi radices, pyrethri radix.

Lapis pyritæ, lapis pyrebolus.

Lapis phrygii, lapis argyrites.

Lapis magnetis, lapis phrygius.

Lapis asii, lapis gagates.

Lathyrinum, granum cnidium.

Lauri baccarum, serpillum aridum.

Lentisci, polygoni radix.

Lepidii, erythrodanum.

Lepidi radices, folia capparis.

Leporis marini, cancer fluuialilis.

Leucini floris, struthion, seu lanaria.

Ligni balsami, radix uiolæ candidæ.

Lini seminis, fabæ succus.

Loti seminis, Betæ semen

Lybistici, semen staphylini:

M

Malabathri, cassia uel nardus Indica.

Magnysine uitreg, lebrû Italicû.

Malorum cotoneorû, melilotû.

Malux, sænugræcum.

T 2

Mandra-

Mandragoræ, oleæ lachryma.
Mandragoræ succi, dorycnium.
Mannæ thuris, cortex thuris.
Mastichæ, lentisci medulla seu

cor.
Medullæ ceruinæ, adeps cerui,
uel medulla uituli.

Mellis sapa.
Mellis Artici crudi, mel aliud de
spumatum.

Meu, myrobalanus.
Myrsinites uinum, succus mori.
Misyos Cyprii, ochracigna.
Muscæ, muscæ tantundem.
Mororum succi, ruborum folia.
Myrobalani, peucinum.

Myrrhæ trogloditidis, calamus
odoratus.

Myrtei olei, lentiscinum.
Myrti, succus mori.
Misy torrefactum, diphyrges.

N

Nardi Syriacæ, iuncus odoratus.
Nepitæ, menta sylvestris.
Napi, gongilidis semen,

O

Ocymi, sisymbrium.
Ocymoides, syluatica menta.
Oenanthes succi, ampelini arbo-
ris succus.
Olei ricinini, oleum laurinum.
Olei ueteris, duplū olei coqui-
tur cum adipe suillo ueteri.
Oleæ lachrymæ, hypocistidis suc-
cus Galenus oleæ Aethyopi-
cæ lachrymæ.

Opocarpasi, liquor myrti.
Opopanatis, lac sycamini.
Orizæ, hordeacea farina.

Oenitho gallorum, anthani.

P

Papaueris liquoris, mandragoræ
suceus.

Peristereonis, chamæleuce.
Peucedani liquoris, succus gly-
cyrrhizæ.

Picis liquidæ, opopanax.
Pityocampæ, uespæ, in Cedriâ.
Piperis, zingiber.

Polypodii, radix Chameleæ, uel
chamæleontis.

Polytrichi, absinthium.
Propolis, ladanum.
Populi nigrae furculorum, sam-
psuchus.

Pfilii, lenticula palustris.

Pterei, cncori semen.

Pulegii, hyssopus.

Pyrethri, zingiber.

Pumicis, terra Cretica,

Phu, sphagnus.

Phyci, anchusa.

Q

Querqus, chamæleon.

R

Rapæ, heliotropium.

Radicis rumicis, Cinira.

Raphanini olei, rhicininum.

Recrementi plumbi, helcysma.

Recrementi æris Cyprii, melin-
teria Aegyptia.

Resinæ piceæ, resina terebinthi-
na.

Resinæ colophonie, apochyma.

Rhodoidis, sinopsis.

Rhododaphnæ liquoris, uiscus
quercinus.

Rosarum siccatum, Perseæ fo-
lia sic.

lia sicca.

Rhu, centaureum.

Rubi canini, uesicariæ semen.

Rumicis, pyrethri radix.

S

Sabini olei, oleum recininum.

Sagapeni, piceæ resina arida:

Salamandræ, lacerta uiridis.

Salis ammoniaci, sal Cappadocicum.

Salicis liquoris, nigræ hederæ liquor.

Saluæ, nepitæ.

Sampfuchi, rhus calinarius ficus.

Santonici, abrotanum.

Satyrii, semeu erucæ.

Scammonii, ricini.

Scillæ, bulbus.

Scinci, satyrium.

Scordii, albi papaueris caput.

Semperuiui, lactuca serapiadis, radix pæoniæ.

Semperuiui succi, lactucæ succus, aut folia.

Sepiæ testæ, pumex.

Serpylli, potamogiton.

Sesami, semen lini.

Sesamoides, expressum amarum.

Sinapis, cardamomum.

Sisonis, anisi.

Sisymbrii, ocymum.

Sphagni odorati, iuncus cultus.

Spheclæ, hoc est fœcis uini com-

bustæ, sandaracha.

Stymmeos tufi, squama æris.

Styracis, castoreum.

Strobilorum, semen cucumeris,

Suruthii radices, radix ueratri nigri.

Sulphuris uiui, sandaracha.

Syrici, spuma argenti.

T

Terræ Samiæ, leucographis Aegyptiæ.

Terræ erythriadis, calx Thebaica. Galenus addit terræ teneræ, plumbago.

Thapliæ, Elydriou.

Thapliæ succi, chamæleontis nigri succus.

Thermuntiadis, lycopsolos.

Troximi maiounium, aut maioulum.

Thuris, ampelites.

V

Vini Italici, uinum mendesium.

Vuæ acerbæ, galla omphacitis.

Vuæ passæ satiugæ, palmulæ.

Visci quercini, chamæleon niger.

Vulpini adipis, urfinus adeps.

Vulturis fœcis, columbinus fœmus.

X

Xylobalsami, uiolarum albarum radix.

Z

Zingiberis, pyrethrum.

*De ponderibus & mensuris.**Cap. XXVI.*

Pondus, grauitate dimensum iudicatur, mensura autem uasis capacitate: uas autem, siccae quantitatis aut humide mensura est, ut tres quantitatis quae mensuratur, sint differentiae, una quidem ponderis, altera uero aridae substantiae qualis ea quae in cumulum cogi potest, porro tertia humidae est substantiae. Cum autem multa propeque infinita sint pondera & mensurae, pro regionum diuersitate, & utentium consuetudine, de ijs quae omnibus in usu communi sunt, nobis sermo erit praecipuus.

De notis ponderum & mensurarum.

Quoniam uero nonnulli literis non integris, sed notis, signisque pondera & mensuras demonstrant, satius fuerit, ueteres in hac re imitari, & primum characteras ipsos exponere. Primum igitur χ litera, cum superscriptum habet α , chalcum hoc est aereolum signat, exempli gratia. Si \circ habeat, choa, quod est congiuum. Si ν , chœnicem. Si μ , chemam. At κ si ϵ habet suprapositum, & lineam rectam, quae per obliquum inferius cornu ipsius secet, ceratium, hoc est siliquam notat, ut Si ν superiectum est, cyathum Si \circ , cotylam, hoc est heminam. At linea circumflexa quam nihil aliud circumstat, & quae per obliquum ponitur obolum notat, Si duae huiusmodi lineae sint, quas nihil circumstat, duos signant obolos: qui oboli gramma, hoc est scrupulum faciunt. is notatur litera τ , quae ϵ literam habent annexam, recta quadam linea diuisam. Duae autem coniunctae atque altera parte in angulum coactae, duobus κ literae cornibus similem ad rectam lineam spectantibus, notant drachnam, quae alio nomine uocatur olca, proprie uero olca per λ scribitur, cui in medio litera \circ sit addita. Verum si λ adiectum habet, libram signat. Nonnulli uero alteram λ literae lineam oblique secantes libram ostendunt. At cum τ litera, in ipso sui angulo \circ habeat, unciam denotat, Quod si μ in summo uertice habeat oppositum ν , minam refert Si ν , notat mystrum, Si ϵ , medimnum, Si \circ , modium. Porro τ post se habens ϵ , & ν , signat tryglion, $\tau\epsilon\nu$. At ξ cui iuxta sit positum ϵ , xessen, qui sextarius, ostendit, $\xi\epsilon$. Si \circ apponitur, oxybaphum, id est acetabulum $\xi\circ$ Aliqui uero sextarium linea recta ξ secantes conficiunt. Sed κ adiectum literae μ , heminant κ addito ϵ , incumbente ipsis μ , ceramium ualet.

De pon.

De ponderibus.

Mina Attica & Aegyptia habet uncias sedecim. Romana uiginti. Libra uncias duodecim Vncia drachmas octo. Drachma habet scrupula tria. Scrupulum, obolos duos. Obolus, siliquas duas. Siliqua, æreolos duos, & duas tertij partes.

De mensuris liquidis.

ITalicum ceramium habet congios octo, Congius sextarios sex, Sextarius cochlearia duo, quæ nonnulli triblia nuncupant. Hemina idem triblium continet, mystra magna tria, acetabula autem quatuor. Nam magnum mystrum habet acetabulum, Acetabulum sesquicyathum habet. Cyathus, chymas paruas seu mystra paruas duo. At si uoles & ponderum liquidorum mensuram scire, permultæ liquidarum rerum secundum lancis momentum differentię habentur, ut in olei, uini, & mellis exemplo dicemus. Mel igitur uino ponderosius quarta parte, itemq; decima est: quo fit ut ferè tertia ponderis pars mellis accedat: capit enim integrā huius mensuram, & insuper trientem. Mel autem oleo ex media parte grauius est: continet enim totum olei modum, & ultra semissem. Vinum oleo nona parte supereminet, totum enim ipsius pondus continet, & nonam eius partem. Quod autem res hæc dilucidior, omnium mensurarum pondus sigillatim uelut in tabula depictum subiecimus. ex qua liquido constat, per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, oleum, uinum, & mel, ex ordine demonstrari.


	Olei	Vini	Mellis
Ceramiū Italicū habet	lib. 72	lib 80	lib. 108
Congius	lib. 9	lib. 10	lib. 13 S.
Sextarius	lib. 1. unc. 6	lib. 1. unc. 8	unc. 13 & S.
Hemina	unc. 9	unc. 10	unc. 13. & S.
Mystrum magnum	unc. 3	unc. 3 scrup. 8	unc. 4. & S.
Acetabulum	drac. 18	unc. 2. scrup. 12. drach. 17	
Cyathus	drac. 12	drac. 12. scrup. 4. unc. 2. dr. 2	
Mystrum paruum	drac. 16	scrup. 20	drach. 9

ORibasius secundum adamantium author est sextarium Italicum uini mensura quidem unciarum uiginti quatuor, esse, pondere uero unciarum uiginti, sextarium pondere mellis duas libras, & dimidiam habere.

De aridis.

Agyptia artaba habet modios quinque. Modius ægyptius & Italicus Chœnices octo. Chœnix sextarios duos. Sextarius, semifextarios duos quos & heminas uocant. Hemina habet cyathos octo. Atticus medimus habet semifextaria, quæ hemiecta uocant duodecim Hamiectum chœnices quatuor. Ita medimus habebit minas quadragintanouem, sextarios nonaginta sex. Huiusmodi autem mensurarum pondus exponere haud facile, quod aridarum rerum infinitæ iuxta momenti lancis rationem differentię existant.

FINIS LIBRI SEPTIMI IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO MEDI-
CO INTERPRETE.



LECTORI.




Ntequàm te ad lectionem Pauli conferas, scito aliquando uerbum digerere positum esse pro discutere. Item mannam pro tenuiore parte thuris. Cachry pro flore ro-
ris marini.




IOANNIS ANDERNACI

IN LIBRVM PRIMVM
PAVLI ÆGINETAE
COMMENTARIVS.



CAPVT I.



VANDO QVIDEM gravidis.] Pri-
mum hoc caput Pauli ad uerbū ex
quinto Oribasij sumptū est : in quo
gravidis multa superuenire legimus
inter cætera stomachi redūdationē.
ut Pliniano more loquar, quam Pau-
lus uerbo τῷ περισσάειν significat.
Id si Hesychio & Suidæ credimus, à
canibus caudam mouētibus: aut po-

Stomachi
redunda-
tio.
περίσσει-
σις,

tius, quod hic etiam magis cōgruit, à fluctuum agitatione tra-
latum est. In gruida enim sanguis menstruus, qui ante cōce-
ptum stato tēpore, expurgari solebat, copiosior in utero col-
lectus quā pro fœtu adhuc exiguo ad stomachum regurgi-
tat, ibiq; exundans, nauseam excitat. In prima nostra uersio-
ne erat, Nausea, sicuti etiam Aristoteles lib. 7. de historia ani-
malium ponit. ἔτι δὲ ναυτία, inquiēs, καὶ ἐμετοὶ λαμβάνου-
σι τὰς πλείους. id est, præterea nauseæ & uomitus plurimas
infestant. Aetius πλάστος τομάχου ait, quod est nimia humi-
ditas stomachum debilitans, non ut Orosius putabat, sola
imbecillitas. Nā Galenus Commentario secundo in primum
de morbis

ναυτία,

πλάδους. de morbis vulgaribus, αἰτ τὴν περιττὴν ὑγρότητα πλάδον εἶναι
 θεν ὀνομαζειν, hoc est superfluum humiditatem, pladon appel-
 lare consuevit, de Hippocrate dicens. Idem Commentario
 secundo de ratione uicis in morbis acutis, ἐφ' ὧν καὶ προσέ-
 θηκεν, ὥς ὁ μὲν ὑδαρὴς οἶνος πλάδους ἐν τῇ αἰὼν καὶ λίχ τουτέστιν
 ἡγρότητα, καὶ αὐτοῖαν ἐμπόσει. hoc est, in quibus etiam adie-
 cit, uinum aquosum, Pladon, id est, humiditatem & imbecil-
 litatem in superiore uentre excitaturum.

πτυνέλι-
 ζεν. Sputa crebra.] Quia stomachus ex humiditate languet, eo-
 que os ipsum tenui sputo assidue plenum existit: Græca di-
 ctio est πτυνέλιζεν: quam Galenus in priore prædictionū in-
 terpretatur, πτενιν πολλάκις, hoc est spueri frequenter.

καρδιωγ-
 μός. Stomachi erosio.] Quando ab acrioribus humoribus irri-
 tur, mordeturq; uomitus futuri signum non exiguum habet-
 tur. Græce dicitur καρδιωγμός, quasi dicas cordis morsus. Ve-
 teres autem olim os uentriculi cor appellauerunt, nimirum
 ex situs uicinitate: quia cor prope os uentriculi situm est, ut
 ait Galenus, & ipsa rei euidentia docet eundem affectum Ga-
 lenus etiam καρδιαλγίαν uocat libro secundo de placitis Hip-
 pocratis & Platonis.

καρδιαλ-
 γία. Cibi fasti-
 dium.
 ἀσιτία. Cibi fastidium.] Nimirū ex uiciosis humoribus stomachū
 infestantibus, si Galeno credimus græca dictio est ἀσιτία, que
 signat cibo abstinere, & inedia ūti, sicut Grammatici nobiles
 interpretantur. Galenus etiam libro primo περὶ ἐπιδημιῶν
 differentiam inter ἀσίτες & ἀποσίτες ponit hisce uerbis. ὅτι
 τὰς ἀπορέκτους ἀσίτες ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες τὰς μὴ προσενεγ-
 καμένους σιτία, τὰς δὲ ἀπετραμμένους προσίεσθαι, ἀποσίτες
 καλεῖσιν. hoc est, quod Græci appetentia carentes uocāt, Asi-
 tos, eos sanè qui cibo non assumunt: illos autem, qui assu-
 mere oblatos auersantur, abhorrentq; appositos, omnibus est
 manifestum. Ibidem ἀπόσιτοι πάντων γούματων διέττελεον,

ἀσιτία,
 ἀποσιτία. quasi dicat, omnium ciborum fastidio laborabant. Erit itaque
 ἀσιτία abstinentia à cibo in totum: ἀποσιτία, fastidium qui-
 dem, sed ut aliquid tamen assumatur, quod Galenus ostendit
 libro primo de causis symptomatum, grauidarum accidentia
 enumerans in hac uerba, βραχέα σιταν μένης τῆς ἀνθρώπου διὰ
 τὴν ἀποσιτίαν. Hoc est q̃ mulier pauca comederet ob fasti-
 dium. Hippocrates in Aphorismorum commentario quarto:
 ἀπυρέτω εἶναι ἀποσιτία. Galenus interpretatur ἢ μὲν ἀποσι-
 τία τὸ

Fastidium
 abstinentia.

τὰ τὸ αὐτὸ δηλοῖ τῇ ἀνορεξίᾳ. Rursus in libello de uictu priuatorum: ὁκῶσισι δὲ δόλαι γίνονται ἐκ τῶν σπλάγχνων, ἢ ἐκ γυμνασίας, ἢ ἐξ ἄλλης τινὸς ὁδοπορίας τουτέισι συμφέρει ἀναπαύσασθαι οὕτως. Hoc est: quibus dolores uiscerum oboriūtur, aut ab exercitio, aut alia quadam obambulatione, his conuenit in abstinentia conuiuere. His omnibus animaduersis, legendum uidetur ἀποσιτεῖν pro ἀσιτεῖν, id quod ex sequenti oratione cuius mediocriter sagaci licet deprehendere. Nam Paulus singulorum accidentium remedia tradens, ἀποσίτης δὲ, inquit, non ἀσίτης: quanquam nō ignarus sim aliquando authores, alterum pro altero usurpare: ut ē capite 35. Verum cū utraq; hic ponatur, ἀποσιτοί, & ἀσιτοί exacte intelligenda sunt. Miror hoc Oroscium qui in aliis corrigendis nihil facit reliqui, non aduertisse: Castigatorem uero Basiliensem, qui Paulum Græcum germanicis typis excusum adidit: tum hoc, tum alia pleraq; præterisse, notatu alioqui dignissima.

ἀσιτος.

Corrigitur
locus Pau
li impressiOroscius.
Castigator
Basiliensis.

Vina fulua.] Vt pote frigidioribus naturis accommodata: tū ad concoctionem, tum ad succi bonitatem procreandam, ut ex Galeno didicimus. Ait enim libro duodecimo Methodi οὗτοι πάντες οἱ οἶνοι κίρῳ, καὶ θερμοί, καὶ ἐνώδεις ἐστί, καὶ τῆς συστάσεως μέσοι τῶν τεύχων καὶ τῶν παχέων. Hoc est, omnia hæc uiua fulua, tum calida, tum odorata sunt, & substantiam habent inter aquosa & crassa mediam.

Vina fulua.
κίρῳ.

Color hic fuluus, qui Græcis κίρῳς dicitur, proximus est flauo, quasi dicas in pellucido flauum: hinc etiam flauus color & fuluus eidem sæpe rei accommodatur. Id quod ex Galeno licet condiscere, libro quinto de Sanitate tuenda, ubi habet, σκόπον ἔχων οἶνον κατὰ μὲν τὴν σύστασιν αἰὲν τὸν λεπτότατον αἰρεῖσθαι κατὰ δὲ τὴν χροῖαν, ὅν οἱ ἵπποκράτης ἔθηκε κίρῳν καλεῖν, δύναιτο δ' αὖ καὶ ξανθὸν ὀνομάζειν αὐτόν. Id ferè sonat, huc consilium dirigens, ut uinum substantia quidem tenuissimum semper: colore autem, quæ Hippocrates κίρῳν id est, fuluum nominare consuevit: possis etiam eundem flauū appellare. Galenus alibi τὸ κίρῳν χρώμα δηλοῖ αὐτὸ λεῖψιν πυρρῶν ὡχρῶν. Hoc est, fuluum colorem possis rufum pallens dicere. Sunt qui hunc colorem latine Giluum nuncupent: ego, malim ex Galeni interpretatione, fuluum conuertere, Pliniū secutus: qui hunc colorem inter alios uino attribuit, non giluum.

Color fuluus.
κίρῳς.Flauus.
πυρρῶν.
ὡχρῶς.

luum. Siue autē dicas gilua flaua, aut fulua, nihil interest, modò obserues plerunq; uina ex uetustate hunc colorē induere.

At medicamenti nomine.] Superius commemorata ad cibum referuntur: sequentia ceu medicamenta adhibentur, quæ stomachum ex nimia humiditate imbecillem corroborant, exciccentq; ὡς φάρμακον δὲ. id est, ut medicamentū uero habet textus, ego nomine medicamenti uerti.

Radix Pontica.] Hoc est, rhapsodicum, uim habet corroborandi stomachum imbecillem: uide Dioscoridem.

Extrinfecus præcordia.] Hoc est, qua parte uentriculi os habetur. Abusus est Paulus dictione περικάριον, quæ apud Galenum propriè significat membranam, seu tuniculam, cor ambientem, aut si mauis, cordis inuolucrum. Quia uero os uentriculi olim cor appellabatur, excusari potest, ut Pericardion pro regione externa, sub qua illud delitescit, accipiat. Plinius libro naturalis historiæ I I. membranas septi trāsuerſi,

præcordia appellauit, q; cordi prætendantur. Galenus autem, & Hippocrates ὑποχόνδριον totam illam regionē appellant, quæ à mucronata cartilagine, utraq; in parte ad umbilicum usq; porrigitur. Celsus autē latinæ linguæ in Medicina princeps, præcordia nominat. Cæterum ex hoc Pauli loco cōstat, ubi os uentriculi affectum est, ante non ad dorsum applicāda remedia. Nonnulli autem Medici apud, Lugdunum dorso ad moueri præsidia, ut in inflammatione gulæ uolunt, erroris occasione sumpta ex loco quodam Galeni in 13. Methodi perperam à Linacro Anglo conuerso. Habet autem in hunc modum tralatio. Verum gulæ, quæ propriè uocatur stomachus, cataplasmata super spinam dorsī imponimus, non autem ad pectus: idem facimus, & cum phlegmone os uentris laborat. Multo melius sonant græca. ἀλλ' ἐπίγει τῷ κυρίως ὀνομαζομένου στομάχου καὶ τὰ καταπλάσματα κατὰ τῆς ῥάχews ἐπιτίθεται ἐκ ἐμπροσθεν, ὥστε ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς φλεγμῶν, id est: Sed gulæ quæ propriè nominatur stomachus, &c cataplasmata super spinam dorsī applicamus, non antè, quemadmodum (intellige) facimus in anteriore parte, cum os uentriculi inflammatur. Huic sententiæ ipsa rei euidentiā, quæ ex Anatome apparet, adstipulatur.

Præcordia cōtegere.] Hoc loco usus ē dictione ὑποχόνδριον: cū hic eundē locū quē superius in uomitu uoluerit, intelligat.

At eas

περικάρ-
ιον.

præcordia.

Præcordia
apud Pli-
nium,
ὑποχόν-
δριον.

Subcarti-
lagineum.

Medica-
menta in
affectu sto-
machi ubi
applicāda.
Recentiores
quidam a-
pud Lug-
dunū Me-
dici

Linacri
uerso.

Galeni lo-
cus. 13. Me-
thodi.

At eas quæ cibum fastidiunt. [Græce est τὰς δι' ἀποσί-
της. Remedium fastidientium ponit, quāquam superius ἀσι-
τον scriptum erat.

Oenanthe.] Hoc est, uua syluestris uitis, ut ait Dioscorides:
ad uerbum hæc ex Oribasij quinto transcripta sunt. Auicen-
næ interpretes eundem locum turpiter corruperunt

Citta.] Orosius Citta male interpretatur picam: non
enim pica morbus est apud latinos, sed malacia: à græco au-
tem uerbo κίττα possis dicere picā, sed apud idoneos autho-
res usurpatū non est. Galenus originē huius mali tradit libro
primo de Symptomatum causis in istum modum. *μοχθηρῶν
δὲ ποιότητων ἐτίθει μῦθον. ἂν οἷς αὐτὸς τῆς κοιλίας χιτῶ-
νος ἀναποθῇ περίττωμα μοχθηρὸν, εἴωθε δὲ τῷτο γίνεσθαι
μάστιγα τὰς κακοχίμοις γιναιξίν, ἐπειδὴ ἀνκίσσῃσι, καὶ καλεῖ-
ται κίττα τὸ παθὸς.* Hoc est: Præuas autem qualitates appet-
tunt ij quibus uitiosum aliquod recrementum in uentriculi
tunicas est insinuatū, id quod mulieribus, præsertim succis
præuis obnoxiiis, ubi in utero habere cœperint, accidere cōsue-
uit, ac uitium appellatur κίττα & Plinius lib. 28. cap. 7. mala-
ciam stomachi appellat.

Error Ora-
scij.
κίττα.
Malacia.

Id tertio à conceptu mense.] Galenus libro citato, καὶ τῷ-
το πάσχουσιν αἱ πλείους αὐτῶν ἀρχὴ τῷ δυνάτερι, καὶ τρίτου μῆ-
νος ἐν δὲ τῷ τετάρτῳ παύονται, id est, ac complures ipsarum
hoc affectu usq; ad secundum & tertium mensem laborant:
quarto autem infestari desinunt.

Malacia
stomachi.
Aduerte lo-
cos Pauli
& Galeni.

Id quod utero est.] Sic interpretatus sum κύημα, quasi di-
cas conceptum: nondum enim fœtus dici potest, si Galenū,
ex quo ferè omnia hæc sunt deriuata, his uerbis loquentem
intelligamus. κατὰ μὲν τὰς πρώτας δύο μῆνας, ὁ λόγον ἐπισπᾶ-
ται. τῷ αἵματος δὲ εὐατὸ τοῦ ἐμρυνοῦ, ὥς αὐτὸ ἐτι μικρότατον
ὑπάρχον. ὅταν μὴ δ' ἐμβρυον ἡδυνῇ καλοῖται, κατ' ἐκείνον τὸν
καιρὸν, ἀλλ' ἐτι κύημα, id est, in primis sanè duobus mensibus
fixtus pauxillum sanguinis ad se attrahit, ut qui minimus ad-
huc existat, quando ne fœtus quidem tunc appellari debet,
sed potius conceptum. Et reliqua uerba Pauli in Galeno or-
dine inuenies.

κύημα.
Conceptus.

Iam labor & longior.] Remedium est fastidij, & malaciæ
stomachi, quæ præuos cibos & alienos à natura appetit, uerum
malaciæ magis. Græce est in omnibus exemplaribus cum im-

Remedia
malaciæ
stomachi.

pressis,

ἔυστοι.

pressis, cum manu scriptis quotquot mihi uidere contigit, ἔυστοι θιε καὶ οἱ πάντοι, &c. Hoc est ad uerbum, bene cōmēsse faciunt & labores, quod perinde est, ac si dicas bonorū ciborū appetētiā faciūt: ut qui superfluitatē, ac redundantiā humorū discutiant, unde prauorum excitatur appetitus. Clamat hic Orosius Copum & me errasse qui ἔυστοι pro εὐετοι legimus. Quando quidem uero superius fecit mentionem ἀποσιτων & ἀλλοκατων δρεγυστων, non absurdē ἔυστοι in remedio ponitur. Præterea si remedium est malaciæ potius quàm fastidij, labor, certē ἔστοι rectē dicuntur πόνοι, q̃ bonorum ciborum, malaciæ autem malarum rerum appetentiam facit. Sed parum refert, an εὐετοι legas.

ἀταλαι-
πώως.
ταλαι-
πωρία.

Quæ uero mulier citra labores.] Græcē est ἀταλαιπώως, id est, sine exercitio aut labore. Nam ταλαιπωρία laborem & negocia uitæ apud Hippocratem significat cum alibi, tum in libello de uictu priuatorum, τῆς δὲ παχέας χροῦ ὅσοι βολονται λεπτοὶ γενέσθαι τὰς ταλαιπωρίας νήσιας εἶντας ποιεῖσθαι ἀπάσας. Hoc est, crassi qui tenues uolunt fieri, omnes labores ieiuni subibunt.

Actia.

Verum actia.] Ut piper, gingiber, nasturcium, aliæq; id genus quæ calore suo stomachi superflua consumant.

Oedemata.] Tumore sunt ex pituitoso humore collecti, qui digitis prementibus cedunt: uariis etiam morbis superueniunt. Vide Galenum de Tumoribus præter naturam.

κατανίζων.

Lauantur.] Græcus codex impressus κατανίζην pro κατανίζειν habet. Superfundere etiam significat.

IN II. CAPVT.

Mulier
adole-
scens.

Etate nec nimium.] Ex hac clausula Græca μήτε δὲ νεώτερά, reddidi: nec nimium adolescens, hoc est, quæ sit in ipso uigore ætatis: quo nimirum corpus absolutum iam est, & copioso abundat sanguine. Sin infra uiginti quinque sit annos, nempe adolescens, corpus adhuc increfcit, & alimentum minus habet perfectum. Εὐός; νεώτερά uerti adolescens. Nam ab anno quartodecimo usq; uigesimum quintum, ætas uocatur adulescentia. Ab anno trigésimo quinto, multis solent menses cessare, aut omnino pauci fluere, eoq; alimento minus ad fœtum alendum abundant.

Nutrix nō multo ante.] Quia sanguis tunc ubertim ad mammas confluat unde lac copiosius etiam suppeditatur.

Masculum.

· Masculū.] Hippocraticū est propterea ꝥ laborato magis, probōq; nutrimento ex sanguine pollet, & minus excremento.

· Condimenta.] Sic dicuntur quæ liquoribus quibusdam ut aceto & sapæ, aliisq; condiendis induntur aromata, siue semina odorata quod genus sunt cuminum, anisum, fœniculum, græcis dicuntur ἀρωματισμοὶ & ἀρωματά. Lege in textu τὰς ἐπισήμους ἐν αὐτῷ καὶ ἀρωματισμοὶ, pro τὰς ἐπισήμους.

ἀρωματά.

Venere nutritrix.] Galeni præceptum ex primo de sanitate tuenda: quia ex hac menses prouocantur, & lac odoris gratiam in deterius mutat.

ἀρωματισμοί.
Condimenta.

· Manus humerosq;.] Exercitationem nutritrici idoneā præscribit: qua uidelicet partes superiores agitantur sanguinē copiosum lacti generando suggerant. Dicit enim Galenus sanguinem optimum gigni exercitatione moderata, cibis tū boni succi, tum iusto tempore, modoq; assumptis. Præterea positione tēpestiua modiceq; sumpta. Græce est, ἀλγίστω, i. molatè.

IN III. CAPVT.

L Audatissimum.] Galenus libro primo de sanitate tuenda ad uerbum omnia comprehendit. De ungui autē, ex Dioscoride libro secundo sumptum est, quod autem ad lucem debeat inclinari, de suo Paulus adiecit: quemadmodum etiam de probatione.

IN IIII. CAPVT.

L Acuitiatum.] Ex quinto Oribasij conscripta sunt remedia nimirum lactis uitiati: quæ tum corporis totius purificatione, tum uictus ratione constant.

· Oxymelite.] Hic uomitus facillimus est, aliquando additur radícula quæ raphanus dicitur, minutim cōcisa horis duabus in oxymelite madescit. Deinde ea proiecta, oxymeli assumitur. Vel radiculam esse oportet, deinde aquam tepidā bibere Valentiores uomitus ciendi modi septimo lib. tradunt.

Vomitus.

· Laboribus.] Nam exercitatio calorem prouocat: qui frigidum, uiscosumq; humorem calefacit, extenuatq;.

Cibum præcedentibus.] Alioqui plus noxæ quàm cōmodi afferent: imo plus pituitæ generarent, dum uidelicet cibū prius quàm esset concoctus, in membra digereret.

· Salsamentum,] Græce τάρυχος est, quod conditā thynni carnem significat. Cuius generis & Cybia sunt, quo nomine Pjiuius Pelamidem concisam appellat. Pelamidem uero

τάρυχος.

Thynnum,

Thymum, qui nondum attigerit annum. Idem à recenti partu Corpyla dicitur,

Esus por-
culorū pro-
sumētis æ-
tate uaria-
tur.

Carnibus suillis.] Ad obtundendam nimirum humoris biliosi acrimoniam. Nam humida & crassi succi : ijs qui concoquere possunt, utilissima. Habet autem uiscosi aliquid, quo iecur & renes obstruat : cætera ex omnium animantium genere quæ pedibus fidunt, ut ait Galenus, saluberrima. Porro indistinctè dixit Paulus carnibus suillis, cuius putæ ætatis esse uelit omittens Nam floridæ ætatis hominibus ac sese exercitantibus iusta magnitudine adulti : inclinantibus, qui adhuc incrementum, porculi conueniunt, Minimorum caro excrementis generandis est : uetulorum siccitate, & duritia displicet.

Collatio
locorum
Pauli &
Galen.

Σαρκίς; & uini dulcis.] Galenus libro περὶ ἐνχυμίας καὶ κακοχυμίας, contrarium ferè scribit, docens biliosis, quibus lac acrius tenuiusq; esse solet uinum dulce nequaquam conuenire. His uerbis : τοῖς χολωδέτεροις σώμασιν, ἢ τε διὰ φυσικὴν δύσκρασίαν, ἢ τε δι' ἐπίκτητον ὁπώσ' ἂν γεγούσιν, ἢ τε φαλερίνοις, ἢ τε τρωλίτης κίρρῳς γλυκὺς, ἢ τ' ἄρουσιος ἢ δ' ὁ λείσβιος ὁ ἐν ὠδῇ τε καὶ κίρρῳ ὁμοιοῖς τοῖς προειρημένοις ἂν ἐπιτήδειος πίνεσθαι. Δερμοὶ γὰρ ἅπαντες οἱ τοῖςτοι. Μὴτ' ἂν χαλώδεσι, μὴτε τοῖς ἐξ ἐγκαύσεως ἢ καυμάτων πολλῶν, ἢ ἐν δόλαις, ἢ λύπῃς, ἢ ὥρα, ἢ χῶρα καὶ καταστάσει θερμῇ, διδόναι τοῖςτον οἶνον. ἐξ ὑπερκατάρχει μὲν ἂν ἀγαθὸς ἅσιν τοῖς θερμαίνεσθαι θεομένοις, φλεγματώδεσι καὶ ψυχραῖς κρᾶσιν, καὶ χυμῶν πλῆθος ὁμῶν κρῶκοςιν, ἀργῶς βιῇσιν, ἐν χωρίῳ ψυχρῷ, καὶ χειμῶνι, καὶ καταστάσει ψυχρῇ καὶ ὑγρῇ. τέτοις μὲν ἅσιν ἀγαθὸς ὁ κίρρῳς οἶνος καὶ γλυκὺς. ἐναντίως δὲ τοῖς ἐναντίως ἔχουσιν, id est, Biliosiori corpori, siue ex temperamento naturali, siue qualicunq; asciticio, nec salernum, nec dulce molites fuluum, nec Aruicum, nec Lesbium odorum & fuluum prædictis simile potui est idoneum. Quippe omnia id genus uina calida sunt, eoq; nec biliosis natura, nec ex insolatu, aut aliis ardoribus, uel inedia, uel tristitia, uel anni tempore, uel regione, & calido aeris statu huiusmodi uinum exhibendum est. E contrario salutare est omnibus qui calefieri desiderant, pituitosis, frigidis téperatura, ijs qui crudorum humorum copiam coaceruarunt, in ocio uiuentibus; in loco frigido, hyeme, & statu aeris frigido, humidoque. His inquam uniuersis fuluum ac dulce uinum saluiferum est, contrarium ijs qui secus habent, &c. Quid igitur hic dicemus?

ratione

ratione alimenti exhiberi. Nam antea dixerat ἡ τροφή δ' ἐξ πάντων ἐστὶν αὐτῶν ἀνάλογος τῷ πάχει. Hoc est: Alimentum uero ex omnibus ipsis crassitie respondet: puta qualem substantiæ crassitiem obtinent, tale etiam nutrimentum, nempe crassi succi producunt. Sic igitur ijs quibus lac tenue est, conuenit. Quanquam muliebris etiam sexus, respectu masculini, frigidior existat: deinde sanguis tenuis, & serosus esse potest, acris, non etiam statim biliosus, ac calidus.

Cucurbitula etiam.] Vt uidelicet sanguinē ad partes eas ex alijs attrahat. Caute uerò ad māmillas defigenda est. Caro enim mollis cum sit, faciliè intumescit, cucurbitulaq; repleta difficile auellitur. Quod si hoc acciderit, sponsia calida illi supponi debet: sic enim laxatur. Sin minus, pertundetur.

Melanthium.] Dioscorides hoc docet lac extrahere: in qua re miror castigatorem Orosiū, papauer nigrum uertere: quod contra omnem medicinam est, ne dicam piaculum, prebere ad lactis generationem uehementer refrigerantia adeo ut suporem inducant, & quidem uiolenter, nec sine incommodo natura. In Græce exemplari legēdum quidem ei assentior pro γλυκύ, γλυκῆ, quod præterijt Gemusæus. Melanthiū uero apud nullos autores papauer nigrum signat, etiam si conueniret instituto. Ita sunt quidam ad uituperandū alios procliues, ut sæpe ipsi in multo grauiores errores incidant:

Calida prius.] Græce est θερμῶ προσαιονήσαντες legendum: non προσευνήσαντες, ut habent codice impressi, quod neuter Aristarchus, uel Orosius uel castigator Basiliensis aduertit. Dicitur etiā καταιονήσαντες à uerbo καταιονῆν, quod significat καταυτλῆν, & καταχεύειν. Galenus i primo ad Glauconem. τῶν δὲ σπλάγχνων προνοῖται καταιονῆντά τε καὶ καταπλάγοντά τῳ μαλαττεν καὶ χαλὰν δυνάμεναι: hoc est uisceribus autem prospicere oportet, superfundendo, obducendoq; ea quæ emollire possunt, & laxare. Leonicenus unguento uertit.

Prius emulso.] προαμέλξασαν passiuè positum est: cum medium alioqui sit.

Ieiuno.] Hic propriè positum est ἀσίτω, ut faciliè intelligas in initio primi capitis pro ἀσίτης legendum ἀποσίτης.

Cibus solidior.] Galenus primo de sanitate tuenda puerū uult nutrirī lacte, quoad primores dentes emisierint. Deinde

Error Orosii,

Textus Græcus corrigi. Melanthiū quod gith dicitur, προσαιονῆν. καταιονῆν.

στίγιον.

cibo solidiore, utpote pane, leguminibus, carne, similibusque, sed omnibus prius commansis. Græcè tātum est στίγιον, quod per se cibum simpliciter signat, uerum lactis ratione solidior intelligendus uenit.

Si autem imprudentibus.] Græce est, εἰ δὲ λαθόντα πληρωθῆναι, id est: Si autem latentes repleti fuerint. Sed uerbum λαθόντων in eiusmodi locutione uertitur, recte cōuertitur, imprudentibus nobis, aut nescijs, id quod ē Budæus, annotauit.

IN VI. CAPVT.

Exanthemata.

PVstulis quæ quod puero.] Post educationem infantuli morbos enumerat, quibus in ea ætacula cōflicari solet: uocatq; Græce ἐξανθήματα à uerbo ἐξαιθῆναι, qđ est efflorescere.

ἐπαυθῆναι.

Ad summa eruperint.] ὅθαι δὲ ἐπαυθῆσιν, qđ est i extima eruperint. Vt ἐξαιθῆναι sit simpliciter se in altum promere: ἐπαυθῆναι uerò iusta magnitudine & figura per summa apparere.

IN VII. CAPVT.

κέρυζα.

GRauedo.] Græce est κέρυζα. Sic enim Celsus lib. 4 interpretatur: qua nimirum pituita ex capite defluens, nares claudit, uocem obtundit, tussim mouet.

μελιτισμός.

Melitismi.] Ita dicuntur, sicut sinapismi, cum melle pars oblinitur, melitismus, cum sinapi, sinapismi.

Tectius

Copioso calido.] In Græco deerat θερμὸν quod est calido. Sic enim magis aperit & discutit si quæ sunt superflua.

Græcus

IN VIII. CAPVT.

mutilus.

Discocto.] Hoc est, probe cocto: quod Græci dicunt ἀπέφθον.

IN IX. CAPVT.

Tendines.

TEndinum.] Quos hic uocat tendines, considerato, an musculorum buccam mouentium, an nervos à cerebro dentium radicibus adhærentes, unde sensus ipsis communicatur. An tendines alios malis.

Exoribasio.

Anisum.] Impressi codices habent ἀνισον, hoc est anethū, quod ipsum quoq; aluum sistit. Sed Oribasius habet anisum.

Calide.] Non calidis potentia, sed calide actu aluus sisti debet. Græce θερμῶς non θερμοῖς legendum.

IN X. CAPVT.

ἀφθαί.

APhthæ.] Celsus libro secundo capite primo: Proximum est ut infantes adhuc pueros serpentina ulcera oris quæ Græci ἀφθαί nominant, exerceant. Variis interim coloribus apparent,

apparent, pro humorum ea gignentium natura.

IN XIII. CAPVT.

TOmenti modo.] Græce est ἐν τρέπω πτύγματος. Significat autem idem πτύγμα quod πύλημα, τρέφειν ἐρεῖν, σῦν τρεμμα ἐρεῖν, hoc est, hapsus lanae ut Celsus ait, uel circulus.

πτύγμα.

Heliotropion] Celso herba solaris dicitur. Ab herbariis uulgaribus nouo indito nomine, uocatur herba cancri, cum scorpionides potius appellaretur. Sed quia scorpio incognitus magis est à cancro appellationem traxerunt.

Cucumeris.] Cucumis statim in Pepones, & Melopepones degenerat, figura tantum & quantitate inter se dissidentes: cum magnitudine excessere, pepones uocantur, cum uero rotundi, formam & effigiem mali referunt, facta ex pepone, & malo appellatione.

Pepones,
Melopepones.

IN XIII. CAPVT.

IAm uictus rationem præscribit ab infantia usq; ad ætatem declinantem, quæ nō tam ex Medicina, quàm Philosophia petita est: quæ mos est etiam Galeno, ut non solum corpus, sed animum quoq; curet.

Liberiore.] Græce est ἐν αἰέσει, hoc est, cū animi remissione, à uerbo ἀνίμι, qđ est, licētia permitto, aut solute indulget.

ἐλαφρῶς.

Leuiora] Græce quidem τροφὰς ἀντὶ τοῦ προσφέρειν ἐλαφρῶς, hoc est, alimēta ipsis leniter præbere, reddidi ego leuiora: utrum malis accipe. Hæc dixi, ne uilitigatores ullā calumniandi occasionem habeant, si uel tantillū immutauerim.

IN XVI. CAPVT.

EXercitatio] Totum hoc caput ex secundo Galeni de sanitate tuenda Galeni tuenda transcriptum est: ex quinto uero Oribasii. in eodem uero hæc clausula aliter legitur. Græcus codex Pauli impressus habet: δὲ μήτε πλεῖστος ὡμῶν, καὶ ἀπειτῶν, μήτε σιτισίων, μήτε χυμῶν, ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν ἢ ἐν τοῖς ἐντέροις, hoc est: Non debet erudi, incoctiō; siue cibi, siue humoris copia, aut in uentre, aut in intestinis contineri: pro ἢν τοῖς ἐντέροις. Galenus habet ἐν τοῖς ἀγγείοις, quod est in uasis: cui lectioni ego assentior. Intestina siquidem concoctioni proprie dicata non sunt: deinde uentris dictione etiam ipsa comprehenduntur. Verum ut concoctio altera in uentre, altera in uasis administratur: ita distributio ex intestinis prima: altera ex uasis obitur. Hæc non aduerterunt Orosius, &

Locus Pauli castigatus.

Erratum
Orosij.

Basilienſis caſtigator. Omitto quod etiam ἐκ τῆς γαστρὸς in eodem ſerè Galeni loco, Oroſcius ex ſtomacho diſtribuitur, ueteris, cū dicendum ſit ex uentre. Nam inde ſit diſtributio.

Vnde manifeſto liquet.] Galenus cū libro de ſanitate tuè da, iam citato, tum maximè in commètariorum περὶ εὐχυμίας, καὶ κακοχυμίας ſimillimam habet ſententiā: ὥς περ γὰρ ἀγαθὸν μέγιστον ἐστὶν εἰς υγίαν τὸ πρὸ τῶν ſιτίων γυμναſιον, οὕτω βλαβερώτατον ἀπασα κίνησις ἐπὶ ſιτίοις, ἀναδίδεται γάρ ἐκ τῆς κοιλίας ἡ τροφή, πρὶν πεφθῆναι, καὶ τῷδε πλῆθος ὁμῶν χυμῶν ἀθροίζεται κατὰ τὰς φλέβας, ἐξ ὧν ἔωθε νοσήματα παντοῖα γίνονται. μὴ φθασάντων αὐτῶν ἢ τοὶ διαφορῆναι πόνοις πλεονῶσιν, ἢ πεφθῆναι, καὶ μεταβαλεῖν εἰς αἵμα ὑπὸ τῆς κατ' ἡπαρτε καὶ φλέβας δυνάμεως. Hoc eſt, ut Græcæ linguæ ignare intelli- gant: Sicut enim exercitatio cibum præcedens plurimū conſeruandæ ſanitati conducit: ſic quælibet à cibo cōmotio, nocentiſſima eſt. Nam alimentum antequam ſit cōcoctum, ex uentre diſtribuitur. Vnde crudorū humorū copia in uenis col- lecta, omnigenas morborū ſpecies procreare ſolet, niſi protinus labore multo fuerint diſcuſſi, uel concocti, ac in ſanguinē facultatis beneficio quæ iocinori, ueniſq; inſita eſt, trāſierint.

Exerci-
tatio.

Modo factam.] Galenus addit, ſecundam, ut ſit mediocriter pallida concoctionem ſecundam (nempe quæ in uenis ſit) modo factam ſignificat. Omisit Paulus ſecundam, quia ex urina iudicium non niſi de ſecunda concoctione ſumitur.

Compen-
diū Pauli.
Caſtigatur
Paulus.

Acclius deambulatio.] Codex impreſſus uiciatus eſt, habet enim καὶ οἶον ἀντις δύναιτο pro καὶ οἱ ἀναιτες περίπατοι ex Galeno inſtauratum, unde hæc omnia tranſcripſit. Eſt autem acclius ambulatio, cum quis contra montem, aut loca æditiora inambulæ. Non aduertit Baſilienſis caſtigator.

Exercita-
tioes ſin-
gularum
parrium.

Præterea per alias ex.] Quippe itatio, curſusq; crurū exercitationes ſunt: acrochiri ſinr, & ſciomachiz, brachiorum, ac manuum propria Lumborum autem, aſſiduè ſe inclinare, & ruruſ reuocare. altereſ, ſpinæ thoracis autē & pulmonis, maximæ reſpirationeſ propriae exercitationeſ ſunt.

ἐν αὐτῇς.
Caſtigatur
codex Græ-
cus impreſ-
ſus.

Donec ruſceſcat.] Hoc eſt dum ſanguis in extimam cutē fuerit euocatur. Id ſignat ὅταν ἐν αὐτῇς ὑπάρχη. Hoc eſt cum floridus, uiuiduſq; & rubet apparuerit.

Concinne.] Malè in Græco ῥαθυμοί, pro εὐρυθμοί legitur. Vide Oribadium & Galenum Non aduertit Gemuſæuſ.

Calido

Calido uapore.] In codice Græco impresso θερμὸν ad sudorem uidetur referri. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda legit θερμῶ, ut referatur ad uaporē, sicut nos conuertimus. Vterq; Aristarchus, & Orosius, & Basilienfis hæc præterierunt.

Viciatus
codex.
Orosius.

Apothērapia.] Exercitationis omnis pars ultima est apothērapia, seu dicas recreatoria: nam corpus expurgat, & lassitudinem arcet.

IN XVIII. CAPVT.

I Nter frictions.] Paulus hoc ex secundo Galeni iam dicto libro ad uerbum mutuatus est. Galenus autem ex commē-
tario Hippocratis, qui inscribitur κατὰ ἰατρικὴν, in hunc modum: ἀνάτριψις δύναται λῦσαι, θῆσαι, σαρκῶσαι, μινθῆσαι, ἢ σκληρῆν θῆσαι, ἢ μαλακῆν λῦσαι ἢ πολλὰ μινθῆσαι, ἢ μετρίῃ παχύναι. Hoc est, frictio potest soluere, ligare, replere, minuire. Dura ligare, mollis soluere, multa minuire.

ἀνάτριψις

IN XIX. CAPVT.

I Nter uocis exer.] Hoc est ex quinto Oribasij transcriptū. Galenus huius exercitationis ferè non meminit. Est autem dictio Græca ἀναφωνοῖς: quæ signat exclamationem uociferationemq;: qualis in cāru editur, & lectione clara, orationeq;. Verbum ἀναφωνεῖν pro uoce cōtēdere interpretari potes.

ἀναφώ-
νησις.

IN XX. CAPVT.

V Lcerosa.] Exercitationum genera persecutus, nunc ea quæ illis superuenire solent, enumerat. Sunt itaq; lassitudinis tres numero differentia, ulcerosa, tensoria, & inflammatoria, seu ut Græce dicam, φλεγμονώδης. in tertio Galeni de sanitate tuenda ad uerbum explicat.

Lassitu-
dines.

Quo tendi uidentur.] Græce impressi codices, τίνεσθαι, quod est liquari, consumi; habent, pro τίνεσθαι non tamen hoc aduerterunt Orosius & Gemusius. In eodem capite χαλᾶται δὲ συντεταγμένον, pro χαλᾶται δὲ συντεταγμένον, quod est, sane laxatur, quod distentum est.

Negligen-
tia Oro-
scij.

Oleo dulci atq; egelido,] Hoc est: Ex maturis oliuis quarum baccæ iam nigrescere inceperint, droppas appellant, confectæ. Egelido, hoc est tepido, ut soli expositum fieri solet. Id Græca dictio uidetur innuere ἐλιδεύς si Grammaticis credimus, qui exponunt ὑπὸ ἡλίου θερμανθέντος. id est à sole excofacto. Quid si hyems, aut frigidum alioqui tempus sit: quò soli non solet, aut certe parum nos excalfacere, tunc ne etiam soli

ἐλιδεύς.

Egelidum

Tepidum. erit exponendum ut incalescat. Sane friuolū esse puto quod Orosius adfert, & pro tepido tantū, & ponitur postea in lassitudine inflammatoria legitur, *ἐλαίου τε ἐν πολῷ χλιαρὸν*, quod est: Oleum igitur copiosum tepidum addibendum. Verū ideo me reprehendere uidetur Orosius, quod egelido dixerim, putans hoc frigidum significari: male mehercules in authoribus latinis uersatus. Celsus egelidum in eodem sensu quo ego multis in locis usurpat: ut lib. 4. cap. 11. Neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est. Quomodo etiam Linaer eundem locum in Galenum ante me uertit, qui antea corrigendus erat. Scio quidē apud ueteres in usu fuisse post lassitudinem unctionem, uel in sole, uel ad ignē, si hoc pacto uolet intelligere *ἐιληθέρους*, uerū hoc oī tēpore nō est perpetuū.

Instauratur lectio Pauli,

[Vnctio.] Non est in græcis codicibus impressis: aliquot autem scripti manu habēt, & sensus exigit. Quid enim est, si referatur hæc dictio, continua, ad quietem. Multa quidem esse debet: non tamen perpetua, quod *συνεχὴς* significat. Iam Galenus ipse & Oribasius habent, *ἀλειψὶν συνεχὴς*, hoc est, unctiones continua. Legendū itaq; in Paulo pro *μάλιτα συνεχὴς*, quod est maximē continua, *ἀλείμματα συνεχῆ*, unctiones assidua. Hoc omiseras Gemusez, qui mauis curta omnia & mutila. aliquādo in Paulo legi, quā dictione una, aut altera ex Galeno, unde hæc transcripsit, sententiæ autoris adiuncta: utrum maius sit peccatum, alij iudicent.

Gemusez.

Apothepaz exercitationem. Quæ tum in motu, tum strictione, & pauca, & mollis, & tarda sit: præterea solum similiter calidum. Protinus autem in lauacra frigida exiliant, ut nimirum ipsis robur, in cute una cum calore constet, quæ admodum ait Galenus lib. 3. de sanitate tuenda. Lege in codice græco, *ἐν τοῖς λείπτροις ἐκ τῆς*, &c.

Corrigitur textus.

[Boni succi.] In codicibus impressis perperā habetur *ἐὺθυς* pro *ἐύχυμῷ*. Gemuseus omisit & hoc & superius.

IN XXI. CAPVT.

τέγνωσις quid;

Acopum ex populo nigra.

[A Strictio.] Galenus lib. 3. de sanitate uenda inquit. Voco ita meatuum cutis uitium, quo superuacua transmittere prohibetur. *τέγνωσις* græcis appellatur.

[Oleumq; ex.] Hoc Oribasius debet Is enim lib. 5. ad uerbum ex Galeno prius mutuatus erat. Verum in hoc dissentit, Paulus habet *αἰγίστιν ἐλαίου*, hoc est, oleum ex populo.

nigra

nigra cōfectum, Oribasius ἀκοπον ἀγέρινον. Galenus acopon ex abietis semine, τὸ δια' τῆ σπέρματος τῆς ἐλάτης ἀκοπον. Habes apud Paulum lib. 7. acopon ex abiete, acopon ex populo nigra, & oleum ex eadem populo, omnia eiusdem facultatis Nam loco fructus abietis, nigræ populi fructus æqua portio, apud eundem autorem ponitur.

IN XXII. CAPVT.

HOc capite de lassitudinibus agit, quæ citra exercitationē aut motum corporis sua sponte, nempe ex humorum suū perfluorū copia accedunt. Galenus eas lib. 4. de sanitate tuenda persequitur amplissime,

Si his peractis.] Hoc est : Si omnibus commemoratis præfidiis malum cesserit, ad consueta munia paulatim transcundum est. In Paulo deprauata est lectio græca, habetur. n. πρὸς τὰ συνήθη κατὰ λόγον, pro πρὸς τὰ συνήθη κατ' ὀλίγον, quod corrector Basilienfis omisit. Linacer rursus, conuertit.

Corrigitur
textus.

Si enim vires cōstent.] Quod est, cum sanguinis plus, succi uero mali minus in corpore redūdat. nam in sanguine vires naturales deprehenduntur. Si igitur paululum uel citra sanguinem restitutum uel ultra, processum est, audacter mittendus est. Si plurimum nequaquam.

Quando
mittendus
sanguis.

At si crudi humores.] Hi enim in iecore, & uentre manētes, temporis spacio paulatim cōcoquuntur, efficiunturq; benigni. eōq; seruari debent, qui tales humores collegerunt, in omni quiete, præcordiis probe fomētorum præsidio munitis, non aut sanguis debet eis detrahi, qm̄ uiriū robur his non adest ut Galenus ait in θεραπευτικῷ περὶ φλεβοτομίας in hanc sententiam. ἡ δὲ γὰρ ὁπότε πλῆθος αἱμάτων χυμῶν ὑβρίζεται τοιοῦτον, ὡς κελύεσθαι φλεβοτομίῃν ὁ λόγος ἐλέγχεται. δῶμιν γὰρ τέτοις ἐδυνάμεν ἐπάρεσι. Præterea purgatio his dari non debet, quia concocta. non cruda medicamentis sollicitare oportet,

Galenī sen-
tentia.

Oxymel.] Intellige simplex. Id enim cum ætatibus, tum naturis uniuersis, ut ait Galenus, & præcipuè pituitosis ad sanitatis securitatē seruit utilissime, dum omnes meatus artios aperit, ut nusquā crassus, uel glutinosus humor adhærescat.

Crudis ul-
riū robur
deest.

Apomeli.] Fit hoc melle à fauis expressio, & aqua fontana. Verum non simpliciter ex melle & aqua, ut putat Orosius. uide Galenū lib. 4. de sanitate tuenda, & Paulum lib. 7.

Oximeli-
tis facul-
tas.

Erratum
Orosij.

Senectus.] Ex quinto Oribasij. quintoq; Galeni de sanitate tuenda. In Paulo autem Græcus codex impressus deprauatus est habet enim ἐπαυρότως δ' αὐτῇ δια τῶν θερμαίνοντων τε καὶ ὑγρυνόντων ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι, hoc est: Corrigitur autem ea calefacientibus, & humectantibus una cum calefacientibus Superfluum est ἀμὰ τοῖς θερμαίνουσι. Orosius & Gemusæus non aduerterunt.

Erratum
Orosij.

Friccio.] Cū oleo scilicet adhibita, quæ uitale robur excitat, & modice calefacit, unde & distributio nutrimentum facilius, & nutritio promptior consequitur.

Imbecilliores.] Ut qui decrepita potissimum ætate sunt: et si alij alijs celerius senectutis incommoda experiantur Quicunq; igitur uel crudi adhuc senes, quos græci ὠμογέροντας appellant, uel decrepiti, imbecilliores uiribus existunt naturalibus, ter die cibum assument, idq; hanc ob causam potissimum: nempe q̃ una uice multum assumere nequeunt. Deinde, etiam si sumant, concoquere nequeunt, quare melius est cibum partiri in tres uices.

ὠμογέ-
ροντες.
Viridis se-
nectus.

Ficum.

Ac fici maturæ.] Hæ paulo innocentiores, immaturis: me diocriter tamen in usum adhibita. Ante cibum alium assumi debent, eo quod si non citò per aluum descendat, corruptio- nem in uentriculo subeunt, & alios secum cibos corrumpunt, id quod de omnibus fructibus fugacibus intelligendum est.

Per hyemem uero caricæ.] Hæ incidendi, extenuandique uim habent, quo nomine aluum citant, renesq; exputgant. Cum nucibus uerò simul comestæ ad omnia præstatiores existunt, atq; hinc nonnulli qui medicamentorum aduersus lethalia cōfecturas perscripserunt, ficus aridas cum nucibus, & ruta præsumptas omnium illorum præsens esse remediū tradunt.

Si nullū in dextra.] Galenus libello περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας inquit: περὶ ισχάδων δὲ δόξεν αἰ τις ἐναντία λέγων ἀληθεύειν, εἰ κακοχύμους γὰρ ἀμὰ καὶ εὐχύμους αὐτὰς ὅππινος αἰδὲς τε καὶ ὑγιανὸν ἔχουσας. εἰαν γὰρ αὐταὶ διηφέρχονται κατὰ τὴν γαστέρα, καὶ ἢ ἀπ' αὐτῶν ἀναδεδῆσα τροφή, διὰ τὴν δέξι-
τος, καὶ τῶν κερῶν ὑγιαναίτε ἵπσι καὶ εὐχυμει, βραδύνουσαι δὲ κακοχυμότεραι πῶς γίνονται Id est: De caricis autem, si quis contraria pronunciet, uere dicere censeatur, nempe bono maloq; esse præditas: morbidi cuiusdam & salubris particeps.

Si nanq;

Si namq; per aluum descendant, ac alimentū quod ab eis pro-
uenit, in corpus distributum, iecur renetq; transierit, salubres
sunt, & succi benignioris: sin remorentur, prauioris quodam-
modo sunt: In textu hoc Galeni habes *διὰ τε τῆ δερματος*,
quod est, per cutem, male pro *διὰ τε τῆ ἡπατος*. Hoc in codi-
ce nuper impresso Gemusæus castigator præterijt.

Ante cibum.] Alus subducendæ gratia: quæ etiam oliuis,
ut Galenus in commentario de alimentis docet, & damasce-
nis sollicitatur.

IN XXVI. CAPVT.

QVandoquidem uero.] Ex quinto Oribasij sumptum
est Græcus textus deprauatus in Paulo est, pro *ἐπι-
δὴ δὲ δεικται* legi debet *ἐπιδὴ δὲ δὲ τῇ ἐξαι*, &c. quod anno-
tauit Orosius. Verum in hoc grauissimè peccat, dum alios
reprehendit quod *τρίματι* uerterit frictione, cum Galenus,
Paulus & Oribasius semper dictionem *τρίψιν* & *ἀνάτρίψιν*,
pro frictione usurparint. *τρίμμα* uero. apud grāmaticos, Sui-
dam, Hesichium, Budæumq; nostrum pro detrimento accipi-
tur, ueluti cum lapides atteruntur, aliàs aliæ res minutissimæ
deteruntur. Quid hic commodius erit quàm pulvis? qui ex
medicamentis contritis effectus sit, & corpori admotus in bal-
neo. Addidi hic, aquæ indito, ad sensum explendum Præterea
errat Orosius, qui *λουόμενος*, id est, dū lauatur, uerterit, post
balneum, cum eiusmodi smegmata in balneo soleant adhi-
beri. Sed frictionem intelligit: quanquam ipse textus sequens
eum admoueat. Nam à balneo acopi usum præscribit: in bal-
neo, aliorū erit. Reliquit textū uitiosum corrector Basilien-
sis.

Summatq; propoma.] Vfus sum dictione græca quod ferè
nulla apud latinos extet, quæ ad unguem eam referre possit.
Græci autem uocant *προπόματα* quæ ex uino fiunt, & melle
dispumato. Nā Paul. lib. 7. inqt: *ἀλλὰ καὶ τὰ μὲν ἐξ οἴνου συντε-
θέμενα, ἃ δὲ καὶ προπόματα καλεῖσι, τῷ μέλιτος ἀπαφροδιέντος
ἐκ λαμβάνει πρὸς τέσσαρας τῷ οἴνῳ, καὶ συντίθεται μὴ ἐφόμενα*

IN XXVII. CAPVT.

COrpus decoloratum.] Vita lætior, citra curas, & melācho-
liam actiones naturales non habet impeditas, unde san-
guis primū coqui, deinde toti corpori distribui potest. Græce
est *βίος εὐφροσύνης*, hoc est, uita læta, & iucūda: *προσωνής βρῶ-
σις* est *προσφιλής*, quod signat chara, gratāq; commestio.

Passillos.

Textus
Galenī
uiciatus.

Corrigitur
Pauli le-
ctio.
Erratum
Orosij.
τρίμμα.

Erratum
Orosij.

Propo-
mata.

*βίος εὐ-
φροσύνης*
προσωνής
βρῶσις.

κόλλικες.

[Pastillos.] Græca dictio est κόλλικες, à nullo ferè grammatico exposita. Galenus autem ex Hippocrate interpretatus est *περοχίσκικες*, quod hic optimè quadrat. Magni alioqui uiri in hac uoce decepti sunt, qui pro glutinâtibus quibusdam rebus usurparint.

Corrigitur
codex.

IN XXIX. CAPVT.

Melcoctum.] Exemplaria græca deprauata sunt, habent enim καὶ μέλι ἐφθόν τὸ σκληρόν ἄγαν, pro τὸ σκληρόν ἄγαν εἶναι, hoc est, quod durū nimis sit: causam addit, cur melcoctum dentibus noceat.

IN XXXI. CAPVT.

Germani-
cā impres-
sio.

In superiore uentre.] Ex quinto Oribasij transcriptum est, εἰς τὴν ὑπὲρ τοῦ στήθους ὑπὸ τοῦ στήθους, in quo sit concoctio. In eo si diutius immorentur, perficacia sunt & dura.

Ventos contrarios.] Nihil oculis magis incōmodat quàm uentus contrarius, eoq; miror, cur Germanicus corrector mutauerit ἰνατίους, hoc est contrarios in ἐνατίους, quasi dicas causæ authores.

IN XXXII. CAPVT.

Purimum noxæ ciborum.] Similem habet sententiā Galenus in commentario Aphorismorum primo: ὅταν γὰρ ἐπερπλησθῇ τὰ ἀγγεῖα ποτῶν ἢ σιτίων τῇ διαρρέειναι κίνδυνος αὐτοῖς, ἢ καταπνιγῇ αἱ καὶ σφειδῇ αἱ τὸ ἐμφυτον αὐτὸ διεσπῇ. καθάπερ καὶ ἀπώλλονται οἱ τίνες. Hoc est: Cum enim uasa potu, aut cibo repleta supra modum fuerint, periculum ne ea rumpuntur, aut ipsi suffocantur aut etiam calidum natuum ipsum extinguant.

Vomitu igitur.] Post uomitum autem os colluendū, dentes, oculosq; & totam faciem postea præcepit Oribasius. Id nisi fiat, dentes eis qui uomunt, computrescere. Sollicitari autem uomitus debet aqua tepida statim assumpta.

πληθώρα.
πληθος.
πλησμονή.
νέ.

At si neq; descenderit.] Signa repletionis uenarum commemorat. At sanguinis redundancia proprie πληθώρα græcis dicitur. πληθος. pro omnium humorum sepatatim plenitudine accipitur. πλησμονή pro répletione tum potus, tum cibi, & uentris & uenarum usurpatur.

IN XXXIII. CAPVT.

Cibis in uentre. Hoc sumptum est ex sexto Galeni de sanitate tuenda. Fit autem sæpe, ut cibi corrumpantur, aut

nimia

nimīa copia ingesti, aut qualitate praua donati, aut tempore in commodo assumpti, aut ipsius uentriculi affecti uicio. Quō autem corrupta educantur, Galenus ample docet. Inter cetera uomitum cōmendat ex uini dulcis potu. Sed Pauli textus impressus in omnibus exemplaribus deprauatus est, habet. n. *δι δὲν πόσεως καὶ γλυκέως*, pro *δι δὲνός πόσεως γλυκέως*.

Corrigitur
textus
Pauli,

Quæ mediocriter purgant.] Sunt enim quædam medicamenta, quæ admodum grauitè, & magno cum naturæ detrimento purgant. Itaq; mediocria hic præcipit, quæ sæpius per interualla sumi possint: qualis est picra dia aloes, cuius compositionem habes in septimo descriptam.

IN XXXV. CAPVT.

Veneris hæc sunt commoda. Ex Oribasij lib. i. hæc sunt transcripta. Ante commoda autē docet, quibus uenus noceat: tum partibus corporis, tum temperaturis. Noxia itaq; uenus est inquit, pectori, pulmonibus, capiti, & neruis: itē siccis natura, & frigidis. Caueri etiā debet post repletionem, cū cibi, tum uini, item post euacuationem ex uomitu factā: purgationem, & si uenter sua sponte fuerit solutus. Præterea si cibus nondum sit concoctus, aut si ægritudo quædam infestat.

Eoq; melancholicis.] Vide Aristotelem in problematum sectione 4. ad finem, nimirum qd statu redundant. Semen autem decessio flatus existit. Sed quid de insipientibus dicemus, an & illi flatus habent? Ego sane opinor uenerem insipientibus conuenire, quod seminis qualitas quæ uirilitem & uedicā græce *θυμὸν* homini cōciliat, si in corporibus alioqui temperamento calidis, copiosior impertiatur, ex *θυμὸν* solent *μάνια* fieri. Semine autem excreto, animus ille remittitur & qualitas imminuitur. Galen. optimè de ueneris usu scribit in cōmentario qui inscribitur, *ιατρικὴ τέχνη*, uerba ipsius in hunc modum habet: *ἀφροδισίων δὲ κατὰ μὲν ἐπίκουρον ἔδει μία χρῆσις ὑγιεινὴ, κατὰ δὲ τὸ ἀλκιμὲς, ἐκ διαλεμμάτων τιλικύτων ὡς ἐπὶ ταῖς χρήσεσι, μήτε ἐκ λήστεως αἰδοῦντα, καὶ κηφότερον αὐτὸν ἑαυτῇ δοκῶν γεγονέναι, καὶ ἐνπνέοντα, δὲ καὶ τοῦ πῶς χρήσεως, ὅταν ἀνδρὶ βῶς μέσον ἢ τῶν ἑξωθεν περιστάσεων ἀπασῶν τὸ σῶμα μὴ ὑπερπεπληρωμένον, μὴ ἔνδον, μὴ ὑπερεφύμενον, μὴ ὑπερθερμασμένον, ἢ ἐξηρασμένον, ἢ ὑγρασμένον ἀμέτρως. i. Rei ueneris fm Epicurū sane nullus ad sanitate usus est. Sin aut̃ uerū fateri uelim, coducit, si tāto t̃pis interuallo*

Venus corpus intergram requirit,

exerc-

exerceatur, ut ex ipsius usu nec resolutionem corpus sentiat, & leuius quàm fuit euasissè, perspirātiusq; uideatur. Tempus autem coeundi est, cum ex omnibus quæ foris accidunt medium exacte corpus obtinuerit, neq; uidelicet repletum nimis sit, neq; inane, neq; refrigeratum impendio, neq; excalfactum: neq; siccatum, neq; humectatum immodicè.

Cæterum alij etiam.] Dux dictiones contrariæ in græco ponuntur, nempe *δυσιτότεροι*, & *ἄσιτοι*, quanquam improprie si Galeno credimus, *ἄσιτοι* ponitur pro ijs qui fastidio laborant. Nam id *ἀπίσιτοι* significat, ut superius annotatum est. Sed positum est opinor, ut *ἀσπλάγνος*, hoc est, sine uisceribus, pro eo qui parua uiscera habet, *εὐσιτος*, hoc est, uoce carens, pro illo, qui paruam uocem edit, *εὐσιτος* cibi appetens. Superius nempe capite primo positum uidetur pro *εὐσιτος πρὸς τὸν*, hoc est, cibi cupidus faciens. Nam *εὐσιτοι δὲ καὶ οἱ πόνοι. καὶ αἰμακρωτέραι ἀποδημίαι*. Id est: Iam uero & labores, & longiores profectioes cibi appetentiam faciunt. Verum alius *εὐσιτοι* legendum putat.

Celsus.

At uehemens.] Celsus eleganter libro primo hanc sententiam ex græcis confirmat his uerbis. Concubitus uero, neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est. Rarus corpus excitat, frequens soluit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis scire licet, eum nō inutile esse, quæ corporis neq; languor, neq; dolor sequitur.

Antequam somnus inuadat.] Ex Oribasio hæc particula sumpta est: & uideri possit Galeno contraria. Is enim libro primo de sanitate tuenda ex Hippocratis sententia hunc ordinē obseruat. Labor, cibis, potus, somnus, uenus, & hæc omnia mediocrità. Paulus ante somnum uenere inuandam censet, redditq; rationem non certè inuolidam. Sed intelligendū est, secundum cibum, non statim, sed concoctione obita: nihil etiam refert, si somnus aliquis breuior præcesserit: sequatur prolixior: ex quo uires colliguntur.

Varia le-
ctio.
Gemusq;

Frigus superueniens.] Bisariam legitur in græcis exemplaribus, Germanicum habet *καὶ ψέγης αὐτὴ ἐπιγιγνώμεναι*, hoc est, frigus urgens, aut ualens. Alia habent *ἐπιγιγνώμεναι*, quasi dicas superueniens. Ita quoque Oribasius habet. Nescio cur Gemusq; mutauerit.

In

IN XXVIII. CAPVT.

CApite grauantur & anxij fiunt.] Hoc caput ex Oribasij libro primo transcriptum est. Vbi etiam græce habetur, καὶ ἀσώδης γίνονται, quod est, & anxij fiunt, conflistanturq;. Oro scijs alios reprehendens ex Marcelli Florentini Dioscoridis interpretis sententia uertendum censet ἀσώδης ex replezione cibum fastidientes. At Galenus in commentario libri secundi προῤῥητικῶν Hippocratis hoc modo interpretatur, διττῶς γὰρ γινόμενων ἀσώδων τῶν καμνόντων, ἢ αὖ μὲν τρέπον, ὅταν ἡ δύναμις ὑπὸ σώματος βάρυνται καὶ μηδὲν φέρειν σχῆμα ἡδύως. ἕτερον δὲ ὅταν τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς ὑπὸ μοχλοῦν δάκνεται χυμῶν. οἱ πρότεροι μὲν ὀλεθρίως δάκνεται, ναυτιώδης δ' εἰσὶν οἱ δεύτεροι. Id est: Cum bifariam ægotantes fiāt ἀσώδης, uno quidem modo, quum uirtus à corpore grauat, nullamq; eius figuram ex facili tolerat, altero autem cum os uentriculi à uitiosis humoribus mordetur, priores quidē affecti sunt perniciosè: alteri uero nauseabundi exiisūt, &c. Hoc itaq; Pauli contextu prior significatio accipienda est: nō secunda, quādoquidem uirtus seminis copia multum grauat, Deductum autem ἀσώδης est ab ἀσκή: quæ dictio frequens est apud Galenum & Hippocratem, primum δυσφορίαν, signans: deinde fastidium acribus humoribus stomachum rodētibz excitatum, unde & uomitus ἀσώδης dicitur. Nolo hic cōmemorare, quā multi etiā celebres uiri in eius interpretatione sint decepti. Legendum est ἀσώδης, non ἀσάδης, quod etiam ἀσόμενος dicitur.

Aliorum.] In codicibus græcis impressis habetur ἁλῶν, hoc est, sale, pro ἁλλων, quod est, aliorum, quam lectionem & sensus, & Galenus in sexto de sanitate tuenda approbat. Nos antea quoq; aduertimus.

Semen uiticis.] Græcus codex habet καὶ σπέρμα τῆς λίνου: hoc est & semen lini, pro σπέρμα τῆς ἄγνης, quod est semen uiticis. Sic etiam habet Oribasius. Irem superius iam fecerat Paulus mentionem seminis lini. Hoc non aduerterūt Oroscius & Gemusæus.

IN XXXIX. CAPVT.

PIper myrrham cum dulci.] Calida perfrictionem expertis præscribit: quæ nimirum habitum ipsorum restituat. Nescio autem cur Oroscius legendum hic censeat cum uino albo,

ἀσώδης.
Hippocrates.

Duplex significatus
dictionis.
ἀσώδης.

ἀσκή, quid

ἀσόμενος.
Lectio castigata.

Lectio deprauata.
Erratum.
Oroschj & Gemusæi.

Oroschius falso emendat.

albo, cum nullum eius generis calidum sit, nec odorum, quale Paulus requirit. Melior itaq; lectio cum uino dulci, quale est fuluum, frigidis aut temperamento, aut ex accidenti accommodatissimum, si Galeno credimus, & ipsi euidentiz.

IN XL. CAPVT.

ἐγκαυσες.

quid,
Celsus.Lectio. e.
mendata.

ἀθρόως.

[S]i qui uero.] Græce est ἐγκαυσες, quod ad uerbum sonat S adustio uel exustio. Galenus lib secundo κατὰ τόπους: propriè dici affirmat, de ijs qui exuruntur in sole. Celsus: Si quis in sole exustus est, huic corpus & caput oleo perfundendum. Paulatin.] In impresso est κατὰ λόγον, quod est secūdn rationem, pro κατ' αἰγιον, id est palatim, cuius cōtrarium sequitur ἀθρόως, quod idem significat quod uniuersim, subito ac una uice.

IN XLI. CAPVT.

Celsus.

Cibi ualen
tis materia

τρόφιμα.

Celsus.

Instantata

lectio.

[C]ibos ualentis materiæ.] Ex quinto Oribasij traducta sunt: uoco autem cibos ualentis materiæ, quæ probe & multum nutriunt: ut Celsus alia ualentis, alia inediæ, alia imbecillæ materiæ, libro secundo commemorat: uocatq; ualentissimū, in quo plurimū alimenti est. Græci uocant τρόφιμα.

[Et ijs quidem obl.] Græcus codex deprauatus est, habet enim καίροντι μὴδ' ἐπὶ τῆτοις. Id est, oblectetur, neq; ob hæc pro καίροντι δ' ἐπὶ τούτοις omisla negatione μὴ. Sic legit Oribasius, quod etiā Orosius annotauit: sed Gemusæus omisit.

IN XLII. CAPVT.

Vomitus

quot mo-
dis excite-
tur,

[Q]uoniam laboriosè uomentibus.] Hoc caput ex primo Oribasii sumptum est. Vomitus primum uiciis ratione excitatur: deinde medicamentis, &c. Victus ratione excitato utuntur etiam in secunda quoq; ualetudine: præterea in acutis fere morbis, quum bilis, aut pituita in stomacho superat. Medicamentis uomitum facientibus, neq; sani, neq; acuta egritudine occupati utentur. Nam ea longis tantum affectibus, & induratis conueniunt. Hinc etiam ueteres cū nihil in medicina spei deprehendissent, ad uomitum solebant confugere. Id quod hodie etiam empirici quidam sine ulla ratione facitantes, optimis quibusq; medicis laudem præripiunt. Nam ea medicamenta propinant, quæ suprâ & infrâ ualentissimè purgent: quæ si æger ferre possit, sanitati plurimum restituitur: sin autem moritur, audaciæ suæ & temeritatis patrociniū habent, q; scilicet morbus fuerit desperatus,

tot me-

Empirici
nostræ æta-
tis,

tot medicis antea curationem frustra molitis. Ceterū quando potissimum uomitus sollicitari debeat, Polybus in libello de uictu priuatorum docet. Sex mensibus hybernis inquies, uomitu, æstate clysteriis utendum est. Quia enim per hyemē pituita in uentre generatur, uomitu eam euacuari præcipit. æstate uero bilem supernatantē, deorsum reuellere. Quæ sententia Hippocrati contraria in Aphorismis uideri queat: ubi habet: Aestate superiora magis, hyeme inferiora medicamentis sollicitare oportet. Hic dicemus ex sententia Galeni, totū corpus si purgare uolueris, æstate per superiorem uentrē, hyeme per inferiorem medicandum est. Sicut in Aphorismis dictum inuenimus. Etenim redundantibus, purgatio medetur, illuc quod uergunt adhibita. At si ab incremento humores in parte aliqua prohibere uolueris, per opposita reuellere conducit. Melancholicus autem humor quocunq; in loco fuerit, per inferiora educi debet. Ceterum alii singulis mensibus bis uomunt: alii per longiora interualla: alii nullo tēpore præscripto, sed quoties aut uino, aut cibo pleniore se ingurgitarint. Qui aut uomere bis in mēse uult, inquit Polybus, & post eū Celsus, melius cōsulet, si biduo continuarit, q̄ si post quintumdecimum diem uomuerit. Galenus aut nihil referre dicit, si ex interuallo nō cōtinuatis diebus uomas. Porro uomitus quō medicamentis exciteē, septimo libro est cōprehēsum.

Ferculum ex fabis,] Græce hoc uocatur ἔντος. Galenus interpretatur libello de euchymia his uerbis. ἔντος οἶνομάζω τὸ ἐκ τῶν ἐρεχθέων ὅσπριων καὶ χερρόπων σκιδναζόμενον, &c. Verū quod sequitur in codice καὶ τὰ πρίονα τῶν κρεῶν, hoc est, & pinguiore carnes, ubi legendum eē seο καὶ τὰ πλείονα τῶν κρεῶν, quod est, & copiosiores carnes, scilicet fabarum. Nam ex leguminibus hæc commemorat Paulus. Non sum autem ignarus, pinguiore carnes, ut est suilla aliorumq; animalium uomitum posse excitare. Verū Oribasius nobiscum sentit & contextus requirit.

Verū non solum.] Hoc quoq; superiorem lectionē confirmat. Nam χύλοι hoc est, succi seu cremores non de carnibus animalium dicitur, si quid iudico, sed de leguminibus aqua maceratis: aut de herbis, si mentio earum fuisset facta. Dixi autem cremores, secutus Varronem & Celsum, qui uocant cremorem psisanæ, aliorumq; granorum, ac leguminum.

Irrites.

Polybus.
Quādo uomitu utendum.

Collatio sententiarum.

Quomodo totum corpus purgari debet, & quō pars corporis, Humores ne crescāt per opposita reuellendi.

Quādo uomendum.

ἔντος,

Neglexis Orosius.

Chyli leguminum.

[Irrites.] Parum absolute dixit irrites, digitis eo perunctis, intellige & in os demissis.

Instaurata
lesio.

[Ne cesset uel intermittat.] Manca uidetur sententia græca: ἐμετικὸν δὲ καὶ τὸ μὴ ἀνίεναι καὶ διαλύειν ἐπὶ τοῖς ἐμέτοις, quod est: Eum qui uomere debet, non oportet cessare, nec intermittere. Quid hoc est, nisi ponatur aliquid, quod terminum eius signet? Nam hoc pacto perpetuus, uomitus, aut simile quippiam intelligi possit, quod quàm sit absurdum, omnes eruditi norunt, addendum ergo in codice græco ἀχρεὶς ἂν ἀπαντὰ λαβὴντα ἐμβάλη. i. Donec oīa quę infestāt, eiecerit.

Ut est in Oribasio, quod Orosius & Gemusæus præterierūt.

IN XLIII. CAPVT.

Orosius
& Gemu-
seus nimis
in aliorum
erratis oc-
cupati.
Epithymi-
dosis: non
animaduer-
sa ab Oro-
scio.

[M]ane epithymi drachmam.] Nusquam inuenio minus epithymi pondus ad aluum ducendā. Alii drachmas tres propinant, alii quatuor, alii quinque. Nec opinor drachmam unam quippiam proficere, eoq; mendum forte est. Item Paulus in septimo drachmas quinque præbet. Auicenna usque ad quatuor.

IN XLIII. CAPVT.

Varietates
clysterum.

[C]lysteribus utendum.] Quemadmodum balneorum præfecti, lapidum sordes, lutumq; abluunt, ita clysteres uentriculi & intestinorum pituitam & bilem detergent, qui pro humoris diuersitate etiam uariari solent: alii præterea lenes, alii acres habentur. Item triplici liquoris mensura constant. Sūma est, tres hemine, media, duę, minima, una. Si Oribasio credimus, eoq; miror Paulum hic semiheminā ponere, quod ferē apud nos dimidia libra est: quę parum adeo euacuabit.

IN XLV. CAPVT.

πάρεσις.
παράλυ-
σις.
πάρετοις.

[V]timur etiam gland.] Et hoc & superius caput ex primo Oribasi transcriptum est. In calce habetur græce παρεσις αἰδοῖν quasi remissionibus, aut relaxationibus, uel resolutionibus. Sed πάρεσις & παράλυσις, ita differunt, q̃ illa partem aliquam corporis obsidet: hæc uero totum corpus. Dicuntur etiam παρετοις resoluti in aliquo membro.

IN XLVI. CAPVT.

ἀποφλε-
ματισ-
μός.

[H]umores in capite.] De medicamentis agit quę materiā ex capite tum per os, tum per nares detrahunt, ac potius detrahendi modum præscribit. Ac primum Græco uocabulo ἀποφλέγματισμός appellat. Scribonius compositione nona exponit

exponit his uerbis: Si per os magis detrudere materiã uisum fuerit, suadebimus pyrethri radiculam commanducare: atque subinde hiantem pati fluere saliuam, Celsus etiã lib. 4. cap. 2. explicat: Gargarizare his, quæ saliuam mouent, inquiens: Nam aut manduntur ea medicamenta, aut in gargarismata adhibetur. Rectè igitur interpretabimur, & Latine ἀποφλεγματίζην, saliuam mouere. Alterum medicamentum quod per nares caput purgat, ἰχθυήν uocatur. Solet enim hoc per cornu, quod ξιγχιτύς dicitur, naribus infundi. Ibi paulisper commoratur, materiam è capite detrahit. Tertium ab illitu διαχριστὸν nuncupatur, quod palato, collumellæ, & narium foraminibus applicatur. Verùm hoc in uniuersum intelligi debet, nullum ex comprehensis modo medicamentis esse adhibendum, nisi toto prius corpore purgato.

Materiam
per os de-
trahere.

Saliuam
mouere.

ἰχθυήν.

διαχρισ-
τὸν.

Sapa.] Græci hoc uocant σίρσαιον, & ἰψήμα. Galenus lib 3. κατὰ γένν. cap. 1. 1. οὐκ εἶναι τῶν τροχίσκων ἢ κυκλίσκων, ἢ ὅπως αὖν ὀνομάζην ἐθελοῖται, ὧν εἰς ἐπὶ καὶ ὁ πολυνόμος δι' ἰψήματος ἢ σιρσαίου καὶ γὰρ καὶ τὸ το καλεῖν ὡς αὖν αὐτὸς βαλνῆς ἐξέφωστοι, &c. Solutio igitur uno pastillotum aut orbiculorū, aut quomodocūq; uocare libet, è quorum numero etiã est qui Polyidæ ascribitur, ex sapa, quā Græci ἰψήμα uel σίρσαιον, uel Sapz. quomodocūq; hanc quoq; uelis, appellant Est autem serzū uel hepsēma, uel sapa, ingenij non naturæ opus, musto ad tertiam usq; partem mensuræ decocto. Quod ubi factum ad dimidiam est, defrutū uocamus. Hæc Plinius lib 14. cap 9. Idē Defrutum, lib. 23. cap. 2. Vino cognata res sapa est: musto decocto, donec tertia pars super sit. His consentit Leontinus agriculturæ Leontinus, scriptor Græcus, in hunc modum inquiens: τλεύκης καλλι-φουξέτας ἢ, οἶνον καλλιφουξέτας ἢ. ἐπὶ τρίτης ἐφῶν καὶ ἀπαφρίζων, ἐξάιρετον ποίσεις, Hoc est: musti optimi sextarius octo, uini nobilissimi sextarius centum, ad tertiam coquens, despu- mansq; eximiam sapam conficies. Columella refert quosdam partem quartam eius musti quod in uasa plumbea coniecerunt, nonnullos tertiam decoquere. Verum id ex aliorum sententia recenset. His accidit aliud sapa nomen Latinum, Calenum. Calenum scilicet, quod deprauatum est in Palladio, mutatumq; in Caroenum, quod uir quidā non mediocriter in literis uersatus putat ex Palladij seculo manasse. apud ueteres tū Græcos, tum Latinos in usu nō fuisse. Verum rem penitus intro-

spicienti Calenum apud Strabonem urbs est Cāpaniæ, in cuius agro uinum optimū & dulce nascitur. Plin. lib. 14. cap. 16. ijs præponi solebāt Calena, Legendū itaq; cēseo apud Palladium: Modus his & uirtutē mutabit, & nomina. Nam defrutum à deferuendo dictū, ubi ad spissitudinem ualde despumauerit, effectum est: Calenum, cum tertia perditā, duæ partes remāscunt: sapa, ubi ad tertiā redacta descenderit &c. Quē admodū igitur *σάπων* & *ψικτον* apud Hippocratē inter se cōfunduntur, ita apud Latinos sapa, & defrutū. Cū ipse Columella lib. 12. scribat, mustū quādo dulcissimi saporis decoquit ad tertiā, & decoctum, sicut supra dixi, defrutū uocat.

Voces cōfunduntur.

Quod autem ori illinitur tale est: sapo.] Hoc sumptum est ex lib. 2. de Cōpositione medicamentorum secundum locos ad calcē: uerba ita sonant: *ἄλλο διαχειρόν τόματος, σάπων α διές τέτλου χυλῶ χρίσιν, τὰ κατὰ τῶν ὕφανισκον, καὶ τὸν κρόνα τῷ τόματος, τὸ δ' αὐτό τῷ καὶ ἐξέρινον ἐστίν.* i. aliud qđ ori illinitur. Saponem betæ succo dilutum palati regionibus & columellæ illinito. Idem uero hoc etiam per nares infunditur, &c. Deinde sequitur paulo post, *ἐν πορείᾳ δὲ πολλὰς ἐχρήσασθαι φαρμάκων ἐγχεομένων τῇ ρινὶ μελανθίῳ, ποτὲ μὲν ὅξει, ὅρμι μετὰ διαβρέχων πρὸ μιᾶς ἡμέρας, ἅτα τῇ ὑπεραιῳ σὺν ὀξεί πᾶσιν λέων, καὶ ἐγγίαν εἰς τὴν ξίνα διὰ τῶν μυκήρων.* Hoc est, facili autem paratu subinde usus sum medicamento melanthio, quod naribus infunditur, interim sane aceto acri pridie macerans, deinde postero die ex aceto rursus læuigans, infundensq; narium foraminibus, &c. Ex priorē igitur cōtexu Galeni, Pauli lectio corrigenda uenit, legendumq; pro *σίνιπι*, qđ est sinapi, *σάπων*, hoc est sapo. Cui lectiōni altipulatur etiam Oribasius lib. 1. Est autem teste Plinio Sapo galloꝝ inuentum rutilandis capillis, ex seuo & cinere, liquidus & spissus. Hoc non aduertit Orosius, iam seuerus aliorum castigator.

LECTIO CORRIGITUR.

Hoc non aduertit Orosius.

IN XLVII. CAPVT.

Quæcumq; urinæ ciendæ sunt.] Omnia ex Oribasio perne descripta sunt, nisi quod post rutam, addit Oribasius, aut anethi radices ustæ, aut cinis eorum cum melle. Cæterum quibus de causis menses retineantur interim, tertio libro abunde condiscēs.

Vulux subijciuntur.] Græci uocant medicamenta propriè, quæ lana excepta naturalibus cōduntur, *πρόδια*, quales sunt

sunt possi dicti, aut penicilla, collyriāq; , ut apud Aristotelem in 2. de generatione: τὰς δὲ γυναῖκας βασιανίζουσι τῆς τε προσ-
 θέτοις, ἢ ἀνδρῶνται αἰδομαι πρὸς τὸ πνεῦμα τὸ διδραξεν κα-
 τ' αὐτῶν αἶμα: καὶ τῆς ἐγχερίτοις Hoc est, mulieres autem ijs quæ
 uulux insinuantur, explorant, num odores ad spiritum qui fo-
 ris aduenit, ab infernis partibus sursum perueniant: item ijs
 quæ illinuntur, &c. quod Hippocrates ex suffitu aromatum
 ad nares & os delato cognosci tradit. Cæterum προσθιτά ue-
 niunt à uerbo προσθιτάειν, quod priuatim signat, subiici natu-
 ralibus mulierum. Dioscorides lib. 1. cap. 1. προσθιτῆσαι δὲ ὡς
 κολλύριον μετὰ μέλιτος, ἢ μβρυα κατασπῶσι. Hoc est radices
 iridis collyrij modo cum melle naturalibus foeminarum su-
 biectæ fœtus excutiunt. Hinc etiam προσθιμάτα deriuantur,
 idē quod πρόσθιτα, significātia. Dioscorides de costa loquens,
 δύναμιν δὲ ἔχει ἐμμήνων ἀγωγόν, καὶ τῶν περὶ τὴν ὑτέραν πα-
 τῶν, ἀγαγόν ἐν προσθιμάσιν, κατὰ τὴν λήμασιν καὶ περιέσσει, quod
 Latine sonat: Menstrua uero educit, & uulux affectibus me-
 detur, in pessis subiecta, superfusionibus & fomentis. Quæ ad-
 modum igitur προσθιτάειν apud Græcos usurpatur, ita subiici-
 cere, apud idoneos Latinæ scripturæ scriptores. Id quod ex
 Celso licet deprehendere, lib 5 c. 21. ubi habet: Sed alia quoq;
 utilia sunt, ut ea quæ foeminis subiiciūt: πέσσοις Græci uocāt.

Aut allium. Lege in codice Græco ἡ σκόρδον λείον προσ-
 θιμένον, non habetur impressum ἡ σκόρδον λείον προσθιμένον.
 Id nec Oroscius, nec Gemusæus aduertit.

IN XLVIII. CAPVT.

SVdorem eliciunt.] Quemadmodum alius quotidie respō-
 dens, & urina, aliaq; recrementa reddita sanitati faciūt, ita
 sudor etiam cum opus est, effusus, non mediocriter corpus cō-
 seruat. Ex cibo igitur dum concoquitur, duo recrementa ge-
 nerantur, alterū, quod crassius est, crassioribus intestinis trās-
 mittitur, alterum quod tenuius, cū chylo adhuc fertur. In
 iocinore chylus in sanguinem conuersus, ad cauam uenam
 transit. Quem ubi serosi illi humores, quod excrementum te-
 nue appellauit, eō traduxerint, non conuenit, ut diutius in cor-
 pore maneant, ideoq; renes caux uenæ non procul à iocino-
 re adhærent, qui illos recipiant, pauco sanè adhuc aquoso hu-
 more sanguini permixto, uehiculī causa, qui & ipse purgari
 per cutis meatus debet, uocaturq; sudor. Si itaque copiosior

προσθιτά.
 προσθιτε-
 ται.

Subijcere.

Oroscius
 hoc negle-
 xit.

Recremen-
 ta.

Sudor quo
 modo gene-
 retur.

successu temporis collectus fuerit, ut iam onus uenis existat, artificio elici debet, natura uidelicet cessante, uel ob meatuum densitatem, uel ob aliam causam. Scribit itaq; remedia quædam Aegineta, quæ ex Oribasio omnia mutuatus est.

Similiter inspersa.] Codex impressus uterque habet ἐμπλασσομένη, quod est emplastri modo adhibita pro ἐμπασσομένη, id est, inspersa. Non enim simplicia euumerata, materiam habent, quæ illini possit. Oroscius & Gemusæus præterierunt, in aliorum erratis castigandis occupati.

Oroscius
non aduertit.

IN XLIX. CAPVT.

L Audatissimus.] Quemadmodum uino, escis exercitatione, uigilijs, somno ac uenere, alijs alias uti pro ratione ætatis expedit, ita de aere, quoq; iudicandum, quem optimum in pulmones trahere, omnibus iuxta salubre est. Transcriptum est hoc caput pene ad uerbum ex Gal. 1. de sanitate tuenda, & Oribasio.

Pestilentem auram exhalante.] In codice impresso habet δηλητήριον αὔραν ἀναπέμποντος, hoc est exitialem perflatum sursum mittente. Galenus unde hæc mutuatus est, ἀποπνέοντος habet. quod est, respirante, exhalante: quanquam parum refert, hoc, uel illo modo legas.

Galeus.

Nota morborum pul-
pice gra-
fantium.

Hoc igitur modo.] Hippocrates iudicium hoc maximum in morborum causis cognoscendis tradit: nempe si oēs, cuiuscunq; ætatis, ac tēperaturæ fuerint, morbis cōficiētur, aerem autorem esse intelligemus ut postea in secundo uolumine discēs.

IN L. CAPVT.

A Quarum,] Ex eodem Galeni loco: hæc transcripta sunt. Autor autem hic noster ad sanitatem tuendam etiā aquæ bonæ usum facere testatur. Si quidem sit interim, ut alibi Galenus memoriæ prodit, ut totus exercitus prauæ aquæ usu de uita periclitetur.

In lib. de
euchymia,
& cachy-
mia.

Aegre concoctionis.] In Græco ἀτέρεμνα male pro ἀτέραμνα legitur. Quæ de dictio proprie de leguminibus dicitur, nempe concoctu difficilibus ob duritiem. Galenus in libello quomodo boni maliq; succi generantur, in hunc modum ait: ἐνία δὲ τῶν δημητρίων σπερμάτων, ἐδ' ὅλως ὀγκῶσαι πέφυ-
κεν ἐφ' ὅμνα κεκλήκασιν ἀτέραμνα τῶν παλαιῶν ἑλλήνων τινές, id est: Nonnulla uero cerealium semina nequaquam solent intumescere, cum coquuntur, uocarunt autem eiusmodi ex ueteribus Græcis nonnulli οὐτέραμνα, quasi di-

ἀτέραμ-
να.

cas re-

cas rebellia,peruicaciâq;. Aristotele, ἀτέρραμον ὕδωρ pro cru-
 da aqua dixit in quarto de generatione animalium διὰ καὶ
 ἀτέρραμνα ὕδατα,καὶ ψυχρά,τὰ μὲν ἀτεκνία ποιῶ,τὰ δὲ δι-
 λυγόνια. Hoc est: Quare etiam cruda aqua,& frigida partim
 sterilitatem,partim semellarum procreationem efficit. Cæ-
 terum ἀτέρραμον habet cōtrarium,τέρραμον Theophrastus in
 octauo: τὸ δὲ τέρραμον,καὶ ἀτέρραμον λέγεται ἐπὶ ὀπρίων μύ-
 ρον. Qd̄ est: Teramū & ateramū de leguminibus tm̄ dicitur.

ἀτέρραμ-
 νον ὕδωρ.

τέρραμον.

Aut terram colatur puram.] Paulus habet,puram, sed Ga-
 lenus unde hæc transcripsit. integra sententia sic habet: ὡς
 ὅσων γε πρόσθε τὰς ἀνατολὰς ἐξέρχονται πνεύματα,καὶ διὰ πρόσ-
 τινος ἢ γῆς διηθεῖται καθαρεύει, &c. Hoc est: Vt quatu ad Orien-
 tem solem fons erumpit,& per meatuum quendam aut ter-
 ram puram colatur.

Instaurata
 lectio.
 Nō aduer-
 tit Oro-
 sciū.

IN LI. CAPVT.

FRigidam lauacionem.] Hoc est in aqua frigida lauatio-
 nem,quam Græci ψυχρολουσίαν uocant. Celsus libro pri-
 mo frigida etiam lauacionis meminit, Aestate aptissima sunt
 & caro,& olus,porciq; dilutissima, frigida lauatio. Hæc non
 omni conuenit ætati, sed ubi iam corpus iustā impleuerit ma-
 gnitudinem. Nam in adolescente, incrementum eius remo-
 rator. Hoc quoq; ex Oribasij libro citato transcriptum est.

Frigida la-
 uatio.

..Iis qui nullo uictus.] Qui enim cibis crassi succi, maliq;
 usi sunt, iis statim ex frigida meatus occluduntur, per quos di-
 scuti, euocariq; debebant Græce est πρὸς τὸν χῶρον quod signat, ut
 cōtigerit, nulla ratione habita, quæadmodū faciūt, qui nec de-
 bito tēpore, nec pro naturæ modo, aut exercētur, aut cibū su-
 mūt. Exacte alit uiuūt, qui exercitationes ante cibū modera-
 tas subeunt, & quādiu libet, ut ait Galenus dormiunt, ad con-
 coctionem scilicet obeundā, nec balneis à cibo utūtur, postre-
 mo qui cibos mediū tenuiū, crassorumq; ordinis assumūt, qua-
 les sunt exquisitissimi, maximeq; inculpati, tāquā in symme-
 tria excessiū cōstituti. Huius generis sunt panes optime ela-
 borati, carnes gallinarū, gallorū, auiū, phasianorū, perdicū, co-
 lumbarū, atragenarū, turturū, turdorū, merularū, omniumq;
 passerulorum, præterea piscium saxatiliū. Quanquam qui
 plurimis exercitationibus utuntur agricolæ, nautæ, aliq;
 id genus tā exacto uictu opus nō habēt, quippe caloris benefi-
 cio qui laboribus excitatur, et crassi succi cibos tuto assumūt.

Exacte ui-
 uētes qui.

Porro multis.] Qui nimirum sole feruente iter fecerunt, aut laboris quid subierunt, totum corpus stipulæ modo aridū habentes, ij ubi in aquam frigidā se proiecerint, iuuantur: potissimum qui ualentibus sunt uiribus, & frigido soli assueti.

IN LII. CAPVT.

Balnearum
naturales.

Differētig.

Vfus.

Naturalium balneorum.] Vocātur balnea naturalia, quæ sua sponte talia proueniunt: alia calida per se, alia calefunt. Galenus libro de simplici medicina illorum mentionē facit Plinius lib. 31 cap. 6. ubi in hunc modum habet: Est autem utilis sulphurata neruis, aluminata paralyticis, aut simili morbo solutis. Bituminata, aut nitrosa utilis est bibendo atq; purgationibus. Pleriq; in gloria ducūt plurimis horis perpeti calorem earum, quod est inimicissimū: namq; paulo diucius quam balneis uti oportet. Hactenus Plinius. In Germania certe plurimis horis quotidie utuntur, nec à cibo potuq; interim abstinēt, corpore etiam nullam antea euacuationē per medicamenta experto, quod contra omnē rationem est, præterea uno balneo & paralytici, & sanguinem spuentes & lienosi, aliisq; affectibus obnoxii utuntur.

Aquarum naturalium.] Sola aqua potabilis teste Galeno humida est. Cæterarum nulla humectare potest, quod uidelicet nō sint exacte aqua, sed mista & adulterata, accepto nimirum, aut alumine, aut chalcitro, aut sale, aut id genus aliquo.

IN LIII. CAPVT.

Sic etiā Po-
lybus de
ratione pri-
uatorum.
Questio
cur hyeme
laborandū
magis.

Solutio.

Non alienum est.] Celsus ex Hippocrate eleganter transtulit eandē fere sententiam. Eo tempore anni inquires, calidis omnibus potius utendum est, uel calorem mouētibus. Pluribus uti laboribus.] Quærere aliquis possit, cur pluribus utendum laboribus per hyemem, cum calor ipse genuinus sit amplior tunc quàm alio tempore, testimonio etiam Hippocratis, qui ait uentres hyeme & uere calidissimi sunt. Ex calore autem concoctio optima, inde probus sanguis, ex hoc autem omnes corporis partes aluntur. Quare paucioribus laboribus hoc tempore quàm alio utēdum est. Siquidem calor naturalis per se copiosus, & efficax, non opus habet ut plus nunc excitetur quàm in ipsa æstate, aut alia anni parte. Huic quæstioni sic respondere non dubitem. Calidissimi quidem uentres hyeme existunt, naturali calore, hoc est, temperatissimi. Particulæ autem corporis magis refrigerantur hyeme, ac

me, ac nonnullis ad uentris usq; regiones penetrat. Quapropter etiam si probe concocti sint in uentriculo cibi, non tamen exactam in iecinore mutationem recipiunt, sed aliquatenus ea frustrantur. Præterea totius corporis uenæ ab aere circumfluo refrigeratæ haud similiter ipsos transmutant. Accedit ciborum copia, quam tunc una cum pituitosioribus qualitatibus assuunt: uade etiam humor crudus colligitur, qui laboribus & exterioribus particulis recalcascentibus concoqui, digeriq; debet.

Plus esse] Hippocrates, aut Polybus eius discipulus ait: τὴ μὲν χειμῶνος ἐσθ' ἵεν ὡς πλεῖστα, πίνειν δὲ ὡς ἐλάχιστα. εἶναι δὲ χρὴ τὸ πόμα αἰνῶν ὡς ἀκρητέστατον. quod Celsus in hunc modum interpretatur. Hyeme plus esse: minus, sed meracius bibere conuenit.

Polybus.

Celsus.

Vere autem inuente.] Vide libellum Galeni, cui titulus est, quos & quando purgare oportet.

A laboribus conquiescendum.] Intellige iis quibus per hyemem usus fueris. Sæper enim exercitatio corporis necessaria, uerum minor nunc, & facilior, ne calor naturalis, qui a sole tunc euocatur, etiam per hanc magis dissipetur.

At in autumnno.] Celsus eadem fere habet: per autumnū, inquit, propter cibi uarietatem, periculum maximum est. Itaq; neq; sine ueste, neq; sine calciamen tis prodire oportet, præcipueq; diebus frigidioribus, neq; sub diuo nocte dormire, aut certe bene operiri.

Poma.] Græce est ὀπώρας. Nam pomum generale uocabulum est, & quicquid apud Græcos opera continet, completitur. Discrimē ponit Democritus inter oporas & acrodrya. Quicquid herbaceo fructu uiret lignosi nihil exterius habēs, ut duracina, pyra, mala damascena, pruna, opora, apud Græcos dicitur. Acrodrya uerò contra nominatur, quæ putamen exterius, lignosumq; fructum cōtinent, ut malum punicum, castaneæ, pistacea, nuces, uti unq; genus Salgami nomine complectuntur latini, à quo Salgamarius originem duxit. Celsus eodem loco iam citato: poma inquit, nocere quidam putāt: quæ immodicè toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur, ita non hæc, sed consummatio omnium nocet. Galenus optimè utriusq; uocis significatū exprimit Cōmentatio περὶ εὐχυμίας καὶ κακοχυμίας, in hunc mo-

ὀπώρας.

ἀκρόδρυα

Celsus.
Poma.

Galenus.

dum: τῶν δ' ἄλλων οἱ μὲν ὠρεῶσι καλούμενοι κέρσι, κακόχυμαι πάντες. εἰ δ' ἐ διαφθαρῶσιν ἐν τῇ γάτρει φαρμάκου δηλητηρεῖς πλυσίον ἡκυσιν, ὥσπερ καὶ τὰ μῶρα ἢν δ' ὀνομάζουσιν ἰδίως οἱ Ἕλληνες ὁπῶσαν ἐν σπύκοις καὶ ταφυλαῖς οὔσαν, αἱ μὲν μὲν ἐπὶ τῶν εἰρημένων, &, τὰ δ' ἄλλα τῶν ἀκροδρυῶν εἶδη κακόχυμα ἐστὶ, &c. Hoc est, aliarum uero arborum fructus fugaces, omnes, maligni sunt. Sin autem in uentre computruerint, medicamenti uenenosi naturam induunt, sicut & mora, &c. Quam autem Græci propriè nominant oporam, ficus & uuis cōprehensam, prædictis est potior. Plinius compositionem quādam Oporinen appellat ex fructibus generatam, ut confundat differentiam, quæ inter oporam & acrodrya existit. Tu igitur si uoles oporam fructus omnes appellabis ὠρεῶσι καέρσι, horarios fructus.

Quando
purgandū.

Post æquinoctium.] Intellige autumnale, quod ad octauū calendas Octobres, uel ad sextum incipit, ut Florētinus Agri culturæ scriptor memoriæ prodidit. Consulit itaq; Paulus, ut si fortè humores uel melancholici, uel adusti in corpore redūdent, ante hyemem in autumnō purgentur. Siquidem bis corpus in anno recte euacuatur, si plethoricum, sanguinis dimissione: si malis scatet succis, purgatione. Vere, humorum qui ex hyeme sunt contracti: autūno, qui ex æstate reliqui uisione sunt experti. Quare in duobus æquinoctiis fere, sani corporis euacuationē molimur, ad futurorū accidentiū præcautionē.

IN LIIII, CAPV T.

Omnis mu-
tatio subi-
ta noxia
est.

Consuetis
aliquid tri-
buendum.
Densū,
Rari.

Facili præditus.] Hoc caput ex libro primo Oribasii sumptum est. Vult autem Paulus in omni uitæ genere, ut semper consuetis utamur. Quod enim contra cōsuetudinem est, nocet. Neq; enim ex nimio labore, subitum ocium, neq; ex nimio ocio subitus labor sine graui noxa est. Qui igitur in laboribus uitam agunt, si facile ferunt, mutationem non consulit. Qui in otio degunt, sani neq; hi ad labores sunt cogen di. Siquidem natura consuetis gaudet. Verū ut mediocris exercitatio summum corpori præsidium cōciliat, ita ocium, extremum adfert malum, ut albi Galenus ait, præsertim si corpus densum, quod non ex facili diffletur, contigerit: sin autē natura est rarum, perspiratu non impedito, aptisq; nutritur humoribus, etiam si non exercitetur, uix morbis est opportunū: Siquidem per meatus, quicquid fuliginosum uiscosumq; fuerit,

rit, diffilatur, expelliturq; , eo qui talem corporis constitutionem, fabricationemq; habent, à græcis uocantur *εὐδιαπιδυτοι*. Exercitiū hoc loco intelliges, ex præscripto institutū, quod multi ante cibū, uti expedit, subire nequeunt ciuilibus negotiis, aut aliis et districti. iis igitur si meatuū cutis raritas & amplitudo fauet, etiā sine exercitio, sanitate aliquādiu frui licet.

Imo nec eos.] Hippocrates hanc sententiam in aphorismorum secundo confirmat: *τὰ δὲ ἐκ πολλῆς χρόνου συνήθεια, καὶ ἡ χεῖρα τῶν ἀσυνήτων, ἥσσοι ἐνοχλεῖν ἔωθε*. Hoc est: Quæ longo tempore consuecta sunt, etiam si insuetis sint deteriora, minus molestare solent. Nec ea de exercitiis tantum, sed omnibus quæ ad corpus attinent, accipienda ueniunt.

In omnibus autem his.] Galenus in libello *περὶ ἐνχυμίας, καὶ κακοχυμίας* probat in hunc modum: Multi eiusmodi uitæ institutum sequuntur, ut ipsis non liceat, uel ante cibum, probè exercitari, uel satis opportune cibum sumere, uel alimenta feliciter concoquere: qui sane à morbis immunes permanere nō possunt, nisi ex interuallo alui subductione sibi prospiciant: interim purgatione, cum tempestiua sanguinis detractione, &c. Quanquam Paulus etiam intelligit ut quoti die a lius bis, aut certe semel respondeat inculpate pro assumptorum ratione. Id nisi fiat, certe sollicitandā esse docuimus.

Necessitas purgationum contra eos qui nunquam medicina utendū docent.

IN LVI. CAPVT.

Vomitionibus.] Quandoquidem plerisq; necessitas incidit, nauigio per mare proficiscendi, Paulus et hic remedia malis obuenientibus enumerare uoluit, Oribasium secutus libro quinto: facit igitur uini mentionē, quod maximè stomacho uomitionibus turbata cōuenit. Vocat autē græcè *οἰνάριον* quasi dicas uillū, sicut et *ὀξείον τὸ ἀπὸ μέλιτος*, pro oxymelite.

οἰνάριον.
ὀξείδριον.
Pollen polentæ.
Errat Oribasius.

Polentæ polline.] Hoc est tenuiore parte farinæ ordeæ tostæ. Voco autem pollinem cuiuscunq; partem subtiliorem, non tantum farinæ triticeæ, ut putat Orosius. Nam Celsus, Scriboniusq; thuris pollinis meminit. Plinius præparationem eius lib. 18. cap. 7. docet: Polentam quoq; græci nō aliunde præferunt. Pluribus sit hæc modis. Græci perfusum aqua ordeum siccant nocte una, ac postremo die frigunt: deinde molis frangunt. Galenus lib. 1. de alimentis, de nouello ordeo tosto intelligit. Græci polentam *ἄλφιτον* nominant: tenuiorem eius partem, *ἄλφιτον παιπάλιν*.

ἄλφιτον.
ἄλφιτον παιπάλιν.
λιν.

Quum immodice corpus.] Ex Oribasii quinto, metho-
di uero Galeni decimoquarto hæc ferè transcripsit:
Cæterum medici officium est, ut intemperies corrigere, con-
tinui diuorrium, committere, ita quoq; amputare, & præscin-
dere, quod magnitudine, uel numero redundat, reficere autè,
& fingere quod desit. Verbi causa, cum corpus ex corpulentia
eò deuenit, ut nec ingredi sine molestia, nec sedem propter
uentris molem contingere, nec respirare libere possit, hanc
sedem propter uentris molem contingere, nec respirare libe-
re possit, hanc liquare & tollere, æque nimirum, ut quando
corpus ali definit, huic quoq; reficiendo prospicere. Paul. græ-
ce dixit *ὅταν εἰς πολυσαρκίαν ἁμετρον ἐκτραπῇ τὸ σῶμα*. Hoc
est: Cum corpus in corpulentiam immodicā deuenierit. Cel-
sus plenum corpus dicit & obesum.

*πολυσαρ-
κία.*

*Leſio ca-
ſtigata.*

ὀξεῖα.

ταχεία.

Calidior & siccior.] Græcus codex non habet καὶ ξηροτέ-
ρα, id est & siccior. Ex Galeno autem addendum uenit, quod
Gemufæus præterit.

Citas exercitationes.] Græce dixit Paulus *ὀξεῖα γυμνάσια*,
quod ad uerbum sonat, acuta exercitia Galenus in commen-
tario libelli de ratione uictus priuatorum interpretatur fere
quod decimoquarto docuit: *ἢ ταχεῖα κίνησις τὴν δερμασίαν
ἐπιπλεῖον αὐξάνουσα τὴν τοῦ σῶματος*. Quod est: Velox motus
calorem amplius augens, corpus liquat. Idem igitur est *ὀξεῖα*,
& *ταχεία*. Celsus cursum, multam obambulationem, omnem-
que uehementem exercitationem ponit.

*κατασάρ-
κους.*

*πολυσάρ-
κους.*

παχέας.

ἡλίωσις.

Fallitur.

Oroscius.

Iuuat itidè crassios insolatus.] Crassios hic intelligo, quos
græci *κατασάρκους, πολυσάρκους, ταχέας* noiant. His opponuntur
λέπτοι, ἰσχυροί, κατισχυθέντες, & καταλεπτυσμένοι. Celsus
cōtrarios inter se uocat, plenū, & tenuē, gracilem & obesum.
Insolatus autem græce dicitur *ὑλίωσις*, quod Celsus interpre-
tatus est sol inurens: & omnis calor, quanquam Oroscio id
non placeat, homini in bonis authoribus parum uersato.

Præbibere autem non debent.] Hoc intelligendum est ni-
mirum, ne cibus statim in corpore distribuatur. Contrariam
plane sententiam habes apud Polybum: quam Celsus dein-
de interpretatus est: sed nonnihil euariat. Græce primū sic
habetur: *καὶ τῶς σιτίσις ἐπιχειρεῖν, προπεπωκότας οἶνον κε-
κραμένον, καὶ μὴ πανὴ σφόδρα ψυχρόν*, hoc est: Et cibos aggre-
di, uino

di, uino prius temperato, & non admodum frigido assumpto. Celsus inquit, semel die assumptæ epulæ, & uini non perfrigidipotio ieiuno in consuetudinem adducta. Galenus autem, sententiam corrigens, dicit legendum μήτ' ὀλως θερμόν, quod est, neq; omnino calidi.

Semel tantum die.] Græci hoc uocant μονοσιτεῖν. Galenus autem in commentario nuper citato locum hunc quasi corrigit, κάλλιδον inquit ἀνὴν εἰρηδοῦν πρὸς αὐτῷ μὴ μονοσιτεῖν, ἀλλὰ ὀλιγοσιτεῖν, hoc est: Præstaret dictum ab eo fuisse, non semel epulās assumere, sed modicas. Quidam enim ex iis qui semel tantum cibum sumunt, multo plūs ingerunt, quàm qui bis capiunt.

μονοσι-
τεῖν.
ὀλιγοσι-
τεῖν.
Galenus
non semel
modice,

IN LVIII. CAPVT.

QUum extenuatos.] Hoc caput ex decimoquarto Methodi Galeni sumptum est. Commemorat autem uictus rationem extenuatis accommodam, primum quidem uinum crassum, cuiusmodi sunt nigra & fulua Italica uel Asiana, aut etiam Hispana. Linacer autem methodi interpretes uertit οἶνον παχδόν, uinum pingue, quæ ratione, uel quem secutus autorem nescio. Dicuntur autem uina crassa, quæ succū crassum habent, multumq; alunt. Cibus autem crassi succi, qualis est, alica, porcina caro, panes furnacei, & textuacei, tragus, oua, lac, caseus, magnaq; piscium pars. Qui cibi crassi, omnes ad nutriendum sunt ualentissimi: & si probe in uentriculo, ac iocinore concocti fuerint, sanguinē benignū generare solent.

Vina cras-
sa.
Linacri
locus.

Exercitatio modica.] Omnia exemplaria Pauli impressa habent γυμνάσια δὲ βραδέα. Hoc est, exercitia autem lenta: & optime quadrat lectio superiori sententiæ, quæ de crassis extenuandis habetur, nempe huic, Citas exercitationes. Galenus autem in Methodo, omnibus codicibus attestantibus, legit βραχέα, hoc est, modica. Celsus in simili sententia de replendis tenuibus dicit conuenire, modicam exercitationē. Rursus Galenus in commentario superius citato dicit extenuatis eadē fere ex usu esse: οὕτω δὲ, inquit, καὶ τὰ γυμνάσια, βραχέα τε γυμνάζεται, καὶ βραδέα, καὶ μετὰ τροφὴν. Quod est: Ita uero etiam exercitia, & pauca, & lenta, & post cibum habebit. Sume igitur utramuis lectionem. Ego secutus sum Galenum in methodo, unde hæc sunt descripta.

Crassi suc-
cibus.

Contrarij
loci.

Apud Pa-
lybum.

Leſio
emendata.

Deinde frictione dura] Hæc sententia & mutila, & deprauata

uata existit in Paulo. Quid enim per hæc uerba intelligas: καὶ πεῖτα σκληρὰ μὴ πολλὰ πέλυντες τὸ δέρμα, &c. Corrigenda instaurandaq; est ex Galeni lib. 6. de sanitate tuenda, in hūc modum: καὶ πεῖτα τρίψαι σκληρὰ μὴ πολλὰ πέλυντας τὸ δέρμα.

Orosius.
Castigator
Basilienis.

Hoc est: Et postea frictione dura non multa cogentes cutē, quo densa, durāq; euadat. Hæc Orosius & castigator Basilienis non aduerterunt.

Ijs qui pallido.] Iram, motusq; animi præcipit decoloratis, ut uidelicet inde sanguis in exteriores partes trahatur: sicut alii quibusdam medicamentis eò alliciunt.

IN LIX. CAPVT.

πίττωσις

Extenuantur plerunq;.] Vide Galenum in decimoquarto Methodi medendi, ubi etiam horum curationem plenius persequitur. Picationis mentionem facit, quæ πίττωσις dicitur græcis, hoc est, pix mēbris oblita: hyeme bis æstate semel, idq; frigidis & humidis, aut utroq; tēperamēto simul donatis. Nā ficcis & calidis eiusmodi medicamēta adhiberi nō debēt.

IN LXI. CAPVT.

Instaurata
lectio.

Dentient, incrementq;.] Hoc & superius caput, ex cōmentario Galeni sumptū est, qui ars medicinalis inscribitur. Deest autem in codicibus Pauli impressis dictio καὶ, in capitis principio. Lege igitur τοῦτε ὀδόντας φύσει δ᾽ αὐττον, καὶ αὐξήσεται. Hoc est: Dentes citius producent, & augebuntur.

Consuetudo
acquiritur
natura.

Is ob consuetudinem.] Puta liberaliorem cibum sumptū cōtinue, ocium, totamq; deniq; uictus rationem: quod apud Galenum κατὰ συμβεβηκός, hoc est, secundum accidens, contrarium huic uocat κατὰ φύσιν, ex natura. Veluti alii nati grādiōribus uenis, corpore ad gracilitatem idoneo ex ocio diuturno, cibisq; tum ualidis tum copiosis crassescunt, alii exilibus uenis præditi ex labore assiduo, curis, uigiliisque & cibis extenuantibus usi in obesitatem prolabuntur.

Instaurata
lectio.

Nigri ipsis pili existunt.] In codicibus Pauli impressis hac tota sententia desideratur: planeq; ut adsit, necessaria ad disputationē de tēperaturis vī. Nā altera diuisionis pars existit.

Hoc etiam
aduertit
Orosius.

Repone igitur ex Galeno in arte medicinali in hūc modum post ἐκ ὀλίγῳ θερμότερον. μέλαινα δ' αὐτοῖς αἱ τρίχες, καὶ ἡ σὰρξ ἀπὲς μέλος εἰ δ' ὀλίγῳ μὲν αἷν θερμότερα, παμπόλλῳ δ' ἐυγρότερα, μαλακὰ τοῦτοῖς εἶναι ἡ σὰρξ καὶ πολλὰ, καὶ τὸ χρῶμα συμμιγῆς ἐξ ἐρυθροῦ καὶ λευκοῦ καὶ φανώτων ὀλίγῳ θερμότερα.

Color

Color autem & capilli.] Hic quoq; mutilus est codex græcus, habetur enim: τὰ δὲ τῶν τριχῶν τῆς χροῖας, pro τὰ δὲ τῶν τριχῶν, καὶ τῆς χροῖας. Nec aduertit hoc Gemusæus. Color itaq; totius corporis, hoc est albus, maxime erit, si illud uehementer fuerit frigidum, capilli quoq; rarissimi enascentur, si illud tale fuerit: sin minus, minus illa quoq; erunt intensa. Hoc itaq; est pro proportionē.

IN LXII. CAPVT.

EXiguum sane caput.] Hæc quoq; ex arte medica Galeni transcripta sunt. Prauam, inquit, cerebri structuram indicat. Nam quod in tentorijs præstant pali quos græci κάμακας appellât, & in ædibus parietes, id nimirum in animalibus ossium substantia. Quippe ad huius imitationem cætera omnia in animâte solent effingi, mutariq; ut si caluaria sit rotûda, ne cessario cerebrû tale fuerit: quemadmodum etiam si oblonga sit, talem quoq; figuram cerebrum induet. Si itaq; paruû est caput, ea q̄ ossibus adhærēt, exigua, aut mutila esse cõiicimus.

κάμακας.

Figura.] Nempe quæ ad oblongæ spheræ potissimum similitudinem structa est. Alia uero capitis figura uertice acuminato, qualem Therpsites habebat apud Homerum, deprauata est. Naturalis itaq; priorem ac posteriorem partem prominentiorem habet. Deprauata, altera eminentiarum caret. Interim utraq; : quare etiam futuras præter naturam habet.

Figura per
fecta.

Si optimè sit disposita.] Galenus dicit: Si ualidam habet ceruicem, aliisq; ossibus optimè sit constituta.

Plerunq; igitur.] Retuli ad eminentias. Nam figuram nō pōt. Vult itaq; Paulus nōnunquam etiam fieri, ut capita etiā bona existant, quāuis eminentiæ à naturæ modo recesserint.

IN LXIII. CAPVT.

MInimeq; ab omnibus exteris.] Ex eodem Galeni commentario sumptum est: dicit autem exteris, quod idem sibi uult, ac si dicas, extrinsecus accidentibus quæ calefaciūt, refrigerant, siccant, & humectant. De pilis etiam in libris de facultatibus naturalibus comprehensā à Galeno reperiās.

Summatim circa.] In fine capitis hæc clausula habetur. Sonat autem græcè ταχύνησι τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν ἅπαντα ἔσθιν. Hoc est ad uerbum: Cito senescunt in iis omnibus quæ circa caput sunt. Quasi dicas: Omnes capitis partes potissimū, mature senium testantur.

κλύδων-
ες.

Fluctuationes.] Sic interpretatus sum græcam dictionem κλύδωνας. Ventriculi est parum ea quæ ingesta sunt, comprehendentis, concoquentisq; fluctuationes experiri. Male impressum est in Galeno græco nuper ædito Basileæ, κλύδωνας pro κλύδωνας.

Castigatus
locus.

Calidis cibis.] In impresso codice erat, πολλοῖς pro θερμοῖς. Nec aduertit Gemusæus, tot manu scripta exemplaria iactans. Galenum uide in arte medicinali.

IN LXV. CAPVT.

Leſio in-
ſtaurata.

Præterijt
Oroſcius.

Gemusæus

Non modo uentriculus.] Ex eodē Galeni libro, eodemq; ferē loco transcripta sunt. Post hæc autem uerba: Cor, pulmo, & iecur, sententia Pauli manca uidetur, quicquid Gemusæus dixerit de epitome. Quid enim est, quin etiam bibentes, non cessant, uel ut græce dicam, καὶ μὲν δὴ καὶ πίνοντες οὐ πάνονται, nisi alia præcesserint? Integra igitur sententia apud Galenum sic habet: καὶ μόνον ἡ κοιλία διψῶσιν τε καὶ ἀδίψως ἐργάζεται, καὶ ψυχρῶ καὶ θερμῶ πόματος ὀρεκτικὸς, ἀλλὰ καὶ τὰ κωτὰ θώρακα σπλάχνα καρδία, καὶ πνεύμων: ἀλλ' οἷγε διὰ τὴν τοῦτων θερμότητα διψῶντες, εἰς πνεύουσι τε πλέον, ἐκφυσῶσι τε μακρόν, ἀδιθαίνονται τε κατὰ τὸν θώρακα τῷ κάυματος, ὥς ὡς περ οἱ διὰ τὴν γαστέρα κατὰ ὑποχόνδρια, καὶ μὲν δὴ πίνοντες, καὶ εὐθέως ἡ συχνάσκει. Hoc est ut interpretatus sum, restitue igitur, si uidetur codicem: Prius tantum erat: Non solū, uentriculus sitim uel adfert, uel arcet, ac frigida calidæq; portionis appetentiam facit, sed etiam quæ in thorace continetur uiscera, cor, pulmo, & iecur. Quinetiam si biberint, non statim sitire desinunt, &c. Quam integra hæc sit oratio, doctis iudicandum relinquo, meo certe iudicio apponenda uidetur, quæ ego textui inserui ex Galeno Miror Oroscium hunc locum præterisse: Gemusæum autem non castigasse ex ueteribus exemplaribus quibus se abundare sæpius triumphat.

ἐντρέχει.

Recrementa ipsis interueniunt.] Hoc est, crassæ humiditates & pituitosæ arteriam asperā, per quam uox editur, interceptiunt. Græcum uerbum est ἐντρέχει αὐτοῖς. Alias signat, insident, inhaerescunt, si Græcorum grammaticis fidem accommodamus.

IN LXVI. CAPVT.

AC præcordiorū regio.] Hoc est qua præcordia incipiunt. Græcus codex habet: καὶ τῶν καθ' ὑποχόνδριον ὅσα τοῖς πλεσίον, quasi dicas ad uerbum: Et præcordiorum quæ his propinqua sunt. Hoc est, & partes præcordiorum his pectoribus uicinæ hirsutæ sunt. Mox sequitur: Magna uero ex parte quod textus græcus in impresso tantum his uerbis continet: ὡς ἐπιτοπολὺ καὶ τὸ, pro ὡς ἐπιτοπολὺ δὲ καὶ, atq; sic corrigito. Paulo post: Quinetiam, in græco impresso est καὶ μὲν γὰρ ἡ, &c. tu corrige ex Galeno καὶ μὲν τοὶ καὶ ἡ, requirēte id sensu. Rursus pusillanimes, negligentes, pectore glabro, codex græcus plane deprauatus est. Habet enim ἄτολμοι, καὶ μάλιστα ἐφελὼν αὐτοῖς τὸ τέρονον, pro ἄτολμοι καὶ ἀμέλῃται, καὶ φίλον. Hæc Gemusæus castigator non aduertit, sic nec superiora Oroscius.

Omisit
Oroscius.Lectioes
castigatz

IN LXVII. CAPVT.

HOc caput etiam ex eodem Galeni commentario, ut superiora quæ de temperaturis agunt, quasi transcriptū est. Cæterum in clausula uenæ duriores, græcus codex deprauatus est. Habet enim αἱ φλέβες ξηραὶ, quod est uenæ sicce, pro αἱ φλέβες σκληρότεραι. Hoc est uenæ duriores.

Locus ca-
stigatus.

IN LXVIII. CAPVT.

Porro si humiditas calori fuerit cōiuncta, hispidos quidem minus, tales.] Vtrunq; exemplar impressum mutilū est, desideratur enim ἥττον. Nam legendum est, συνελθούσης δὲ ὑγρότητος τῇ θερμότητι, λάσιον μὲν ἥττον οἱ τοῖσται. Hoc Gemusæus præterit.

Lectio ca-
stigata.

IN LXX. CAPVT.

QVum itaq; calida.] Totum hoc caput ex sexto Galeni de sanitate tuenda iuxta principium, & Oribasii quinto sumptum est: cōnenit aut recte ut postquam temperaturarū notas descripserit, intemperierū remedia subiungat. Sollicitudo & uigiliæ.] Post has dictiones, καὶ κινήσεων ἀπασῶν ὀξεῖων. Hoc est, & omnes celeres motus. Sic enim uerto εἶς, quod est acutum, Recte autem dixit celeres motus: ut qui corpus calefaciant impensius.

Motus ce-
leres.

Humidæ & calidæ natura.] In græcis codicibus impressis, tantum humidæ, habetur. Legendum autem ex Galeno, sensu id requirente: αἱ δὲ ὑγραὶ καὶ θερμαὶ τῇ φύσει, &c. Quod est: Hu-

Instaurata
lectio.

Calida &
humida,

est: Humidæ uerò & calidæ natura. Nam ubiq; apud Galenū habes, humidæ & calidæ naturæ, putredini sunt obnoxæ, qđ lib. I. de febrium differentiis hisce uerbis confirmat: *ἔτοιμότατα γὰρ σήπεται πάντ' ὅσα θερμά, καὶ ὑγρά.* Hoc est: Nā omnia quæ calida & humida sunt, facillime computrescunt.

ἁπορροιαί

Rheumaticis, plethoricisq; . Vfus sum græcis dictionibus opera dedita, quod medicis admodum sint familiares. Poterā autem dixisse, fluxionum & redundantie morbis, quemadmodū Linacrus. Sed nescio quid energię habēt uoces græcanicæ.

Porro defluxionibus] Recte quadrat. Nam superius dixit, rheumaticis patent morbis. Vocantur autem græcis ἁπορροιαί corporis defluxus, nunc in hanc nunc in illam partem: quales experiri sæpe solent humidi temperamento & calidi.

Lauacris, multa exerc.] Trifariam hæc lectio apud autores uariat: apud Paulum habetur: ἁπορροιαὶ δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λουτρῶν καὶ γυμνασίων πολλῶν καὶ πρὸ τροφῆς. Hoc est: Defluxionibus prospiciendum est, lauacris, exercitiis multis, & ante cibum, &c. Oribasius legit καὶ τῶν ἀπορροιαῶν δὲ προνοεῖν χρὴ διὰ τε λουτρῶν καὶ γυμνασίων πολλῶν, &c. consentit fere cum Paulo. Galenus autem in hunc modum: ὥς τε καὶ τὸν ἐπιτατῆντα τῷ ταιούτῳ σώματι τῶν ἀπορροιαῶν προνοεῖται χρὴ διὰ τε γυμνασίων ὡς ἔφη, καὶ λουτρῶν καὶ τρόφων πλείονων, ἐκκρίσεώς ὡς τε τῶν δι' ἑξῶν, καὶ γακτρος γινομένων, &c.

Lectio no-
eatu digna
instaurata.

Hoc est, Quare qni huiusmodi corpori tuendo præficitur, prospicere iis debet quæ ab ipso defluunt tum exercitiis ut dixi, tum balneis, & cibis pluribus, tum uero iis quæ per uentrē & urinas redduntur, excernendis, &c. In hac oratione mendū plane est: quod enim sibi uult, cibis pluribus? cū corpus defluxionibus opportunum, sobriam potius uiuendi rationem requirat, quàm multorum cibo tum ingestionem qui ipsi sæpius fluxiones solent excitare. Legendum itaq; existimo in codice græco λουτρῶν πρὸ τροφῶν πλείονων, quod est: Lauacris ante cibum pluribus. Nam ut exercitatio cibum præcedēs, ita balneum quoq; superflua corporis discutit, subsequēs autem cibos, cruditatem, eoq; prædicta symptomata procreat. Sed cui auctori assentiemur, alius habet pluribus balneis, alius, pluribus, exercitiis. Superius semel dixerat, multa exercitatione, eoq; hic etiam referendam puto dictionē pluribus, uel exercitiis. Hæc nō aduertit Gemusæus nec Orosius.

Omisit
Orosius.

IN LXXI. CAPVT.

INter frigidas.] Hoc totum caput ex sexto libro Galeni de sanitate tuenda sumptū est: ex Oribasij autem quinto. Enumerat autem tres frigida intemperies differentias, frigidā & siccam, frigidā & humidā, frigidā & mediocrem in siccitate & humiditate. Harum singularum remedia ordine enumerat. Inter quæ Paul. recēset ἀλυσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ λεπτότερα, quod est balnei abstinentia, exercitia plura, & tenuiora Vbi legendū existimo ex Galeno, sensu id exigente. ἀλυσία τε καὶ γυμνάσια πλείονα καὶ διαίται λεπτότεροι, hoc est: Balnei abstinentia, exercitia plura, & uictus ratio tenuior. Hoc præterierunt Orosius & Gemusæus.

Locus re-
stitutus.

IN LXXII. CAPVT.

INtemperies sicca.] Hoc autem caput ex septimo methodi ad uerbum transcriptum est: ubi docet, quæ potissimū intemperies, seu alterationes facilius reparari queant Enumerat autē siccitatis differentias tres: quas etiam alibi cōprehendit: Verum Pauli codex græcus statim in principio capitis deprauatus est. Habet enim ἡ δὲ τῆς ὑγροπαγῆς οὐσίας πρὸς ταύταις. Quod nihil fere significat. Corrigitur igitur in hunc modum: ἡ δὲ τῶν ἐκ τῆς ὑγροπαγῆς οὐσίας συνικτώτων, ἐκτακέντων, καὶ τρίτῃ πρὸς ταύταις. In textu latino sum interpretatus græca, quæ desiderabantur. Castigator Basilienſis hoc quoq; præterit.

Castigator
Basilienſis.

Ex humore concreto.] Galenus addit, sicut caro & adeps, Paulus compendij causa omisit. Cæterum caro & adeps nihil aliud sunt, quàm humor concretus: caro quidem, sanguis ui assimilattice in carnem redactus: adeps autem humor extra uasa elapsus, ex frigidityte congelascit, concreſcitq;.

Chondrum ptisanæ modo.] Chondrus omnino fit ex zea, ut in sequentibus docebitur.

Ptisana, ἀ πτίσσην duxit originem, quod ordeū unde præparatur, tundendo deglubatur, ac suo cortice castratum, usui seruetur. Hordeum mundatum officinæ uocant: tunditur enim hoc, nec molitur.

Quo picatores utuntur.] Vnguentum hoc alias dropax uocatur, quod picem recipit. Vide Paulum, in septimo ad calcem. Solet partibus emacratīs adhiberi. Administratio græcis πίττωσις, quasi picatio: qui adhibent πίττωται dicuntur.

πίττωσις
πίττω-
ται:

Codex
Græcus re-
stitutus.
Omiserūt
aristarchi.

Iam uero multæ.] Græcus codex non habet δαφιλῆ, hoc est, multæ: uerum sensus exigit, ut contraria opponantur sibi δαφίλης, καὶ μέτρων. Sic etiā Galenus habet: μὴ βῶτω δ' ἐφ' ἑστῆς δαφιλῆς ξηρότητι καθάπερ ὑπὸ κίτται, μὴ πανὺ πολλὴν θερμότης. Hoc est: Ab hinc uero iuncta sit multæ siccitati ut dictū est, non admodum multa caliditas. In sequenti sententia, restitue græcum codicem, ac lege: πὶ μὲν τῆς τοιαύτης ὑπαλ- λάξεως τὴν πρότερον ἀγορὴν φυλάξομεν. Quæ Oroscius, & casti- gatores Basilienses omiserunt.

Quæ sint
galactode.

Tepidos lactis modo.] In Græco codice est, χλιαρὰ δὲ τὰ ἐδέσματα καὶ γαλακτώδη Hoc est, Tepidos autem cibos & lacteos offeremus. Galenus lib. 7. Methodi dictionem γαλακτώδη interpretatur, χλιαρὰ δὲ, inquit, τὰ ἐδέσματα προ- αίστομεν ἀκαλῶν ἔσθας ἐπὶ τοῖς ἰατροῖς γαλακτώδη, quod est: Tepidos autē cibos offeremus, quos medicis uocare lacteos con- suetudo est Idem lib. 11 Aetij τὰ ἀλβυλα καὶ τῇ κρύσει γα- λακτώδη. Hoc est albulæ, & teperamēto lactæ balinæ, quod est, tepidæ lactis iam emulcti modo. Celsus tales cibos, lib. 4. cap. 11 in hunc modū inquit. Aqua neq; ea ipsa frigida, sed potius egelida dāda est. Ibidē: Si uero tormina sunt, oportet frigidis & humidis fomētis stomachū fouere: uel si uēter do- let, iisdē egelids, sic ut uēter ipse mediocriter calētibus iuuēt.

Restitutus
locus.

Quod si ad uomitū sint idonei.] In Græco codice mutilatus locus est, in hunc modum: εἰ δ' ἐπιτηδείως ἔχῃ. διὰ τὰ φασίδων ἐμέτω, adde post ἔχῃ dictiones duas πρὸς ἐμετῶν, quod Gemusæus castigatōr non aduertit, uolens in compen- dio eiusmodi intelligi.

IN LXXIII. CAPVT.

Q Vum igitur attenuandi.] Olim ueteres maiorē uim in uictus ratione ponebant, quā in medicamentis: ubi uel humor uiciosus emendandus, uel morbo ueniētī erat: prospiciendum: alia nimirū ratione, quā huius seculi Me- dici facitantes: qui statim cum quis de particula aliqua cō- coqueritur, ad ualentissima etiam medicamenta confugiunt. Cæterum Paulus noster hæc ex commentariū Galeni cui titulus est, de ijs quæ bonum malumue humorem gignunt sumphisse uidetur. Habet ille in hunc modum: καὶ διὰ τὴν τοῖς ἰατροῖς εὐρεθὴ τὰ κλιθέντα πρὸς αὐτῶν ὑγιενὰ φάρμακα. τῆς λιπυνούσης ἅπαντα δυνάμειος ὄντα. τούτοις γὰρ ἔργον ἐστίν,

ἐστίν, ἐκφράττειν μὲν τὰς φωνὰς διερόδους, ἀπορρέυπτειν δὲ τὸ προπλαττόμενον γλίσχρον ἐκ τῶν χυμῶν τοῖς ἀγγείαις, τέμνειν δὲ καὶ λεπτύνειν τὰ παχέα τῶν ὑγρῶν, ἀλλ' ἔτι πλεονάζει τε ἐν αὐτοῖς, ὁρῶδες, ἢ πικρὸχολον ἐν τῷ χυμῷ, ἢ μελαγχολικὸν ἐργάζεται τὸ αἷμα. Hoc est: Quamobrem medici salubria ab ipsis uocata medicamenta inuenerunt, omnia facultatis attenuatorum: liquidè munus ipsorum est arctos transitus patētiores reddere, succorum lentore uasis adhærescentē abstergere: humorū crassitiē incidere atq; extenuare. Sin aut ferosum quippiā in eis redūdet, uel sanguinē biliosum temporis interuallo, uel melancholicū efficiūt, &c. Sunt aut medicamenta salubria, cibi loco medicamentorum sumpti, quibus per sanitatē utimur.

Salubria
medica-
menta quæ.

Porro quæ increassandi.] Ex eodem commentario transscripta sunt, ubi in istum modū habet: τὰ δὲ τῶν παχέων καὶ γλίσχρων γεννῶντά τε χυμοὺς ἐδέσματα τροφίμωτάτα πάντ' ἐστὶν, καὶν πεφτῇ καλῶς ἐν τε τῇ γαστρὶ καὶ τῷ ἥπατι, χυμὸν αἷμα γεννῶν πέφυκεν, ἀμεμπτότατα δὲ τῶν ἐδεσμάτων ὑπάρχει τὰ μετὰ τῶν λεπτινόντων τε καὶ παχυνόντων. Quod est: Cibi uero crassius, uiscososq; humores generātes, oēs & ualentissimæ sunt materię, & si probe in uentriculo, & hepate fuerint concocti, benignū generare sanguinē affolēt: uerum inculpatissimij inter cibos sunt, qui tenuium, crassorumq; medij habentur.

Qui sese exercent, & quantum libet.] Galenus hæc ita habet: ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις οἶοντ' ἐστὶν γυμνασίαις τε πλήσι χρῆσθαι, καὶ κομᾶσαι μεχρὶς περὶ ἀν' ἐθέλωσι, καὶ βίον ἔξω τῶν πολιτικῶν ἀσχολιῶν ἔρηνται τοῖς ἐγγχεῖν, καὶ τὰ παχύχυμα καὶ γλίσχρα τῶν ἐδεσμάτων ἐδίην. Hoc est. Quibus itaq; exercitiis pluribus uri licet, & quā diu libet dormire: ad hæc qui uitam ciuilibus negotiis uacantē degunt, ii & cibos crassius succi, & uiscosos tuto assument.

Porro quemadmodum.] Ad uerbum ex eodem loco transscripta sunt Galenus autem addit rationem: neutiquā enim, inquiens, aliquis ægrotabit, si opportune prospiciat, ne concoctione unquam frustretur, item ne à cibo ualidam quandam ambulationem subeat. Quippe sicut exercitatio cibos præcedens, plurimū cōseruandæ sanitati conducit: sic quælibet ἐν cibis cōmotio, nocētissima est. Nam alimentū antequā sit cōcoctione elaboratū, ex uentriculo distribuitur. Vnde crudorū humorū copia in uenis collecta, oīgenas morborū spēs pro-

Exercitatio.

creare solet, nisi protinus labore assiduo fuerint discussi, uel concocti, ac in sanguinem commutati.

[Varia ciborum genera.] Plinius lib. 11. cap. 52. Homini cibum utilissimus simplex, Aceruatio saporum pestifera, & condimenta perniciosiora.

IN LXXIIII. CAPVT.

τρώφιμος. **L**actuca.] Ex libris de alimentorum facultatibus fore mutatus est omnia Paulus. Itaque cum dicit, eoq; somnū accersit, intellige, uel peri commanducata, ut Galenus uti solebat. Valenter nutrit, græca dictio est *τρώφιμος*, quasi dicas, nutriendus ualde, sic enim docti interpretantur uocem istam.

Ita boni succi. Galenus, cum alia omnia olera paucissimū sanguinem generent, sola lactuca non multum quidem nec uiciosum gignit, non tamen absolute *εὐχρημον*, hoc est boni succi, laudabilem & benignum.

Intybus. [Intybum.] Alias græcis *σενδὶς* dicitur, in satium & agrestem diuiditur. Quanquam græci per cichoreum tam domesticum quàm agrestem intelligant. Satiuus intybus duplex, unus latioribus foliis, lactucæ similia, quem nos endiuia, corrupto nimirum uocabulo appellamus. Alter, foliis strictioribus, multis capillamentis per radicem transeuntibus. Hoc loco intybum, intellige potissimum, quam uulgo Endiuia nominamus, in acerbis usitaram.

Endiuia. [Brassica marina.] Forte ea est herba, quam officinæ soldanellam uocant circa maritima nascētem, nisi Dioscorides folia longa brassicæ huic attribuisse, quæ in Soldanella non sunt. *Soldanella.* aut longitudo de foliorum ordine uenit intelligenda.

[Blitum & atriplex.] Blitum olus rubrum quod in cultis se attollit, cuius folia iuribus incocta sic ea inficiunt rubore, ut nigelli uini dilutum colorem repræsentet: à quo rubrum olus etiam ab olitoribus uulgo uocari. Radice non una nritur, sed contra cæterorum fere olerum morē multiplici, prolixa, non in rectum tendente, betaceis frondibus, sine acrimonia fatuis, semen corticeum profert racematim singulis ramis insidēs. Atriplex flore aureo prodit, caule interdū purpureo, interdum candicante, ramoso, folio bliti. cū pubescit herbaceo, cum senescit, flammeo nonnunquam in luteum languescēte, semine foliaceo, simplici radice in altū ascendente. ex quo multæ se promūt. Dicitur ēt Dioscoridi Chrysolacanū.

Chrysolacanum.

Scymos

[Scolymos.] Paulus & Aetius scolymon à cinara diremerunt hanc officere stomacho, illum prodesse iudicantes. Idem etiam Galenus, ex quo sua mutuati sunt illi in 2. de alimentorum facultatibus testatur. Alii tamen Græci nullum aliud inter hæc discrimen ponunt, quàm quod scolymos ferus sit, & syluester: cinara uero, domita cultu, feritate exuta, mitior & altis: cuius cibus, licet stomacho sit grauis, non protinus à scolymis natura, uiribusq; degenerauit. Verum ex coctura noxam, quam prius referebat, amolitur: ijs additis quæ etiã Galenus enumerat.

[Attractylis.] Hæc duas habet species, una mitior est cnicoco satiuo similior, caule rectiore ac rigido, exili. Itaq; pro collo antiquæ mulieres utebantur, atq; hanc proprie attractylida nominabant, semine cãdido, grandi amaro. Ab officinis dicitur hodie syluestris cartamus. Quibusdam sanguinea uirga nominatur quod uulso ramulo cruorem modicũ profundat. Altera species hirsuta, caulibus sonchi, torosis, humi reptãtibus, semine minuto, frequenti, amaro, & pilis barbato, flore luthæo, ut prior. Cruor etiam ex uulnere secti exit: hæc officinis uocatur, cardus benedictus.

Syluestris
cartamus.

Cardus be
nedictus.

Apium hipposelinum, sion, smyrnion. Quum apium abso lute apud autores ponitur, hortense uenit intelligendũ, quod uulgo Petroselinum dicitur. Semina quæ à pharmacopolis passim uenduntur, eleoselini sunt, id est, palustris apii. Hippo selinum à Romanis olus atrum dicitur, non autem ab equis nomen sumpsit, ut quidam uoluere, sed à magnitudine sua. Nam apud Græcos ἰππος in compositione solam magnitudi nẽ signat, in ijs maxime rebus, quibus nihil peculiare habet. Id quibusdam putatur apium, quod Galli, Ache, Germani eppich nominant, Ferrariæ uulgo appellant apium Macedo nicum. Dissentiunt autores in Hipposelino & Smyrnio. Alii Hipposelinum, olus atrum nominant, alii smyrnion, quidam diuersa olera hæc iudicant, quidam eadem. Nam Plinius ait: Olus atrum hipposelinum Græci uocãt, alii smyrnion. Theo phrastus idem uidetur cum Plinio dixisse. Galenus smyrnion olus atrum uocat, Romanorum secutus nomenclaturã. Dioscorides & Plinius de iis priuatim ut genere diuersis egerũt. Forte ea herba est, quam Galli leuechrã nominãt. Sion, Lati nis dñ Lauer, frutice pusillo, in profluentibus aquis emicante,

habitu subrecto, pinguiq; latis ac luxuriatibus foliis, olus atro-
similibus, minoribus tm̄, odoratisq; Officinæ berulā uocant.

Berula.

Eruca.] Notissima herba est, in acetariis utimur, ob gustus
acrimoniam. Græci ἐϋζωμον, Galli Raquetam appellant.

Ocymum.] Recentiores Græci, qui de re herbaria scripse-
runt, basilicum, hoc est, regium appellant: quod nomen apud
omnes fere nationes hodie usurpatum uidemus.

Gingidiū.
Chærefo-
lium.

Gingidium simile est scandici.] Gingidium forte est herba
ea quam uulgo Chærefolium appellant: non autem quam
Plinius Chærepyllon nominat. Olus fuit Pauli & Galeni tē-
poribus tritissimum in usu. Scandix syluestre olus est; ac ui-
lissimum si Plauto credimus.

IN LXXV. CAPVT.

Aspara-
gus.

A Sparagus.] Per hanc dictionem intelligi uolo, quæ pri-
mum in lucem prodeunt olerum germina, priusq; in fo-
lia explicentur, recentissimosq; turiones qui edendo sunt. In
summa, primos caulicorum partus comprehendendo.

IN LXXVI. CAPVT.

Bulbi.

B Vlbī.] Bulborum facies, ut olim ueteribus fuit cognita,
ita nunc maxime cum officinis, tum medicis, pace erudi-
torum dixerim, incognita est. Sunt autem cepæ modo tunica-
ti, & fronde cepiria, tereti, angusta, in mucronē desinente, cau-
liculo dodrantali, in cuius fastigio flos emicat purpureus, ut
in scilla circumactus. Agri Gallici appetitus appellationē in-
diderunt, q̄ meram excitent cibi auiditatem. Verum genus
hoc q̄ in hortis copiosiore coma uiret, nucleis gracilioribus
nunc portetā, nunc unionetam à porri, uel unionis, tū sapore,
tū forma uocant. At nō solū propriæ cuidā plāta bulbi nomē
inditum est, uerum etiam rotundæ radices suis membranis tu-
nicatæ Bulbi nominantur, siue pluribus capitulis coagmen-
tentur, uno folliculo omnes ambiente, siue quadantenus di-
stinctæ separētur, quales sunt croci, liliorū, narcissi, scyllæ, &c.

Pastinacæ uero, dauci & cari.] Ad uerbum ex Galeni libro
citato transcripta sunt. Pastinacæ species satis sunt cognitæ.

Officinariū
daucus.

Dauci uero & cari non item Sunt porro tres Dauci species à
Dioscoride descriptæ: quam hodie in officinis habemus, sylue-
stris pastinaca est, ut sapor, odor & tota deliniatio ostendūt.

Verus Dau-
cus.

Nulla autem dauci species apud Dioscoridē pastinaca sylue-
stris est, sed tertia tantum huic comparatur muscario. Verus
Daucus

Daucus ex Creta exportari debet. Huius semina & radices in usum modicum ueniunt: aliarum specierum semina tantū. Quia uero Dauci & syluestris pastinacæ eadem propemodū uires existunt, ea pro dauco uti licebit.

Cari.] Officinæ carui dicunt Serapionem suum, aliosque Barbariæ scriptores secutæ. Non tamē semen hoc carui quod Pharmacopola uendunt, respondent Serapionis descriptioni quippe crassius hoc esse dicit quam cyminum, officinarum autem multo minus cymino est. Caros igitur forte una ex nostratibus dauci speciebus erit, si semen etiam à Dioscoride exiguum descriptum, respiciamus.

Ameloprasum.] Caule proflit bicubitali, foliis porraceis, sed angustioribus, flore cādido, radice bulbosa. Prouenit in uinetis, unde à natalibus ampeloprasin quasi uitigineū porrum Græcis notatur. Nostrates officinæ uineate porrū appellant.

IN LXXVII. CAPVT.

TVbera.] Hæc ex terræ sagina conglobantur, sine medulla, uina, cortice, solo undiq; circumdata, nullis fibris, nullisq; capilamentis nixa, nec extuberante loco in quo gignuntur, aut rimam agente, nec ipsa terræ coherent Galli hæc trufia nominant. Itali zunesta tarenfola. Vere effodiuntur, nec ultra annum durant.

Fungi.] Istorum origo prima è limo & acescente succo. madentis terræ, aut radices ferme glandiferæ. Initio spuma lentior, dein corpus membranæ simile, mox partus. Cortice, medulla, neruo, uena carent.

IN LXXVIII. CAPVT.

CHondrus.] Magna scriptorum recentiorum dissensio est, & adhuc sub iudice lis est. Nam scilicet chondrus & halica diuersa inter se sint, cum apud Paulum distinctim scribantur, an idem, cum apud autores Græcos chondrus, pro halica Romana sæpius ponatur. Apud recentiores autem Græcos ambæ dictiones coniungantur: Vt in Aetii sermone 9. cap. 10. in hunc modum: τρεφῆν δὲ διδόναι χόνδρον ἅλικος μετ' οἷνῳ λευκῷ. Quibus uerbis præcipit cibum dari chondrū aliq; cū uino albo. Item discēptatur, an hæc semina sint naturalia per se, an potius res factitiæ. Certe quantum ad primā cōtrouersiam attinet, collatis multorū autorū scriptis, chondrus uidetur antiquorum in usu fuisse, si Galeno de uictus rōne in

Chondrus.
Halica.

morbis acutis credimus, quanquam lib. 1. de alimentis nomē eius apud antiquos perrarum fuisse prodatur, ut fere sibi ipse contrarius uideatur. Alica uero teste Plinio, res Romana est, neque Pompeij magni ætate in usu fuisse traditur, nec pridem excoGITATA. Paulus noster ambo quasi consimilis usus ac facultatis, frequenter coniungit, ut lib. 3. cap. 31. *ἔστω δὲ σοι ἀλικάτος πλεῖστος ἐκ ψυχρῆς, ἢ ἀλιῆς, ἢ χόνδρου*. Id est: Panis tibi esto lotus ē frigida, uel alica, uel chondrus. Sic itaq; colligo, ut secunda quoq; discordia dirimatur, chondrum & alicam eisdem fere modis fieri, non autem semina, aut fruges esse per se. Paulus autem dicit alicam chondro in omnibus respondere, nisi quod uetrem magis astringat. Nimirū propterea quod chondrus fiat ex zea, quæ Italis & quibusdam Germanis spelta nominatur hodie. Frumēti genus inter triticum & hordeū mediū. Alica uero ex tritico fiat, quicquid dicat Palladius de hordeo semimaturato. Ea hodie nobis puls frumentacea uocatur: prisana cremori colatitio similis. Errant qui alicam ex zea, chondrum ex tritico fieri autumant. De chondro consulant Dioscoridem & Constantinū lib. 3. de re rustica. Interim uideas apud ueteres hæc duo confundi, ut quod alicæ tribuendum sit, chondro tribuant. Inueniasq; uarias uel chondri, uel alicæ conficiendæ rationes. Non etiam audiendi sunt, qui far apud Romanos dictum, chondrum esse arbitrantur: cum & ipsum far testimonio Archigenis frumenti quædam sit præparatio, ex zea nimirum & frumēto. Plinius testatur populū Romanum farre tantū ex frumento tercentū annis usum fuisse.

Panes.

Inter panes firmissimus.] Vtus sum dictione Celsiana, firmissimus, pro eo quod est alimenti plurimum præstans, quamquam in comparandi gradu τροφιμώτερος habeatur.

Syncomistus.

Syncomiston.] Hunc alio nomine Galenus autopyron appellat, quod ex omnibus suæ farinæ partibus citra ullā deductionem cōstet, inter fursuraceum & similageum medius, syncomistos quasi confusaneus dictus, quoniam castratus nō sit, sed omnia simul tulerit, fursures, utriculos & similem.

Maza.

Polenta] Vide Galenū lib. 1. de alimētis, ubi polentam ὀ. Græci ἀλφίτα noīant, recenset, ex hordeo nouello mediocriter tosto fieri, eamq; ueteres militib⁹ panis loco dare solebāt. Maza.] Cū polēta liquore cōspergitur, atq; subigitur, maza appellationē assumit. Hinc quidā eruditus ossam appellat.

Oryza.

Oryza.] Hoc frumenti genus Gallicum, Germanicumq; Oriza.
uulguſ detracta priore litera Rizon appellant.

IN LXXIX. CAPVT.

Legumina

EX leguminibus.] Legumina, inquit Galenus ea ex cerea-
libus ſeminibus appellant, quæ panificio non accommo-
dantur, ut puta fabæ, ipſa, cicera olentes lupinum, oryza, eruū,
&c. Galenus uocat ὁσπερία & χερσόνα.

IN LXXX. CAPVT.

DE temporariis.] Sic interpretatus ſum ὥραιος: quaſi di-
caſ horarios. Nam Galenus cæteriꝫ; græci id anni tem-
pus, horam appellant: in quo medio canicula ſidus oritur, ad
quadraginta uſq; dies perdurās, quo tempore omnes tempo-
rarij fructus, aut tempeſtiui, ut Plinius ait, proueniunt. At Ga-
lenus non ſolum horarios dici cenſet, qꝫ eo tempore naſcan-
tur, ſed ut à cōditaneis diſcernantur. Sic ē Plinius appoſite di-
xit, de perſico, qꝫ nō aliud fugacius. Hoc eſt qđ minus duret.

Omnia ponia.] Græce eſt ὅλη ὁπωρεῖα. Sic antea interpre-
tatus ſum quicquid herbaceo fructu uiret, lignoſi nihil exte-
rius habens. Proprie uero Galenus operam nominat libello
περὶ εὐχυμίας καὶ κακυχυμίας, ficus & uuas: ut Paulus ſequen-
ti capite etiam indicat.

IN LXXXI. CAPVT.

EX ceraſijs.] Galenus commentario iam citato in hunc
modum de tempeſtiuis illis fructibus præcepit. Sunt autē
arbori prope dixerim uniuerſi fructus, uitioſis ſuccis donati,
præter quas uocāt caſtaneas. Hæ ſi quidē exactā in uētriculo
concoctionē adeptæ, nutriunt, uerū ſuccis craſſioribus: malis
nequaquā. Aliarū arborū fructus temperarij omnes maligni
ſunt, nā ſi in uentricula cōputreſcant, medicamenti deleteriꝫ
naturā fere induūt, ſicut & mora, licet ea perſicis dictis & pru-
nis moderatiora ſunt. Tamen corruptelam nihilominus illic
prauā ſuſtinent, &c. De uſu horum paulo poſt ait: A uitioſis
ſemper abſtinendum, niſi cū ægroti æſtate totius corporis
ſiccitatem caloremq; emendare conantur. Cōueniunt enim
tunc poma, pira mora, ceraſia adſumpta. Cucumer uero, pe-
po, & melopepo, item præcocia dicta, uel perſica modice tunc
manducari debent.

Aliquādo
uicioſis
utendum.

In uniuerſum, aſtringentia.] Vide Galenum lib. 2. de ali-
mentis: ubi rationem tradit, cur rethori cuidam aſtringen-
tibus

tibus sumptis post alios cibos laxantes uenter fuerit solutus. Ibiq; hæc Pauli sententia copiosius explicatur.

**Primæ mē-
sz qui cibi
cōueniunt.** Eoq; primum exhiberi debent. Idem Galenus libro supra nominato confirmat in hunc modum. Omnes cibi qui prauum succum cum humiditate, & lubricitate obtinent, ex facili descendunt, eoq; prima mensa sumi debent.

Duracina. Duracina.] Sunt qui lectionem hanc deprauatā putant, uelintq; legi pro duracina, rhodacina nulla plane ratione ualida nitentes. Galen. quidem & alii uetustiores hoc uocabuli non usurpant, uerum recentiores græci, uti Paulus, hoc cum Rhomanis commune habent. Vocantur autem duracina, q̃ corpus ipsorum pertinacius ossi hæreat, quā ut auelli queat.

**Constanti-
nus.** Græci δωρακενᾶ, uel δωρακινᾶ dicunt, latinos fere imitati. Cōstantinus lib. 10. de agricultura. ἐπειδὴ δὲ ἴσμεν τὸ δωρακινὸν ταχέως γινώσκον. Paulo post, ἐξυδρᾶ ποικίλης τᾶ δωρακινᾶς, ἥ δὲ αὖ φυτέων ἐπὶ τὰ φυτὰ.

Druppæ. Druppæ.] Plinius lib. 13. cap. 26. Oleum & Omphacium est. Fit duobus generibus, & totidem modis ex olea & uite: olea adhuc alba expressa, deterius ex druppa. ita enim uocatur, priusquam cibo matura sit, iam tum colorem mutans, &c. Græci δρυπτακᾶς appellant.

Pistacea. Pistacea.] Vide Plinium. Fructus est ex nucum genere, qui è Syria apportatur: Crescit arbore omnino nuda, præterquam ramorum cacuminibus. Hæc enim conantur denfioe folio, angusto, maiore tamen quā lentisci subruffo, surculis dependētibz pineæ nucis similitudine. Lutetiæ in quibudam hortis est uidere nunc. Officinæ pharmacopolarū uocant fistica, aut fisticorum grana.

**Pistica of-
ficinar.
Sfrica.** Sirica.] Galenus ita uocat zizipha à recentioribus græcis appellata: quæ officinæ sephisiariorum iuiubas nuncupant. Recentiores maxime commendant hunc fructum, ut boni succi. Galenus ut prauū donatum reiiciendum putat. illi præterea stomachum gratum, hic cōcoctioni rebellem prædicat. item illi aluo subducendæ conuenire, hic astringere aluum. Aetius recentior, calore & humore temperata tradit, eoq̃ sanguinis acrimoniam edomant. probum succum creant, le-rosū sanguinis humorem eliciūt. Decoctum eorum tussimā & difficultatē spirandi lenit, pectori, renibus, uescicæ, prodest.

IN XCII. CAPVT.

Molles.] Addidi cute, & paulo post, dura carne, dixi, ne ex simplici uocum interpretationem cōtraria inter sese posita uideri possint Sūt itaq; pisces hi molles cute si attingas, duri autem carne, ut Galenus habet lib. 3. de alimentis. Nihil in capita pręcedentia sum commentatus q̃ & facilia, & ex Galeni libro iam citato sūt omnia fere decerpta.

IN XCIII. CAPVT.

Cartilaginea.] Hi pisces superioribus sunt contrarii, nam duram habent cutem: mollem autem carnem. Ceterum Galenus selache dictos affirmat, ἀπὸ τῆ σέλας ἔχειν, hoc est, quia splendorem habeat eorum cutis.

Selache
Pisces.

IN XCVII. CAPVT.

ITaq; somnus.] Galeno lib. 3. de causis pulsuum in hūc modum somni generationem describit: ὁ μὲν γὰρ ὑπνὸς γίνεται τῆς ἐμφύτης θερμασίας ἥτοι δια κάματος τινα, καὶ ξηρότητα πλείονα πρὸς τὴν τροφὴν ἐπιτραφείσης, ἢ διὰ ἀμετρίαν ὑγρότητος ἀδυνατῆς ἐκτὸς ἀποτέμνεται ἐπὶ δ' ὁ μὲν πρότερος ὑγιεινὸς τε καὶ κατὰ φύσιν, ὃ δὲ δεύτερος βλαβερὸς, οἷος ὁ ἐν κώμασιν τε καὶ ληθάργοις. Hoc est: Etenim somnus fit, cū naturalis caliditas, uel ob defatigationem quandam & maiorem siccitatem ad alimentum conuersa est, uel ubi propter nimiam humiditatem foras nequit extendit. Prior sane est salubris, & secundum naturam. Secundus autem dictus, qualis in comate & lethargo, &c. Paulo post: τῶν δ' ὑπνῶν τῶν κατὰ φύσιν, ὥσπερ ἔν καὶ τῶν ἐξηχεύσεων ἢ γενέσεις οἷα πρὸθεν εἴρεται, θεομένους μὲν ἅμα, καὶ ἀπορῶντος ὑγρότητος διαφυλῆς τῆ κατὰ φύσιν ἐν τοῖς ζώοις θερμῆς καὶ διατῆτος συνιόντος ἐς τὰ σπλάχνα, καὶ τὴν γαστέρα τῶν ὑπνῶν γινόμενων. ἀντάρκως δ' ἀπολαύσας τούτης ὥς ἡδη τὴν κατὰ φύσιν ποιότητα ἔχων, τῆς γενεῆς ἀποτελεμένης, &c. Hoc est. Sōnorū uerò naturalium, sicuti ēt uigiliarū generatio existit qualis antea exposita est, nēpe ut somni fiant cū naturalis animantium calor indiget quidē simul & destituitur copiosa humiditate, eoq; ad uiscera & uentrē cōmeat: ut aut uigiliæ, cū idem calor hac humiditate potius fuerit abunde, ut iā naturalē habeat qualitatem, &c. Nā ex alimēti cōfectione multa uaporosa humiditas in ipso calore, meatibus, omnibusq; particulis intermediis suggerit.

Somni ge-
neratio.

Vitium

Mutua ui-
rium subfi-
dia.

Virium animalium requies.] Hoc est, ipsæ quidem non agunt, sed naturalibus subsidium adferunt: eoq; præcipitur recte, ut dum sit concoctio, etiam in uigilantibus, abstinetur à lectione, disputatione, aut cogitatione graui, ne uis naturalis alio distrahat, nā mutuo sibi ferūt auxilia, impedimētaq;.

Tempus
somni.

Tempus somni optimum à cibo.] Intellige, non statim: nā somnus statim à cibo, caput replet, ut etiam plethoricæ dispositiones, si Galeno in Aphorismis fidem accommodamus.

Terminus autem somni.] Non sunt audiendi qui unum omnibus terminum somni præscribunt. Nam alii celerius, alii tardius concoquunt: hi plus assumunt, illi minus. Quare Galenus recte in commentario de euchymia & cacochymia tradit. Quibus itaq; exercitationibus plurimis uti licet, & quam diu libet dormire, ij & cibos crassi succi, & uiscosos tuto assument. Quæ ita græce sonāt ὅσοις μὲν γὰρ ἀνθρώποις ὄντων ἐστὶ γυμνασίοις τε πλείοσι χρῆσθαι, καὶ κομᾶσθαι μέχρις περ ἀν' ἐθέλωσι, &c. ut supra dictum est.

IN XCIX. CAPVT.

Catapho-
ra.
καταφέ-
ρειται.

Cataphora.] Dictio græca est, à uerbo καταφέρειται, quod est obdormiscere uehementius. Vnde etiam καταφορικὸς ὕπνος dicitur. Latine interpretari possis, grauis aut uehementis soporis impetum. Galenus sub hoc nomine, alios affectus soporosos uidetur comprehendere, καταφορὰς inquit, βαθείας ἐργάζεται. ἃς ὀνομάζουσιν ἀποπληξίας, καὶ κάρους, καὶ κατοχάς. Hoc est, Cataphoras profundas efficit, quas nominant apoplexias, & caros, & catochos.

In Epistola Dioclis habetur συνάχην νύκτωρ. In qua uitiū esse puto. Nam quid sibi uelit νύκτωρ, non satis intelligo. Angina enim omni tempore solet excitari. Nihil itaq; mali erit, si legas pro νύκτωρ, νυκτάλωπα.

FINIS LIBRI PRIMI


COMMENTARIORVM.





COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER SECVNDVS.



CAPVT I.



LIBER hic secundus de febribus, & earum accidentiis facili tractat compendio, ex Galeni opere de medendi ratione ad Glauconem magna ex parte transcriptus. Nonnulla uero Paulus noster ex opere de Crisibus, pauca ex Prognosticis Hippocraticis, quædam ex aliis autoribus sumpsisse uidetur. Cæterum à morbis sim-

ilaribus auspicaturum se dicit, qui quatuor constant interperaturis. Quia uerò calida omnium est efficacissima, merito ab hac appellationem desumpsit, febres, morbos nominâs similes, qui nimirum etiam simpliciores dicuntur. Compositos in tertio quartoq; uolumine persequetur.

Oribasii compendio.] Iulianus olim Imperator medicinâ suo tẽpore uagam amplamq; intelligens, præstantissimos ex omni regione medicos Romæ colligendos magno studio curauit deiegitq; ex uniuerso illorũ numero septuaginta duos, qui diuersis antiquorum auroꝝ monumentis euolutis examinatisq; necessaria magis in artem medicam compendiosa ratione comprehēderent. Hi igitur oēs, sua prius rōne & uia, singulatim explicata, uno tandem consensu scribenda prouinciam Oribasio ut facile principi, doctissimoq; tradiderunt. Is uaria Galeni opera, aliorumq; nonnullorum perferuatus in

compen-

compendium quoddā septuaginta duobus libris comprehendit
sum (tot enim fuerant conuocati medio) artificiosè redegit.
Paulus autem Aegineta opus hoc maius esse animaduertēs,
quā ut iter facturo circumferri possit: aut ab homine tenuio
ris fortunæ comparari, in septem tantum libros constrinxit.

Castigator
codex.

Ex Galeni sane. In græco male legitur ἐκ τῶν Γαλινῶ
μὲν ὡς μάλιστα. Hic ὦ est superfluum: ac legi debet Γαλινῶ μὲν
ὡς μάλιστα. Hos & Orosius, & castigator Basiliensis præterit:

IN II. CAPVT.

αἰσθόως.

VNa uice.] In græco est αἰσθόως, quod cumulatim signat,
ac una uice. Celsus dixisset semel. Contrarium huic κατὰ
μέρος, & κατ' ὀλίγον, quod est, particulatim, & paulatim, mul-
tisq; uicibus. Quando scilicet morbi in abscessum finiūt plu-
ribus diebus fit erisilis.

Græcus
codex ul-
ciosus.

IN III. CAPVT.

Neq; enim capitis.] Ex Galeni 1. de diebus decretariis hæc
transcripta sunt. Desideratur autem in Paulo uocula, δι,
habet enim πρὸς τοὺς εἰς βάλλων, pro πρὸς τοὺς δι εἰς βάλλων,
quod neglexerunt Aristarchi.

Aliquem latere.] Galenus addit emphaseos gratia καὶ
ἀναμνηστικῶτατος εἶναι, hoc est, etiam si stupidissimus, & ab omni
alienus sensu fuerit.

IN IIII. CAPVT.

νεκρῶδες.

LEthales notæ.] Subsequentes scilicet, facies cadauerosa,
sano quā dissimillima, et quæ mortuum imitetur, unde
græcis νεκρῶδες dicitur. Nam si ex Hippocratis sententia, si-
milis sit sani præsertim ipsius, qui nunc ægrotat, faciei, opti-
me sperandum est. Porro notæ hæc sunt in morbis acutis, diu-
turnis, animi defectionibus, doloribus, item omnibus defun-
ctis. In faciei autem, quod imprimis appareant, & uim obti-
neant maximam: Cadauerosa, quoniam natura debilitata, nō
amplius sanguinem & spiritum in hanc suppeditat.

Laurentia
nus.
Nares acu-
tæ.

Nares acutæ.] Ita Celsus interpretatur Nescio cur Lau-
rentianus Nasus cōpressus uerterit, quod græcis dicitur ὀξεία
ξίς. Sunt autem nares acutæ, aut ob aliquam causam carnosas
animalium partes consumentem, corruptentemq; , aut ob
debilitatem caloris natiui, qui non magis in extimas corpo-
ris partes extendi potest, sed in uisceribus solis exiguis rema-
net.

nec. Quo fit, ut non amplius tantum sanguinis, aut spiritus in partes illas affluat. Cum autem in naso osseæ partes & humide carnosæq; sint, inuicem commissæ: deinde quum osseæ propter terrestrem ipsarum substantiam similes permaneant, humidiores autem consumi facile possint, & in se conciderent ob inopiam tum spiritus tum sanguinis, fit ut nasus gracilescat.

Oculi concaui.] Ob easdem causas fiunt: sed quanto extremo naso humidiores, mollioresq; existunt, tanto citius cauantur. Imo etiam spiritus animalis copiosi participes existunt, & caloris non pauci, quibus ipsi destituti merito cōtrahuntur. Cadauerosa igitur facies quæ sequentia apud Hippocratem obrinet, in diuturnis sæpe morbis uisitur: raro per initia, ob quod & periculosissimū est, & in acuta morbo prorsus lethale: tãquã ne occasione quidẽ habuerit à tẽpore. In morbis autẽ lōgis nõ adeo lethale: ita nec in frigido loco, hyeme, statu aeris, frigido, & senectute: quia morbus naturę respōdet.

Si hæc ueq;] Aut tali aliqua manifesta causa, minus periculosum est, quam si ob morbi malitiam, etsi præstaret, neque ab eiusmodi causis uirtutem prorsus debilitari. Celsus optime hanc sententiam lib. 2. exprimit latine. Si hæc, inquit, ita sunt, ut neq; uigilia præcesserit, neq; uentris resolutio, neque inedia. Dixit autem Hippocrates neq; ex uigilia: quia ex hac oculi, ueluti chorda ex siccitate tenduntur. Vigilia.

Vacuatione. Intellige per alui profluuium, & mordicationem, ut Galenus apud Hippocratem interpretatur. Verum Hippocrates habet τὰ τῆς κοιλίας ἐμλαρισμένα ἢ σφοδρῆς, quod est: Alui uehementer humectata. Celsus dixit uentris resolutio. Paulus utitur dictione κοιλίης. Vacuatio.

Aut inedia.] Hippocrates dixit λιμῶδες τι, quasi famelicum aliquid, aut fames quædam Paulus ex Galeno ασιτία, hoc est, inedia. Cæterum & alui resolutio uehemens, & inedia corpus siccant, adeo quandoque, ut per se emortuam hanc faciem inducant. Inedia.

Si oculi lumen refugiunt.] Hoc est, auersantur, ob uisoriæ facultatis imbecillitatem. Quæ quum propter instrumentorum affectionem laborat, quemadmodum in lippitudinibus, aut ob alium quendam fluxum præter naturam quidem est, non tamen mortale: cum autem per se afficitur, lethale.

Ilachrymant, nõ ex quadam] Hippocrates habet ἢ γὰρ

Hippocra-
tes.
Celsus.

τὴν αὐγὴν φεύγουσιν, ἢ διακρίουσιν ἀπροαίρετως. Hoc est: Si n-
lumen refugiunt, aut illachrymant citra uoluntatem: nimi-
rum ob facultatis retentoriæ imbecillitatem. In Hippocra-
te additur: ἀποτρεφῶσιν, quod est, peruertuntur. Celsus sim-
pliciter dixit, si præter hæc oculi quoq; lumen refugiunt, &
illachrymant. Paulus autem pulchre distinguit, causa tum ex-
teriore tum interiore, quæ sane utraq; lachrymas sæpe in ocu-
lis mouet.

Ad hæc si alter ex his minor.] Quæ nota facultatem ip-
sam dispensatam emori significat.

Album
oculi.

Quæq; in ijs alba.] Sicut in lippitudinibus quibusdam &
ebriosis nonnullis Iudicim uero est plenitudinis in cerebro,
eiusq; membranis: interim & inflammationis. Vtroq; enim
modo sanguis ad oculorum uenas exprimitur. Album oculi
pars est pupillari ambientis, pericranii extremitas.

Aut nigracent.] Refrigerata scilicet. Refrigerantur autē
emortua. Idcirco mali colores perpetuo apparent.

Pituita a
pud Celsū
in oculis p
græcorū.
λῆμα.

Crassior pituita.] Græce λῆμα, quod Plinius lib 23. cap 1.
dixit, græco usus uocabulo, uel inquires, si lemæ in oculis erūt.
Nos Celsum imitati libro secundo, de indiciis mortis, quod
caput ex Hippocrate transtulit, diximus, pituita. Habet ille,
pituitaq; in iis innatans nouissime angulis inhærescit. Cæte-
rum Galenus Lemas exponens, dicit lemicocti alimenti esse
recrementum. Nam facultas oculum dispensans imbecilla al-
latum nutrimentum nequiuuit concoquere. Iam sunt etiam
lemæ in lippitudinibus tum ob humiditate præter naturam
copiam, tum ob instrumentorum uicium.

Per somnum alba.] Ex 14 cap. prognosticon Hippocratis
sumptum uidentur. Ita uero apparent, ob imbecillitatem fa-
cultatis palpebras mouentis, cum citra causam exteriorē
constituitur.

Stridor ex
quibus
causis.

Stridere dentibus,] Hippocrates adiicit, quibus à pueritia
conuetum non est. Fit autem ex cerebri offensione, & per se
delirium significat: cum delirio autem, mortem. Cæterum
sunt stridores dentium, cum temporales & masticatorii mus-
culi modo conuulsorio mouentur. Quibusdam accidit, ipsis
tantum musculis affectis, uel ab origine, uel postea ex quadā
causa. In nonnullis principio neruorum in eiusmodi affectio-
nem deducto, unde potissimum illorum quæ ab eo nata sunt,
conuulsiones

convulsiones fiunt, ut hic neruorum musculus infertorum.

Aut in ueste floccos legere.] Hoc græce dixit Paulus unico uerbo *κροκιδίζειν*, quod Hippocrates τὰς κοκιδὰς ἀπὸ τῶν *ἱματίων ἀποτίλλειν* dixit capite uigesimo octauo. Celsus hoc interpretatus libro secundo: ait: Si in ueste floccos legit, sim briasq; deducit. Id autē sit corporis humoribus ad caput exhalantibus Quorum uapore purus ille pupillæ humor inficitur, unde prædictæ oriuntur imagines, ut in suffusis. Vbi enim niger aliquis, aut crassus antestat, lumē uisoriū prohibēs foras excedere, pro humoris subsistētis natura, imagines generant.

κροκιδίζειν

Si æger supinus.] Hoc à decubitu iudicium sumptum est. Galenus in prognostica Hippocratis capite septimo scribit, id neq; ad salutem, neq; ad mortem habere momentum, sed medium esse, aut parum ad alterum declinare. At si consuetū ægro est, ita cubare, & medicum ingredientem non reueretur, ex bonis signis est. Sin autem consuetum non est, & medicum reueretur, malum est.

Veluti resolutus.] Græce est *οἷον παρρημένον*. Nam *πάρεσις* idem quod *παράλυσις*: Sed illa incertis quibusdam partibus, hæc in toto corpore obuenire dicitur. Sit igitur, ueluti artubus resolutis. Forte idem est quod dixit Hippocrates *καὶ χεῖρας καὶ τράχηλον, καὶ σκέλα ἔχειν ἐκτεταμένα*. Hoc est, & manibus & ceruicem & crura habere extensa: non contracta. Celsus dixit, ubi supinus æger iacet porrectis manib & cruribus.

πάρεσις

Vel si etiā deorsum.] Hoc inquit Galenus facultatis corporis gubernantis abolitionem testatur. Celsus dixit, ubi deorsum ad pedes subinde delabitur.

Spiritum.] Hoc est, totam respirationem frigidum, ob extinctionem caloris natiui. Græce est *ἀναπνεῖν*, quod est, respirare, Celsum secutus dixi spiritum elidere.

ἀναπνεῖν.
Spiritus elidere.

Item pulsus languidus.] Hippocrates pulsus non menit. Languidus autem, quem alii obscurum uertunt, imbecillitatem uirtutis fatetur. Creber magnam necessitatem, deficiens per interualla, aut ut percipi uix possit, extremam debilitatem.

Sudore digeratur.] Græce est *ἰδρῆν συγκοπτικῶς*, quasi di cas sudare ad syncopen. Vide Hippocratem. Celsus in Cardiacō dixit: Id autem nihil aliud est, quā nimia imbecillitas corporis, quod stomacho languēte immodico sudore digerit.

ἰδρῆν συγκοπτικῶς

ἔνσφυξία.

Pulsus negetior.] Græca dictio est ἐνσφυξία, quasi dicas, bona pulsatio Hoc est in diocris magnitudine, frequentia & celeritate: æqualis sibi per omnia.

προσφο-
γαί.

Bene erga cibū.] Paulo aliter sonant uerba græca, εὖ ἔχεν πρόστας πρόσφορας. Hoc est: bene habere ad oblationem intellige cibi.

IN V. CAPVT.

SI quatuor particul.] Quum nimirum materia est extra uasa. Sicut autem morbus totus quatuor, habet tempora: principium, augmentum, statum, & declinationem, ita quoque particulares accessiones Vide Galenum de morborum temporibus, & de totius morbi temporibus, quem librum nos latinitate donauimus.

Cuius extremus.] Hoc est, longissimus, quasi dicas: Si longissime producat, in septimana iudicatur. Nam teste Galeno exacte peracutus is est, qui quartum diem attingit. Non exacte, qui ad septimum usque producit. Ita inter acutos, alius exacte acutus, qui ad usque diem quartum decimum producit. Non exacte uero, qui usque ad uigesimalium durat, quam & ipse acutus sit.

Sin autem inde in quadragesimum incidit, acutus ex decedentia, quem græci κατὰ μετέπτωσιν appellant.

Quarto die crism.] Nam quarto plerumque solunt, aut occidunt. Si multum, ad septimanam perdurant.

Sed duodecim.] Quæ accessionis longitudo maxima est, tertianæ exquisitæ dictæ, quæ intra quatuordecimum, hoc est, antequam omnino prætereat, soluitur.

Longus.

Talis morbus longus.] Ut est quarta, & semitertiana, tertiana non exquisita.

Acutorum
duplex na-
tura.

At si particulares.] Galenus l. b. 2. Duplex autem horum acutorum quoque, natura est. Vel enim accessionum remissiones in exactum integritatem finiunt, uel continua, semper febris manet, quæ particulares accessiones non habet, materia in maioribus uiscerum uasis subsistente.

Corrigitur
codex græ-
cus.

Si quidem facies, & totum.] Intelligi primis diebus. Nam fieri potest, longo tempore ex parua febre, ut corpus modice collabatur. Modice autem dixit: quia nimium consumi & præter rationem facultatis retentoriæ imbecillitatem testatur. In codice græco, superflua est particula ε. Nam legi debet: τὸ

πρόσωπον,

πρόσωπον, καὶ τὸ λαίπδον, &c. non autem τὸ πρόσωπον ἢ καὶ τὸ λαίπδον, nam una hæc uocula sententiam peruertit, quod nec Orosius intellexit, nec Basilienſis corrector.

Si proſus nihil.] Græce eſt. αὐτὸ πᾶσι πάσι ἀσύμπτωτον, quod eſt: Sin autem omnino non collapſum eſt. Celfus latinus lib. 2. cap. 4. de ſignis lōgæ ualeitudinis dicit: Vbi æger pro ſpatio parum emacreſcit.

Ex arteriarum motu.] Magnus pulſus, qui in omnem diſtantiā attollitur, ſit ob magnum refrigerij uſum. Citatus, ubi magnitudo pulſus non ſufficit, additur Celeritas. Sicuti cū qui magno incedit paſſu, non poteſt iter inſtitutum tempeſtius abſoluere, niſi eundem gradum acceleret. Creber, celeritatem adhuc adiuuat, dum breuem facit ab opere quietē. Veluti qui nunquam intermittit, uerū ſemper iter repetit, quod celeriter perficit atq; maximum uſum refrigerii indicat. Vehemens, robuſtis uiribus, natura ſtrenue ſe ad fuliginosa excrementa expellenda accingente.

Contrarius longum.] Hoc eſt: Paruus, tardus, rarus, languidus. Paruus quia tantus color nō eſt, qui refrigerari ualde requirat, aut uiribus imbecillis, materiaūe oppreſſis.

Quatenus calidæ, & urētes.] Subaudi ad tactum Hæc ſumplit ex libro primo Galeni ad Glauconem capite de curatione doloris capitis.

Deliteſcentes.] οἷον σμυχόμενοι, græce eſt. Interpretantur autem grammatici σμυχόμενοι ἀφανιζόμενοι, quod eſt, non apparentes. Galenus utitur hoc uerbo, præterquam in libro ſupra citato, ſecundo etiam de iudicatoriis diebus. Qui nanq; inquiring, ad quartumdecimum, aut uigefimum diem morbi proſus acuti exciderunt, hi plane inceperunt tanquā σμυχόμενοι, lento motu. Nihil refert etiam ſi interpreteſis, mitiores & languidæ. Habetur in codice Græco ante σμυχόμενοι dictio μαλακώτεροι, ſac tu μαλακώτεροι.

IN VI. CAPVT.

Magna ex parte.] Recte dicitur, magna ex parte, quoniā plurimi longi affectus teſte Galeno libro ſecūdo de diebus decretoriis, etiam excretionibus finiuntur, ſed non manifeſtis. Poſſimum autem abſceſſibus, & concoctione. Qui enim ad quartumdecimum crudi ſunt, non ante quadrageſimum ſoluuntur.

Dies decretorij qui,

Dierum decretoriorum.] Antequam dies ipsos enumeremus, apte prius dicetur, cur ita appellentur, Græci uocant, *κρισιμῆς*; quasi iudicijs dicatos. In quibus natura cū morbo pugnante, iudicium expectatur, natura ne morbum sit superatura, an morbus naturam. Hoc autem fit, quando facultas alicui siue qualitate, siue quantitate, siue utroque corpus offendentis, operi suo ualentissime se accingit: quæ uere Crisis dicitur. Hæc autē singulis diebus potest accidere, teste Galeno, sed non æque frequenter, nec æquali fide. Hinc Paulus nolter inquit: Dierum decretoriorum alii de ægris frequenter, cum fide, nempe cum excretionē quadam copiosa, aut abscessū non obscuro. Post quæ morbi recidua timēda nō est.

Salubriter.] Græca dictio est *ἀγαθῆς*, quod est bene: quo die morbus ad sanitatem desinit, eoq; dixi salubriter.

Perfecte.] *τελέως* interpretatus sum perfecte, iudicat autem is dies perfecte, qui nihil amplius in morbo facit reliquū.

Manifesto.] Hoc est: Quo cum excretionē, aut abscessū quodam euidenti morbus solutus est.

Natura
motibus
ordinans
gubernatur.

Insigniter.] Paulus dixit græce *ἐπισύμωσις*, Galenus *ἐνστάμωσις*, quasi cum bonis signis. Hoc est, qui prius à contemplatorio iudicatus sit, Iam intelligendum uenit, naturæ motus proportionibus definitis fieri, & circuitibus ordinatis, cū morbi materiā superauerit: prohibetur autem quum non plane superauerit. Septenarij igitur circuitus ualidissima sunt uirtute præditi: mox quaternarij: quædam uero extra hos excidunt: quos coincidentes seu intercalarios nominare licet. At perfectus circuitus est, ex tribus septenariis compositus, qui nimirum uiginti constat diebus. Vnde liquet non omnes septenarios inuicem separari. sed nonnullos coniungi, ut etiā quaterniones. Nam hi teste Oribasio in ipsis partibus à præcedente numero incipiunt: post ipsas uero partes absq; præcedente numero procedunt. Porro secundus sextenarius circuitus à primo dissociatus est, testimonio Hippocratis ex Aphorismo quarto decimo libri secundi, secūdi septenarii, octauus dies initium est: tertius septenarius circuitus secundo coheret: Vnde fit ut non eadem proportio post quartumdecimū diem seruetur. Nam ab ipso quartodecimo, qui finis secundi est, tertius incipit: post uigesimum diem, idem circuituū ordo per-

do perpétuo cōsistit. Hinc est quod apud Hippocratem probetur maxime, post septimum, quartumdecimum, uigesimalum, uigesimalseptimum, trigesimalquartus, quadragesimus. Respō debet ergo trigesimalquartus, quartodecimo, quippe qui ex duobus septenariis sit coniunctus. Et quadragesimus, uigesimo, ut qui tertium septenarium coniunctum expleat. Eadē ratione commendat sexagesimum, octuagesimum, centesimum, centesimum uigesimalum, ut perfectos circuitus. Iā quaterniones ita habent. Secundus & primus coniunguntur: tertius à secundo sepatatur. Quartus autē tertio, & quinto coniungitur: quintus iterum sexto. Atq; ita quoque post uigesimalum, ut in septenariis proportio seruetur. Concidunt eis nonus, quintus, & tertius.

Sunt itaq; potentes ad iudicandum septenarii: mox quaterniones. Quartus enim dies morbos qui primo non desinunt, soluit Undecimus quos septimus nō discussit. At si maior morbus sit quā ut quarto die crīsim subeat, certe solutio ipsius in eodem preparatur: septimo autem finis morbi adii-citur. Qui uero morbi septimo die non finiunt, undecimo natura soluere molitur Atq; sic in ipso uel decernit, uel quartodecimo pręparat. Ac omnibus pulchre euenientibus, nullo admissio errore, ad quaternionum circuitus iudicia omnino perueniunt. Erratis autem quibusdam admissis, in coincidentibus, seu intercalarios recidunt, quanquam in facta iam crisi iudicāda, pręstat eam in nono factam esse, quā octauo, ut que sit tutior, & fidelior: Itaq; differunt quaterniones ab intercalariis, natura & usu: natura ut dictum est: usu, quod ad futurę crisis cognitionem sufficiant. At morbi acuti impari dierū numero, longi pari iudicantur. Inuadunt quidam morbi secundum diem priore grauiorem habentes: quartum tertio, & totas accessiones in diebus partibus, qui longorum morborum iudices sunt. Protinus autem ut acuti propter accessionis uehementiam finiuntur, hi ēt secundo die interficiunt, & quarto: uerū sexto plurimos. Cæterum dies intercalarii, tertius, & quintus, non minus quā quartus decernunt. Nam perturbationis euidentia naturam ea quę molestant, etiam ante tempus propulsare compellit. Ptoinde primariam decernendi uirtutem non habent, sed per accidens aliquod sic eneniū. Quoniam enim natura non conueniēti semper tempore de

morbis decernit, sed concitata plerunq; alias aliis de causis, à quibus accessio in morbis acutis maxime continua redditur, in imparibus acutorum iudicia fieri ratio est.

Exiguum naturæ impetum] Hoc est, si uel modice natura ad expetendum aliena se accinxerit. Ex primo Galeni libro ad Glauconem de curatione doloris capitis hæc transscripta sunt, ubi ita habetur: ἡ μὲν γὰρ ἐβδομὴ ἡμέρα, καὶ κατὰ τὰς βραχέας παρασπιδὰς τῆς φύσεως ἔξομα πρὸς τὴν διὰ νωστὴς κρίσιν. Hoc est: Nam septimus dies etiam ex paruis naturæ apparatusibus ad crism quæ per euacuationem confit, erumpit, itaq; ad quartumdecimum usq; diem ualentissima. Græci erat ἀγωνιστικώτατα, hoc est, maximo cum certamine, & impetu naturæ. Ex lib. 2. de diebus decretoriis.

ἀγωνιστικώτατα.

Prorsus elanguescunt] Superius dixit de diebus post uigefimum succedentibus: quod scilicet uehementiam in iudicando remittant. ita hic eos qui post quadragesimum sunt, prorsus, lāguescere in naturæ moribus. Græce est τελείως εἶσιν ἐκλυτοί, quod est, omnino sunt resoluti. Male autē in codice Græco impressio est ἐκλυτοί pro ἐκλυτοί. Nec hoc aduerterūt Oroscius & Gemusæus.

Leſio codicis Græci castigatur.

IN VIII CAPVT.

Concoctionis signa] Galenus lib. 1. cap. 3. de Crisibus eadem plane habet. Dicit autem signa decretoria nonnunquam male euenire, propterea quod apparētibus scilicet decretorijs citra concoctionem, natura ob perturbationis uolentiam, quæ alias ab aliis causis accidit, ad expellendum coacta, crisis uel bona, uel mala fiat.

Neq; igitur per initia.] Ex eodē Galeni libro capite octauo sumptum est: sequitur autem in Paulo Græco: ὅτε ἐν ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οὔτε ἐν ταῖς ἀναβάσειν αὐτὰ φαίνεσθαι χρὴ, ἀλλ' ἐν τῷ τῆς παρακμῆς χρόνῳ. Hoc est: Neq; igitur per initia, neq; in augmento ipsa apparere, sed declinationis tempore conuenit. Galenus autem habet: ὅτε γὰρ ἐν ἀναβάσει, ὅτε ἐν ταῖς ἀρχαῖς, ἀλλ' ἐν ταῖς ἀκμαῖς αὐτὰ ἐπιφαίνεσθαι χρὴ. Quod est: Neq; n. in augmento, neq; principio, sed in uigore ipsa apparere oportet. Cui lectioni ego assentior. Nam testimonio Galeni lib. 2. de Crisibus, capite quinto: Exquisita cōcoctio status tempore confit. Ergo si morbus ante statum iudicatus fuerit, malo est. Mutandum itaq; in Paulo ἐν τῷ τῆς

Leſio codicis Græci uiciata.

παρακμῆς

παρὰ κμῆς ἐν τῷ τῆς ἀκμῆς. Hoc nō intellexisti Orosci, nec tu Gemufeg aduertisti.

Si accessiones urgeant.] Galenus lib 3. de Crisibus, capite quarto, inquit in hunc modum: εἰ μὲν γὰρ ἐπύχουσιντο, καὶ προλαμβάνουσιν αἱ τῆς συνήθους ὥρας, &c. Hoc est: Si enim urgeant, præuertantq; horam consuetam. Paulus habet: εἰ μὲν ἐπιτέσσιντο, hoc est, si intrudantur, quod postea explicatur per hanc clausulam: Et uehementiores multo fiant. Quare cum Galeno etiam legendum censeo, ἐπύχουσιντο, non ἐπιτέσσιντο, quatenus non adeo refert, utrum malis. Galenus certe paulo post eodem uerbo eadem in re utitur: πρόσθλον inquitens: εἰς ἐπὶ τὴν κρίσιν ἐπίγεται, &c.

Item iis qui ob rigores.] Nempe iis qui febribus laborant intermittētibz. Parum proprie dixi rigores, nam hi proprie de frigoribus uehementibus, aut duritie ex frigore cōtracta, aut etiam sine frigore dicitur. Vt apud authores idoneos est inuenire. Græca autem dictio ῥίγος, totius corporis cōcussionem significat. Celsus eā uocabulo horroris qui Græcus φρίκη dicitur, interpretatus est. Plinius ramen libro septimo capite quinquagesimo scribit: Gertis pestifer calor remeat horis, aut rigor. Capiamus itaq; hoc loco rigorem, pro uehementi horrore, ut Galenus est autor.

Rigor.

IN X. CAPVT.

ANte quamlibet iudicationem, ægrotus grauiter excruciat-
tur.] Caput hoc ex primo Galeni ad Glauconem libro, sumptum est. Excruciat autem grauiter, quia natura in totum contra morbum insurgit, ad expellendum ea quæ præter naturam sunt. Græce est δυσφορία προγῆται. Hoc est ad uerbum: Difficilis tolerantia præcedit. Nam δυσφορίαν uerbum. signat ægre morbum ferre, inquietū esse, exagitari & affligi.

Atque his obuenientibus.] Galenus libro citato: εἰ γὰρ ἐπὶ τέτοις ἀπασιν. Hoc est: Si enim præter hæc omnia. Sublimius attollantur. Galenus libro tertio de prænotione ex pulsibus sumpta, inquit pulsum sublimem omnem excretionis indicem esse.

Ad hæc si dies decretorius indicetur.] Hoc est si prædicatur ab alio contemplatorio, ut septimus à quarto, quartusdecimus ab undecimo, &c.

Exilientem.] Subaudi è lecto. Galenus in commentario quem inscripsit περί προσγινώσκειν, in hunc modum habet: Cū natuta incumberet in ea quæ grauabant, expellenda, æger erexit se tanquam uellet è lecto exilire: Rogatus cur id uellet facere, respondit se uidere serpentem rubrum ex regula emergentē, ac ueteri ne in uia ille aberrans, super ipsum caderet, eoq; fugere in locum quo decumbebat.

Si qua partium ipsius palpitet.] εἰ τὶ πάλλεται Græcus co-
 dex habet, ut etiam Galeni primus ad Glauconem. Signat au-
 tem πάλλομαι, idem quod moueor, concutior, palpito. Vide
 πάλλομαι libellum Galeni de palpitatione, quam alii tremorem inter-
 pretantur. Libro primo de crisibus pro πάλλοιτο habetur,
 σείεται, quod est, mouetur, additurq; καὶ τρεμῶδες γίνεται,
 id est, & tremulum fit, ut labrum.

Venæ in temporibus.] Quod signat sanguinem ad supe-
 riora erupisse, & calidissimum, cum alioquin proprium sit ar-
 teriarum pulsare.

IN XI. CAPVT.

Crisis.
Iudicium.
Iudicatio.

SI euacuatio.] Ex Galeno de Crisibus tertio, cap. 3. fere om-
 nia transcripta sunt Meminerint autem lectores, aliquādo
 me dictione Græca crisi scilicet uti, quod medicorum familiæ
 sit & usitata, & familiaris. Aliquando interpretor iudiciū, uel
 iudicationē: quod ut mihi liceat post alios, oratos ipsos uolo.

IN XII. CAPVT.

Pulsus
partes,

Pulsus.] Hoc caput ex uariis Galeni libris de pulsibus tra-
 scriptum est. Primum itaq; Paulus definitionē ponit, qua
 dicit cor & arterias attolli, & deprimi. Attolluntur autem, lon-
 gis fibris in se coeuntibus: aliis omnibus relaxatis. Submit-
 tuntur, hoc est deprimuntur, astringuntur, longis relaxatis, la-
 tis in se coeūtibus, Græce est εἰ μὲν σφυγμὸς κύκωσις ἔστιν καὶ
 διάσκαξις ἀρτηριῶν κατὰ διαστολὴν καὶ συστολὴν γιγνομένη. Hoc
 est: Pulsus sane motus est cordis, & arteriarum qui fit secun-
 dum diastolen & systolen.

Fuliginosa.] Quæ ex functione obita collecta sunt. Nam
 hæc teste Galeno, non aliter calorem natium, quàm flammā
 ignis extinguunt.

Primo pulsuum genus.] Hoc ad uerbum ex Galeni libel-
 lo ad candidatos medicinæ sumptum est. Habetur enim: Ex
 iis quæ propria morus sunt, celeritas existit & tarditas: alius
 uigens

urgens motus, alius resolutus.

Quoniam enim.] Hunc syllogismum ex primo de differentiis pulsuum mutuatus est. Verba ita sonant: Quia uero & arteria tria interualla sortita est, sicut aliud quoduis corpus, lungum, latum, & profundum, necesse est omnino in singulis distantis quantitate diastoles, & sistoles metiri. Veri autem interuallum, *διάστασιν*, quod neoterici dimentionem interpretantur. Celsus libro tertio dixit: Si uenæ non æquis interuallis mouentur, arterias intelligere.

διάστασις
Interuallū

Humoris infusi.] Galenus libro de dignoscendis pulsibus quarto etiam ex infusione humoris differentiam pulsus constituit. Nā alias plus, alias minus in ea continetur, nunc crassior, nunc tenuior, nunc aquosa, nunc aerea humiditas.

Pleniorem.] Verba sunt Archigenis apud Galenum lib. quarto de dignoscendis pulsibus, admodum obscura, ut lectores facile iudicabunt. Cæterum plenus pulsus habet tria genera, ut summam dicam: Primum, quod ipsum corpus arteriæ, quo statu sit declarat: alterum quod qualitatem substantiæ quam continet: tertium natiui spiritus facultatem indicat.

Pulsus
plenior.

Quoniam uero caloris.] Hic locus ad uerbum ex lib. 1 de differentiis pulsuum desumptus est. Verba ita sonant: ὅτι κατὰ τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον, ἐνεργέτερον γινωριζομένης τῆς τῆ πυρετῆ θερμότητος οἷα τις ἐστίν, ἢ ἢ κατ' ἄλλοτι πόριον ἄπτοιο, πιθανόν εἶδεν εἶναι τισι καὶ τοῦτο γένος σφυγμῶν συναριθμῆσαι τοῖς ἄλλοις. Ex qua lectione uidetur addendum in Paulo *τινὲς*, ut sit *ἡξισαὶ τινὲς καὶ τῆτο*, &c qđ pterunt Aristarchi.

Corrigitur
exemplar.

Nam cum arteria.] Galenus primo differentiis pulsuum in hunc nio dum habes: τῆς ἀρτηρίας σώματος ὅσης κόλου, καὶ μακροῦ καὶ περιφεροῦς, κινεμένης τε διὰ παντὸς διπλὴν κίνεσιν ἐξ ἐναντίων συνθετον μερίων· ἢ γὰρ εἰς ἐαυτὴν συνιζάνηται· ἢ διὰ τὴν ἀλλοτρίαν πανταχόσε, καὶ αὐτὰς τῆς διπλῆς κινήσεως ὁνομαζομένης σφυγμῷ, διττὰς ἀναγκαῖον αὐτῇ συμπέπτεν ἡριμίαις ἐφ' ἐκάτερα, &c. Hoc est, ut Græcæ linguæ ignari intelligant. Cum arteria corpus sit cauum longū, & teres, moueaturq; perpetuo duplici metu, ex contrariis composito partibus (uel enim in se undiquaq; subfidet, uel in omnem partem attollitur, qui motus duplex appellatur pulsus) necesse est, ut duplex ei quies in utroq; coincidat. Deinde pergit, atq; has duas quietes exercitata manus cognoscit, & ratio demō-

strat.

Corrigitur
codex græ-
cus.

strat. Pauli lectio uidetur corrigenda. Habet enim codex im-
pressus τῆς γὰρ ἀρτηρίας διπλὴν κινήσιν ἐξ ἐναν-
τίων συγκαταμένον κινήσεων. Quod est: Cum enim arteria du-
plici moueatur motu, contrariis composito motibus, pro ἐξ
ἐναντίων συγκαταμένων μορίων. Sic itaq; tu corrigito, Croseus
& Basiliensis corrector hoc sponte sua scilicet omiserunt.

Differentiæ rhythmi.] Ex primo de differentiis pulsuum
Galenī transcripta sunt. Quare qui omnia planius fusiūsq;ue
explicata desiderabit, ad eos se commentarios conferat.

Ac cum secundum magnitudinē inæqualitas, id quod ma-
turius, aut tardius assumpserit.] Hoc est, ut apertius in-terpre-
ter: quanquam sic habeant, ac cum inæqualitas ex magnitu-
dine sumpta, inæqualitatem quæ celeritatis, aut tarditatis ra-
tione constat, assumpserit. Sed malui esse obscurior, quàm non
fidelis Aristarchis nostris uideri.

Ac si id quod in situ est.] Eadem locutio. Idem intelligo.
ac si dicas: Si eam differentiam inæqualitatis sumpserit, quæ
ex situ arteriæ capitur.

Porro opportunum erit.] Sequentia Pauli dicta, ex Ga-
leni libris de causis pulsuum, & de prænotione miro artificio,
compendioq; sunt decerpta.

Magnus igitur pulsus.] Galenus primo περὶ πνεύματος
σφυγμῶν, in hanc sententiam ait de magno pulsus ἡτοι γὰρ
διὰ τὴν ἰσχύτητα τῶν σώματων, & διὰ τὴν τερεμνότητα τῆς κρα-
σεως, ἢ διὰ τὴν ἐπίκτικότητα κινήσιν. Hoc est: Vel enim sit ob
corporis (intellige arteriæ) gracilitatem, aut temperamentī
calorem, aut motum acquisitum.

Causæ ipsos naturales.] Paulo post Galenus habet: ἀλλ'
αὐτὰ μὲν ἐπίκτικοι κινήσεις, αὐτὰ καὶ καταστὰς, παραμένοντι δ'
ἔτι διὰ τὴν ἰσχύτητα, καὶ τὴν κράσιν, quod est: Verum mo-
tus ascititij statim subsidunt, qui autem ex gracilitate, & tem-
peramento proueniunt, adhuc perseverant.

Ut etiam manu admoda.] Galenus ὡς ἐν αἰσίοις τῶν σφυγ-
μῶν ἀφαιμένω, καὶ πεταβραχὺ διαλείποντι, καὶ πάλιν ἐφαφα-
μένω σαφέστατὰ διαγνώσκει τὴν μεταβολήν. Hoc est. Ut liceat
tibi pulsus tangenti, & deinde paululum intermittenti, rur-
susq; iterum attingenti, mutationem manifestissimā digno-
scere, &c. Habetur autē in codice græco Pauli bis πάντως, tu
igitur postremum expunge, quod neglexerūt nostri mastiges.

Qui sane

Textus
græcus
castiga-
tur.

[Qui sane ob balineas.] Hæc fere & sequētia lib. i. iā citato inuenies. Nisi qđ Gal: uerbis nōnihil immutatis eadē dicat.

Ex humorum putredine magnus, ad magnitudinem, adhuc submissionem magis citatam.] Galenus libro. 2. προγνώσεως σφυγμῶν hanc sententiam interpretatur in eum modum: ἐκ λώσι τῶν αἱμάτων τὸ μὲν τάχος τῆς συστολῆς αἰτιόλογον τι πλῆθος αἰθωλωδῶν περιττωμάτων ἀθροίζεσθαι τε αἵμα καὶ ἐκκρίνεσθαι. Et statim: καμπολὺ μὲν γὰρ ἀθροίζεται κατὰ τὰς σφίγας τῶν χυμῶν, &c. Hoc est: Indicabit igitur, celeritas quidem systoles, eximiam quandam fuliginosorum excrementorum copiā colligi simul, & excerni, &c. Permultum enim ex humorum putredinibus colligitur. Iam libro primo de causis ita habet: Cum refrigerantem causam attrahit corpus arteriarū distenditur: cum fuliginosum excernit, comprimitur. Superat autē aliās diastole, cum scilicet maior refrigerij usus est. Systole, cum plura recrementa expelli desiderant.

Causæ pos-
suum & eo-
rum diffe-
rentia,

Verum ad magnum pulsum.] Galenus primo de causis: Conuenit igitur tria causarum genera sibi mutuo opitulari, ut pulsus magnus aut celer fiat: nempe usum generationis ipso- rum urgentem, uirtutem robustam, arteriarum tunicas molles, aut non omnino duras.

Celeritas accedit.] Eodem libro: Copiosiore calore in corpore collecto, necesse est animal maiorem desiderare respirationē pulsusq; maiores. Qua autem ratione maiores, hac etiam uelociore & frequentiore. Vt enim sitientes nō solū multum, sed etiam cito, & frequenter potionem assument, ita qui refrigerantem substantiam requirunt, multam simul hanc, & celeriter & frequenter attrahunt. Quare proprii, sunt copię caloris pulsus magni, celeres, & frequentes non tamē necessarii frequentes, uerum si nullum ex prædictis impederit.

Non amplius id quod in.] Primo de causis Galenus. Fortassis uidebuntur pugnare ea quæ apparent tum inter se, tum una cum causis propositis. Conuenit enim, ut in caliditate primum sane magnitudo, mox celeritas, deinde frequentia erat, ita etiā in frigiditate primū sane oriri paruitatem: mox tarditatem: tertium raritatem. Quæ igitur solutio? Quoniam uirtute robusta, & si usus paulo minus fuerit, primam sane actionem, neq; exiguam, neque tardam necesse est fieri, secundam uero post longius tempus, si usus urget, ratio est absolui.

Dubij so-
lutio.

Sicue

Sicut enim cū urgebat stimulatq; & impellebat uirtutē ad actionem, ita cum non urget, diutius conuiescere permittit.

Sin autem tarditas paruitasq; accreuerint, ē contrario raritas in crebritudinem.] Quod fit cum non totum arteriæ spacium absoluit pulsus, sed medium duntaxat, unde sæpius repetere cogitur: alioqui in magno usu cum frequens est, totum spacium peragit, crebro id repetens. Si uerò maior frigiditas oborta, sit, eoq; usus abundē solutus fuerit, una quidem cum eo motus etiam celeritas ita soluetur. Minor autem erit & diastole si plurimum fuerit aucta frigiditas, rarissimos quidem, non tamen & tardissimos, & minimos pulsus fieri necesse est: sed tardiores semper, & minores sufficit. Quippe uirtute robusta absolute tardi, aut parui nunquam fient, etiam si usus admodum fuerit solutus.

Itaq; latitudo.] Latos omnino pulsus post criticas excrectiones fieri docet Galenus lib. 2. de pulsuum causis. Paulo post: Frequenter lati fiunt ob humiditatem, & præsertim cū ipsa corpora arteriarum irrigua fuerint, ut in hydrope, aliquando ob pondus, quod extrinsecus arteriis accidit. Id autem pōdus plerunq; cutis ipsius rigositas est.

Quemadmodum sublimitas.] Sublimis in ira & ante crises, scilicet cū natura ipsa quæ molestā, expellendis incumbit.

Longus.] Cum quo reliquarum duarū distantiarū quantitas existimatur, ob tenuitatem corporis, aut peculiare magnitudinem talis efficitur. Nam aliquando motus quatuor digitis occurrit arctus sane & gracilis adeo ut chordam tenuē repræsentet. Siue enim ueluti gracilis cuiusdam chordæ, siue ut pili occursum appareat, ex hoc ipso magna quædam tunica arteriarum durities apparet.

Non enim extrema.] Idem Galenus habet primo περι προγνώσεως σφυγμῶν, hisce uerbis: ἀσφυρία κατὰ μὲν τὴν ἀλβύθειαν ἐδέποτε ἐν ζῶντι σῶματι γίνεται. Hoc est: Pulsus defectio reuera quidem nunquam in corpore uiuo accidit.

Corpore emaciato.] Hanc sententiam & superiorem in libello de pulsibus quem ad candidatos inscripsit.

Vires dissoluuntur.] Vide libellum iam citatum, & prognosticum.

Durum pulsum.] Galenus lib. 3. de differentiis pulsum in caice: & 1. de dignotione: Durus inuiciens, & uehemens esse

esse possunt, sed non uehementissimus, & durissimus. Vide ēē primum de præsagijs pulsuum.

Reliqua pituitæ uiria] Alia quæ arteriarum tunicas humiditate multa, & præcipue pituitosa irrigant. Primo de causis ad calcem.

Rhythmus.] Vide secundum Galeni librum de præsagijs, & tertium de causis pulsuum.

Deficientes] Alii uocant intermittentes. Fit quando facultas grauatür humorū copia, & impeditur, quo minus momentum conuenienti tempore auspicetur: uel ob crassitudinem, uel copiam humorū ora arteriarū cordi uicinarū obstruentē.

Pulsus deficientes unde.

Coincidentes.] Fiunt hi teste Galeno ob frequentiam inæqualem: quod cor sæpe functionem minus ac usus exigit, obierit. Hoc autem ipsum rursus fit, uel grauato corde humorum copia, uel instrumentis obstructis, uel coactis: quæ & deficientium causa erat. Differunt autem inter se, quæ coincidentes uirtutem testentur repugnantem, & contendentem cum ijs quæ molestant. Deficientes, detrectantem id subire. Coincidentes sæpe crīsim intulerunt. Deficientes illis periculosiores. Vtriq; accidunt in febribus ardentibus,

Coincidentes pulsus.

Inclinantes.] Cum uirtus imbecillis erit, corpora autem arterias ambientia, emaciata & colliquata. Multæ sunt causæ. Inflammationes, scirrhī, abscessus, phymata cruda, omnis tumor præter naturam, durities squalida, frigiditas nimia. Galenus primo de causis.

Inclinantes.

Caprizans.] Fit cum uirtus quantum ad se pertinet, naturale robur seruat, sed à motu impeditur, uel propter copiam modicam uel obstructionem, uel instrumentorum cōpressionem. Vide secundum de causis pulsuum.

Caprizans.

Dicrotus] Hic & caprizans bis feriunt, sed dicrotus duritiam instrumentorum habet, & intemperiem.

Dicrotus.

Vndosus & uermiculans] Hi duo quantitate sola differunt, una species existunt. Sūt autem in diuersis particulis, sed uno in pulsu, causa est, imbecillitas uirtutis, aut copia humorum, aut mollicies instrumentorum extrema: cum robur uitale arteriam nequit attollere.

IN XIII. CAPVT.

Aluus optima.] Hoc caput partim ex prognosticorū secundum Galenum, partim ex primo de Crīsis libro Galeni sumptū est. Dixi

Aluus.

est. Dixi autem alius, pro deiectione, secutus Celsum, qui libro secundo eandem fere sententiam habet. At uenter ei qui à periculo tutus est, reddit modo mollia, figurata, eodem fere tempore, quo secunda ualitudine assuevit, modo conuenientia his quæ assumuntur. Cæterum qui causas omnium uolet intelligere, commentarium suprâ citatum lectitet.

Leuiter ruffa.] Sic interpretatus sum ἐπόπυξρον quasi dicas subruffa: hoc est, quam bilis ex iocinore leuiter tinxerit.

Conuenienter spissa.] Græce est ἀμὰ τῇ προσκρούσει συντακτός, quod est cum conuenienti spissitudine. Apud Galenū de Crisibus non est, quod satis in uerbo συντακτός, hoc est, cohærens intelligatur.

Non nimis foetida.] Hippocraticum esse dixit Galenus, quod Celsus aliquando interpretatus est, mali odoris, aliquando si magna foetidas odoris accessit.

Non exucata.] Hoc est: Ex qua humiditas chyli aquositasq; non sit per uenas mesaraicas iecori distributa. Ut fere idem, sit quod alius liquida aquosaq;. Cum. n. distributio parum absolute peragitur in uentre, excrementa liquida, tenuia & aquosa permanent, si Galeno & rationi credimus. Græca dictio est ἀχύμων, quam Leoniceus uir alioqui in Italia habitus maximus in re medica, uertit, humoris expers, quod quam sic ad rem, eruditi iudicent. Est autem ἀχύμων, id quod Galenus lib. 8. de cōpositione medicamentorum secundū locos, ἀνεχύμων dixit, in hac nimirum sententia ὅταν μὲν ἐν ἱλκην ἐκ τῆς κοιλίας τε καὶ τῶν ἐντέρων τὴν τροφὴν ἀπορῶσιν τὸ ἥπαρ ὑγρὰ, καὶ ἀνεχύματα ἐκκρίεται διὰ τῆς ἐδρας. Hoc est: Cum igitur iecur alimentum ex uentriculo & intestinis per debilitate nequiuertit attrahere, liquida, & non exucata per sedem excernuntur, &c. Ex hisce uerbis liquet nō debere accipi pro ἀχύλων, aut ἀχυλοποιηθέν, sicut nōnulli interpretantur. Nam deiectio liquida, & tenuis esse potest, etiam si uenter pro munere suo sit functus. Necesse autem est & circumpositas partes à uitio immunes esse, & distributionē probe in iecur fieri, ut alimentū concoctū esse, ex aluo iudicemus. Cæterum ἀχύμων vñ contrarium fere esse uerbo συντακτός. Nam hoc tam est substantia moderatum, ut undiq; cohæreat, simulq; existat molle. Illud contra tam liquidum ut undiquaq; diffusetur.

At, mere ruffa.] Iam ad tertium deiectionū genus descendit, quod

dit, quod non nihil ex recrementis à toto corpore in uētre
confluentibus: non ex ciborum confectiōe iudicare potest.

Viridis æruginosæ.] Aëruginosa in uentre gignitur & por
racea: aliæ bilis differentiæ in uenis procreantur teste Gale
no in commentario de atra bile.

Animantis particularum cōsumptionem.] Græce est σύν
την δυνάμει των τῆ ζωῆς πορίαν, quali dicas colliquationem ani
mantis particularum indicat: Intellige autem solidarū: quæ σύντηξις
absolute particulæ dicuntur.

IN XIII. CAPVT.

Vrina igitur.] Ex lib. 1. de Crisibus omnia mutuatus est
Paulus. Cæterum ubi de exacte aquosa agit, Galenus su
sius pleniusq; persequitur. Habet autem Paulus: τὸ δὲ ἐσχά
τως ἀπεπτονὸν περὶ τὸ ὑδατῶδες ἀκριβῆς, οἷον ἀπεινώμενης
πέψως σύμπταμα τῆ φλεβώδους γένους ὑπάρχον. Hoc ut inter
pretatus sum. Galenus autē τὸ τοίνυν ἐσχάτως ἀπεπτον ἐπέ
ἀπαντα ταῦτ' ἐστίν. ἐν δ' αὖν ὑδατῶδες ἀκριβῶς τὸ τοῖστον, Vrina cru
da.
ἂν ᾗ πεπτόμενον, ὡς τὸ θολερὸν ἔτε μέλλον, ὡς τὸ μετ' ἐλί
γον ἀνατολούμενον. ἀλλ' οἷον ἀπεινώσμενης τῆς πέψως σύμπτα
μα, τὸ τοῖστο τῆ φλεβώδους γένους ὑπάρχει πάθος, οἷον ἀκριβῆς
ἀπεψία γαστρὸς. Quod est: Itaque extreme cruda præter hæc
uniuersas existit. Talis autem erit exacte aquosa, ut quæ neo
modo coquat ut turbida, nec coquenda est, ut quæ paulo post
turbatur, uerum ut desperatæ concoctionis accidēs. Talis ue
noli generis affectus existit, qualis exacte uentris cruditas.

Hic uicina est] Recenset ordine erudarum differentias,
quas etiam Galenus breuiter hunc in modum cōmemorat:
χέριτον μὲν ἢ ὡς ἔρα διὰ ῥῥοια, μοχθηρὸν δ' ἰκανῶς καὶ τὸ λεπ
τὸν δ' οὕτως καὶ λευκόν, οἷον περὶ καὶ τὸ ὕδωρ. τοῦτω δ' ἐγγύς
ἐστίν ἔτερον οὖρον ἐν πολλαῖς τῶν νόσων φαινόμενον, ὡς οἶνον δια
κῆν ἰκανῶς λευκῶ καὶ λευπτῶ μμιγμένον ἔχειν ἰδῆαι. Quod Aduerte,
est: Deterrima quidem in urinas profluxio. Iam uerò praua
admodum est tenuis adeo & alba, qualis & aqua existit. Huic
aut uicina est alia urina, quæ in multis morbis apparet: & uini
albi admodum & tenuis mixtam habere speciem uideat, &c.
Paulus fere eadē habet, nisi quod οἶνον hoc est, uini, nullā men
tionem faciat. Tu igitur apud te cōsidera, num Galeni scriptu
rā malis, an intelligere ἐγγύς ἰκανῶς τῶ λεπτῶ καὶ λευκῶ, quā
est: Alteram urinam esse admodum propinquam tenui & al
bæ urinæ,

bx urinæ, quæ aquam repræsentare dicebatur. Orosius locū hunc nimia sua diligentia intactum præterit.

Castigatur
græca.

Tantum uero crassitie ipsam ab aquosa.] In græco codice est τὸ ὕδατος, hoc est, ab aqua: ubi legendum sit ὕδατος, id est, ab aquosa, nec hoc aduerterunt Aristarchi.

IN XV. CAPUT.

Sputa.

SPutum subflauum, subrusum. Ex eodē Galeni loco, & Orisbasij sexto libro collecta ista uidetur. Hippocrates in prognosticon secundo prius omnia est complexus.

Etenim præter sanguinem.] Hæc periodus libro secundo prognosticon, a Galeno sic scripta est: πλὴν γὰρ τῷ αἵματι, ὅστις ἀνὰ κρατὸς ἢ μοχλοῦ ἐν δόκηται διάθεσιν, ἐπὶ θερμότητι φλογώδεις τὴν γενέσιν ἔκων, ὁ μὲν ξανθὸς, ἐξ ὀπταμένης αὐτῆς τῆς ὀρεώδους ὑγρότητος, ἢ ἐπιμυγνύμενης ὡχροῦς ἐφαίνεται, ἢ δὲ ἰώδους ἐξ ὑπεροπτήσεως ταύτης, ὁ δὲ μέλας, ἥτοι τῆς αὐτῆς ὑπεροπτηθείσης, ἢ περὶ δὴ κακίᾳ τε καὶ διαβρωτικωτάτῃ γίνεται μέλαινα χολή, ἢ τῷ παχέος αἵματος ὁμοίως ξηραθέντος, ἢ λυγρῇ νεκρώσεως τε καὶ ψύξεως. Hoc est: Nam præter sanguinē, quicumq; syncerus humor fuerit, prauam indicat affectionem, ex flamma caliditate trahens originem. Flauus sane, serosa ipsa humiditate retorrída, qua admixta, pallidus apparebat. Eruiginosus autem, hæc nimium adusta. Nigar, uel eadē supra modum adusta, quæ efficitur atra bilis & pessima, & maxime erodens, uel crassio sanguine similiter reficcato, uel ratione tum mortificationis, tum perfriktionis.

Cruenta igitur.] Galenus loco iam citato in istū modum habet: τὰ μὲν γὰρ αἱματώδη καὶ φλεγματώδη, μέτρια, τὰ τῆς ξαιτῆς ἢ μελαίνης χολῆς, χαλεπα. διαβρωτικά μὲν γὰρ ἐστὶν ἀμφω τῶν σωμάτων, καὶ τὰ τ' αὐτοῖς κινεῖν. Hoc est: Etenim cruenta, & pituitosa moderata: Flauæ autem, aut nigræ bili sputa difficilia. Quippe ambo corpora credunt, atq; hoc ipsis est commune. Paulus non habet φλεγματώδη.

Nam si prompte excreentur.] Hoc est ex Hippocrate: ἐπεὶ γὰρ εὐπετέως ἀναπτύσσεται. Galenus interpretatur dictionem εὐπετέως, quod nos uertimus prompte, hoc pacto. τὸ δὲ εὐπετέως ἀντὶ τῆς ῥαδίως τε καὶ ἐτόμως οἱ Ἕλληνες λέγουσι. Rursus: εὐτετης γὰρ αἰαγογὴ πτύελοι, τὴν ἐπὶ ἐτόμῃ τε καὶ ῥαδίᾳ γίνεται μετ' ὀδύνης ἰσχυρᾶς ὕψους κατὰ τὸν θώρακα.

Castigatur
codex græc.

Valde crassum.] Græcus codex habet ὑπέπεχον, quod est subcrassum

subcrassum, pro ὑπέρπαχυ, hoc est, supra modum crassum, ex pituita nimium assata nimirum. Præterijt Gemusæus.

At si expuatur quidē.] Codex græcus deprauatus est, habet enim εἰ δὲ μὴ πύοιτο μέλαν, ἀλλὰ, pro εἰ δὲ μὴ πύοιτο μὲν, ἀλλὰ, &c.

Emendatur græca.

IN XVI. CAPVT.

Diarias febres.] Hoc principium sumptum est ex primo Galeni libro ad Glyconem circa principium. Dicuntur autem ἐφ' ἡμέρας græcis, quasi dicas ad diem durantes: ἀμφ' ἡμέρας autem, circa singulos dies infestantes, quotidianæ uno uerbo latinis appellantur.

Diaria.

Opportuni sunt.] Ista cum sequentibus ex octauo Metho di Therapeutices huc translata sunt. Paulus ἐφ' ὧν αἱ ἀπόρ' ῥοιαι τῆ σῶματος εἰσιν ἐκ αὐτῶνδεις, ἀλλὰ δριμύτη καὶ οἷον καπνῶδεις ἐχουσιν, &c. Galenus autē habet: ἐν οἷς ἐστὶ τὸ διαπνεύμενον ἐκ αὐτῶνδεις, οἷον περὶ ἐν τοῖς ἐνυχίοις ἀλλὰ διακνῶδεις, καὶ δρομύ, καὶ καπνῶ παρὰ πλῆσιν ἢ λινύ, &c.

Lauare quidem non subinde.] Paulus græce habet λούειν μὲν μὴ πολλάκις, hoc est ut uertit. Galenus autē οὔτε τρίψεων, ἔτε λουτρῶν δέονται πολλῶν, quod est: Neq; frictionibus, neque balneis multis indigent.

Conferuntur loci.

Vehementer refrigerata.] Græcus codex deprauatus est. Habet enim ψυχρὸν τὰ δὲ αὐτὰ σφοδρῶν καταχρῆν, &c. Vbi sit legendum ψύχοντα δὲ αὐτὰ σφοδρῶς, ut nos etiam uertimus.

Græca uiciata.

Victus dulcibus.] Hoc est bonis. Nam bonus in corpore succus, aut sanguis, dulcis & est, & dicitur: malus autem, amarum, acidum, aliamuē qualitatem extraneam habere ostenditur. Perperam igitur nos corripuit Orosius, quod dulcis succi γλυκύχυμος uerterim: cum idem sit dulcis & bonus in probi sanguinis significatur. Male habet græcus codex γλυμύχυμος. Vide Galeni octauum circa principium.

Codex græcus uiciatus.

Aliquos horum nutrire] Codex græcus est deprauatus habet, τέτων τινὰ τρέφειν, pro τέτων τινὰς τρέφειν. Vide octauum Galeni de morbis curandis. corrigenda sunt omnia exēplaria impressa.

Sed ulceri quod.] Plénius in Galeno hæc sententia habetur in hunc modum: ἀλλὰ πᾶς τ' ἔλκεος ἐφ' ᾧ περὶ αὐτὸ βυβῶν αὐτοῖς ἐστὶν γεγεννημένος, αὐτῷ τε τῷ βυβῶνος προνοοῦσθαι μένοι λύνται κατὰ τὴν παρακμὴν τῷ γενομένου παροξυσμῷ. Hoc

Græca emendantur.

est: Sed ulceri ob quod Bubo ipsis fuerit excitatus, ipsiq; buboni prospicientes in accessionis declinatione lauant.

Cæterum à uino.] Hæc clausula ad uerbum ex primo ad Glauconem sumpta est. Vbi etiam dictio πρὶν accipitur pro μεχρὶς οὐ, hoc est donec: aut sic dicendum: Cæterum priusquam inflammationes fuerint solutæ, arcendi à uino sunt ægroti. Atq; hoc pacto seruabit dictio communem significatum.

IN XVII. CAPVT.

Græca corrigenda.

Nota.

Putridæ febres.] Hoc caput ex primo Galeni de febribus libro totum transcriptum est: sed uarijs ex locis. Textus autem in græco Pauli codice deprauatus est. Habet enim τῶν ἐπὶ σήφει πυρετῶν διάγνωσις, τῷ μὴδὲν τῶν προκαταρκτικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, καὶ τὸ μὴ ἀπὸ εἰγυς δι' ἄρξασθαι τὸν πυρετὸν. Hoc est: Febrium ex putredine contractarum dignotio est, quod nulla causa primitiua præcesserit, & quod non à rigore febris inceperit, &c. Quæ sententia plane falsa est. Nā proprium plane febrium putridarum est à rigore inchoare. Orosius & castigator Basiliensis, clarissimi & medici, & philosophi, ut ipsi audire uolunt, hæc opinor tanquam parua neglexerunt. Tu, autem quisquis ueritatem amas in hunc modum corrigo: τῶν ἐπὶ σήφει πυρετῶν διάγνωσις τὸ μὴδὲν προκαταρκτικῶν αἰτίων προηγήσασθαι, τὸ δὲ ἀπὸ εἰγυς ἀρξασθαι τὸν πυρετὸν, ἢ τ' ἐγκύσιως, &c.

Corrige græca.

Hoc enim singulariter.] In codice græco superfluum est τὸ, post μέγιστον adde δὲ particulam, quia noua incipit oratio.

Similiter ad ipsas.] Græce est ἰδίον ἐστὶ μάλα τῶν τοιούτων πυρετῶν. Galenus habet: ἰδίον δὲ ἐστὶ ἐν τοῖς μάλα. Si uoles, ita legito.

IN XVIII. CAPVT.

Si uires sint ualidæ.] Ex Galeni undecimo Methodi sumpta sunt ad uerbum. In nono libro circa principium, ait in eundem fere modum: Nani si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre uenæ sectionem iubebit, quantum satisfacere. tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant, uidebitur.

Putrida per uenas.] Et hæc ex undecimo, sed paulo ante, mutuatus est Paulus. Oportet enim id, quod putruit, omni ratione uacuare, quod reliquum est, moderatis motibus, & refrigerante perspiratu, ad exactam symmetriam reducere, &c.

Si uero

Si uero febris magnitudo.] Galenus addit ad planiorem intellectum, ut in continuis. Hæ enim magis hominem affligunt, quàm intermittentes.

Vires inualidæ.] Græcus codex Pauli habet καὶ τῶν δυνάμεων ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires ualidæ, cum sit legendum καὶ τῶν δυνάμεων ἢ ἰσχυρῶν. Hoc est: Et vires non ualidæ. Præterijt hoc Gemusæus.

Textus
græcus
uiciatus.

IN XIX. CAPVT.

Tertiana febris cum sit.] Ex secundo libro de crisi- bus, capite tertio hoc transcriptum est iisdem plane uerbis. Cæterum Galenus post illa, in hanc quoq; sententi- am habet: τὴν ἢν ἀκριβῆς τριταίων ἢ ἐνδέχεται μὴ ἔμετὰ ῥίγους σφοδρῶς γινέσθαι. Quam orationem Leonicensus uertit. Tertianam itaque febrem fieri contingit sine rigore uehementi, &c. Cum sit dicendum: Exactam itaq; tertianam non licet nisi cum rigore uehementi fieri.

Leonicens
error.

IN XX. CAPVT.

Exquisitam tertianam.] Ex primo ad Glauconē hæc Paulus transcripsit. Nonnihil autem à Galeno uariat, breuitate sermonis intelligo, quæ tamen sensum nonnihil obscurum reddit. Verba ad Glauconem ita habent: προτρέπιν ἢν χορὸν τὸν μὲν εἰς τὴν γαστέρα συρρέοντα κενοῦνθαι δι' ἐμέτων. τὸν δὲ κάτω ἐπίοντα ὡσαύτως διὰ τῆς κάτω ἐκκρίσεως. Quod est: Humorem itaq; in uentriculum confluentem, per euomitiones euacuare oportet: inferius autem descendētem similiter per internam excretionem. Paulus autem in istum modum: καὶ τὸ μὲν εἰς γαστέρα συρρέει, κενοῦν δὲ ἐμέτων τε καὶ κάτω. Hoc est: Et quod sane in uentrem confluit, euacuare per uomitum, & inferna, &c. In Galeni uerbis γαστὴρ pro uentriculo: apud Paulum pro toto uentre positum esse existimandum, si concordēs alioqui intelligas.

Conferuntur
loci.

Vinis autem admodū uetustis.] Lectio in codice impresso plane mutila & deprauata est. Habet enim ἀπέχειν δὲ μέλιτος, καὶ νέπυος καὶ ταρίχης, καὶ τῶν φύσιν διεμῶν τὰντα μὲν ἐπὶ παλαιῶν. Ex Galeno & Oribasio legendum: ἀπέχειν δὲ μέλιτος τε καὶ νέπυος, καὶ ταρίχους, καὶ τῶν διεμῶν ἀπάτων, καὶ οἴνων δὲ τῶν φύσιν διεμῶν, καὶ παλαιῶν ἰκανῶς, &c. Atque sic nos reddidimus latina: In priore enim lectione nulla uel acrium, uel uini facta est mentio. Orosius & castigator

Basilienſis non aduerterunt.

IN XXI. CAPVT.

L Auare in tertianis ſpuriis.] Hæc quoque ex eodem loco ſunt huc translata. Dictio autem τὶ in græco exemplari deſideratur. Lege igitur : ἀλλὰ τὴν καὶ τοῦ τριημέρου. Quod ceu paruum Ariſtarchi noſtri contempſerunt.

IN XXII. CAPVT.

Quartana.] Ex primo etiam ad Glauconem & ſexto Oribasij hæc ſumpta ſunt. De rigore autem quartanæ febris, Galenus cum alibi, tum in libello de tremore & palpitatione inquit : τὸ δὲ τῶν τετρατάων οἱ περιχέοντες ἀχρεὶ καὶ τῶν ὀτῶν φασι δύναιεν, ὅταν ἢ σφοδρῶν. Hoc eſt: Rigorẽ quartanarum qui experti ſunt, etiam ad oſſa uſq; penetrare affirmant, cum uehemens fuerit.

Nec bilis uomitus.] Sed pituitæ intelligas, comitatur etiã lienis inflammatio, tumor, interim faſtidium, intenſa interim cupiditas.

Puſſus exiguus ac rarus.] In hac febris inæqualitas pulſuũ in uno ictu maniſeſtiſſima deprehenditur Multo enim uelocius principium motus finemq; inuenies quàm medium.

IN XXIII. CAPVT.

Quartana.] Ad uerbum omnia ex Galeni libro iam ſepius nominato, compendioſe tranſcripſit. Quãquam id antea fecerit Oribasius lib. 6.

Qui refrigerant corpus ſiccantq;.] In græco codice erat ὑγραίνοντων, hoc eſt, humectantium pro ξηραίνοντων, quod eſt, ſiccantium. Miror tam apertum uicium iudices noſtros adeo oculatos non deprehendiſſe.

Tum per dies aliquot.] Male eſt in exemplari græco δι' ἡμερῶν τριῶν. Quod eſt: Per dies tres, pro δι' ἡμερῶν τινῶν. Id eſt: Per dies: aliquot. Baſiliẽſis corrector hoc quoq; neglexit.

Quod ſuccum Cyrenæicum.] Galenus hoc medicamentum maxime etiam commendat libello de Tremore, ceu ad rigorem, quartanosq; circuitus, uſiſſimum.

IN XXIII. CAPVT.

Quotidiana.] Ex quinto capite ſecundi libri de criſibus excerpta ſunt. At Galenus libello de Typis, latius accidentia enumerat in hunc modum : ἀμφιμερὶν δὲ παρέπεται ὑγρότης ἔξω, καὶ φλεγματώδης ἐκκαταί, καὶ δειψός οὐκ ἐπιτε-

Caſtigatur
codex græ-
cus.

Reſtitutus
codex græ-
cus.

ἐπιτεταμένον, καὶ βαρυσμὸς τοῦ σώματος ὅλης, καὶ ὕπνος καρώ-
δες, καὶ καταφορικὸς καὶ σφυγμὸς μέγας, καὶ ἄραιος, καὶ χαῦνος
τὸ πρόσωπον ὑπὸ πέλιδνον, καὶ χαῦνον, καὶ πέπονῶδες, καὶ πολ-
λὴν ἐμφαῖνον τὴν τῆς ὕλης καχεξίαν, καὶ τροφὴν, &c. Hoc est,
ut ignari linguarum intelligant: Quotidianam uero comi-
tatur habitudinis humiditas, uomitus pituitosi, sitis nō inten-
sa, grauitas totius corporis, somnus soporosus, ueternosusq̃;
pulsus magnus, rarus, laxus, facies subliuida laxa, perponū mo-
do tumida, quæ magnam materiæ præuitatem, & mutatio-
nem repræsentet.

Aquosiora.] Gal. addit libro iam citato: καὶ φλεγματικώ-
τερα, quod est, pituitosiora, quæ ipsam febris cām ostendunt.

IN XXV. CAPVT.

Quotidianam curantes.] Ex primo ad Glauconē lib.
Galeni Paulus hæc descripsit.

Oxymelite.] Simplici intelligendū, ut quod omnes me-
tus arctos aperiat. ne crassus alibi humor, uel glutinosus ad-
hærescat. Conuenit aut cum ætatibus, tum naturis uniuersis.

Primis diebus.] Græce est κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας. Male Galeni lo-
cus castigatus.
autem in Galeno ad Glauconem μετὰ τὰς πρώτας ἡμέρας ha-
betur, quod etiam castigatur Basilienfis non mutauit.

Ventriculi.] Sic uerti γαστρός; quæ dictio nunc pro uentri-
culo, nunc pro toto uentre accipitur. Galenus libello de ty-
pis febrium ait: συνίσταται δὲ μάλιτα ἐπιτομάχῳ κακοπρα-
γῶντι. Quod est: Constituitur autem potissimum ob stoma-
chum male affectum. Propterea Paulus recte dixit uētriculi,
& oris ipsius rationem esse habendam; quanquā accidat in-
terim, ut in hac febre etiam lien scyrrhū contrahat.

Idq̃; tam diu, quā.] Græce est: κατὰ πολὺ ἕως οὗ παύσῃ.
Hoc paulo secus sonat, quā reddiderim. Galenus nō habet:
Eoq̃; multi, à quodam alio quā Paulo fuisse adiectū proutant.

IN XXVI. CAPVT.

Si uitrea pituita.] Ex Oribasij sexto sumptum est. Vitrea
autem pituita à Galeno lib. 2. de febrium differentiis expli-
catur, in hunc modum: ὑαλώδη δὲ μοι δοκεῖ προσαγορεύειν ὁ
παραγώγας τὸν χυμὸν τοῖσιν, οἱ νεώτεροι δὲ ὧν ἐστὶ καὶ φίλιπ-
πος ὁ μὲν ἀπλῶς. Item in commentario de Tremore in hanc
sententiam: ὅτι μῖον δ' ἐπὶ τῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς εἶγος
ἄλλα καὶ ἐπὶ τῷ ψυχρῷ φλέγματι φιλεῖ γίνεσθαι καλεῖ δὲ ὑα-

λῶδὴ τὸν χυμὸν τῦτον ὁ πρᾶξαγός, &c Hoc est: Non solū autem ob flauam, aut nigram bilem rigor, sed etiam ob frigidam ualde pituitam fieri solet, uocat autem humiorem hunc Praxagoras, uitreum. Subiungit autem: Verum hic rigor nō adeo uehemens est: quanquam pluribus nonnunquam diebus subsequētibz perseveret.

IN XXVII. CAPVT.

συνεχῆς.
συνόχης.

Continentes.] Ex sexto capite libri secundi de Crisibz excerpta sunt. Interpretatus autem sum hic febres continentes, quas Græci συνεχῆς appellant: continuas autē, quas συνόχης. In Latina quoq; lingua duas uoces usurpamus. Cæterum Galenus intelligit continentes, quarū materia in uasis subsistit: ubi enim ea per totum corpus delata fuerit, intermittentes appellatæ, sunt.

ὀξύτης.

Acumine.] Græce est ὀξύτης. Nam ut ὀξύς acutus morbus dicitur, ita deriuatiuum ipsius ὀξύτης, acumen, celeritas, aut præcipitantiæ, aut quocunq; modo libet appellare.

IN XXVIII. CAPVT.

Restituitur
codex.

Continuarum.] Vide nonum Methodi, & sextum Oribasij. Per cōtinuas autem hic intelligo συνάχους, qui ex sanguine potissimum constituuntur. Male in Græco codice legitur τῶν συνεχῶν pro συνοχῶν Neglexit hoc Gemusæus. Nā συνεχῆς uocabulum generale de omnibus febribz ex quocūque humore continue affligētibz. συνοχὴς autem de febre ex sanguine uel putrido, uel efferuescente usurpatur. Barbari hāc fœminino genere synocham nominarunt.

Emendan-
tur græca.

In uigesimo nono capite codex Græcus habet παχῆα προτραχῆα. Non enim crassa lingua, sed aspera, uel scabra dicendum est, hoc in loco, quod castigato Basiliensis in codice suo alioqui emendato non aduertit. Cæterum caput hoc & inferius ex sexto Oribasij descriptum est. Præcipit autem ardenti febre laborantes non solā aqua, sed mulsā aquosā nutriendos esse, Cuius rationem Galenus in commentario Hippocratis de morbis acutis. Aqua, scribens, natura frigida, tarde penetrat, & quā plurimo tempore in præcordiis subsistēs, in acutis morbis corrumpitur: mel bilefcit, ob id mulsā aquosa dari debet: ut aqua nulla in superiore uētre facta mora à melle mixto ad distributionem trahatur. Non autem aqua cruda, sed cocta esse debet.

Sustiner e

Sustinere.] Ita sum interpretatus διατᾶν; hoc est, nutrire, alere. Cellus ait, cremore ptisanæ sustentandi sunt. Atque hoc loco proprie dicendum est. Sustinere. Quia tantum cibi hic porrigitur, quantum viribus sustinendis sufficit.

IN XXXII. CAPVT.

DVplex hecticarum.] Galenus lib. 1. de febrium differentiis, Oribasius sexto eadem plane habent. Leonicens & Laurentianus parum recte in translatione Latina a se gerūt. Quid autem sibi uelit Orosius interpretando, ἡ καὶ μεῖστος ἐστὶ σιχνῆς, uel etiam si humiditatis aliquid cōtinuum permaneat, eruditi iudicent. Cum melius dixisset, uel etiam madore adhuc copioso, aut multo permanente. Nam σιχνὴ nō tantum συνεχῆς significat, si Hesichio credimus, sed etiam πολὺς. Præterea sensus hunc significatum requirebat. Cæterū Hectica dicitur, quod stabilis sit, ac solutu contumax, uel quod totum corporis habitum occupat.

Aduerte.

IN XXXIII. CAPVT.

Hectica febre.] Vide Galenum lib. 10. Methodi medēdi ubi paulo manifestius curationē hecticarū persequitur.

Moderato.] Græcus codex habet aduerbium; μεμετρημένως, quasi dicas mensuraliter. Nam Gal. 10. magnam curā habendam esse dicit mensuræ, frigidę febricitantibus exlubēde.

μεμετρη-
μένως.

IN XXXIII. CAPVT.

QVandoquidem tertiana.] Hæc Galenus in secūdo fere de febrium differentiis, Oribasius in sexto tradidit. Cæterum nomē claturæ rationem in libello de Typis interpretatur. Est autem semitertiana triplex: Parua, media, & magna. Parua uiginti quatuor horas absoluit. Media triginta sex. Magna quadrāginta octo, atq; continuæ proxima est. Porro ætati mediæ accidit, & tempore potius autumnī, cū etiam ualde periculosa est, non solum stomachum, sed etiam nervosam partem, & ut summatim dicam, media attingens.

IN XXXV. CAPVT.

PVblica grassantes.] Vide Oribasij sextum, Hippocrate in commentario περὶ ἐpidημιῶν, & de natura hominis.

Cæterū morbos publicæ grassantes uoco, quos Paulus πανδημίας & κοινῆς sua lingua appellat. Opportunū autē hic est explicare, quos nam Græci ἐπιδήμιαι, ἐπιδήμιαι, σποράδες, πανδημίας, nominent. Galenus itaq; cōmentario primo in primum

ἐπιδήμιαι
ἐπιδήμοι.
σποράδες
πάνδημοι

ἐπιδημῶν in hunc modum scriptum reliquit : μεμνησθαι χρὴ
 τῶν εἰς τὰ μέλλοντα λέγεσθαι γινώσκων, ὡς ἕνα μὲν τῶν νο-
 σημάτων κοινῇ πολλὰς καταλαμβάνει, δὲ λέγεται κοινά. Hoc
 est : Meminisse conuenit horum ad ea quæ post dicentur, sciē-
 dumq; nonnullos sanē morbos communiter multos corripere,
 qui sanē uocantur communes. Statim subdit : τῶν δὲ κοι-
 νῶν τὰ μὲν ἐνδημα εἰσι, τὰ δὲ ἐπίδημά τε καὶ ἐπιδημία. τῶν
 δὲ τὰ χαλεπώτατα λοιμώδη καλεῖται. Id est : Ex cōmunibus
 alii uernaculi sūnt, alii aliunde in populum ingruunt. Horum
 periculosissimi, pestilenciales appellantur. Item ἕνα δ' ἑκα-
 στον ἰδίᾳ τὰ σποράδην προσαγορεύμενα. Nonnulli singulos
 priuatim inuadentes diffusi, ac erratici nuncupantur. Paulo
 supra : δηλον ἐν ὧς ἕκ τῷ γένει τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων ὅσα
 κακοκέραια γίνεται, καὶ λοιμώδη καλεῖται, τὸ δὲ τῶν ἐπι-
 δημίων ἐκ τῶν παυδύμων τε καὶ παγκόσμων γένος ἐστὶν δ ταῖς
 σποράδεσιν νόσοις ἀντιδιαιρεῖται. Hoc est : Itaq; cōstat ex po-
 pularium morborum genere eos esse, qui malignissimi gene-
 rantur, & pestilenciales dicuntur Populares autem illorū ge-
 nere comprehendī, qui undiquaq; & communiter in omnes
 grassantur. Quod genus morbis priuatim, & inter se dissimi-
 libus opponitur Habes fere omnium appellationes explica-
 tas, quo autem dilucidior fiat interpretatio, pauca ex primo
 Hippocratis de uictus ratione in morbis acutis subiiciā. Ver-
 ba sunt Galeni in commentario primo : δηλοῖ δὲ διὰ τῷ λό-
 γῳ τέτλη, τὰ μὲν τινὰ πολλὰ γίνεσθαι νοσήματα καθ' ἕνα χρόνον,
 ἀπερ' ὅταν μὲν ὀλέθρια γένηται, λοιμὸν ὀνομάξουσιν, ὅταν δὲ
 ἐπιεικέτερα, ἐτέρα τινὶ προσήγορία δηλώσιν, ἐπίδημα καλεῖν-
 τες, ὥστε εἶναι τὸ μὲν ἐπίδημον νόσημα τὸ κατὰ χρόνον τινὰ
 πλεονάσαν ἐν τινὶ χωρίῳ, τὸ δὲ λοιμὸν ἐπίδημion ὀλέθριον.
 ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλο γένος νοσημάτων κοινὸν πολλοῖς ὑπερεστὶ τὸ
 κατὰ χώραν ἐπιγινόμενον, τὰ ἐνδημα καλούμενα. τέτοις δὲ αὐ-
 τίκεινται πᾶσιν αἱ σποράδες νόσοι διαφερόντως ἐνοχλεῖσαι τῶς
 νοσούντας οὐ κατὰ τὸν κοινὸν τρόπον συνιστάμεναι. Hoc est : In-
 dicat autem in hac oratione, multos sanē quosdam morbos
 uno tempore fieri, quos, cum perniciosi fuerint, pestilentiam
 nominant, cum mitiores, alia quadam appellatione signifi-
 cant populares, aut uulgares nuncupantes. Ut popularis qui-
 dem morbus sit, qui certo tempore in regione quadam domi-
 natur. Pestilentiam uero morbum popularem perniciosi mi-

Iam uero aliud quoq; morborum genus est, multis commune, quod ex loci natura superuenit, uernaculum appellatur. His autem omnibus opponuntur, priuati morbi, diuersa ratione ægrotos infestantes, non communi modo constituti, &c. Hactenus Galenus noster: cuius sententiam ita interpretor. Morbi qui undiquaq; populatim, nullo non tempore anni grassantur, nulliq; nec sexui, nec ætati, nec corporis statui par cunt, *πανδημίας*, & *παγκόσμιος* appellant Græci, ex aere infecto trahunt originem. Qui autem certo tempore in regione quadam publice dominantur, *ἐπιδημίας*, quasi dicas popularis, aut uulgares nuncupant, similiter ex aere, aquæ uiciatæ potu, stagnorum, paludumq; graui halitu procreantur. Qui autem perpetuo in regione quadā inrudescunt, *ἐνδημίας* Græci, patrios nostri & uernaculos nominant, simili fere ex causa oriuntur. Porro fit interdum, ut morbus regioni peculiaris, & generalis uno tempore simul inuadant, pro aeris, aliarumque circumstantiarum ratione. At morbi priuati cuiq;, inter se dissimiles, *σπράγδαίς* uocalit Hippocrates, ex uictus ratione trahunt originem.

Cibiq; igitur communes.] Non solum aer teste Galeno communes morbos efficit. Siquidem qui in Aeno dū fames grassaretur, leguminibus uescebantur, crurum impotētes euaserunt. Item qui Etuo genium dolore cruciabantur. Nouimus autem nonnullos, qui etiam triticum semiputridum fame coacti ederunt, in communem incidisse morbum ex causa communi. Et alibi exercitium totum praua usum aqua similiter in omnibus militibus noxam sensisse.

Afflictiones corporis.] Cum Hippocrates dicit alios morbos ex uictu procreari, intelligit etiam uitæ studia. Nempe exercitia, orium, uigilias, tristitiam, iram, perfrictionem, inso latum, balnea quoq; non suo tempore usurpata, morbos excitare, saltem ratione secundaria.

Hæc quidem non.] Græcus habet: *ταῦτα πένον*, quod sonat. Hæc quidem igitur. Verum mea sententia legendum uidetur *ταῦτα μένου*, negatur id quod tum autoritate Oribasii, tum ipsa ratione probate possum. In primis enim Oribasius sexto libro hanc lectionem confirmat; deinde in eodem capite statim Paulus dicit. Siquidem in alias causas nec omnes simul incidimus, neq; tot die inuoramus, aer autē quoniam

Cibi communes,

Castigan-
dus Græ-
cus.

Gemufus
natura ma-
ledicus.

quoniam omnibus circumfusus est, & inspiratu attrahitur, ut animalium quoque corpora afficiat, est necesse. Nō dico quod Galenus primo commētario in Hip Epidemia, unde ista partim sunt excerpta, in hunc modum habeat: τὰ δ' ἐκ τῶν ἐδεσμάτων καὶ πομάτων σπᾶντα ἐστὶ. Hoc est: Qui autem ex cibo, aut potu fiunt, rari sunt, &c. Gemufus noster uituperandi studio, damnat hanc meam lectionem, nullam adferēs uel autoritatē uel rationē. Quis amabo ignorat populares morbos continenter quidem ex aere procreari, aliunde autem rarius? Sed inquit Gemufus, ex euaporatione lacuum frequentius accidere: cui in hoc respondeo, nullum uel stagnum, uel paludem morbum communem generare, nisi τῷ βλάπτειν τὸν ἄερα, ut ait Galenus. Aer autem ipse uel calidior, uel frigidior, humidior uel sæpe nobis circundatur. Quare etiam is morbos potius, quàm Solæ paludum uaporationes, efficit. Quæ ut dixi, nunquam corpora humana afficiunt, nisi prius aerem ipsum corruperint. At rursus obijciat Gemufus Galeni sententiam commentario secundo in libellum de natura humana, uerba hæc sunt: πολλάκις μὲν γὰρ ἀναθυμιάσις τινὲς ἐξ ἐλῶν ἢ λιμνῶν, ἢ τελεμάτων, ἢ γῆς τοιαύτης αἰτίαι γίνονται τῶν τοιούτων νοσημάτων. Hoc dico Galenum uelle indicare non solum ex aere intemperato huiusmodi morbos procreari, quod Hippocrates uidetur innuere, sed etiam ex aere, euaporationibus paludum infecto. Nō tamen negat ex aere frequentius contrahi. Ad hæc omnia, ex oratione Pauli opinionem meam possum astuere. Nam cōferens ille aerem cum aliis omnibus supra nominatis causis, raro nos omnes simul in eas incidere pronunciat: non autem fieri posse, ut aeris usum effugiamus. Adde quod aeris tantum remedia enuumeret, ubi intemperies aliqua subesse uidetur, reliquarū causarum, non item. Vix ergo candide lector, quid faciat procliuus hominum quorundam, ad huiusmodi lectionem natura.

Præterea lignorum. Et Galenus hoc etiam confirmat libro de Theriaca ad Pisonem in eam sententiam: διόπερ ἔπαινω καὶ τὸν θαυμασιώτατον ἱπποκράτην ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκείνον τὸν ἐκ τῆς αἰθιοπίας εἰς τὰς ἑλλήνας φέροντα ἐκ ἄλλως ἐθεράπευσεν, ἀλλ' ἢ τρέψας τὸν ἄερα, καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μηκέτι τοιοῦτος ὢν ἀναπνέεται. κελύσας ἐν ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην ἐξάπτειν τὰς τὸ πῦρ, ἐκ ἀπλῆς τῆς ἀνάφωστος τῆς ὕλης ἔχον, ἀλλὰ τε φάνωγε καὶ

Notat

καὶ τῶν ἀνθρώπων τὰ ἐνὸς δέτατα, τὰ αὐτὰ συνεβούλευσεν εἶναι τῇ
 πυρὸς τὴν τροφήν, καὶ ἐπισπένδειν αὐτῷ τῶν μυρῶν λιπαρώτα-
 τα, καὶ ἡδύαν τὴν ὀσμὴν ἔχοντα ἵνα οὕτως καθαρὸν γενόμενον οἱ
 ἄνθρωποι ἀναπνέουσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τὸν ἄερα. Qd' olim
 sic Latine reddidimus : Quamobrē etiam Hippocratem illū,
 multis admirādum laudo, qui luem illam pestilentie ex Ac-
 thiopia Græcos inuadentem, non aliter curauerit, quā a-
 rem mutando, alterandoq; , ne talis amplius inspiraretur . Cū
 igitur ignem per totam Athenarum urbem incendi iussisset,
 nō simplicem lignorum materiam, uerum feta, floresq; sua-
 uissimos, fomitem ipsius esse consuluit, unguentaq; pinguiissi-
 ma, & odorifera ipsis superfundī, ut aerem purum hoc modo
 redditum homines in mali subsidium inspiraren t.

IN XXXVI. CAPVT.

Nares destillant.] Galenus in commentario Prorrhēci
 Hippocratis scriptum reliquit : ἀπασῶν δ' ὕδων τῶν ἀπὸ
 ξινὸς σάξων χαλεπῶν ὅταν παχῆα, καὶ μέλαινα ἀπόσταξις, τὰυ-
 τὰς ἀλεβριώτατας εὐρίσῃς. Id est : Cum autem omnes ē nare
 stillationes sint periculosa, cū crassa, & nigra fuerint, has per-
 niciosissimas reperies.

σάξης.

Venter colliquata.] ἡ γὰρ τὰς συντήξης habet græcus
 codex. Est aut̄ σύντηξις colliquatio, cōsumptioq; , nepe cū par-
 ticulis quotidie aliquid decedit, nec alimētū recipiūt. Plinius
 lib. 22. cap. 25. hac uoce utitur, Tali, inquit, sorbitionis ge-
 nere emendantur syntexes, hinc syntectici eodem autore di-
 cuntur. Licebit igitur interpretari hāc sn̄iam, uenter Tabida,
 & quæ ex ipsius substantia decesserunt, humore undiquaq; in
 ipsum confluente, emittit, partim uomitu, partim inferius.

Aloes partes duæ.] Hæc est descriptio pillularum cōmu-
 nium: quæ in Nicolao illo præposito uiciosa & deprauata
 habetur. Nam is ponit aloes uncias duas, croci & myrrhæ
 utriusq; unciam unā, in peste addendū consuluit, bolū arme-
 nū. Primū uetus scriptura croci nō meminit, deinde thymia-
 matis ammoniaci, non boli armeni unciam præcipit. Id genus
 permulta monstra in officinis nostris pertinaciter regnant.

Catapo-
tra,

Theriacen ex uipetis.] Hoc etiā Galenus lib. de Theriaca
 ad Pisonem confirmat in eum modum : τὸν αὐτὸν τρόπον νο-
 μίζω καὶ τὴν θηριακὴν, ὥσπερ τι καὶ αὐτὴν ὕσαι πῦρ καθαί-
 ρει, τὰς μὲν προπινοῦσας αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ καταστάσει, μὴδ'
 ἑλως

δλως εἶν ἀλίσκοθαι τῷ κακῷ. τῆς δὲ ἡδὴ φθάσαντας παθῶν
ἐξαῖθαι δύνασθαι, ἀλλήλῃ φαν, καὶ τρέψουσιν τὴν τῆ ἀναπνύ-
δεντος ἄερος ποιησίον, &c. Hoc est: Simili modo Theriacen ceu
ipsa quoq; ignis quidam purgatorius existat, præsumentes in
pestifero aeris statu, neutiquam malo corripi sinere nouimus.
Correptis autem mederi posse, aeris inspirati maliciam in al-
terando mutandoq;. In Galeni codice græco, qui Basileæ nu-
per impressus est perperā legitur ἀναπλάσθεντος ἄερος. Quasi
dicas: Aeris reformati, positum est pro ἀναπνύδεντος. Quod
est, inspirati. Nam qui correpti peste sunt, malum aerem at-
traxerunt respiratu, non reformatum aut resectum, aut quo-
modocunq; dicere libeat.

IN XXXVII. CAPVT.

Nota codi-
cum uarie-
tatem.

Nonnulli febricitare.] Galenus lib. 1. 2. omnia hæc ad uer-
bum habet. Variat autem nonnihil lectio græcorum co-
dicum. Galeni habet ἐν ὕγκει τε μέζονι τῆ κατὰ φύσιν ὅλον τὸ
σῶμα ἐπὶ καὶ ἡ χροιά τοῖς μέν, &c. Hoc est: Et totum corpus
uastiore mole quam pro naturæ modo cernitur, & color, &c.
Pauli τὸ σῶμα τῆς γαστρὸς, quod est, os uentriculi uastiore mo-
le cernitur. Mea sententia cū Galeno legendum esse censeo.

Corrige
græca.

Vt pote quos.] Apud Paulum impressum est οἱ δὲ καὶ χω-
ρὶς τέτων, pro ἄγε καὶ, &c. Sic etiam Galeni exēplaria om-
nia habent. Nam ratio datur cur missionem sanguinis, aut pur-
gationem non sustineant. Signat igitur hoc loco, si quidem, di-
ctio ἄγε. Præterit Orosius, castigator Basiliensis neglexit.

Sin autem robore mediocri.] Galenus, si autē pulsus me-
diocri robore sit, & magnitudine, paulum ad ægrotantem re-
fert, cuius tamen uites ex pulsū cognoscuntur.

Ergo si æstas.] Galeus non habet, καὶ θερμὸς, quod ego
interpretatus sum, calidi temperamenti. Non enim referri
potest ad θεῖος, ut Grammatista putat.

Balneum his aduersissimum.] Galenus addit, & aer am-
biens uel nimium calidus, uel frigidus.

IN XXXVIII. CAPVT.

Qui tenuium humorū.] Ex eodē loco Galeni, & sex-
to libro Oribasij transcripsit. Dicit autem paulatim
& continue alendos huiusmodi humoribus laborantes: præ-
terea fructus, quos ὀπωρὰς græci nominant, exhibendos. Su-
pra uerti poma, quod nihil refert. Nam fugaces seu horarios,
seu

seu tempestiuos *ἀγρευς* græci appellant. Hoc remedium olim Lutetiæ in quodā adolescente continua febris laborante sum expertus salutare. Nam quoties ille uel aluum deijcere, uel urinam reddere extra lectum uolebat, aut etiam quoties pedibus tantillum consistere, aut in sella, quousq; ei lectulus ster neretur sedere, in sincopen solebat incidere: ac uidentes hoc aliquot medici, de salute minus sperare cœperunt. Ego uidens iuuenem natura biliosum, tenuiq; sanguine præditum, cogitavi illi quoquo modo uirium dissipationem impedire, ac statim quum ē lecto in sedem esset collocatus, porrexī ei uiam recentem nondum exacte maturam: nam initio Augusti accidit morbus: qua assumpta, paulatim per dimidiam horam seruauī hominem extra lectum citra animi defectiōnem, quod feliciter successisse animaduertens, sequenti die idē facere decreui: exhibitaq; paulo maiore portione, ad unam usq; horam sine ullo incommodo, ut prius seruauī. Factumq; est tandem diebus infecutis, ut tuto iam extra lectum in cubiculo obambulet, daretq; occasionem reliqua auxilia exhibendi. Hoc te nolui celare lector.

Historia.

IN XXXIX. CAPVT.

Reliquæ occasiones.] Ex eodem Galeni loco sumpta hæc sunt ad uerbum. Enumerat autem Paulus syncopæ causas, dolorem uehementem siue ex intemperie, siue humoribus, siue utrisq; uel etiam ex continui diuortio ortum, uigilias nocte dieq; affligentes, nā somno mediocri uires recreantur, immodica inanitio, aut per uentrem, aut uomitu, aut sudoribus, aut urina, aut sanguinis profluuiū. Ac in iis qui aliena loquuntur, hoc est, qui mentē non constant, qui delirant, desipiuntq;. Nam *παρὰ πάλιν* uerbum signat *παρὰ φρονίσαι*, *ἀλλοφάσαι*, cerebro scilicet affecto, adeo ut functiones suas peculiares, nequeat edere. In ijs si motus quandoq; corporis fiat, uires collabi necesse est. Ad quas conseruandas, & ad syncopen uitandam, singulare est præsidium, temperamenti custodia. Ante omnia uero trium principiorum: mox reliquarum partium, quęcunq; illa in consortium affectus principia secum ex facili trahunt.

ἀλλοφάσαι.

IN XL. CAPVT.

ITaq; dolor.] Hęc magna ex parte Galenus in secūdo de locis affectis habet. Reliqua in 12. Methodi medendi.

Dolor

ναρκώδης.
ὀδύνη.

Dolor stupidus.] Græce est ἡ μὲν ναρκώδης ὀδύνη διὰ ψυχρὰν γίνεται διάθεσιν. Quod interpretatus sum ad uerbum in Paulo. Galenus libro iā citato ait. καὶ τὸν τὸ ναρκωδὲς ἀλγῆμα διάθεσιν ἐργάζεται ψυχρὰν τε, ἃ μὰ καὶ ὀδυνηρὰν, quod est. Itaq; stupidus dolor affectionem frigidam simul & dolorificam parit. Aduerte lector. Paulus hic dolorem ut affectū, Galenus causam interpretatur Verum sequētia in oratione Galeni eos conciliant. Nam stupor, inquit, frigiditas quædam est non exigua eoq; membris hac occupatis difficilem & motum, & sensum parit, atq; ita stupidus dolor, non indicat doloris speciem, uerūm dolorem simul & uel affectionem frigidam, uel difficultatē sensus, motusq; ab ea particulæ obortā. Cæterū nō solū in neruis, sed aliis omnibus partibus accidit.

πόνος
σφυγμώ-
δης.

Pulsatilis autem dolor.] Græce dicitur σφυγμώδης, & σφυγματώδης πόνος, quasi interpreteris, pulsorius, & pulsatilis labor, uel dolor: insignium inflammationum proprius, arteriarum quidem semper, primario affectu, aliorum uero corporum sensilium omnium, consortii lege. Cæterum uocem græcam πόνος Galenus sic exponit, ὁ γάρ τοι πόνος αἰσθησις ἐστὶν ἀνιαρὰ, καθάπερ ἡ ἡδονὴ προσκλήσις αἰσθησις. Hoc est: Si quidem dolor, sensus est molestus, sicut uoluptas est sensus iuuvis, quod Cicero elegāter dixit. Omne id quo gaudemus, uoluptas est, quo offendimur, dolor.

Colicus
dolor.

Sin autem tanquam à palo.] Colicorum dolor est, qui in imo uentris ea potissimum parte urget, qua urinarii meatus ex renibus ad uesicam exporriguntur. Atq; hinc non ita ex facili discerni à nephritide potest.

Puncto-
rius.

Punctorius autem.] Galenus habet: ἀρξόμεθ' ἐν αὐτῇ ἀπὸ τῆς νευματώδους ὀνομαζομένου, συνιπαμένης περὶ τῆς ὑμένας μά-
λισσα. ὅσον εἶχης τῇ πάθεις κατὰ τὸ νύττωσαι δοκῶν ἐρησιμένης, ἐκτενομένης δ' πλέον ἐπὶ ἐν κύκλῳ ἐπὶ τῷ τοῦ ὀδύνης. Hoc est, ut Copus noster uertit: Igitur iterū incipiamus à puncto-
rio uocato dolore, ac uidetur quidē ueluti ipsius affectus inter-
pungendū circa mēbranas potissimū. uerum dolor circa locū
punctū ad magnū spacium extēditur. Nos autem, pace illius
dictū sit, in hunc modum uertendum putamus. Incipiemus
itaq; rursus à punctorio dolore dicto, circa mēbranas potissi-
mum constituto, cuius affectus ueluti radix in eo quod pungi
uidetur defixa est, dolor autem lōgius orbicularim ad id ex-
tenditur,

tenditur, &c. In pleuritide hunc dolorem esse nemo ignorat: acri humore membranam costas succingentem pungentem.

Pertundens, uehementissimis.] Hic dolor græcis dicitur διατρων, quod idem est, ac si dicas διαρμῶν, id est, cū impetū perrumpens. Copus uertit turgidus dolor, qua ratione, ignoro. Certe in Cephalæa, caluaria ipsa perrumpi, pertundiue do-
lentibus uidetur. Id autem tunc accidit, quando ueluti à radi-
ce incipiens, ad uicina transit, ut ait Galenus.

Pertundēs

Membrana quidem.] In græco codice deest μὲν particu-
la. Legendum enim ὁ μὲν ἐπὶ τῷ δέσματι, ut respondeat se-
quenti, ὁ δὲ, quod omnes nostri. Aristarchi non aduerterūt.
Nec impressum exemplar à Gemusæo castigatum habet. Cæ-
terū mēbrana cuti subiecta quæ sit, audi. Cōtinetur ea cute &
corporibus subiectis p fibrarū tela modo subtiliū traductus: q̄
uenæ cutē nutriendes & nerui sensum cōmunicātes permeāt.

Viciatum
exemplar.

Diuellētes cruciatus.] Impressa omnia exemplaria ha-
bent διὸν διασπρωμένης pro διασπρωμένους: quāquam Orosius
hoc & castigator Basilienensis non annotarint.

Viciosus
codex.

Profundi sunt.] Hoc est in alto delitescētes, unde quibus-
dam ὁσόκοποι quasi ossium dolores appellantur.

Si igitur sanguinis sit copia.] Ex 12. Methodi medēdi Ga-
leni, & 6. Oribasii sequentia sunt transcripta.

Auxiliantes.] Miror cur Gemusæus hunc locum depraua-
tum reliquerit in suo codice, cū plane ad sensum nihil faciat
dictio προσλιπαροῦντες, lege igitur προσβοηθοῦντες ex Gale-
no, ut nos etiam antea uertimus.

Castigatur
græci codi-
cis lectio.

Irrorationibus.] Hoc est, asperisionibus. Nā καταπονῆν est
καταβλῆν, quod signat superfundere. Linacer uertit καταπο-
νήσεις καὶ πυρεσσεις, humidis & siccis fomentis. Quāquam

καταπο-
νῆν.

non parum diuersa nomina sint, uariasq; res significant. Nam
καταπονήσεις est asperio irroratioq; ut Celsi more loquar, ex

καταπο-
νήσεις.

oleo potissimum ad rem propositam idoneo facta, ueluti cū
multa pituita in ore uentriculi hæret, oleū in quo absinthiū
ebullierit, id superfundim⁹ πυρίσσις quæ & πυρίμα, & πυρία,
& δέσμαμα græcis dicitur. triplex est. Nēpe humida sicca, &
mixta, si Hippocrati & Galeno credemus. Humidū fomentū,
spongia mollis magna; ex aqua calida expressa, applicataq;
huius generis est aqua calida, aut oleū in utriculos, aut uala-
area, fictiliaq; aut in uesicā coniecta, parti; dolēti admota.

πυρίσσις.
πυρίμα.
πυρία.δέσμα-
μα.

Fomentum,

Siccum

Siccum fomentum est, milium, sal, harena in sacculos cōiecta, aut solum linthrum. Item lateres & titiones panniculis inuoluti, & sic circumdati. Pace cuiusdam docti uiri dixerim apud Celsum lib. 2. non esse uicium scripturæ in dictione, titiōnibus. Nam tertio eandem repetit, fomentisq; inquiring, protinus ualidioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Mixtum fomentum est, hordeum, eruumq; prius contusa, aceto & aqua macerata, uel etiam farina simili modo preparata, & in sacculis apposita. Ceterum humida fomenta conueniūt inflammationibus ex bilioso humore suscitatis. Sicca iis, quæ ex tenui & aquoso sanguine proueniunt. Mixta crassius, uiscosisq; humoribus incidendis, conficiendis, dissipandisq; expediunt.

δγκας.

Sin moles.] Quidam parum nersati in medicina uertūt dictionem δγκων in græco codice positam, tumorem, nullo plane sensu, quanquam id quoq; hac uoce significetur. Voco autem hoc in loco molem, corpus, quod ab externo supercecidit: quod uel durum, uel magnū, uel graue, uel simul ambo fuit. In fine capitis male legi in codice ipressō ξυρῶν ᾧ ξυρῶν.

IN XLI. CAPVT.

Quum per uentrem.] De hoc accidenti Oribasius lib. 6. eadem tradit Ceterum syntexin, seu ut latine dicā colliquationem corporis facies illa cadauerosa comitatur. Quod in marcore quem μαρὰ μὲν græci nominant, uidere est, aut etiam in hectica marasmode.

Castigatur
codex græ-
cus.

Ex fonte.] Huius loci castigationem Orosius exemplari suo debet, & Oribasio. Nam omnia exemplaria quæ mihi uidere contigit, habent, ἀπὸ γῆς pro ἀπὸ πηγῆς, quanquā aqua ex terra intelligi possit, aqua ex fonte. Hoc præterit, etiam Gemulæus.

IN XLII. CAPVT.

Nonnunquam palpebras aperire.] Hoc Galenus confirmat lib. 1. de febribus: οὐ μὲν inquiring, οὐδ' ἀνατέλλειν ἐπιπλέον οἷοίτε ἐπὶ τὰ βλέφαρα, παραπλησίως τοῖς νιτάζουσιν, ἀεὶ διακείμενοι, καὶ μέντοι μύουσιν ὡς τὰ πολλὰ, καβαπερ ἐπινώττοντες. ἐπὶ δ' οὐχ ὁ ὕπνος αὐτῶν τὸ πάθος, ἀλλ' ἐγγενόσεως ἀδυναμία. Hoc est: Nec uero palpebras diutius attollere possunt similiter nictantibus perpetuo affecti. Quinetiā plerunq; conuiuent oculis, ueluti dormitantes. At affectus ipsorum

ipſorum ſomnus non eſt,uerū uigilandi impotentia,&c. Hęc quidem de heſtica Galenus pronunciauit . nos autē de omni febris,in qua uigiliz urgeant.

Si cōiueant.] Male in græco codice *μῦσαι*, quod eſt uel Reſtituo
conniuere, legitur pro *μῖσαι*, quod etiam Oroſcius anno- exemplar,
tauit : Baſilienſis autem corrector neglexit .

Cibus quodāmodo ſit magis accuratus.] Ita reddi dictio-
nem græcam *περιεργότερα* . Nam uerbum *περιεργάν* in ho- *περιεργάν*
nam partem acceprum eſt, quod accurare . Id ſignat ex cura
& conſilio aliquid gerere Aliquando in malam partem ſumi-
tur, pro eo quod eſt *πράττειν τὰ περιττὰ* Galenus alibi *διαί-
τη ἀκριβῆ* in eodem ſignificatu protulit, hoc eſt uictu ac cura-
to, exquiſitoq; nō de tenui intelligēs, ſed ex delectu ſumpto.

Linctus ex papauetis.] Hanc compoſitionem etiam ho-
die officinæ uocant diacodyon. Dixit autem Paulus ex ſapa, *Diaco-
dyon.*
quia duplici modo fieri ſolet, ſcilicet ex ſapa, & ex melle Quæ
ſapam recipit ad ſomnum conciliandum utilis eſt. Quæ uero
mel, ad ſputi reiectionem .

In quibus autem caput.] Contrario ſupradictis modo af-
fectos recenſet. Nam illi ob tuſſim ex deſluxu capitis pulmo-
nes infeſtantem dormire non poſſunt, eoq; diacodyon ex ſa-
pa aſſumēt, quod tenues humores in craſſet. Hi autem quibus
caput deſluxionibus obnoxium non eſt, ſufficu iuuabūtur. In
ſequenti ſententia pro *παράγματις*, legitur *παράκματις* . Item
pro *λί*, quod ſignat libram pone *γ*, quod notat drachmam .

Arnabo.] Recentiores quidam modo carnabum, modo
carnabadium, alii zarnabum, & zarnabadium . Odoramentiſ
experitur. Vide Paulum in ſeptimo . Sunt qui Doronicum in
officinis appellatum eſſe pronūcient . Non ſalicis folia, id eſſe
putes, ut quidam grammatiſta hæſitabundus exponit.

IN XLIII CAPVT.

Soporis noxi].] Ita ſum interpretatus dictionē *καταφορὰν*, *καταφο-
ρὰ*
ſquam ſi penitus introſpicias, & ex etymo interpretari li-
beat, impetus ſomni uehementioris merito dicetur, & inex-
pugnabilis pene dormiendi neceſſitas, ut Celſi more loquar.
Dixi autem, noxii, quia ſopor etiam bonus eſt.

Lactis modo tepenti.] Tantum ualeat *γαλακτέδιον*, quali di *γαλακτω
διον*
cas, lactoſa. Galenus multis in locis hac uoce utitur pro tepi-
do. Non autem pro eo, cui lac ſit admixtum .

Castigato
græcum
exemplar.

Si uero morbus.] In codice græco deest particula δὲ, ac legendum est ἐπιμενύσσης δὲ τῆς νοσῆ. Noua. n. sentētia incipit, quod miror Orosiū & Basiliensem correctorē uoluisse prætere, cū alibi ēt minora à me p̄termiſſa ceu capitalia clamitēt.

IN XLIIII. CAPVT.

Nonnullis etiam cum igneus sensus.] Hoc est, cum com-
buri uidentur nimio calore febris, pulicaris herba, quam
græci psyllium nominant, conducit.

Pernulceriq;.] Græce est διαφλαφκτέον, à διαφλαφκν,
quod Celsus latine dixit, corpus eius leuiter ex oleo ueteri
permulceatur, &c hic autem manibus tantum permulceri de-
bent, somni conciliandi gratia.

IN XLV. CAPVT.

EX absinthio.] Hoc est, ut Galenus ait, in quo absinthii co-
ma sit feruefacta. Siue aut oleum, siue unguentū, dicas, ni-
hil refert. Quamquam Orosius olea in quæ etiam aromata
coniecta sunt, unguenta dici nolit, contra ueterū sentētia.

Olei uox.

νάρδος.

Nardino.] In græco codice est νάρδον, quod signat nardo:
eadem nimirum locutione qua usus est Celsus, & Scribonius
Largus aliq; ueteres. Celsus lib. 3. ungi rosa debet, pro rosa-
ceo. Ut in compositione 210 apud Largum. Idem rosa dilu-
tum explet concaua uulnera, pro rosaceo dilutum.

Emendate
codicem
græcum.

Sin autem inflammatorum quiddam.] Codex græcus ha-
bet φλεγματώδες τὸ pro φλεγματώδες τι, quod omnes casti-
gatores Pauli, ceu momenti exigui neglexerunt.

IN XLVI. CAPVT.

Rigori.] Medici hodie dictione rigoris utuntur pro græca
ῥίγος quamquam non ita latine Celsus Hippocratis sen-
tentiam aliquando uertens pro ῥίγος horrorem reddit. Verū
nos φρίκην horrorem uocamus Inopia itaq; linguæ, ῥίγος fe-
brium, quasi ad uerbum, rigorem interpretamur.

ἀγών.

Concertationē naturæ.] In græco codice est: οὐδ' ἐκλύεν
τῶν ἀγῶνα. Quod Paulus ἀγῶνα dixit, ego concertationē na-
turæ exposui. Nam in crisi natura certat cū morbo. Si eo sit su-
perior, bona crisis est: si morbus uicerit, mala. Quamobrē si
natura se accingit ad ea quæ offendunt, expellēda, ut in rigo-
re accidit, moliendū nihil est. Dixi igitur cōcertationē natu-
ræ dissoluere, uel certamē uel pugnā quā cū morbo habet. Na-
turæ quidē in græco non est, sed sn̄z claritatis gratia addidi.

IN XLVII. CAPVT.

A Diutareq; calfactu] Recenset hic Paulus, quibus modis sudor per crism erumpens, etiam adiuuari debeat, nempe foru mediocri, quiete calido clystere, adeoq; in quiete manere xgros uult, ut sudorem non abstergant.

Recreare.] Græce est ἀναψύχειν, quod uerbum duo significat, refrigerare, & recreare, seu reficere. Helychius grammaticus dicit idē esse quod ἐπιζειν, euentilare, & ἀναψύχειν interpretatur παρὰ θυμῶν, hoc est solatium Cōgruit magis id hoc in loco, nempe uires sudorū copia lassas, oppressasq; recreare.

Tenui uelamine.] περιβόλαιον λεπτόν in græco codice est. Celsus ait: Veste leui, madida, interpretatus sum ἐμβριβεγμένον ab ἐμβρίχω quod est irrigo, madefacio.

Ambæ siquidem.] Ad calcera & floces uini referuntur. In græco neutrum genus est. ἀμφω ἀνακαλύπμενα. ambo ad fouendum applicata, genuino corporis tempore siccantur: siccata meatus per quos sudores erumpunt, obstruuntur.

Qui per ualidam expressionem.] Græce est, κατ' ἐκδιψιν, quæ sit natura quasi necessitate quadam oppressa. In doloribus uehementissimis & anima sæpe deficit & sudores frigidi erumpunt. Hi dicuntur fieri per expressionem, ualidam addidi, significantiæ gratia: Quidam pro ἐκδιψιν, legunt ἑλλειψιν, quod est animi defectum, quod non male etiam hic quadrare potest. Eruditi iudicent.

IN XLVIII. CAPVT.

Hypoglottia.] Formulæ quædā medicamentorū sunt, quæ in tussi, thoracis arteriæq; uiciis assumuntur. Hodie bechicas officinæ, & penidias appellant. Fiunt autē potissimum ex radice dulci, tragacantho, terebinthina, zaccaro, aliisq; ad rē propositā cōgruis. Ceterū Galenus uocat ὑπογλωττισίδας.

Lana sulphure imbuta.] Græce est ἔριον τεθειομένον, ad uerbum sonat: Lana sulphutata. Oroscius corripienti studio potius quàm ueritatis, uertendum clamat, sulphure suffita. Quomodo autem lanæ suffiatur, nusquam me legisse fateor, homines suffiri sulphure in tussi lego Lanam autem ut pice, aut alio pingui, ita sulphure imbuti. Imbutas sic applicari. Nā suffitus parum in lana proficit.

Pingue] Græcus codex habet καὶ ἢ λιπὴς, pro ἢ λιπὸς, accipimus pro pinguitudine, aut oleo, aut quacunq; re pingui.

Permulceri.] Hoc est, molliter cōrectare, supra interpretatus sum διαφιλῶσθαι permulcere, ex Celsi more.

IN XLIX. CAPVT.

Sternutamenta.] Vide sextum Oribasii, quomodo autem fiant: Galenus tertio de symptomatū causis explicat. Hic autem Paulus remedia persequitur sternutationis, quæ in febribus molestā esse solet.

λάγων.
κενών.
Corrige
græcum,
codicem.
Castigato
codicem.

Illum intentio.] Græci λαγῶνα & κενῶνα eam partē esse uolunt, quæ latinis dicitur, Iliā. Quidam uero male ἐποχόν-δρια uertūt Iliā, in bonis autoribus parum uersari. In codice impresso est ἐντασις lege ἐντασις, Neglexerunt Aristarchi.

Summatim partium.] Hic Orosius debet exemplari suo. Nam omnia quæ mihi uidere contigit habent, τῶν ἀκρῶν μέρων, quod est, summorum, musculorum pro τῶν ἀκρῶν μερῶν.

Mollis cōrectatio.] Quod ante dixi permulcere, hoc molliter cōrectare interpretor. Nam idem esse puto. Græca uox est, διαφιλῶσις.

Spongiz ex mari uacuz.] Quidam in codice græco legūt προκυνῶν, quod est uacuz, καινοί, hoc est, recentes. Vtrunq; instituto conuenit: quam tu malis lectionem sequere.

IN L. CAPVT.

Vel attemperatos.] Cibi fastidium aliās ex humore pituitoso, aliās ex bilioso nasci solet. Si pituita in stomacho re dundat, uomitu educenda est, si bilis supernatat, deorsum euo canda. Vbi uero totum corpus purgare uoles aliter faciendum docet Hippocrates. Quod si in primo uenis crudi humores semicostiq; habeantur, dissecādi, cōcoquēdiq; quod Hippocra tes πεπασμὸν, quasi mutationē. Huius aut seculi medici perperam digestionē appellant. Si in extremis uenis & corporis habitu sint infixi, relaxandi ueniūt. At biliosi humores, & melancholici, q̄ ultra sanguinis terminū processerūt, caloris uiolentia expelli prorsus debēt; Si in stomacho nausea excitent per inferiora: si in toto corpore biliosi, quod ætate potissimū accipit, uomitu purgari debent: melancholicus aut infra sem per. Porro cum iam educūtur, necesse est eos infrenare, coercereq; ne transitu partes afficiant. Item meliores hoc agēdo in locum restituere. Quā rationē, seu potius, ut Galenus ait, cacochymiz curationē græci ἐπίκρασιν nominant. Verba Ga leni & Methodi in hunc modū habēt: χρὴ γὰρ διλυνόντι κατὰ

πεπασ-
μός.
Nota.

ἐπίκρ-
σις.

τας

ταῖς τοιαύταις ἐναντιώσεως τῶν ἐνδόξων κατὰ βραχὺ μὲν ἐκκινῶν τὸ μοχθηρόν, κατὰ βραχὺ δ' αὖτ' αὐτῷ το χρηστὸν ἐντιθεῖναι καλεῖται δ' ἐπίκρασις ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ἡ τοιαύτη διεσπασμένη τῆς κακοχυμίας. Paulus igitur recte etiā dixit: ἥτοι ἀποβλέψαντα ἐκρίνουν, ἢ ἐπικεράσασα, βέλτερος ἐργάζεται. Quod est: Vel abstergēdo excernūt, uel attēperando, coercēdo, mitigando furorē illorū, obtundendōq; meliores in locum restituent. Hippocrates libro de ratione uictus in morbis acutis materiā eorū quæ attēperare possunt, cōmemorat. Galenus autē eius interpretēs paulo apertius in hunc modū disserit: de torminibus orationē instituens: σκοπὸς δὲ ἐστὶν αὐτοῖς, τὸ μέντοι καθάραι τῆς κακοχυμίας, τὸ δ' ἐπικεράσαι, τὸ δ' ἐπιξηράναι, τὸ δ' ἐμψύσαι. τὸ μὲν ὅν γάλα τὸ ὄνησιν, καθαίρειν δύναται, καὶ ἐπικεραίνει, τὸ δὲ τῷ λίνῳ σπέρμα ξηραίνοντε καὶ φύχην, τὰ δ' ἐκ τῶν πυρῶν ἄλφιστα, τὸ ἐπικερατικὸν ἔχει καλῶς δ' αὐτοῖς ἀναμείκται, καὶ τα κρίνειν, ξηραίνοντα τε καὶ φύχοντα. οἱ δὲ Ἀἰγύπτιοι κύαμοι μετρίως ψύξει δύνανται. τὰ δὲ ὡα καὶ ἡ σεμίδαλις, καὶ ὁ χύνδρος παχύχυμα καὶ ἔυχυμα, καὶ ἐπικερατικά. Hoc est: Eo ipsi spectāt, ut uiciosum humorem partim purgent, partim attēperent, partim desiccant, partim refrigerent. Lac itaq; asininum purgare potest, & attēperare. Lini uero semē siccare, & refrigerare. Trutacea polēta, attēperandi facultatē obtinet. Recte ipsis & ordeacea admixta est, quæ & siccatur, & refrigerat. Aegyptiæ autē fabæ, modiciter refrigerare potest. Oua similago, & chondrus crassi boniq; succi, & attēperatoria existunt, &c. Vides igitur, quō Galēnus utatur dictionibus ἐπικεράσαι, & ἐπικτεραίνειν. Item ἐπικτερατικόν, & ἐπικρατικά. Galenus 12. Methodi de uinis fuluis agens scribit ἐπικτερατικοὶ δ' εἰσὶ καὶ διεσπαστοί, quod postea interpretatur τρέφουσιν δὲ μάλλον, καὶ κακοχυμίας ἐπαυροῦνται. Hoc est: Nutriunt magis, & prauitatem humoris corrigunt, emendantq;. Linacer superiorē sententiā nescio quo modo exponit, certe dictionis uim ignorasse uidetur. Nā quid sibi uult, præterea inutabilia sunt, & nutriētia? Dicere. n. oportebat, attēperatoria aut sunt (intellige malorū humorū, bonos in locū reponēdo, & qui nondū longius terminos cōcoctionis excessērūt, reducēdo, uerimoniā ipsorū obtundēdo.) Ne aut putes bilē absolutā, aut flavā, aut nigrā meliorē reddi posse: imo. nec salām πικρὰ, εὐq; nemo doctus medicus hos

Aduerte.

humores alterandos, cōcoquendosq; uel ut barbari dicunt, digerendos dixerit Sed purgādos potius, meatibus per quos trāsibūt, adaperitis, medicamētis in id efficacibus. Ne aut acrimonia sua & rosione infestēt, ut in torminibus docuit Hipp. cibi & potus ἐπιτεραιτικοὶ assumūtur, quibus potes etiā syropos quosdā mitigatorios annumerare. Ceterū male in codicibus græcis πορρήψαντα, qđ est, proiciētes, pro ἀπορρήψαντα, qđ signat abstergētes Præterierūt id Oroscius, & Gemus & alii.

Castigato
exemplar
græcum.
Restitue
exēplar.
Emendato
græca.

Potissima uero polēta] Codices græci oēs male cōgruā habent lectionē hāc, περατέον ὄνακτα δαιτὴν ὄρειν, μάλιτα δὲ ἀλφίτων, πάλιστα δὲ ἀλφίτων, αὐτ μάλιτα δὲ διαλφίτων.

Non tamen ab iis multum] Hic quoq; deprauatus est codex græcus. Habet. n. μὴ πόρρω μὲν τοι τοῖς πυρετῶν χρεῖς, pro μὴ πόρρω μὲν τοι τῆς τῶν πυρετῶν χρεῖας.

IN LI. CAPVT.

SI uero in grandem famem.] Apud græcos una dictio grandem famem signat composita ex βῆς & λιμός. Quicquid enim grande illi nolunt significare in una dictione per ἵππος, & βῆς, quod est apud nos si uerbum ex uerbo interpreteris, equus & bos, explicanti, ut ἵππος ἐλινεν, βῆλιμος, &c. Ceterum eadem fere habes remedia bulimi apud Gal. lib. 8. de compositione medicamentorum secundum locos. In sequētibz uertit ὀξύτης pro szuitia furore, ad uerbū sonat acumine.

IN LII. CAPVT.

QVONIAM igitur à pituita.] Galenus de symptomatum causis lib. 1. scriptum habet. Canina appetentia fit, cū uel ob acidi humoris uicium uētricus infestatur, uel ubi totum corpus immodice digestum dissipaturq; , continua nutritione indiget, &c. Ceterum in Aphorismorū libri secūdi commentario, cap. 2. o. curationē hanc ad uerbū persequitur,

Auerte,

Incidant, abstergeantq;] Superius & hic male in codice Græco ἔιπτουσιν, pro ἔϋπτουσιν habetur, unius literæ mutatione : quod ceu nullius momenti castigatores Pauli neglexerunt, Quamquam ad sensus puritatem non parum faciat. Quippe diuersa sunt, proiicere, & abstergere.

Pinguia.] Galenus addit, καὶ ὡς ἀν ἐπικτης, ἐλαιώδη τῶν ἐδοσμάτων, hoc est, & ut ita dicam oleosa esculenta.

IN LIII. CAPVT.

PARTICULARUM per quas] Hæ sunt, stomachus, os uentriculi,

culi, ipse uenter. Galenus commentario quarto in opus de ratione uictus in morbis acutis, partes commemorat, quæ aliquando sitim procudere soleant. Idem in hunc modum: πίντων μὲν πρῶτον καὶ μέλιτα τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ἐφεξῆς δὲ ἡ γαστήρ, καὶ μετὰ ταύτην ὁ στόμαχος, εἴτα πνεύμων, εἴτα νῆπις.

Prauas autem portiones] Codex Græcus deprauatus est. Habet enim μοχθηρῶν δ' ἐπιθυμίαι προσηκόντων. Hoc est, prauas aut appetunt qualitates, pro πομάτων, quo edist, portiones. Orosius cum alijs Aristarchis negligenter hoc præterit.

Emendatus
codex.

Cæterum siti pressos] Hæc apud Gal. lib. 1. de symptomatū causis inuenies. Habet autem ille paulo ampliora in istū modum: ἀπαύταις δὲ δίψαι καταληφθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθνήσκουσιν οἶδα, τόντε καταφάγυντα τὴν ἐχίδνα (ὣν δ' ἄρα δίψας) καὶ τὴς ἐκ τοῦ οἴνου πίνοντας ἐκ περιττώσεως θνήσκουσιν, ἐν ᾧ τοιοῦτον τὸ δῆμιον ἐναποτεθῆκεν, καὶ τὸν ἐξ οἴνου παλαιῦ. μεθυθέντα, καὶ τὸν ἀποκαρτερεῖν ἀποθνήσκοντα, καὶ τὴς ἐν τῷ πλοῦθι ἐπιλιπόντος τῆς ὕδατος ὡς ὅσοι τῆς θαλάσσης ἐτόλμησαν, πίνοντες ἀμετρετέρως διψήσαντες τῶν ἄλλων, καὶ τινες μὲν αὐτῶν ὑπαχθόντες τὴν γαστέρα, καὶ διχθέντες σφοδρῶν ὀδύνην ἢ κατὰ τὴς λώπης ἀπέθανον, &c. Vide igitur an ex hac lectione, Pauli codicem in quibusdam uelis castigare. Ego sane saluo aliorū iudicio, legerē δίψαι δ' ἀπαύταις καταληφθέντες, ἐξ ὧν περ καὶ ἀποθνήσκουσιν οἶδα, τῶν φαγόντων ἐχίδνας διψήσας, καὶ τὴς οἴνου παλαιῦ μεθυθέντας, καὶ τὴς ἐν τῷ, &c.

Rosaceo cum impetu salientis modo] Græce est μετὰ κρηκισμῷ γινόμενον, hoc est: Cum crunismo facta: à uerbo κρουνίζειν, quod est, cum impetu decidere Gal. lib. 8. Methodi utitur uerbo κατακρουνίζειν in hac sententia: εἰ δ' ὑγρὸν ἦν τὸ προσφερόμενον, ἐξ ὑψηλῆς τοῦ βάλλοντος, καὶ οἶον κατακρουνίζοντες id est: Sin autem id quod adfertur, liquidum fuerit, ex altiore loco decedentes, & in salientis modum fundentes. Ibidem usurpat d. ctionē κρουνός, ἐτι δὲ μάλλον εἰ κρηκνός ὕδατος φύχει κατακρούσασθαι τῷ ἀγγεῖον φύχει τὸ ὑγρὸν. Hoc est: Præterea magis humore refrigerat, si detiliens aqua frigida uas illidat, &c. Cæterum superfundimus aliquando liquores, ut in hoc symptomate, synecpiti sublata in altū manu, p. med. ocrē laxē hapsū,

κρουνίζειν

κρηκνός.

Iam dilutum.] Sic uocamus humorem in quo aliquid maderit, aut maceratum per horas aliquot sit. Recetiores medici infusionē appellānt, ut infusionē rheubarbari, agarici, cotoneo-

Dilutum.

ἀπόβρεγμα rum Græci ἀπόβρεγμα dicunt.
μα.

IM LIII. CAPVT

Melius autem facit myxion.] Myxion uel myxa, uel myxion fructus est pruno similis. Galenus sericon appellat forte hodie officinis dicitur sebesten.

Salem indicum.] Hic sal nimirum est saccharū quod nos candū appellamus, natura non arte, proueniens quanquā hodie Venetiis & alibi artificio naturam imitentur. Auicenna interpretatus hunc locum Pauli, saccharum tabarzet ponit.

IN LV. CAPVT.

Textus
græcus ui-
riatus.

Imbibito.] Similia apud Galenum lib 7. medēdi Methodi. Badem uero apud Oribasium sexto. Sed perperā hic in Co dice impresso legitur ἀναπέμπομενον, quod est sursum missō, pro ἀναπεπομένον quod ualet imbibito ab ἀναπίνομαι, inde ἀναπίνομαι. Sic habet Galenus loco supra citato, ἐνίστε in-
quiens, ὅς ἐστι αὐτὸς τῶν χιτῶνας, ὡς ἂν ἐποιτὶς ἀναπεπομένον
ἢ ἐμπεπλῆς μένον. Hoc est. Nonnunquam uero in ipsas tuni-
cas imbibitus, ut ita dicam, uel impactus.

IN LVIII. CAPVT.

Porro ubi concoctrix facultas.] Ex hac sententia opinio quorundam de remediis spinæ applicandis in uētriculi affe-
fectibus, satis refellitur, etsi euidentia ipsa quæ in confectioni-
bus apparet, quid in hac re faciendum sit, aperte doceat.

Vel manna uino macerata.] Non in dandi casu, legenda sententia est, sed nominandi. Corrige igitur codicem græcū
ita. καὶ μάλιν ἐν οἶνῳ φεραθεῖσα.

Agathium.] Pastillus est, qui retinendi suppressendiq; po-
testatem habet. Vide septimum.

IN LX. CAPVT.

Typhe.

Typhe.] Specie filigni nō dissimilis, simplici culmo, grano multipici, tunica uelato, atq; leuissimo, radi ce numero-
sa, largior eius in Asia prouētus regione, ut uult Galenus, quæ
super Pergamum sita est. Hanc agricolæ, quod triticum in op-
pida conuehi soleat, ad pan-ficium usurpant. Huiusmodi igitur
arista, hoc est, spicæ apice narium foramina pungere inter-
rim præcipit Paulus, ut irritatus sanguis largius profluat.


FINIS LIBRI SECVNDI

COMMENTARIO RVM.



COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER TERTIVS.



CAPVT I.



ERTIVS hic liber de omnibus totius corporis affectibus particulatim agit: & singula unicuique particulæ cōuenientia remedia cōplectitur, Primum autē cuiusq; morbi curandi Methodū artificiosā exponit, quæ ex causarū notitia, partis tēperamētō ægriq; naturā, & aliis indicationibus sumitur. Deinde sic ad ea ueniendum auxilia præcipit, quæ ipsis locis affectis induci debeant, Græci τοπικὰ nominant. Quod Galenus lib. 14. Methodi pulcherrime docet. Cæterum hic liber Pauli partim ex Galeni opere de compositione medicamentorum secundum locos, partim ex octauo Oribasij trāscriptus est: admixtis interim remediis quæ Paulus ipse usu comprobavit.

IN I. CAPVT.

Quemadmodum stirpium.] Ex 1 cap Galeni de cōpositione medicamentorū secundū locos ad uerbū hæc sunt transcripta. Iam 14. Methodi pene eadē habentur. ascribam autē uerba Galeni, maioris perspicuitatis gratia: εἰ δὲ ἔστιν ὅτι τῶν διαπνεομένων χυμῶν ὅσον ἰλυῶδες ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς τε ἐνθέως, τὰς τρίχας ἐγενήσθαι. καὶ τὴν λόγῳ καθ' ὑπόφρυσιν αὐτῆν. τὰ γὰρ οὐκ ὅτεν ἡτοιγ' ἀπόλλυται παντὰ πασιν ἢ μοχθηρὰν γεννηθῆναι, φθίσει δὲ τὰς τρίχας ἀναγκαῖον ἐστὶ καὶ γὰρ οὐκ καὶ ταῦτα

Pflorū origo & nutrimentum.

τὰ φυτὰ κατὰ διππὴν αἰτίαν ἀπόλλυται, πότε μὲν ἀπορέντα
 τῆς τρέφουσας ἁγρότητος, ἐπὶ δ' ὅτε ἢ οἰκίῃς χρώμενα. Τελείως
 μὲν ἀπολλυμένων τῷ τρέφοντος χυμῷ τὰς τρύχας ἢ φαλάκρας.
 σις γίνεται, μοχλῆς δ' ἀποτελεσθέντος, αὐτ' ὁ φύκις καλῶ με-
 ναι, καὶ αἱ ἀλώπεκες. Hoc est, ut rudiores, intelligant: Osi sum
 uero est ex humoribus, qui per latētes meatus perspirant, li-
 mosum quicquid est, id, & statim ab initio pilos producere, &
 reliquo sequenti tempore, ueluti materiā suggerēdo augere.
 Hoc igitur, cum uel in totū perit, uel prauū generatū fuerit,
 pilos corrumpi necesse est. Quandoquidē etiā stirpes duplici
 ex causā pereunt, interim sanē humiditate quæ ipsas nutrit,
 destitute, interim nō propria utētes. Vbi humor pilos nutriēs
 prorsus interiit, caluiciū prouenit. Cum aut uiciosus est red-
 ditus, & opiales, & alopecie excitātur, &c. Celsus hæc duo po-
 strema uicia cōi uocabulo Areas appellat, quod nimirū lo-
 ca pilis uacua eos in capite repræsentēt. Orosius reprehēdit
 hic me qđ Celsum imitatus dixerim de areis, hoc est alopecia
 & opiali. Recte facit iterator, interpretādi muneris imperitus.
 Nonnullæ uero alienis.] Græce est ἀλλοτρίοις ἐαυτῶν, qđ
 ad uerbum sonat, succis alienis à seipsis. Galenus paulo clarius
 dixit: ὑγρῶς ἀλλοτρίοις τῆς ἐαυτῶν φύσεως, quod est Humori-
 bus alienis à sua ipsorum natura Atq; ita nos reddidimus; po-
 tius indicantes esse, dictiōnē sniæ addere, quā re obscurare.
 Quemadmodum igitur quædā alimēta sunt homini; quædā
 sturno propria, ita herbæ quoq; idoneum, familiaremq; natu-
 ræ suæ humorem quo alantur, attrahunt, alienum respuunt.

Castigant
 codex Græ-
 cus.

Inter se.] Deprauius codex est Græcus, tū Venetiis, tum
 in Germania impressus. Habet enim διαφέρουσα τῶν ἄλλων,
 pro διαφέρουσα τῶν ἀλλήλων. Rursus hic Galenus apertius
 dixit: ὁνόματα δ' ἐσχηκῶσι διαφέροντα παρὰ τὸ σχῆμα. Hoc
 est: Nomina autem secundum figuram diuersa habentes.

Græcus
 mutilus in
 stauratur.

Quoniam in Ophiali.] Codex Græcus hic mutilus est.
 Quid n. sibi uult ὅτι παραπλήσιον ὀφει τὸ βεβλαμμένον φαί-
 νεται μόριον, nisi addat in quo affectu. Addendū igitur necessa-
 rio, ex Galeno nō nihil est, legēdumq; in Paulo ὅτι κατὰ τὰς
 ὀφριέτης παραπλήσιον, &c. Orosius & Gemus. nō animad-
 uerterūt, tam bonis alioquin ut ipsi gloriant, exēplaribus usi.

Orosius.

Deinde loco uitiato.] Hoc ubiq; obseruandum præcipit
 Galenus, ut semper totius corporis uacuatio præcedat, nisi
 admodum

admodum exiguus sit affectus. Dixi loco uiciato auxilia inducemus, pro τοῖς τοπικαῖς ἀποβραπύσασμεν βοηθήμασι, quod est, localibus persanabimus remediis.

Si igitur color ad nigrius.] Hoc est, si nigrior, albidiorue conspiciatur. Nam quod Paulus εἰ μὲν ἐν ἐπὶ τὸ μελάντερον ἢ λευκότερον ἢ χροῖα παρατραπείν dixit, Galenus in methodo in hunc modum: εἰ μὲν γὰρ λευκότερα τῷ κατὰ φύσιν, καὶ εἰ μελαντίον. Quod est, si albidior quàm pro naturæ habitu sit, & si nigrior.

Antidoto Hiera.] Intellige, hiera diacolocynthidos, cuius descriptionē habes lib. 7. Pauli Archigeni ascriptam. Scribonius autem Largus eandem pene ad uerbū habet. Officinę uocāt Hieram cōpositam Galeni: uerum in multis adulteratam. Quæ uero ex aloe, & aliis sex rebus, nēpe cinamomo, xylobalsamo, asaro, spica nardi, croco, & chiamoastiche, cōstat, simplex dicitur. Et hæc in officinis, non parum ab illa Galeni discrepat. Primum sane præter medicamenta quę ab illo numerantur, duo insuper adiecta habet, puta xilozaloen, & cassiā, unū supposititiū carpobalsamum, loco xylobalsami. Deinde pondera etiam diuersa continet. Nam omniū partes equales habet. Galeni autem hiera, aloes cētum, aut cum præstatiōrē fieri cupit, aloes drach nonaginta, aut etiā octuaginta recipit, quorū uero sex: ubi de capite sollicitudo est, croci tm̄ quinq;.

Cataportia ex aloe.] Hæc recipiunt cucurbitę syluestres, quam colocynthida uocant, partem unam aloes, & scammonii singulorum partes duas. Galenus hic absinthii succi partē unam admiscere solebat: antea quoq; mastichen chiam, & bdellium, rediguntur in granula Ciceri similia. His fere respōdent Pilulę nostrę Cochię à Rasi descriptę.

Dein ad præsidia.] Cum iam purum ex purgatione corpus fuerit, humor qui in cute continetur medicamentis digerentibus discuti debet: diligentia adhibita, ne adeo calida, acriq; admoueantur, ut cutis exulceretur. Ad hæc ne nimiū siccet, prouidendum est nam talibus non tantum uiciatus, sed etiam utilis qui confluit, absumitur. Græce erat ἐπὶ τὴν τοπικὴν χωρὲν ἐπὶ μέλαινα quod ad uerbum sonat, ad locale ueniendum curationem, sed Latinius est ut reddidi.

Primæ asperitatis.] Locutio est Varronica pro asperrimo, Græce erat τὸ τραχύτατον.

Hiera diacolocynthidos.

Methodus curationis.

Aliud

Additū est
hic ut cu-
riosis fiat
satis.

Aliud experientia prob.] Hoc medicamentum in Codice Ioannis Lascaris manu scripto, non habetur: nec compositio plane cohæret, ac peregrina plane uidetur.

Orosius.

Vnciæ octo.] Habebatur in Græco χεῖμα supra scripto o sicut alia pleraq; absurda. Miror Orosium in tanta ueterum exemplariorum copia hoc nō monuisse lectorē, cum tamen in sequenti medicamento adnotet legendum μίος προκινός.

Viciata le-
xio Græ-
ca.

Euphorbia, thapsia, baccarū lauri.] Male in Codice Græco habetur δαφνίνον quod est laurim pro δαφνίδων. ut Galenus habet. Nam postea mentio laurini fit. Præterea Galenus in eodem medicamento à Paulo ratione ponderū dissentit. Legit enim Euphorbia, thapsia, & baccarum lauri, singulorū drachmæ duæ, sulphuris uiui, hierati singulorum drachma: ceteræ drachmæ sex, &c. Neglexerunt Aristarchi.

Orosius
& corre-
ctor Basi-
lex.
Orosius,
& Gemu-
sæus.

Nasturci.] Impressus Codex tum Venetiis, tum Basileæ habet καρδαμύμια. Sed Galenus & ipse sensus requirit καρδαμύμιν quod imperigines & lepras discutit, eade n̄ ui præditum qua sinapi. Nec hoc à castigatoribus animaduersum.

Orosius,
& Gemu-
sæus.

Recinini aut ueteris.] Paulo ante etiam deest particula disunctiua in codice Græco, habet. n. κινίν παλαιοῦ ἐλαίου: cum legendum sit ex Galeno κινίν ἢ παλαιῶς ἐλαίου. Nam si ricininum deest, etiam commune uetus oleum eadem præstare potest. Onuferunt correctores.

Gal. a Pau-
lo uariat.

Leporum uentriculi quinq;.] Ex Critone hæc sunt, citate Galeno. Verum scriptura illius à Paulo uariat. Galeni codex habet κολίνας ἕξ hoc est uentriculos sex. Paulus tantum habet πέντε. Vide utrum malis sequi.

Castigatur
codex Græ-
cus.

His adiciantur.] Græci Codices omnes deprauati sunt hoc in loco. Nam habent, πρὸς τοῦτοις λάμβανε τὸ τρίτον, μυρσίνης, ἀκραιμόνων, ἀκανίας καρύων, &c. Quid quæso hinc colligi possit? Legendū igitur cū Galeno cēleo in eū modū: πρὸς τούτοις λάμβανε μυρτῶν, μυρσίνης ἀκραιμόνων, ἀκανίας καρύων, &c. Pondere non nihil apud Galenum uariant.

ἵδυσμα.

Quolibet oleo aromatis imbuto.] Sic interpretatus sum ὃ ἐέλαις ἢ ἵδυσματι. Celsus dixisset, quolibet unguento. Nam Græca vox ἵδυσμα nihil aliud signat quàm unguentum ex oleis succisū præparatum, cui ex aromatis iniectis, odor suauior, & gratia accesserit. Non autē sum ignarus ἵδυσμα apud alios quosdā aliter accipi, ut apud Plinium lib. 13 cap. 1 ubi habet

habet in hunc modū : Ratio faciēdi duplex, succus & corpus. Ille olei fere generibus cōstat, hoc odorū, hac stymmata uocant, illa hedyfinata, &c. In qua oratione plane à Galeno, ceterisq; Græcis dissentit. Nam olea ipsa quæ in unguentis sumuntur, hedyfmata uidetur appellare: stymmata uero aromata. At Galeno & Dioscoridi stymmata, alia medicamēta aromatica, nempe quæ spissitudinem unguento cōcilient, appellantur, unde etiā spissamenta possis nūcupare, alia uero hedyfmata, nimirū quæ gratiā odoris & suauitatē eis imprimant. Vide Dioscoridē in unguēto cinamomino, & Nardino alijsq; cum paucis. Galenus uoces Hippocraticas interpretans, hedyfinata, inquit, pro ipsis aromatis apud Hippocratem accipi.

Anemonæ flos tritus] Oroscius hic in græco codice legendum censet, *ἀνέμωνος τὸ ἐντὸς μέλαι τρίψας μετ' ἐλαίου μυρσίνης*, hoc est: Anemonæ interior pars nigra, cū oleo myrreo trita, ut habetur apud Archigenem, citante Galeno lib. 1. de compositione medicamentorum secundū locos. Vide quid reprehendendi libido faciat. hunc locū adfert, de medicamentis nigrefacientibus, ab Archigene comprehensum, cū paulo superius singulare caput extet de fluidis capillis, de remedijs illos conseruātibus, unde Paulus hanc orationem ad uerbum planè transcripsit. Habet enim Galenus ex sententia Heraclidis: *ἀνέμωνος τὸ ἔνθος τρίψας μετ' ἐλαίου, κατὰ χρίει*. Iam flos ipse non aduersatur aliqua ex parte pilis promouendis.

Stercus caprillum.] Apud Græcos proprie dicitur stercus caprillum *σφύραβος*, teste Galeno lib. 10. de simplici medicina, ubi habet *συνέχεται μετ' ἐν χρώμεται αἰς τῶν αἰγῶν κύπρις*, (*σφύραβος δ' ἰδίως διομάζονται*.) Quod est: Frequentissime igitur caprarū stercoribus utimur, sphyrathi autem proprie nominantur. Oroscius nouus interpret, aliorum autē, si dūs placet, corrector, filum caprillum exponit.

IN II. CAPVT.

E Cinere lixiui.] Paulus lib. 7 lixiuium, quod græci *κενίαν* appellant, cineris lotionē esse dicit: enumeratq; eius differentias. Aliud. n. ex cinere, fici, caprifici, samentorū, & tithymallorū confit, quod uim absterforiam maxime, siccantemq; & exedentē propemodū obtinet. Si calx admisceatur, urentē, *πρωτότακος* dicitur, quasi primarium lixiuiū. Interim ex sola fit calce. Iam quoddā ex sapone præparatur, unde *σαπωνοειδής*.

τύμμα-
τα.

Oroscius.

σφύρα-
βος.

Oroscius.

Lixiuiorū
genera.

πρωτότα-
κος.

σαπωνο-
ειδής.

κονία. κονία nuncupatur. At nomē κονίας plura signat, nēpe calcem ipsam, & lixiuium, cineremq;. Solet aut̃ aliis adiungi, quæ ipsū, quæ de re intelligi debeat, interpretentur, utpote κονία τῆς τῆς, pro lixiuii liquido, κονία ἀσβεστος, pro calce uiua accipitur, cum ἀσβεστος per se calcem non extinctam signet, ut τῆς τῆς ἀσβεστος. Porro cū κονία ἀσβεστος ponitur, hoc est duo substantiua alterum in nominatiuo, alterum in genitiuo, lixiuium calcis intelligendū uenit. Cæterū apud latinos scriptores lixiuii uox aliis atq; aliis dictionibus iuncta, diuersa etiā significat. Primum apud Varronem, Columellā, Plinium frequenter habetur Cineris lixiuiæ, cineris lixiuii, è cinere lixiuium, pro simplici lixiuii. Deinde apud Largum, unde Galenus aliquot medicamenta transcripsit, cōpositione. 228. Hæc terere oportet ex cinere lixiua. In sequenti rursus. Cum cinere lixiui diutius terere. Paulo post in altera: Teruntur ex

Lixiuuium
e cinere.

κονία πι-
λοποιτικῇ
κῇ.

Linacer.

πιλόποιος
ὑδὼς πι-
λοποιτικῇ
κῇ.

cinere lixiua qua utuntur culinarii, sicut apud Paulum Aeginetam κονία πιλοποιτικῇ pro lixiuii quo pilearii utūtur. Legendū est in Codice græco per simplex i nō per κ, ut quidam faciūt, putantes à πύλου quod est lutum, πιλοποιτικὴν κονίαν appellari, ut sit lixiuiū quo figuli utūtur: cū tamen nullū eius ut mihi uidetur usum habeāt. Quare locus in 6. Methodi de prauatus Linacrum interpretem decepit: aliosq; non paucos eum citantes. Verba græca sic habent, μηδὲν ἐν τῷ παραχρη-
μα φάρμακον ἔχων, ἥ τισα κονίαν τῆς τῆς, ἰσρακῶς ἐκ γειτόνων τῆς κάμνοντος πιλοποιδὸν. In qua oratione πιλοποιδὸν legēdum est. Galenus aliquando κονίαν πιλοποιτικὴν, Aliquando ὑδῶς πιλοποιτικῇ, pro eadem re exponit: ut lib. 6. de cōpositione medicamentorū secundū genera in hūc modū, ἄλλη ἢ διὰ τῷ ἀφρονέτρικῇ, ἢ ἰχθυσάτο λάσχος κυρῆ λίτραν ἢ τερμινύτης λίτραν ἢ μάννης λίτραν ἢ ἀφρονίσρου λίτραν ἢ ἐλαίου ξέταν ἢ, ὕτος πιλοποικῇ ξέταν ἢ. μέλις ὡμῇ το β. σιντήρη κατὰ τρόπον. Largus composuit. 216. temporis iniuria non nihil mutilus est. Verba ipsius hæc sunt. Ceræ pondo libra, resinæ terebinthine pondo libra, nitri rubri pondo libra. Hæc teruntur ex cinere lixiua, postea cum olei cyathis sex liquefiunt ad ignē: quibus adiicitur thuris pollinis selibra. Vides hic ὑδῶς πιλοποιδὸν nihil aliud esse quàm cinerem lixiuium, aut lixiuiū, aut quomodocunq; uoles appellare. Atq; ita ego etiam antea sum interpretatus Paulo post Galenus eodem in lib. τὰ ξυρὰ δια-
λύεται

Λετα πιλοπεική hoc est arida dissoluuntur lixiua, ubi simpli-
 citer πιλοπεική dixit pro κοία πιλοπεική. Apud Plinium ci-
 neris uox simplex interim pro lixiuio usurpatur: nempe ex
 Dioscoride uertit dictionem κοία. Ruellius uir alioqui anti-
 quæ eruditionis etiam in postrema editione lib. 6 Dioscori-
 dis κοία πιλοπειτικήν uertit cū luto suo lixiuiū, quā accō-
 modate iudicent alii, certe lutum nemo potui dabit, sed lixi-
 uium, lacte in uentre coagulato. At Oroscius noster nō tan-
 tum sensu inaccommodato, quod de me dicit, sed longe om-
 nium absurdissime uertit calcē qua in tectoriis, dealbandisq;
 parietibus tectores utūtur. Vide optime lector quā sit qui-
 busdam maleferiatis hominibus innatum, alios reprehende-
 re in iis etiam quæ ipsi non intelligant. Iā pondus uiciatū in
 Codice græco non aduertit Aristarchus Nam pro, < δ, qd
 est drachmæ quatuor, reponēdum δ hoc est sextarii quatuor:
 Idem itaq; est κοία πιλοπειτική κοία πιλοπειμή, ὡς πι-
 λοπειτικήν, ὡς πιλοπεικὸν & φακτὴ τῶν πιλωταρίων.

Ruellius

Oroscius.

Græcus co-
dex depre-
uatus Oro-
scij.

IN III. CAPVT.

POrrigo.] Sic interpretatus est celsus πυτυρίασιν. Plinius
 etiam surfures secundum græcæ dictionis etymologiam
 appellat: quæadmodum interpretæ Auicennæ. Vide Galenum
 lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos.

Resoluuntur.] Græce est: εἶν ἀπότῃς, quasi dicas, esto
 particularum eliquatio, uel particulæ eliquantur. Celsus re-
 soluuntur, quem imitatus sum. Nam quædam ueluti squamu-
 læ surgunt eaq; acutæ, resoluuntur.

πυτυρία-
σιν.

Creta futoria.] Sic interpretatur Largus μελαντερία, cō-
 positione 2 18. Aluminis inquiens rotundi, melanterius quæ
 creta futoria dicitur, qua ligulæ calceorum denigrantur. Di-
 uersum est ab atramento futorio sicut Dioscoridē consulas, quā-
 quam Oroscius exponat atramentum futorium.

Melante-
ria.

Oroscius

Ceruse singulorum drachmæ.] In græco codice habeba-
 tur Γο. β. quod est Vnciæ duodecim. ego autem legendū cen-
 seu > β hoc est drachmæ duodecim. Itaq; etiam habet Ale-
 xander, & magis conuenit.

Vicianus
codex græ-
cus. ἰχῶ-
ρες quid.

Ex quibus sanies.] Græce est: ἀφ' ὧν ἰχῶρες ἀποτῃσκοίται.
 Interpretes latini inritū in modū cruciantur, dum græcam uo-
 cem ἰχῶς explicare studēt, alii namq; imitantes Plinū ubiq;
 saniem interpretātur, alii serofos humores & acres, tenuisq;
 quidam

quidam sanguinis cruorem, quidam ut Celsus ipsum sanguinem Aristoteles ἰχώρ δὲ, inquit, εἶναι ἀπεπτον αἷμα, hoc est Ichor autem est sanguis crudus. Ex hac tanta uarietate, certi aliquid adferre conabimur, quod in authoribus exponēdis tuto seq. possis. Itaq; ἰχώρες aquosæ, serosæq; & superius sanguinis humiditates existūt nūc acres & calidæ, nūc pituitosæ.

Calidæ.

Frigidæ.

& frigidæ. Galenus lib. 6. de sanitate tuēda ita scriptū reliquit. ὅταν μὲν γὰρ ἢ μὲν ὅλη τῆ σώματος κρῶσις ἢ χολώδεα τέρα, τὰ δὲ κατὰ κοιλίαν ἀτρώτερα, τηρεῖσθαι δεῖται διὰ τροφῆς εὐτομάχου. μὴ γενομένου δὲ τέτου, καταρρέουσιν ἰχώρες εἰς αὐτὴν, ὅς ἀβροῖζει τὸ σῶμα περίττης. Paulo post, εἰάν δὲ μὴ μῆλον ἢ κεφαλὴ θερμὸς ἰχώρας ἐπιπέμπει τοῖς κατὰ γαστέρα χωρίοις. Rursus de frigidis in hunc modum. ὅταν ἤτοι εἰς θερμὴν γαστέρα καταρρέουσιν ἐκ τῆς κεφαλῆς οἱ ψυχροὶ καὶ φλεγματώδεις ἰχώρες, &c. Hippocrates lib. 4. de ratione uictus in morbis acutis δρυμέας καὶ χολώδεας ἰχώρας dixit, quod Galenus interpretatur in eum modum, ὅτι δὲ ἰχώρας ὀνομάζει τὰς λεπτὰς ὑγρότητας, ἐν δὲ ἵλον. Galenus autem lib. 2. de elementis: ὡς ἐν ἐν τῷ γάλακτι τὸ μὲν εἶναι ὀρεῖός, τὸ δὲ τυρὸς, οὕτω καὶ ἐν τῷ αἵματι τὸ μὲν οἶον ἰχώρ αἵματος ἀνάλογον ὀρεῖῳ γάλακτος, τὸ δὲ οἶον ἔλκε τις καὶ τρεῖς, &c. Quādiu igitur in corpore adhuc sunt ἰχώρες aquosæ serosæq; humiditates sanguinis, uel aquosi humores sanguinis latinè dici poterunt. Nam ipse Galenus eosdem nunc pituitosos, nunc biliosos χύμους, quod est, humores nominat. Vbi uerò extra corpus aut uiuū, aut mortuum eruperint sanies appellari debent. Ut apud Galenū tenuē in ulceribus excrementum ἰχώρ, nobis sanies non incommode exponitur. Item in capitis uiciis quæ ἰχώρας nuncupantur ἰχώρες sanies recte dicuntur. Plinius in affati iecoris saniem appellauit: humorem, qui abs iocinore, uel pulmone, uel alia parte dum affatur, emanat. Cæterum Paulus hoc in loco apposite dixit ἀπατίνονται, hoc est, eliquantur, sicut in corporibus mortuis per solis æstum fieri solet. Atq; hæc sanies crassa uiscosæq; existit,

Interpretatio
ἰχώρος
apud Galenū.

Sanies.

Medicamentum ex charta, xerion.] Huius descriptio est in septimo. Vocatur autem xerion quod aridum sit, & in puluere accommodatur.

Ad Achoras, recrementum.] In impresso codice habetur πρὸς ἰχώρ, ἔντας, hoc est, ad eos qui saniem habent, ego autem puto

puto legendum πρὸς ἀχωρεῖντας, hoc est: Ad eos qui Achoras experiuntur. Nam titulus idem habet, nēpe ad Achoras, non ad ἰχωρεῖς. Quanquam Orosius ἰχωρεῖντας legendū cēseat.

IN IIII. CAPVT.

Capitis dolor.] Hæc ex lib. 2. Galeni de cōpositione medicamentorum secundum locos transcripta sunt. Paulus autem σύμπτωμα dolorem esse refert, ubi Galenus διαθέσιν ponit. Ille hunc superuenire intemperiei, hic affectum ipsum esse pronunciat. Rursus apud Galenum plures causæ commorantur, una sane, simplex intemperies citra humores, altera, horum qualitas, tertia ipsorum copia, item obstructions humorum, uaporumq;. Alia adhuc, quarundam capitis partium imbecillitas, interim externa quædam causa, quam græci πρὸς καταρκτηκὴν nominant: ego sæpe primariā interpretatus sum.

Orosius.

Cause dolorum capitis.

Nisi caliditati aut.] Deest particula in codice græco impresso. Tu igitur lege μετὰ θερμῆς ἢ ψύξεως, quod est, cum caliditate, aut frigiditate. Deerat enim ἢ.

Addendum græco.

Prodest fronti & temporibus.] Recte hoc dicit, nā per initia spinalis medulla dolorem non experitur, eoq; posteriora capitis ungi non debent.

Pastilli ad cap.] Alexander medicus hūc pastillum describit. Sed pondera nonnihil in quibusdam medicamentis uariāt. Cōmendat enim ad diuturnos dolores, omnibus aliis remediis nihil proficientibus. Vbi Paulus, ex somniferis aliquid, dicit, Alexander opii momentum iniiciendum præcipit.

At si frigus.] Ad uerbum ex Alexandro hæc ut superiora mutuatus est Paulus. Facies non cōcidit, hoc est, non macrior est reddita, ut ex calore, sed colorem decoremq; amisit, pallida effecta. Sic ἀχρεῖν, quod est sine colore, ex Celso interpretatus sum. Sanguis enim ob frigiditatem partes externas relinquens, intro refugit, unde pallor uecessario superuenit.

ἀχρεῖν.

Præsertim si recrementa.] Hoc est, si ex crassis, glutinosiq; humoribus dolores sint excitati. Græca sunt ἢ καὶ παχύνεται γλίσχρα περιπτώματα ἢ. Quæ uerba satis obscura in hunc modum intelligi debent, si humores crassi uiscosiq; in capite tenacius hærentes, dolorem excitant.

Locus obscurior.

Si biliosus humor.] Hæc & sequentia ex Galeni secundo de compositione medicamentorum secundum locos, nullo uerbo mutato, habentur. Cæterū ambo præcipiunt, tū Gale-

Quomodo
biliosus hu-
mor præpa-
rari debet.

nus, tum Paulus primū balneū tēperatū, inunctionē, cibū potumq; refrigerantē. Deinde offerūt medicamēta bilē educētia: qđ sane Alexāder medicus suo seculo clarissimus in hūc fere modū exponit Cōuenit igitur, ut superflua medicamentis bili ducēdæ idoneis educātur. Verū ut hoc secundū rōnem fieri possit, corpus antea præparari humectariq; debet, cibis tēperatis, balneis & unctionibus. His. n. probe cōtēperatus, resolutus, & quasi imbecillior effectus humor, facilius expurgabit.

Abinthij diluto.] Hoc est, ut officinæ uocāt infusione: tūc nimirū cū pauca bilis stomachi tunicas imbuerit, irrigariq;.

Vel aloë.] Scammonia nunquam exhiberi debet, nisi maxima bilis copia dolorē excitarit, aut alia uiolēta medicamina. Picra autē prodest, ubi crassi aliqui succi bili sint permixti.

συμπά-
θεια quid.

Si caput consortii lege.] Græce est συμπάσχει, hoc est cōpatitur. Celsus lege consortij, alij per consensum patitur, exponūt. συμπάθεια namq; est, cum pars aliqua corporis, alterius malo, uel confini, uel connexus, uel cōmunicationis gratia condolescit. Huic contraria ἰδιοπάθεια, uel πρωτοπάθεια cū per se, & suo uicio tantum afficitur: quem affectum primariū nominare licet, & ἰδιοπαθεῖν, primario affectu laborare.

Lege con-
sortij.
Cōsensus.
ἐκμοχλῆ-
σαι.

Emolui emur.] Verbum græcum est ἐκμοχλεῖσαι quod de pertinaciter hærentibus proprie dicitur, ut de uiscosis, crassisque humoribus partem aliquam tenaciter obsidētibus, item de induratis affectibus, μοχλεῖται idem est quod κοῖνῃσαι, libro septimo ait: ἡ πρὸς τὸ μοχλεῖσαι ἰδιόθεν ἐκκληρωμένην, de medicamentis efficacioribus sermonem habent. Propterea mihi uisum est, emoliri uerbum non incōmode hic usurpare.

IN V. CAPVT.

παράμυ-
σμος.

V Terq; hic affectus.] Ad uerbum ē Galeni secundo de cōpositione trāscripta sunt, nisi quod pro hac dictione, permanens, Paulus παραμύσμος, Galenus χρόνιος καὶ δούλτος, hoc est, diuturnus, & solutu cōtūmax, habeat. Celsus acutum & pestiferum morbum appellat κεφαλαίαν.

Hiera quam ex acueris.] Scammonio, aut ueratro adiecto hiera uehementior redditur. Atq; id περὶ ὀξύναντας intelligitur, Nam ὀξύεις idem est quod acutum reddere, intendere, uehementiorem efficere.

Vnguenti irini] Ad uerbum habetur hoc in Alexandro. Apud Galenū uariæ nonnihil hoc modo. Vnguenti Irinī ex-
pressionis,

pressionis, castorei, singulorū pars una, baccarū lauri pars una
uiticis seminis pars una, rosarū siccarū, pars una, rutæ summi-
tatum partes quatuor. Aceto resoluta excipiuntur cerato, &c.

Dum intabescerent.] Sie reddidi ὡς τὰ κελύφας, Celsum
imitatus Orosius improprie usq; ad eliquationē dici iubet.

Partem affectam irrorabit.] Lege in græco κατὰ τὴν pro κα-
τέωνι, quod est, κατέβρεχε κατὰ τὴν, superfundebat, asperge-
bat non inspergebat ut uult Orosius.

Dropbx.] Huius descriptionē habes in septimo Pauli ad
finem, ubi etiam sinapismus exponitur. Hæc sunt medicamē-
ta noxios humores in summam cutē euocantia, μετὰ συγκρι-
τικὰ græci nominant. Sic etiam Celsus uerbum hac uidetur
interpretari, ubi summam cutem, inquit, relaxari, euocari-
que corruptū humorem, & habitū corporis mutari expedit.

Malagmate, quia liquidum est parygron] Galenus lib. 7.
de compositione medicamentorum secundum genera, inter
malactica ponit, quod recipit adipem suillum curatum, cerā,
& argenti spumam. Eoq; merito interpretatus sum dictionē,
contra opinionem Orosij. Male est in impressū παύλῳ.

Sani.] Lege in codice græco ὡς μετὰ λυτρὸν ἑγίης γίνε-
σθαι παντελῶς τοὺς κάμνοντας, ut habet Galenus libro secun-
do iam sæpius citato, ad calcem.

Aphlegmatismus.] Nunc uerto medicamentum, quod
pituitam per os educat, nunc quod saluam moueat. Ut hoc in
loco, Celsum imitatus in capite de Cephalæa, cap. 4. Cæterū
in græco codice habetur το. β. quod est, unciz 14. ego puto
C. β. legendum, sicut interpretatus sum.

IN VI. CAPVT

AT quæ mentis alienatio.] Quia multa in hoc caput uo-
culæ incidunt, idem propemodum significantes, non abs-
re fuerit, eas curiosius in utraq; lingua distinguere. Mētis igitur
alienatio uerti pro græca dictione παρακλή. Nam in fe-
bris uehementis statu, ut ait Galenus, accidit ægros παρακλή-
σαι, παραχθῆναι, παραλῆσθαι, & παραφρονῆσαι, quæ latini
exponunt, mente alienari, mente non cōstare, aliena loqui, de-
lirare & desipere. Si autem hoc continuè accidat, phrenitis di-
citur. At si in statu demētia superueniat in declinatione au-
tem cesset, delirium, non phrenitis est appellanda. Celsus eā-
dem ponit distinctionem libro. 3. cap. 18. Phrenitis, inquit

Orosius.
κατα-
κλιν.
Orosius.

μετασυ-
κρικα.

Corrigen-
dus codex
græcus.

Nota.

παρακλή-
σαι.
παραχθῆ-
ναι.
παραφρο-
νῆσαι.
Phrenitis.
Dementia.
Delirium.

tum demum est, cum continua dementia esse incipit.

Læmæ.
Orosius.

Vellæmis, hoc est.] Orosius male exponit λημώντας, id est lippientes Non enim Læmæ lippitudinem signant alioqui omnes quibus Læmæ in oculis innatât, ut hectica uel potius marasmo cōfecti, lippitudine laborarēt, supra dixi Pliniū dictionem græcam usurpare. Celsus pituitam interpretatur.

Coma.

Coma] Galenus comētario in primum τῶν πρὸς ῥῆτι-κῶν refert, Coma & Cataphoram apud Hippocratem idē esse. Sed Coma duplex inuenitur pro humoris ratione. Nam cum per se est, ex pituitoso generatum humore, grauis sopor, & quasi inexpugnabilis dormiendi necessitas. Quod si biliosus humor mixtus præpolleat, uigilās coma dicitur. Quo qui detinentur, nequeunt uigilantium munia subire, sed tum palpebras claudere cupiunt, tum dormire sperant.

προσφύ-
ρως.
Panis lo-
tus.

Commodum incident] Hoc est, opportunitate & occasione sumpta se ingerent. Hoc enim apud græcos προσφύρως ἐντυχάειν significat.

Panis quoq; aqua lotus.] Galenus panis eluēdi rationem inuentam esse scribit, ut obstructionem in cibo impedirent. Nam hic panis lotus quā minimum habet crassicie, glutinisq; utpote ex terrestri ac graui, aereus, leuisq; factus.

Duracina,
Rhodacina.

Peponis duracini.] Sunt qui non duracini legendum censeant, sed rhodacini, quanquam Palladius. Paulus, aliq; recentiores græci ut Constantinus δωράκινα legāt, quos Palladius ubiq; imitatus, duracina conuertit, quicquid sit siue rhodacina, hoc est, à Rhodo nominata, siue duracina à duritie, persica proferas, non multum interest. Plinius etiam cerasa, & uuas duracinas nuncupat: Tu utrum malis sequere:

ὥμηλ-
σις.

Hordeacea farina.] Græce est ὥμηλσις quasi dicas cruda solutio, uel cruda farina ordeacea, ad differētiā polētæ quæ torretur Verum latini interpretes crudam omittunt, iectori id intelligendum relinquentes. Aliquando etiam de aliorum farina ὥμηλσις dicitur, uerum tunc apponitur frugis nomen, ut πυρίνη ὥμηλσις, ἢ λινοςπέρμα. Sæpe ex superabundanti κριθίνη ὥμηλσις nominatur,

IN VII. CAPVT.

ἄσκη.
Orosius.

M Vltus angor.] Caput hoc ex οὐτάου Qribasij transcriptum est. Græce habetur πολλὴ ἄσκη quod interpretatur pleriq; sicut etiam Orosius, fastidium, cum uerè hoc loco sit dicendum

dicendum multus angor. Nā adeo torquetur, ut nesciant qđ
ipsis sit agendū. nunc lecto se erigunt, nūc rursus decūbunt ui-
tæ quasi pertæsi. Morbus hic intra septimum sæpe iugulat.

Tumore molli.] Sic reddidi οἰδημα, qui tumor premētī-
bus digitis cedit, eoq; dixi, molli. Tu si libet dicas, cū edemate.

οἰδημα

Emillicii.] Hoc est, qui foras propelluntur, dolore nimio
exprimente. Græce est προπετῶ γίνονται.

Porro utitor.] Post totius corporis uacuationem deriu-
ationemq; per propinquiores particulas ad topica uenit reme-
dia. Primum alpergines ex hydrelæo, aut uino & oleo, ut in
aliis partibus inflammatis conueniunt: deinde cataplasmata
ex pane, aut farina hydrelæo subacta, quæ ad maturationem
perducunt. Id enim uerbum πιπαίνει significat.

IN IX. CAPVT.

Lethargus.] Oribasius lib. 8. omnia ad uerbū habet. Gale-
nus cōmentario in primū prorrheticon, in hūc modū scri-
ptum reliquit. φρενίτις μὲν γὰρ ἡ ἀκρεβής, καὶ ἀμικτος ἐτέρω
ιοσῇματι γίνεται χολῆς ξαυθῆς καταλάβουσης τὸν τόπον ἐν ᾧ
τὸ πῆρ ψυχῆς ἡγεμονίᾳ ἐστὶ. λήθαργος δὲ τὸν αὐτὸν τύπον ὑγρα-
ναυτῶσε καὶ διαβρέξαντος φλέγματος, Consentint hæc cum
Paulo, nisi quod ipse pituitam frigidiores habeat.

Caros.] Vide Galenum secundo commentario Prorrihe-
ticorum, ubi refert tres quasi species Cari, nēpe morboſi, quō
de hic agitur, medii ut ex uino contracti, & boni qui post lon-
gas uigilias solet accidere. Cæterum arteriæ Carorides à ca-
ro nomen habent, quanquā si intercipientur, nō statim mu-
tum a nimal, aut soporosum euadat, sed omnes arteriæ quæ su-
pra uulneratas partes habentur, pulsū amittūt. Interpretari
licet, soporem ueternosum.

Cari spe-
cies.

Februm a accessionibus.] Emēda codicem græcum, ac pro
παρόξυσμο lege παροξύσμοις, quod Oroscius & castigator Ba-
siliensis studio, opinor neglexerunt.

Oroscius

Membranæ custode.] Sic interpretatur Celsus lib. 8. cap.
3. Quomodo os excindatur. Hæc autem sunt ipsius uerbā: Ἐ-
στὶς foraminibus eodem modo media sæpe, sed multo circū-
spectius excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandem mē-
branam uiolet, donec fiat aditus, per quem membranæ custos
immittatur, μινυγγοφύλακα græci uocant, &c. Nunc quid sit
mēbranæ custos, audi. Lamina, inquit, ænea est firma, paulum

Membra-
na custos

μηνυγ-
φύλαξ.

refima, ab exteriori parte læuis quæ demissa est, ut exterior pars eius, cerebro propior sit, subinde ei subijcitur quod scalp- pro discutiendum est, ac si excipit eius angulum, ultra transire non patitur, eoq; & audacius, & tutius scalp- malleolo sub- inde medicus ferit, donec excisum undiq; os eadem lamina le- uetur, tolliq; sine ulla cerebri noxa potest, &c.

Nota.

Quæ cito transeunt] Hoc est, quæ cito per totum corpo- ris habitum rapiuntur, quale est quod etiam Diacalaminthes inscribitur. Habes utriusq; compositionem apud Galenum libro quarto de sanitate tuenda. Græce est τινὸς τῶν ὀξυπόρων. Non intelligit hic Paulus, quæ per aluum cito transeunt.

βομβύ-
λια.

Ijs autem qui in uetustatem.] Id est, quibus morbus in ue- tustatem incidit, quiq; tremuli sunt. Nā postea ob diuturnita- tē morbi externarumq; partiū imbecillitatē, tremor accidit.

Angustioris uasculis] Sic interpretatus sum βομβύλια. Nā Hesychius ait : βομβυλίδος ποτήριον γένος κατὰ μικρὸν πό- τον τράξαντος, ὅθεν διὰ τὸν ἥχον οὕτω κακλῶσθαι. Cōuenit igit̃ ut eiusmodi poculis dulcis aliqua potio ita affectis instilletur.

IN X. CAPVT.

I Nterim rubore tincta est.] Græce erat ἔρυθρος αὐτοῖς ἐπαν- ταῖ. Hoc est, rubor eis efflorescit, uiuidus est. Auicenna hoc caput ut alia pleraq; in suum librum quasi transcripsit, muta- to ordine tantum, uocatq; affectum Suber asāhari.

Qui uero malo uicti sunt.] οἱ δὲ κρατηέντες. Celsus uer- tit malo uicti. Opponatur ijs qui mediocriter habet: qni mor- bo possunt resistere.

In ijs autem periculum maius est.] Reddidi sic græca hæc χέλεποι δὲ μᾶλλον εἰσίν, quod est, difficiles autem magis sunt curatu scilicet, quibus uigiliæ sunt continuæ.

IN XI. CAPVT.

Causa pru-
dentiz,
Stultitiz.

C Ausam habent communem.] Subintellige, mentis noxa, & memoriæ iactura. Fatuitatis causam Galenus commē- tario in libellum Hippocratis de natura hominis ita memo- riæ prodidit: τὸ μὲν ὄξύ καὶ συνετὸν ἐν τῇ ψυχῇ διὰ τὸν χελεῶδη χυμὸν ἔσται. τὸ δὲ ἑδρεῖον καὶ βέβαιον διὰ τὸν μελαγχολικόν. τὸ δὲ ἀπλὲν καὶ ἡλιθιώτερον διὰ τὸ αἶμα, τὸ δὲ φλεγματος ἢ φύσις ἢς μὲν ἡβοποῖσάν ἄχρητος. Quæ uerba olim sic reddide- ram: Acumen ingenii & prudentiæ ex bilioso humore nasci- tur. Cōstantia uero & firmitas ex melancholico: simplicitas stoliditasq;

stoliditasq; ex sanguine : pituitæ uero natura ad mores fingē-
dos inutilis, &c. Cæterum communem causam refert Paulus
& mentis noxæ, & memoriæ iacturæ. Male habebatur in græ-
co codice καὶ νῦν pro κοινῶν, ut annotauit Orosius quoq; Sed
hoc sane debet exemplari suo. Quod autem τὴν συντάσαν uer-
terit, illic consistentem, cum dicendum esset, constituentem,
efficientem eruditioni suæ & ingenio debet. Nam si cōsisten-
tem, hoc in loco Paulus dicere uoluisset, non opus erat arti-
culo τὴν, qui ueluti autorē & opificē demonstrat. Sic etiā Gal.
intelligit lib. 3. locis affectis, unde hæc partim descripta sunt.

Vel utiq; in humiditate inspersa.] De ea nimirū dicit hu-
miditate, quæ per totū corpus cerebri dispersa est: Gal. tertio
locorū affectorū habet sententiam eandē, sed paulo apertius.

IN XIII. CAPVT.

Vertiginum affectus.] Vide Galenum libro tertio de locis
affectis. Alibi autem refert causam inordinatam flatuosi
spiritus motionem, qui uel in cerebro generatur, uel ab infe-
rioribus sursum fertur.

Rotas, uortices uē.] Græce est ὁὶον τρέχους ἢ δίνας. Gale-
nus τρέχους ἢ δίνας ἐν ποταμοῖς, hoc est, rotas uel uortices in
fluminibus. Nā δίνη συστραφὴ ὑδάτων, Ἄτ δίνος, ait Galenus,
ὄνομάζεται, ὅταν ἡ κεφαλὴ περιφέρεται, φαντάζεται. ὅταν δὲ
σκοτώδης ἢ ὀφθαλμοὶ ἀπὸ τῶδε φαίνεται σκοτὶ δίνος καλεῖται, &c.
Apud latinos uertigo alterum nominari potest, alterum si ad
uerbum interpreteris. Tenibricosa uertigo.

Medicamentis quæ odore mouent.] Hoc est, quæ naribus
odoranda adhibentur, atq; ita cerebrum commouent, græce
dicuntur ὀσφρακτὰ. Celsus, quæ odore mouent, conuertit.

IN XIII. CAPVT.

Morbus comitialis.] Vide Galenū lib. 3 de locis affectis,
& Oribasium in 8. unde Paulus hac ad uerbū transcripsit:
Græci uocant ἐπιληψίαν, quæ dictio cōprehensionē, retēsi-
onem, obturationemq; significat. Nā spiritus animales hoc in
morbo detinent, adeo ut in mēbra corporis distribui nequeāt.

Vel certe aliis quoq;.] Græce est ἡ γυν καὶ ἐξ ἀναδόσεως
ἐτέρων μορίων, ad uerbū sonat: Vel ēt ex aliarū partiū distri-
butione, quod est, uel ēt aliis partibus cerebro cōicantibus.

Voluntatis & consilii expers.] τᾶσις ἀπροαίρετος in græ-
co codice habetur, quod est: Status qui citra uoluntatem &

Vitiatus co-
dex græ-
cus.
Orosius.

δίνη.

δίνος.

Vertigo

ὀσφρακτὰ

τάσις.
ἀπροαί-
ρεσις.

propositum, sit, ueluti angustia, aut tristitia. Aristoteles disti-
guit προάρεστιν ab ἀκυσίου. Illa. n. sit cū ratione & intelligen-
tia, ἀκούσεων cōtra. Possis itaq; dicere, inuitus corporis & ani-
mi status. Galenus libro suprā noīato ait; Dormiētes spirāt,
quāuis nulla alia accedat actio, quæ uolūtate & cōsilio regat̃.
Itē μικέτι παρακοληθῆναι εἰ αὐτῷ, quod est: Non amplius cōsta-
re mēte & intelligētia: ad uerbū uero sonat, seipsum assequi.

παρακ-
οληθῆναι
εἰ αὐτῷ.

Eorum quæ perceperat.] In græco duæ tantum dictiones
habētur, τῶν προσεχῶν λήθῃ, Suidas προσέχειν interpretatur
προσεχῆν hoc est, meditationem, perceptionemq;. Sunt qui
malint τῶν προσεχῶν λήθῃ exponi propinquorum obliuionē,
uel necessariorum.

Mēstruis purgationibus.] Græce est simpliciter κατὰ τὰς
καθάρσεις, mox addit ἡ τὰς κνήσεις, hoc est cū in utero habere
cœperint Celsus apte dixit. In pueris, ueneris, in puellis men-
struorū initiū tollit. Paulus hoc pubertatis uocabulo cōprehē-
dit. Vide Aphorismū septimū lib. 5. ejusq; cōmētariū Galeni.

Si infans adhuc fuerit.] Galenus exiguū quidē, sed elegan-
tem puero eomiciali cōmētariū dicauit: in quo morbi hu-
ius omnē curandi methodum & rationem est cōplexus. Re-
liquarum ætatum meminit etiam lib. 3. de locis affectis.

Mane passum auferetur.] Codex græcus habet κέρασαν-
τα, pro αἰρέσαντα, quod Orosius annotauit. Gemusæus ut
exiguum nimis præterit.

Viciosus
græcus
codex.

Sinapif-
mus.

Sinapismus.] Nempe ut noxii humores ex alto corpore
in extima euocentur. habes autem sinapis oblinendi rationē
lib. 7. Pauli abunde & eleganter expositum.

Iam etiam acrium ciborum esus.] Græce est δρυμφαγία.
Celsus de eodem morbo uerba faciens, acria, inquit, assumat.
Marcellus Dioscoridis interpres, male conuertit uomitionē
acrium ciborum esu concitatam.

Vidi autem quandoq; puellum] Galenus hoc cōmemo-
rat lib. 6. de simplici medicina, ubi de herba Glycyfide dispu-
tat. uidi inquirens puerū totis octo mensibus, morbo liberū &
cū forte fortuna radix à collo cecidisset. rursus cōflictatū, &c.

Inuasuro quidem symptomate. Addidi ad euidentiorē in-
tellectum, communicare morbum aliā obscura nimis esset
sententia, ἐπειδὴν αἰσθάνονται μέρους, id est ubi senserint par-
ticulam, intelligendum affici, uel à particula morbum exci-
tari.

tari. Hæc dixi ne Aristarchi nostri aliquid me præter sensum Pauli assuissse clamitent.

Cum autem remitti.] Græce est ἐν δὲ ἀνέσσειν ἀποθεραπεύειν. In remissionibus autem apothetrapia uti Est aut ἀποθεραπεύειν corroborare & firmare corpus, nec non uindicare à lassitudine. Sequitur autem omnium exercitationem magnam ne corpora in lassitudinem incidant. Hic autē post accessionem corpus ante agitatū recreare non nihil oportet, uel particulam, unde morbus excitatus est. firmare caustico medicamēto, qđ calorē in eo excitet, ne amplius in eā humor frigidus, aut superuacuus cōfluat, & inde ad cerebrū feratur.

Incōueniens ē sublimi cōspectus.] Sic exposui καὶ τὸ ἀτολίζειν ἐξ ὕψους, quod ad uerbū sonat inconniuenter conspiciere ex alto. Celsus uertit clare ē Græcis, loci præcipitis cōspectus.

IN XIII. CAPVT.

MElancholia.] Galenus de hac multa lib. 3. de locis affectis Orbasius eadē lib. 8. habet. Cæterū uno oēs cōsensu dicūt infāniā, mentē ipsā occupare, nūc cerebro ipso peculiari uicio laborāte, nūc toti⁹ corporis affectionē simul experiūte.

Per se ægrotante.] Ita interpretatus sum Græcam dictionem, πρωτοπαθὲντος quasi primario affecto exponas. Idem uero est, per se apud idoneos scriptores, quod nimirum nullo alterius consensu.

Homines auersantur.] Misanthropia est eiusmodi animi affectio, qua quis in solitudine uiuere cupiat, uitet hominum consortia, ut Homerus de Bellerephonte scriptum reliquit.

Qui miser in campis mœrens errabat Aleis,

Ipse suum cor edens, hominum uestigia uitans,
ut Cicero uertit. Dicimus etiam μισανθρωπῆν, & apud Hippocratem ἀπανθρωποποιεῖσθαι, hominum cōsuetudinem auersari.

Inane uiolēter tractent.] Ita exposui διαχειρίσθαι Celsum secutus in capite de phrenitide, ubi habet: Alij consurgunt, & uiolenter quædam manu faciunt. Non sum ignarus διαχειρίσθαι ab Helychio exponi φανέν, quod est occidere, uerū hoc non semper contigit. Tractant quidem uiolēter eos, tum feriendo, tum mordendo, tum alia faciendo. Neque hic debebat Orosius nimum esse grammaticus.

Qui igitur ex primario.] Hæc ex libro tertio de locis affectis ad finē transcripta sunt Reddidi πρωτοπαθὲν primarium affectum,

ἀποθερα-
πεύειν.

ἀτολίζειν.

μισανθρω-
πῆν.
ἀπανθρω-
ποποιεῖσθαι.
διαχειρί-
σθαι.

Orosius.

affectum, qui non ex alterius partis dolentis consensu oritur.
Cæterum omnia remedia melancholiæ Galenus loco supra
citato enumerat præter hoc, una cum decenti animi delecta-
tione, quæ Græcis dicitur θυμωδία.

θυμωδία.

γύργα.

θον.

Aut gestandi grabato intra lecticā insanientibus peculia-
rem.] Celsus ē inquit, maxime suspensi lecti motus. γύργα-
θεν κληνὴ ἐκ τῆς παρ' ἐτους καὶ διαμονικῆς τρεβοῦσι.

IN XV. CAPVT.

Incubo.

Phialten.] Hunc affectum appellaui Incubonem secutus
Scribonium cōpositione centesima, ubi inquit: Facit hæc
compositio ad suspirium, & ad uocis abscisionē, & subitas præ-
focationes ex qualibet causa ortas, & ad eos qui sæpius existi-
mantur ab Incubone deludi. Plinius nocturna delubria noīat.

Nocturna.
delubria.

IN XVI. CAPVT.

Q Vi lycanthropia detinetur.] Hic morbus apud Lati-
nos nomē nullum habet: si ad uerbum interpreteris,
Lycanthropi sonat lupini homines, hoc est, qui lupos imitan-
tur. Auicenna integrum caput de Cutubus hinc transcripsit.

αἰδωῖς.

Oculi ad uidendum imbecilles.] Græce est, αἰδωῖς ἀδρα-
νῆς, quod sonat, uident imbecille. Nam ἀδρανῆς idem quod
αἰδωῖς. Auicenna: Oculi ipsorum sunt debiles & submersi.

IN XVII. CAPVT.

Nota.

A Mores.] Barbari uocant, amor ereos, quasi dicas, amor
amoris. Nam ἔρως Græcis amor appellatur. Auicēna ijscī
nūcupat, ex Paulo multa transcripsit. Habet autem diuersum
de oculis, & sunt, inquit, omnia membra arefacta, præter o-
culos. Paulus refert: Et cum reliquæ corporis partes non colla-
bantur, soli hi amantibus concidunt.

αἰσία.

Pulsus propriè nullus.] Vide Galenū in libello περὶ προγ-
νώσκων, ubi se mulieris amorē ex pulsu deprehēdisse testatur.

Balnei abstinentia.] Orosius legit, ἀλυσία, hoc est bal-
neorū abstinentia, ἀλυσία, hoc est, uinculis ut exponit: quasi
amātes in uincula sint cōiiciēdi: At sequēs snia Pauli facit, ut
αἰσία legendū cēseā. Nā prudentiores inquit, ad balnea,
cōpotationemq; eos ducendos præceperūt. Tu autē cādide le-
ctor, utrā malis scripturā sequere. Nā haud ita multum refert.

IN XVIII. CAPVT.

Q Vando cōmune quidem.] Ex tertio Galeni libro de
locis affectis, & deinde ex octauo Oribasij hæc colle-
cta sunt:

ita sunt. Galenus autē nō meminit dictionis, hemiplagias, quæ ἡμιπλάγια. idē signat quod paralyſis. Ad uerbū si interpreteris, sonat semplexia, hoc est in dimidia parte percussio. Nā uerbū πλάτη, unde apoplexia, & hemiplagia deriuatur, serio, percussio apud nos, significat: unde non omnino male tali percussos affectu, attonitos Celsus notat, quorū scilicet, & mēs, & corp⁹ stupet.

Commune neruorum principium] Cerebrum omnium neruorum tam sensilium, quā mouētium fons & origo existit. Medulla uero secundario neruorū mouentium principium dicitur. Nam & ipsa à cerebro propagatur. At in hoc affectu primum anteriores uentriculi, deinde medius postremo ij qui in cerebello habentur, obturantur adeo, ut ne paxillū quidē spiritus animalis ad medullæ spinalis neruos deriuetur. Vnde sensus, motusq; intercidat, aboleaturq; necesse est.

Quomodo
fiat apo-
plexia.

Ita ut pariter principis animæ] Tres sunt secundū Platonis, Aristotelis, & Galeni sententiam in humano corpore animæ species. Una θυμοειδής, altera ἐπιθυμητική, tertia ἡγεμονία, uel in neutro genere τὸ θυμοειδές, τὸ ἐπιθυμητικόν, τὸ ἡγεμονικόν, ἢ λογιστικόν, ἢ λογιζόμενον. Prima in eorde sedem, ac domiciliū habet. Scd̃a in iocinore. Tertia quæ aliarū dux & princeps est, in cerebro. Merito igitur ea impeditur, uētriculis oībus obstructis, p̃sertim medio, ubi ratiocinatio cōsistere diciē. Sin autem in altera] Hoc est, si alterius partis cerebri tantum, sinus, aut uentriculi, aut quomodocunq; appellare uelis, impediti, obstructiq; fuerint.

Voce inter mortua.] Græce est ἀναυδοί, quod ad uerbum sonat, sine uoce, ut apud Hippocratem ἀναύδους. At Galenus interpretatur, ἀλόγως, quod est sine sermone. Nam αὐδὲ etiā λόγως dicitur. Intellige igitur uoce inter mortua, pro sermonē edere non ualentes, quippe omnes nerui, cum sermone, cum aliarum actionum duces, spiritu animali sunt destituti.

αὐδὲ:

Toruli eleuantur.] Hoc est, ipsæ uenæ attolluntur, quod capitis repletionē testat̃ Græce est τῶν σφαγιτίδων παρῆμα.

Ipsi inhzescunt.] Haud scio cur Oroscius ἐγκείμενα molesta uerterit. ἐγκῆμαι enim ab ἐν & κῆμαι uenit. Nec pituita solum ori molesta est. Imo non adeo molesta est iis quibus sensus omnino perit. Rectius igitur quæ inhzereant, aut eo decumbunt ex capite, auferantur.

Oroscius

Cibus mollis, distribui facilis] In codice Græco habetur

παράλη-

χυλώδης
τροφή.

παράληψέμεθα τὴν ἀπαλὴν καὶ ἐν διόικτον, καὶ χυλώδην τροφήν, quod est: Assumemus tenerum, & distribui facile, & succulentū nutrimentū Celsus lib. 3. de morbo comitiali. inquit: Neq; sorbitiones autem bis, aliq; molles, & faciles cibi, &c. At per χυλώδην quod nos reddidimus succulentū, intelligit cibum ex cremore, uel ptisanæ, uel chōdri, uel alterius frumētī. Nā χύλος cremorē significat, qui in sorbitionibus dari solet.

Vnctioni uero accommodata.] λιπασματα τε σύγχευται τριὰυτα. In Græco exemplari est, quod Celsus expressisse vñ: Vnctione uero, inquit, aptissimū est uetus oleū. Ad uerbum sonat Græce, pinguedines quæ illini queant, huiusmodi sunt.

ἐνταρι-
χείεσθαι.

In quo scilla intabescit.] Græce est ἐνταριχείεσθαι uerbum, quod signat proprie ægros abstinentia immoderata exiccare. Ita scilla in Sole eliquescit, consumiturq; . Celsus etiam dicit: In quo scilla intabescit.

Vitarius
codex
Græcus.

Attendentes.] Male in codicibus Græcis legitur πρόεχον-τας, pro προσέχοντας, hoc est aduertētes. Deinde in eadē snia: διὰ τὸ μὴ συναίσθαιεσθαι εἰ μὴ ὑπερκαυῶσιν pro διὰ τὸ μὴ συναίσθαιεσθαι μὴ ὑπερκαυῶσιν. Quo in loco dū Oroscius alios

Oroscius.

reprehendit, nec locū Græcū emendat, & male uertit ὑπερκαυῶσιν, ne uehemēter urantur: cū Paulus uelit uehemēter quidem, sed nō nimīū, nō supra modū, nec magis quā cōuenit.

φονιγμοί.

Cutis ruborem.] Sic interpretor τὴν φονιγμὸν, Celsus habet: Prodest etiam torpentis membri summā cutem exasperasse, uel urticis cesam, uel imposito sinapi, sic ut nbi rubere ceperit corpus, hæc remoueantur.

Feculæ.] Græce est φέκλης quæ sex combusta dicitur. Gal. lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos ad Achoias, inquit, τρυγὸς οἶνου κικαυμένης, ἣν ξωμάζει φέκλην καλῶσιν. Latina itaq; dictio est fecula, quam Græci imitantes φέκλην nominant. Largus etiam utitur pro fece uini combusta. Hoc ignorabat Oroscius, dum alios reprehenderet.

Oroscius.

Canina cō
uulsio.

Canum more conuelluntur] Verbum è uerbo reddidi. Largus autem interpretatur quid sit spasmus caninus, his uerbis. Facit ad κυνικὸν σπασμὸν, cum in utramlibet partem deprauata est facies. Celsus libro quarto habet: Circa faciem uero morbus innāscitur, quem Græci κυνικὸν σπασμὸν nominant. Is cum acuta febris est, os cum motu quodam peruertitur, ideoq; nihil aliud est, quā distentio oris.

Per narium clysterē.] Græce est διὰ ξινερχύτης, hoc est ad ξινερχύτης.
uerbū per nariū infundibulū, per quod medicamenta in nares
infundūtur Quēadmodū ὠτερχύτης, clyster auricularius, & μι
τρερχύτης uterinus. Celsus lib. 4 cap. 2. fere eadem.

Per rectos siphones.] Sic uidetur Galenus significare, qui καθετήρας lib. 5. Methodi εὐντηγάτους, quasi recto foramine
præditos canales interpretatur. Oroscius rem medicam ex Oroscius.
Celio maluit discere.

Lentisci.] Male in utroq; exemplari habetur σχίνος, quod Codex
est iunci odorati pro σχίνος, nam astringentia in hoc morbo Græcus
requiruntur. deprauatus,

Vitulinumq; & oleum.] In Græco codice deest particula
καί. Nam habetur tantum, στέαρ βουίνον, καὶ χηνίον καὶ μολόχινον
ἐλαίον. Cum sit legendum: καὶ ἐλαίον in fine. Nam molochi-
num oleum nullum dicitur.

Corrige
Græca.

Cum communi curatione.] Hoc est præter communem
resolutorum curationem, quæ medicamētis extrinsecus adhi-
tis, aliisq; absoluitur, etiam hæc quæ sequuntur, facies.

Nostra ætate.] Quod Paulus suo tēpore accidisse in mor-
bo colico commemorat, nos quoq; nostra ætate frequenter
uidemus. Nempe ex magno, diuturnoq; colico cruciatu ar-
tuum resolutionem, præsertim brachiorum, quanquā & cru-
rum imbecillitas summa adfuerit. Iam ex febris quæ humori-
bus ad intestina cōfluētibus, ibiq; dolorē uehementū excitā-
tibus finita fuerit, secuta est artuum resolutio, quod nuper in
Canonico quodā, sed non iuxta regulā uiuēte, sum expertus.

IN XX. CAPVT.

Cum particulæ corporis in anteriora.] Hoc Celsus paucis
comprehendit: Cum mentum inquit, pectori annecti-
tur, emprosthotomos, cum scapulis opisthotonos: cum rectā
& immobilem ceruicem intendit, Tetanus dicitur.

Optimum itaq; præsidium.] Hippocr. lib. 4. Aphorism. se-
ctione 57. Qui convulsione, aut distentione neruorum tuen-
tur, febri superueniente liberantur.

Nonnunquam & risus ipsis Sardonijs oboritur. Dioscori-
des lib. 6 sardona ranunculi genus esse testatur, quæ uescenti-
bus mentem adimat, & quadam neruorum distentione, dehi-
scere in rictus ora cogat, ita ut imaginem ridentium præbeat.

Risus Sar-
donius.

Cucurbitulas adinouere cum lancinatu.] Græce est μετὰ
ἀμυχών,

ἀμυχῶν, quod sonat cum uibicibus excitatis. Sic intelligo hoc loco lancinatum scalpelli.

Orosius. Abstergere, ne imprudentes.] Dum Orosius alios reprehendere instituit, ipse corrigendus uenit, qui tam impure, & nullo sensu penitus uettit, ne perfrigerati occultentur. Videtur autē lexicarius adhuc esse interpres, μὴ λάθωσιν φέξαντες, quod ad uerbum sonat, ne lateant refrigerantes, hoc est, ne imprudentes, nescii, ac non aduertentes, refrigerent particulas.

Hydromeli spissius.] Sic exposui ὑδρομέλι λιπαρὸν, hoc est ad uerbum, hydromel pingue. At nulla pinguetudo in eo habetur. Sit itaq; λιπαρὸν ad pinguetudinis crassitiem incoctum. Nam ad dimidias coqui præcipit.

Orosius. Et laserpicii radices.] Nescio cur hic Orosius succum laserpitij intelligi uelit, cum apud Galenum Dioscoridemq; ipsum, ubi liquoris mentionem facit, οὗ πὸς ponitur. Adeoq; in opisthotonicis. At radicē tum in puluerem redactam, tum decoctam sæpe & in his, & in aliis affectibus dari legimus, ut plane nō sit, quod Orosius in hoc loco uersionē nostram reprehendat. Quin potius in exemplari græco legendū putet ἐμπασθέντα pro ἐμπλασθέντα & ἀφεψίμα ἀντὶς ῥοφείματι, ut sit decoctum ipsius radices. Quid enim est, silphij radices cochlearia duo, aquæ mulsæ cyathis tribus inspersa, uel decocto ipsius dare? Quorsum referri debet, decocto? ad mulsam ne? quæ iā cocta est, quantum opus est. Itaq; ad radicē magis cōpertit. Ea. n. uel pulueris modo inspersa, uel decocta exhiberi pōt.

Græca uiliata.

Myrrhæ drachma ex mulsâ, hyssoρίῳ, decocto] Hic rursus codex græcus deprauatus est, habet enim ἡ σμύρνης < α μελικράτω ὑσσώπω τε ἀφεψίμα. Cum nimirum legendum sit ἡ

Orosius. σμύρνης < α σὺν μελικράτῳ, ὑσσώπω τε ἀφεψίματι, quod Orosius & Basilienensis castigatores non aduerterunt.

Nardi.] Dictum est pro nardini, ut apud Celsum & Scriboniū aliquādo Rosæ pro rosaceo, nardi pro nardino usurpatur.

IN XXI. CAPUT.

Tremoris origo] Vide libellum Galeni de Tremore, quē nos aliquando latinitate donauimus, ubi habet: τρέμος μὲν ἐν γίνεταί τῆς ὀχέσεως καὶ κινήσεως τὸ σῶμα διὰ μὲν αἰτίας. ἢ γὰρ ἐξ ἐαυτῶν δὴ περὶ τὰ μέρη τῶν ζώων οὕτως ὄντα βαρεῖα καὶ κάτω φέρεται πεφυκῆτα, τὰς εἰς ἀπαντὰ τόπον ἔχει κινήσεις. ἀλλ' ἢ διὰ τῶν νευρῶν τοῖς μυσὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐπιπομένην

πεμπομένη δύναμις. ὅσον ὄχημά τι, καὶ πτέρωμα τῆς κινήσεως αὐτοῖς εἶναι, ἢ ὅταν μὲν ἀπολέσῃ τελέως ἀπόλλυσσι δὲ τὰ παραλειμμένα, καταφέρεται καὶ πίττηκᾶτω δίκην ὄρνιθος πτεροβύησταιτος. ὅθεν ὁ δὲ μία κίνησις ὁ πολέπεται τοῖς ὄντω παῖσιν.

Hoc est ut linguarū rudes intelligant: Tremor itaq; fit imbecillitate facultatis, quæ corpus uehit, mouetq;. Quippe animalium particulæ, tam graues cū sint, & deorsum ferri natæ, nō ex seipsis nimirū motiones, in oēm locū habent. Verū facultas, quæ à principio per neruos musculis trāsmittitur ceu uehiculū quoddā, & alia motionis ipsis existit, quā cū prorsus perdiderint, perdūt autē resoluta deorsum feruntur, caduntq; auis penitus destituta modo, unde nullus motus ita affectis relinquit. In oleum descendant. Hoc est in solium oleo repletum, quo olim uti solebant, resoluti, contracti, arthretici, tremuli, Græce est. ἐμβιβαστέον εἰς ἔλαιον. Celsus descendant in solium, ait.

Tremor.

IN XXII. CAPVT.

Q Vanam ex affectione corporis.] Hoc in omniū particularum morbis obseruandum docet Galenus, ut corporis primū affectionem, quam uulgus dispositam appellat, græci διαθεσιν, intueamur. Nam hac neglecta, quicquid particulis admoueamus, sinistre accidit. Cæterum hoc te admonitum uolo candide lector, ubi in uersione mea dictionem inuenis, affectionem, pro διαθεσιν, positam esse, intelligas. Nā dispositio hoc in significato apud idoneos autores nō usurpā.

Affectio.
Διαθεσις.

Perturbatio humiditas oculi est, & calor cum rubore naturæ alieno. Postrema clausula, naturæ alieno, male in codice græco habetur, πρὸς τὸ κατὰ φύσιν. Vbi legendum παρὰ τὸ κατὰ φύσιν.

Græca de
prauata.

Membrana adnata.] Intelligo membranam coniunctam, siue coniunctiuam, ut barbari appellant. Græci τὸν ἐπιτεφυκῶτα, eo quod alii quæ oculum ipsum constituunt, tunicis extrinsecus adnascatur, ligamentum & ipsa existens totiq; oculi ad ossa circumiacentia, ex pericranio ducens originem.

Membrana
adnata.*De defluxionis impetu.*

Angiologiam, arteriotomiam, hypospasium, & petisymphismū.] Omnes has rationes Paulus libro. 6. cōplexus est. Prima est uenarum in fronte ad tempora præfectio quod in hemisphericis etiam fieri solet. Altera est arteriarum retro aures

Angiologia.
Arteriotomia.
Hypospasium.
Petisymphismus.

per

per transversum sectio. Tertia est ab instrumento chyrurgico appellationem sortita, quasi dicas spatæ submissio intra partes quæ à subiectis liberabuntur. Quarta ratio est, quia diuisionem in fronte à tempore ad tēpus transversum molitur, cura tamen adhibita ne tēporaliū musculorū motus uioletur,

Orosius.
Specula-
rium.

Recte huic specularium.] Hic legit Orosius σφεκλάριον, ut significet σφέκλιν, hoc est, ficulam, cupiditate magis reprehendēdi, quàm rōne adductus. Diligēs homo nō legerat apud Galenum hoc remediū citari pro lapide speculario: nec etiā apud Paulū qui lib. 7. hunc in modum habet: σφεκλάριον, διὸ δὲ διὰ μὲν σφεκλάριον. ὅτινες, ἀντι σφεκλῶν ἐν ταῖς δὺρεσι χρωταί, διὸ καὶ διαφανὲς μεσαγορεύεται γυψῶδες ὑπάρχον τὴν ὕστατον, δύναμιν ἔχει παραπλήσιον τοῖς κεκαυμένοις ὀφθαλμοῖς. Si uerò sex cōbusta q̄ ardens est, natura oculis ut ille putat, adhiberi deberet, certe elote elotā esse oporteret.

Ξεροφθαλ-
μία.

Xerophthalmia.] Celsus lib. 6. interpretatur aridam lippitudinem Est enim, inquit genus aridæ lippitudinis, ξεροφθαλμίου græci appellant, neq; tument, neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, & cum dolore quodam grauescunt, & noctu præ graui pituita inarescunt.

Ertropion.

Ertropion.] Hoc uiciū est inferioris palpebræ, qđ parū sursum artollitur, sed pēdet & hiat, neq; pōt cū superiori cōmitti. Id interdū accidit ex mala curatione, interdū ex senectute.

Aegilops.

Aegilops] Est ueluti parua fistula maioris anguli, per quā pituita assidue distillat. Nonnunquam etiam exeso osse usq; ad nares penetrat.

Orosius

Lixiuio quod ex cinere & calce.] Græce habetur absolute πρωτοτάκτω, quasi dicas, primario lixiuio. Paulus lib. 7. habet: εἰ δὲ προσλάβοι καὶ τιτάνου ἢ τέφρα καυτικήν ἐργαζέται τὴν κοίαν ἢ δὴ καὶ πρωτότακτον ὀνομάζεισι. Quæ uerba Orosius non uidetur intellexisse, dū interpretatur cinerē lixiuium, qui primus distillauerit, secutus Hermolaū. Recte igitur quis interpretetur lixiuium, quod per cinerem & calcē distillauerit.

Cum manus opera.] Hoc remedium in exemplaribus uulgatis non est, sed in Lascaris codice manuscripto additū inueni. Si itaq; placet ascribere, aut expūgere, per me certe licebit.

Chalazion.] Celsus sic appellari dicit, quod mobilia, & digito huc, illuc impellantur curationem manu præstendam docet libro sexto.

Encanthia.

[Encanthis naturalis.] Varijs de causis hoc uicium gigni solet. Interim ex ungue parū exciso, uel ob tuberculum, quod palpebras parū deduci patiē. Quod si ungue carūcula nimis abscindat putrescit foramē per quod postea humor descēdit, ac uiciū superiori cōtrariū nascit, quod græci ἐν ᾄδα nomināt.

Tertia samia.] Duplex ea terra apud Dioscoridē habetur, una simpliciter terra samia dicitur, altera γῆ ἄκτις, hoc est, terra alter, quasi dicas, terra stellata. Celsus itaq; ubi posterioris mentionem facit: Terræ, inquit, samiæ, quæ ἄκτις dicitur. Nō ut Orosius uolebat, terræ alteris, obscure nimium. Ceterum ante hoc medicamētum in græco exēplari est διὰ μίλιν perperam pro διὰ ἀμύλιν, quod etiam Orosius annotauit.

De oculis purulentis.] Duæ sunt apud Græcos dictiones, quæ fere in omnibus sibi respondent, nempe ἐπίμυος, & ὑπόπιον. Prima significat pus subesse membranæ corneæ. Largus & Celsus uocant oculos purulentos: altera dicitur, teste Galeno, quasi ὑπὸ ἁώπας, hoc est, sub oculis. Ac ueteres latini hoc uicium appellant, suggillata, genere ecchymomatum cōprehensa. Parum prudenter Orosius, dum in aliorum erratis castigandis occupatur, ipse in grauissimū incidit, qui ἐπόπνοι, quod est, purulentum, conuerterit suggillatum.

Floris æris.] Hoc medicamētū in impressis nō habetur, sed in manuscripto codice Iani Lascaris scriptum inuenitur.

Contritis ad læuorem aridis.] Hoc est, aridis in tenuissimum puluerem reductis. Græce est λεάνιας τὰ ξηρά, hoc est, leuigans arida Celsus autem de Aridis mentionem facit libro quinto, capite uigesimo secundo in hunc modum: Quædam misturæ medicamentorū sunt, quibus aridis, neq; coactis utimur, sic ut inspergamus aut cum aliquo liquido mista illinamus. Alia medicamenta sunt his apposita, nempe quæ liquari possunt. Hæc græcis τηκτά nominantur. Vbi itaq; Galenus alijsq; habet τὰ τηκτά τηκονται, τὰ ξηρά δὲ λεαίνειν δὲ ἢ λειοτρίβειν. Latini scriptores exponunt, quæ liquari possunt, ad ignem liquētur, arida conterantur: Celsus inquit lib. 5. arida ex eo conteruntur. Rursus arida medicamenta cōtrita humore non pingui coquuntur. Item arida ex aceto teruntur. Largus simili utitur locutione, & uerbum λεαίνειν δὲ læuigare oportet, interpretatur. Quæ cum ita sint, immerito Orosius nos reprehendit, negans latine, & fideliter dictum, aridis

ἐλάς.

Terra samia duplex.

Orosius.

ὑπόπιος.

ὑπόπιον.

Orosius.

Arida medicamēta & ξηρά.

Liquida, τηκτά.

Orosius.

contritis, cui magis placet, pulueribus dilutis. Et si apud nulum idoneum scriptorem huiusmodi locutio inueniatur.

Orosius. Sublinimus medicamentis:] Hic quæso candide lector animum aduertat cauillationis Orosii. Damnat me quod ueterim ex græco τῶς πρὸς τὰς παλαιὰς διάθεσις, medicamentis quæ ad ueteres affectiones inscribuntur, ipse enim mauult dici collyriis. Quasi uero collyria non sint medicamenta. Certe ego à præceptoribus meis olim didici substantiam collyriorum, esse & dici medicamenta: ipsum uero nomen collyrii, formam medicamenti indicare. Celsus lib. 6. ita inquit: A secundo die graui quoq; lippitudini per medicamēta recte succurritur. Item in collyrio trygodes. Quo grauior quoq; inflammatio est, eo magis liniri medicamentum debet.

IN XXIII. CAPVT.

AN ob exteriorem causam acciderit.] Ex octauo Orisio hęc mutuatus est. Exterior autem causa est uentris frigidior, aut lauacrum aquæ frigidæ, similiaq;. Hęc itaq; solent interrogari, an ægrotus in ambiente frigido obambulauerit, uel lauacionem frigidam expertus, uel alio modo fuerit affectus. Græcus codex habet ἢ καὶ μόντος ἀνακρίσεως, ubi ἀνακρίσις idem ualeat quod ἐξετάσις. Nonnulli autem lexicarii interpretes contemperamentum uertunt.

Fomenta. Cucurbita ex aqua calida.] Idem Galenus commemorat ex Apollonio, lib. 3. de compositione medicamentorum secundum locos in hunc modum: πυρίαις δὲ χρταίον τὰς διὰ τῶν σπογγῶν εἰς δερμὸν ὕδωρ ἀποβεβρεγμένον, τὶ ταν ἱκανῶς τε ἐκ τεθλιμμένον, καὶ τὰς διὰ τῆς σικίας. Hoc est: Fomētis aut utrum est, quæ per spongas fiunt, in calidā aquā intrinsecas, easq; abundè expressas. Itē illis quæ per cucurbitam adhibetur, &c. Ego itaq; προπυριούμεν ἢ Paulo, uerti fotu prius facto. Quāquam possis dicere, cucurbita prius aqua calida concalsfacta.

Per specillum lana.] Græce est διὰ μιλῶτιδος, quasi dicas specillum auricularium, ut Celsus etiam exponit. Nam eodē capite meminit specilli lana inuoluti, specilli auricularii, & clysteris auricularii, strigilisq;.

Fomentū per arundinem. Vel etiam arundine] Apollonius etiā sententiam recitat, uapore per arundinem perforatum elato. Erit autē alterum arundinis extremum concauitati euriculæ accommodatum, alterum in ollam cutus operculum foramen habeat incūbet.

Decoqui-

Decoquitur in olla absinthium, cuius uapor auditorio meatu insinuat. At hic nullū forū arundine adhibere præcipit. Verum exugi humorem, si quis, forte in aurem receptus sit.

Græca multa.
Orosius.
Cretor.
Basilicus.

Sin aut pauca.] Græcus codex mutilus est, nec Orosius, nec Basilienis castigat aduertit. Deest enim ἡ δὲ, ad integram sententiam explendā, quæ sic legi debet: εἰ μὲν ἂν πολὺ διὰ τὴν σφοδρότητα, καὶ τῆς καλαμίδος αὐτὸ ἐκμηζάνην δέ. εἰ δὲ ὀλίγον, &c.

Cardamomi & nitri.] Galenus libro iam citato legit καρδάμυ ἐκκλόν, καὶ νίτρον βραχὺ σέκε σαρκὶ χωρὶς κεχραμίδων ἀναλαβὼν πότισον κολλύριον, &c. Quod est: Nasturcii, quod facis, & uitri paululū fici carne sine granis exceptū, in paniculum redigito, &c. Verum cardamomi & cardami quod est nasturcii, eadem fere potestas est: nisi quod nasturciū sit ualētius.

Idq; in aurem demittendum.] In græco codice hæc clausula quidem non est, uerum à me addita, ad sententiam absol- uendam. Alexander etiam in hunc modum ex Galeno pro- fert. Hoc te celare nolui.

Nota.

Hyssopum medicamentum.] Hyssopum & herba, & medi- camentum appellatur. Verum ubi herba notatur, simplici uo- cabulo hyssopum dicitur, ubi medicamentū additur ipsa me- dicamenti dictio. Quanquā in eo nulla sit hyssopi herbe men- tio, sed lanarum potius succidarum. Nonnulli autem adiiciūt hyssopum herbam.

Bulborū, polentæ.] Admonuit Orosius græcum codicem esse uiciosū, q̄ habet: βολβῶν ἀφρώων pro βολβῶν ἀλφίτων, &c.

Græca ui- tiata.

IN XXIII. CAPVT.

Linamento ex ellychniis cōtorro.] Varia sunt apud græcos λινάμεν, hoc est, linamentorū genera. Aliud uocāt τρεπτόν, quasi dicas tortile, aliud ξητόν, hoc ē, rasile, aliud τιλτόν, qđ est cōcerptū filatim, aliud ἐλλυχνωτόν ex ellychniis præ- paratū aliud πριαπισκωτόν à pudēdi humani similitudine nun- cupatur: aliud, quod cunei formā referat, aut quia cunei modo foramina obturet, aut cōiuncta separet, σφηνισκος dī Vt Pau- lus sexto uocat σφηνίσκος τρέπτες ἐκ ξάκας, hoc est, cuneo- los intortos ex pāniculo. Adhuc aliud est λινμισκός græcis di- ctū, implicitū in longitudinē linamentū, si Celso credimus, qđ alibi uocat linamentū inuolutū & oblongū. Sicut τρεπτόν li- namentum implicitū, seu intortū simpliciter appellari possit.

Linamēto- rū genera.
τρεπτόν.
ξητόν.
τιλτόν.
ἐλλυχνω- τόν.
πριαπισ- κωτόν.
σφηνισ- κός.
λινμισ- κός.

ἔρεγμός.

P Tisanæ fresæ.] Hoc est confractæ. Græce est ἔρεως ἢ πτισσάνης ἔρεγμῆ. Vt ἔρεγμός significet omne id quod frefum est, uel ipsam confractionem, omnium scilicet, leguminū, nomine tamen ipsorum appposito, ut κριθῆς ἔρεγμός. Cum uerò simpliciter ἔρεγμός ponitur, de faba fresâ dicitur. Quæ si molam experta sit: ἀλδυσρον κυάμινον & ἐρέγμινον ἀλδυσρον appellatur. Ferculum autem ex faba, cicere, & reliquis leguminibus frefis paratum, ἔτ.ος, ex freforum autē farina pulmentariū, λέκυθος Galeno cum alibi, tū in libello de bonis malisq; succis generandis nūcupatur. Quoties autem in Paulo aliisque græcis inuenitur κυάμινον ἔτ.ος, pro faba fresâ elixata ad ferculū intelligito. κυάμινον λέκυθος, pro fabæ fresæ farina elixata ponitur. Sic πτισσάνης λέκυθος, & ὀρόβινος λέκυθος, aliorumq; leguminum dicitur. Vbi uerò hæc uox λέκυθος sola citra alterius adiectionem ponitur, Lutheum oui significat apud medicos, Oroscius male ἔρεγμός pro lomento tantū usurpauit.

Oroscius,
ἔρεγμός.
Ephelis.
Lenticula.

Ad Ephelidem & lenticulas.] Ephelis asperitas quædam & duricies mali coloris est in facie lenticula & in alia partē nō nunquam nasci solet. Celsus ineptias putat curare uaros, lenticulas, & ephelidas.

Suggillata

Suggillata.] Græci uocant ἐπώπια ut antea annotaui. Sūt autem ex genere ecchymomaton, quæ & Hippocrates & alii pleriq; medici appellant cutis affectum, quo uenis in ea tenuibus contusis sanguis inde effunditur, qui ita excretus non uno in loco, nec subito concreuit. Temporis spacio liuescit, nigrescitq; cutis.

Cum melle admoueto.] Galenus habet in eodem medicamēto, ὅξει ἀναλαβων ἐπιτίθει μέλιτος ὀλίγον ἀνακόψας. Hoc est aceto recepta, mollisq; momento subacta.

IN XXVI. CAPVT.

Dentium dolorem] Ex quinto Galeni de cōpositione medicamētōrū secundū locos ad uerbum hoc caput est transcriptū, nisi quod ubi Paulus ad inflātionē habet, Galenus & Oribasius ad dolorem dentium medicamenta subscribunt.

Parulida.

Ad parulidas.] Parulis græca dictio est, ἀπαρά qđ est iuxta, & ἐλγίngiua hoc signat gingiuam. Celsus lib 6. cap. 13. Solent ēt interdum iuxta dentes in gingiuis tubercula quædam oriri dolentia παρυλίδα græci uocant.

Tonfillæ.

Tonfillæ.] Glandulæ quædā sunt in ore utrinq; singulæ penitus sitæ, spōgiis similes, quæ humiditates ex capite recipiant ad fauces humectandis *παρίσµα* græci nominant, quæ si post inflammationem induruerint, *αντίσθεις* appellantur.

Vua.] Græce est *κονίς*, quod ad uerbū sonat columella. Est aut hæc carnosa quædā particula, in summa oris parte suspensa uocis plectrū, recipit ea madorē à cerebro quo superiores palati partes humectat. Si plus iusto humiditatis recipias, interim laxat, ac fastigata descendit, interim inflammationē experit, & ne potius, nec eibus deuorari possit impedit. Vetetes græci *γαργαρεῖνα* & *κόνια* recētiore *κονίδια* appellāt. *σάφη* λην uero quasi dicas uuā, partē ipsā appellari nō uult, sed afficium Celsus aliisq; latini scriptores et partē, uuā nominant.

Vbi æqualiter crassā fuerit.] Paulus præter Galeni morē *κόνια* appellandam particulam censet, ubi in æqualem crassiciem intumuerit. Nam interim tenuis, acuta, albaq; cernitur. Interim una crassa, summa tenuis, & liuida est.

IN XXVII. CAPVT.

Angina.] Apud recentiores medicos uaria sunt anginæ nomina nunc per literā κ, nunc per σ, inchoātia. Ac Galenus cōmēntario tertio in prognostica Hippocratis parū interesse dicit, modo de re ipsa constet, *κνί αγγιν*, an *σνί αγγιν* proferas. Ibidem et tres anginæ species enumerat ex Hippocratis sententia: Pessimè quiens, agunt, qui uehementer quidē dolent nullū autem in ceruice & faucibus symptoma experiuntur. His succedunt, qui quidem non difficulter spirāt, uerū dolent grauitè, collū ipsis intumescit, fauces apparent rubicūdiore. Postremi neq; dolēt, neq; ægrè spirant, ita ut suprema gutturis pars *λάρυγγα* græci nomināt incolumis quidē ipsis perma neat, sed fluxio magna parte biliosior, aut in fauces, aut in collum, aut in utraq; descenderit, &c. Rursus lib 4. de locis affectis quatuor species recenset. Paulus itē noster quatuor enumerat, pro musculorū, uel interiorū, uel externorum inflammationum ratione. Ego sanē musculos primum intelligendos puto, qui in ore circa linguā ex omni parte habentur: qui superiores palatum uersus eam mouent: qui inferiores deorsum, laterales in latera adigunt. plurimi ex ossē 8 græcam literē υ reſ. rente prodeūt. Deinde duodecim proprios, summæ arteriæ parti quā *λάρυγγα* uocant octo autē, cōes, qui scilicet

Species
anginæ.

laryngem corporibus uicinis colligant. necnon eos qui ceruicem constituunt. Iam musculis qui cæso phago subijciuntur, inflammatis, angina quædam oriri solet.

Φάρυγξ. Faucium pharynga græci uocant.] Magna harum uocum ambiguitas apud authores inuenitur. Vnde fit, ut pleriq; græcorum librorum interpretes mirum in modum torqueantur & subinde etiam aberrant. Itaq; φάρυγξ duo significat, nempe fauces, & asperam arteriam. Fauces dico regionem intra os, ubi tum gulæ, tum asperæ arteriæ extrema concurrunt. Grammatici genere distinctionem faciunt hoc pacto: φάρυγξ θυλάχως σημαίνει τὴν κυρίως φάρυγγα ἢ δὲ ἐστὶν ἡ ἀχανεία ἢ μετὰ τὴν τῆς γλώττης εἶζαν ὅτε δὲ ἀστυνικῶς σημαίνει πολλὰς τὸν λάρυγγα. Quæ uerba sonāt ita Pharynx feminino genere prolata, proprie dictam pharyngē, hoc est fauces significat: Hæc autem est oris ampla capacitas post linguæ radicem sita. Masculino autem genere diuictis pharynx, laryngem, quod est, arteriæ asperæ summum uel ipsam arteriam signat. Hippocrates libro prognosticon per dictionem φάρυγγα in feminino genere fauces etiam intelligit, cum ait: φάρυγξ δὲ ἐλκον μέν σὺν πυρετῷ θεινόν, Paulo post, αἱ δὲ κυνάχαι θεινότεαι μὲν εἰσι, καὶ τάχιτα ἀναίρεσιν, δόσαι μὴ τ' ἐν φάρυγγι μηδ' ἐν ἐκδηλον ποίεουσιν, hoc est: Anginæ grauissimæ sunt, & cito interimunt, quæ neq; in faucibus, neq; in collo quippiam manifestum edunt, &c. Hanc sententiam Galenus exponens inquit: ὅτι φάρυγγα τὴν περικειμένην χῶραν τομάκων τε καὶ λάρυγγος ὀνομάζει, δηλον ἐστὶ. Hoc est. Quod pharyngē nominat regionem, gulæ & asperæ arteriæ summo præpositā, nemo ignorat. Rursus φάρυγγα δὲ τὴν ἐν τῷ θανάτῳ τὸ σῶμα, καὶ πηλῶσαι τὴν γλώσσαν κάτω φαινόμενιν ἐνυχορίαν εἰ ἢ τὰ δύο σῶματα ἐστὶν τότε τῷ τομάχῳ, καὶ τῷ λάρυγγος. At pro larynge, & aspera arteria positam, non solū in masculino genere, ut Suidas putat, sed etiam in fœminino inuenias: præcipue apud Galenum, ut secundo de placitis Hippocratis & Galeni: τὸ μὲν γὰρ τῆς τραχείας ἀστυνείας ἢ περὶ δὴ καὶ φάρυγγα προσαγορεύομεν. Ibidem, ἐπὶ δὲ τῇ τοῖς ἀπασιν ἐξῆς ὑποδείξομεν σοι τὸ τῆς φωνῆς ἴδιον ὄργανον τὸν φάρυγγα, καὶ τὴν κινῶντα αὐτὸν λῆς. Hic pro larynge accipit: de qua ita scribit, octauo de usu particularū: καὶ τόγχι πρῶτον τε καὶ κυρίωτα τὸν ὄργανον τῆς φωνῆς ὃ λάρυγξ ὀνομα, τὸ ἀνωπύρας ἐστὶ τῆς τραχείας ἀστυνείας ἢ δη καὶ

ὅτι καὶ φάρυγγα καλεῖσιν δμῶνί μιν, τῇ περὶ τῆς λάρυγγος, hoc
 est: Ac primum, principalissimumq; uocis instrumentū, quod
 larynga nominant, superior pars asperæ arteriæ existit, quam
 sanè etiam pharynga uocant, eodem nimirum uocabulo quò
 pharynx (id est, fauces) ante arteriæ asperæ caput, nuncupa-
 tur. Atq; hici in feminino genere ut superius in masculino po-
 situm est nomē pharyngis, contra grammaticorum opinionē.
 Pollux audiendus non est, qui τὸν φάρυγγα masculino gene-
 re prolatum, pro gulæ extremo accipiat.

λάρυγξ.

Pueris raro talis.] Pueris iterim uertebrae colli è loco suo
 excidūt propter ligamentorū quæ eas cōnectūt imbecillitatē.
 Vnde angina periculosissima oriē, quæ nullis cedit remediis,
 quare ei admouēda manus non est. Intelligenda aut sunt hæc.

Nota,

Pueris raro talis.] Raro quidem, sed tamen interdum an-
 gina hæc accidit, idq; in pueris magis, quàm adultis, ob cau-
 sām superius dictam. Hippocrates huius meminit lib. 2. περὶ
 ἐπιδημιῶν in istum fere modum: ἢν δὲ τῶν κυναρχικῶν παθή-
 ματα τριᾶς, τῆς τράχηλον οἰσπόνδυλοι ἔσω ἔξῃ, τῆς μὲν
 πιπλέον, τῶν δὲ ἐπ' ἐλάττων.

Porro ex strangulatis.] Hippocrates lib. 2. Aphorismorum
 hanc profert sententiam τῶν ἀπαγχονημένων καὶ καταλυομένων
 μήπω δὲ τιθιμύτων ἐκ ἀναφύεσθαι οἷς ἀνὰ φρένας ἢ περὶ τὸ στο-
 μαχόν, hoc est, Quibus strangulatis, solutisq; nondum uero mor-
 tuis spuma circa os extiterit, non restituntur.

Discussis autem colli.] In græco codice est διαλυομένων δὲ
 τῶν περὶ τὴν τράχηλον ἐρυθμμάτων, quod antea uerterā. Simu-
 latq; uero colli impedimenta dissoluuntur, intelligens nimi-
 rum uincula quibus strangulantur.

Aduerte,

IN XXVIII. CAPVT.

Grauedo.] Celsus libro quarto distiones græcas elegāter
 exponit, κορυζαν grauedinem nominās, καταάγμους, uel
 ut Paulus habet, καθάρους distillationes.

κόρυζα.

Aquiloniis diebus.] Græce est ἐν βορέαις καταιγίαις, qd
 est aquiloniis aeris statibus seu constitutionibus. Ego Celsum
 secutus sum.

Tussis.] Tussis uariis de causis excitatur, nūc ob intēperie, Tussis.
 nūc ob humores, uel tenues, uel crassos ex alto descēdētes. In
 iterim ob iocinocis inflāmatōē: iterim ob pulmonis affectū
 Anapho-
 ticos.] Interpretatus sum eos q. ægrè reiciūt, scili-
 tici.

cet qui crassa glutinosaq; ex pectore reiciunt, hi enim difficulter propter crassiciem educunt. Sunt qui ad sanguinē reijcientes referant, mea opinione, incommode.

IN XXXIX. CAPVT.

Qui febris expertes.] Galenus lib. 7. de compositione medicamentorū secundum locos copiosius hæc, Aetius item & Oribasius ante Paulum pene eadem tradiderunt: non autem eo compendio quo Paulus, usi sunt. Cæterum ἀσθμα suspiriū uertit: quod latine etiā dici possit anhelatio.

ἀσθμα.

Acetum scilicet.] Valētia hic commemorat medicamenta, purgationemq; fortissimā, ea nimirū ratione, q̃ multas numero partes pertransire oportet, antequā ad pulmonē perueniāt, nepe os, gulam, stomachum, uentriculū, tenuia intestina, uenas meseraicas, uenas in sima parte iocinoris, item eas, quæ ī gila habētur, hinc uenā cauā, postremo pulmonē.

IN XXX. CAPVT.

Tunica oculi ceratoides.] Ex octauo Oribasii hæc sunt transcripta, Dixi autem in pinguetudinem lāguēscit, pro modice aut leuiter pingues sunt, græce est ὑπολιπαροὶ φαίνονται, hoc est subpingues apparent. Locutio est Pliniana in pinguedinem lanquēscit.

Explicata sententia.

Suffragantibus qui huc req.] Græce est ἐπιτρεπόντων μὲν τῶν εἰς τὸ αἶμα, hoc est ad uerbum, permittentibus quidem ad hoc numeris. Quæ sententia obscura quibusdam uideri possit. Hoc autem sibi uult, omnibus quæ huc requiruntur, indicationibus consentientibus: nempe uiribus, morbi natura, ætate, & aliis id genus reliquis.

Hydrosafū Aetij iunioris.

Hydromalo.] Hoc est potione dulci ex malis. Cotoneis, melle & aqua confecta.

Hydrosafato.] Huius etiam misturam Paulus libro septimo exponit, ex rosīs, aqua & melle. Recentiores autē græci, ut actuarius paulo delicatescentem compositionem hydrosafatum appellant, ea recipit aquæ libras decem, Zuccari libras quinque, hæc seruescunt una donec spissitudo fiat: postea additur succi rosarum libra. Febribus conuenire dicunt.

Oroscius Castigator codex.

Idem in sparsam.] In Græco codice est ἰσως ἐμπεπλασμένης, male nimirum, pro ἰσως ἐμπεπασμένης quod Oroscius & Basiliensis castigator mutare noluerunt.

Epithema.] Hæc dictio quidem in Græco non est, sed intelligenda

telligenda uenit. Nā Aetius eam apponit. Cæterū per resinā, intellige terebinthinam, Per medullam, ceruinam. Nam ista sunt excellentiæ uocabula, Per æsypum quod in Græco est, ὑσσώπος, intellige medicamentum liquidum in septimo descriptum. Aetius legit οἰσώπου ὑγρῷ, hoc est æsypi liquidi. Cæterum iridē siccam mandi detritam, ac in puluerem redactam.

IN XXXI. CAPVT.

CRuentum sputum.] Tribus potissimū de causis sanguis per os educitur Vel enim exesa parte aliqua uenosi generis, uel rupta, uel ore alicuius uenæ patefacto Primam διαβρωσιν, secundam ῥήξιν, tertiam ἀνατομωσιν Græci appellāt, authore Celso lib. 4. At sanguis uel confertim uel paulatim erumpit. Vase quidē eroso sensim educitur, nisi magna adeo sit iactura, ut etiam pars aliqua pulmonis, uel eius cartilaginis reiciatur, aut si casus ex alto, uel compressio uel aliud id genus superuenerit. Rupto autem cumulatim prorumpit, ut in aperto quoq; ore fieri solet. Paulus à Galeno dissentire uideē cum ait, εἰ δὲ κατὰ διαβρωσιν ἢ ἀθρόως, ἀλλὰ κατὰ βραχὴ τῷ αἵματος ἀναγωγῇ γίνεται Nam ille quarto de locis affectis libro inquit, αἰ δ' ἐξ ἀναβρώσεως ἀθρόα κενώσεως αἵματος ἐμίτε προηγεμέναις γίνονται βραχείας τίσεσι καὶ τοῖς εἰς τῶν πνεύμονα δρόμοις εὐμασι. Hoc est: At cumulatæ sanguinis euacuationes ex erosione post pauca fiunt sputa, & acres in pulmonem fluxiones, &c. Quomodo igitur hæc cum Pauli uerbis consentient? Aetius lib. 8. in istum modum litem dirimit: Quibus ex erosione uenarum pulmonis,eductio sanguinis cōtingit, his per interualla modica sigillatim expuitur. Mox subiicit. Fieri etiam potest ut ex erosione sanguis coaceruatim erumpat. Cum enim præcedenti tempore paulatim quis expuerit sanguinē, nec diebus insecutis uel casus, uel alia quædam causa uiolenta superuenerit, sanguinis tamen eruptio multa prodierit, magnam subesse erosionē oportet, &c. Itaq; primis diebus paulatim ex erosione sanguis reiiicitur. Si actio res fluxus in pulmonem destillarint, quæ magnam erosionē pepererint, confertim prorumpit. Non possum satis hoc in capite Oroscium demirari, qui pro dictione Græca πλῆθος multitudinem uerterit, tantus medicus ut ipse uideri uult.

Quærens membrana.] In Græco est δριὺς τὸ ἐνῶδες, καὶ τὸ ἐπὶ τῷ κελύφῃ τῆς βελάνης. In septimo tantum, ὑμενῶδες legitur.

διαβρω-
σις.
ῥήξις.
ἀνατό-
μωσις.

Oroscius.

legitur. Dioscorides habet τὸ μεταξὺ τῆ φλοιῆ καὶ τῆ πρεμνοῦ ὑμενοδῆς. Prima est interior & subiecta cortici tilia quæ ligno membranacea coheret, altera tunica putamini glandis subiecta ὑμενοδῆς itaq; sit ὑμενοδῆς. Vtraq; astringendi uim obtinet.

Mēbranæ
quercus.

[Phagi autem & ilicis mēbranæ præstantiores sunt.] Gal. lib. 6 de simplici medicina eadem fere habet σφοδρύτερον δ' ἐστὶ τὸ ὑμενοδῆς καὶ πρίνος. Intellige τὸ ὑμενοδῆς.

Lectiōnem
obserua.

[Cochleare unum.] Exemplum Græcum Basil.ensis habet κοχλιάρια, ἃ hoc est cochlearia uudecim. quæ mēsurā magna est nimis, eoq; legendum κοχλιάριον. ἃ.

ἐπόραι.

[Fructibus.] In Græco erat ἐπωρών, alias uerti poma, quod scilicet lignosi nihil habeant. uerum hic reeñset etiam malū punicum extrinsecus durum, ob quam causam, fructibus, dixi, quia latius patet, fructus quā pomum. Et differētia superius exposita nonnunquam confunditur.

IN XXXII. CAPVT.

ἐμπύμα

[Puris illuuiēs.] Sic interpretatus sum ἐμπύμα: quasi dicas puris in parte aliqua collectio. ἐμπυοι Purulenti Plinio uocantur. alii exponunt, pectore suppurati.

IN XXXIII. CAPVT.

[Leuritis.] Celsus interpretatur laterū dolorem lib. 2. & 4. Huic, inquit, accedit febris & tussis. In Græco uerbū est συνεδρεῖται, quod signat, simul accedit, afflitt, ac quasi indiuia est.

Iugulum
præcordia.

[Usq; ad iugulum & præcordia.] Alii dicunt usq; ad clauiculam, & hypochondria. Ego Celsum imitor, qui clauiculam seu κλειδ' iugulum exponit, & ὑποχόνδρια, præcordia. Distinquit autem postea, quando ad iugulum dolor, quando autem ad præcordia pertingit.

[Pulsusq; durum & ferræ modo inæqualem.] Hæc pulsus species secundo libro exposita est. Galenus eam aperte interpretatur libro quarto de pulsum causis in hunc modum: εὐλόγως ἐν σκληρότερος ἅπασιν τοῖς ἐπὶ φλεγμοῦ πυρεττοῦσιν ὁ σφυγμὸς γίνεται, καὶ προσέτι γε διὰ τὴν ἐν σκρᾶσίαν τὴν ἐν ταῖς ἀρτηρίαις ἀνώμαλος κατὰ μίαν προσβολὴν, καὶ δὴ λονὼς ἀμφοῖν συνελθόντων τὸ εἶδη μένον ὑπότινεν εἶδος εὐταὶ τῷ σφυγτῷ σφυγμῷ, τὸ οἷον ἐμπρίον τὴν αβήν. οὕτω γὰρ ἀνέγκη φαντασιῶσαι τὸν ἀπτόμενον ὁργάνου σκληρὴ τὴν προσβολὴν ἀνάμεινον ἔχοντας. Hoc est: Bona itaq; ratione omnibus qui ob in-

Pulsus
ferrans.

flammationem

flammationem febricitant pulsus oboritur durior. Præterea ob intemperiem arterias obfidentem inæqualis in uno ictu, & nimirum ambobus coeuntibus pulsus erit species à quibusdam dicta, ueluti serra tangentis manum secās. Ita enim necesse est imaginari eum qui tanget durum instrumentū quod occursum habet inæqualem.

Quæ nihil emolitur.] Hoc est, qua nihil exspuitur. Sic Celsus loquitur libro quarto.

Atq; si tunior purulentus.] Hoc est ex inflammatione musculorum externorum collectus, nisi dissipetur, in exteriorem partem scalpello incidi debet. Græce est ἐπὶ τὰ ἐκτὸς ἐπιτμηθῆναι παραγίνεται, quod ad uerbum sonat, ad exteriora incidi cōmodo est. Nam παραγίνεται signat βοηθεῖν, ἐπικυρεῖναι. Hoc Oroscius in Albano quem ferè in singulis uerbis reprehendit, non adnotat.

Illā nanq; nisi uel extra, uel intus.] Hoc est, nisi per os, uel per aluū fuerit expurgata. Foras. n. per cutē purgari non pōt.

Remedium est sanguis dimissus.] Non dicit qua ex parte mitti debeat Hippocrates sane lib. 4. de uictus ratione in morbis acutis manifesto docet his uerbis: ἢν μὲν δόνη ἄνω περὶ τὴν πρὸς κλινίδα ἢ περὶ μασθον καὶ βραχίονα τέμνειν χερὶ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τίνῃ ἔσω ἐφ' ὁκότερον αὖν ἢ τῶν μερῶν κατὰ τόδῃ. Hoc est: Siquidem dolor sursum ad iugulum, aut circa mammam, aut brachium pertinent, internam brachii uenam secare oportet, illa nimirum parte, qua dolor fuerit. Galenus exponens hæc ait: Cubiti internam incidere conuenit illius partis, qua dolor fuerit. Oribasius capite de sanguinis missione habet: Pleuriticis autem ex ipsa parte quæ dolet auferendus est sanguinis. Hæc obiter posui candide lector, ut isti. Arabum sectatores uideant, ueteres illos ex eadē parte initia semper, non ex aduersa sanguinem detraxisse.

Pleuriticis
unde mit-
tendus san-
guis.

Solidiore utetur cibo.] Græce est καὶ τῇ ἀδρότερα. Nam λεπτότερα, hoc est tenuior, seu qui extenuet, ut est, mulsæ forbitio ex prisana chōdro, aliisq; opponitur δρότερα, q. recte dicitur solidior, qui uidelicet magis nutrit. Gal. interpretatur ἢ παραβύσσα τρέφει, quod est adaugēs alimentū, quod Celsus dicit ualētis materiz. Vt enim tenuis cibus corpori parū adiicit, aut nihil, sed uires tm cōseruat pro tātillo tēpore, sic solidior plus corpus alit. Nō est quod Oros. alios reprehēdat, uertētes

Cibus so-
lidior,
ἀδρότε-
ρον.

ἐδρότερον

ἀδρᾶτερον solidius. Non nego aliquando plenius posse dici.

IN XXXIII. CAPVT.

Cordis affectus.] Gal. cum in quinto de locis affectis, tum uero secundo in librum Hippocr. de ratione uictus in morbis acutis commentario de cordis affectibus pene eadē tracta uit Principia itaq; tria in humano corpore existunt, cor, cerebrum, hepar. Hæc autem interim per se afficiuntur, interim ex consensu tum mutuo, tum aliarum quarundam partium. Corde itaq; affecto per se, præsens est periculum: secundum locum obtinet cerebrum, postremum iecur. At si ex uentriculi dolore, cor afficiatur, syncope oritur, si cerebrum consentiat, delirium, uel conuulsiones.

Syncope
differētiæ.

Syncope appellatam.] Syncope totius habitus est resolutio. Sunt autem aliquot eius species, cardiaca scilicet, quæ intemperiem cordis, uel inflammationem, uel erysipeles sequitur. tomachica quæ ab oris uentriculi affectu, corde simul confortii lege dolēte generatur, Flatuosa, ex cruditatib. constituit.

παλμός.
Palpitatio

Noui inquit.] Lib 5. de locis affectis hanc historiam commemorat Galenus, unde etiam hæc sunt transcripta. Est autē palpitatio quam Græci uocant πάλμον, qui est teste Galeno περι τῶ μόνου καὶ παλμῶ, καὶ σπασμῶ, καὶ ξίγους: διὰ τὰ σπῆλαι καὶ συνήχησις παρὰ φύσιν, ac omni parti accidit palpitatio, etiam immobili. Causam eodem libello Galenus ostendit his uerbis πνῆμα παχὺ καὶ ὡτ μᾶλλον ἐκ ἔχον διέξοδον, hoc est spiritum crassum, & uaporosum qui non habeat exitum. Cordis autē palpitationem humor aliquando generat, in ambiente cor tunica quam pericardion: Anatomici uocant, collectus.

IN XXXVII. CAPVT.

Nam si sola.] Ex octauo Galeni de compositione medicamentorum secundum locos, & ex Oribasio hæc sunt tractata. Paulus dixit, sola, ubi Gal. habet ἐμικτὴ τῆς τοιωτῆς δυνάμεως hoc est, non admixto corroborante præsidio.

Omphacii drachina.] Omphacium est uuae acerbæ succus: quem Barbari agrestem uocant Male in Codice Græco legitur ὀμφανίνου pro ὀμφανίου. Oroscius neglexit.

Oroscius.
Castigatur
codex.

Augendus autē.] Vitiōse legitur in Græco exēplari παρὰ ξένου pro παρὰ ξένου, quod ēt uterq; Aristarchus præterit.

Oroscius.
Deprauatus
codex.

Aloe trita inspargitur.] Græcus Codex perperam habet ἐπιπλάσσειται pro ἐπιπάσσειται nec hoc aduertentibus Aristarchis,

starchis, sicut ē paulo post ἐμπλάσας pro ἐμπάσας habet.

De cibi fastidio.

SI cibus quodammodo præter uoluntatem.] In Græco **C**o
dice est, ἢ βιασθέντες τὴν πρᾶξιν αὐτῶν. Huic respondet
Gal. hoc ad Glauconem primo: οἱ δὲ ἐν θυῖ τὴν στομάχου φαύ
λως ἰσχοῦσιν ὥστε ἀποστρέφειν τὰ σιτία, καὶ ἢ βιασάμενοι
λάβοιεν, ἢ μὴ κατέχουσιν, ἢ μὴ πέττειν καλῶς, hoc est, quidam ue
ro statim os uentriculi habent affectū, ut cibos auerferant, &
si coacti assumpserint, aut nō retineāt, aut male concoquant.

Quam Romam Meleam.] Cōstātinus Cæsar Meleæ præ
parationē lib. 18. de agricultura tradit. Est aut lac in feruētes
ollas, quæ iam acetū incalescēdo absorpserint, reconditū aci
dumq; redditū, ut species eius quod oxygala dī, uideri queat.

Condito.] Constantinus Cæsar lib 8 condici præparatio
nem in hunc modū tradit: πεπέρως πεπλυμένε καὶ ἐφυμέ
νη, τριβομένου ἐπι μελῶς γράμματα ἢ μελιτος ἀττικῆς εἰσ. α.
οἶνε παλεῖ καὶ λυκῆ ξηρας δ.

Maloplacuntion.] Hoc est placentula ex malis Cotoneis.
Paulus lib. 7. latius exponit.

Sorbicionibus ex oleo.] In Græco codice ἐν τῷ male le
gitur pro ἐκ τῷ ἐλαίου. Gemusæus uiciosum reliquit exēplar.

Aloe, masuchæ.] Masucha cōpositio, nō simplex remediū
existit. habes eius descriptionem lib. 7. Pauli expressam.

IN XXXVIII. CAPVT.

CVM tormine intestinorū.] Græca dictio est στέρφου, quæ
Largo tormina intestinorum significat, quanquam & do
lorēm stomachi haud absurde interim interpreteris licet.

Exigua caliditate.] In Græco est, ὑποθερμότης χλιαρῆς,
quasi dicas caliditate tepida Aetius mediocri dixit.

IN XXXIX. CAPVT.

Cholera est immodica.] Cholera commune stomachi &
intestinorum uicium uideri potest. Nā simul & deiectio,
& uomitus est, præterq; hæc, inflatio, intestina torquentur Bi
lis supra, infraq; erumpit.

Hydromalum.] Hoc est aqua ex malis Cotoneis præpa
rata scripturam eius habet lib. 7. Paul. sumitur autem & per
se porui, & cum micis panis.

Horarios seu fugaces.] Alias exposui qui sint horarii quos
Plin.

Melca.

Conditiū.

Castigatur
codex.

Plin uocat temperarios & tempestiuos. Sunt autem hi qui diu offeruari nequeant.

Suum petunculi.] Hoc est suum pedes Celsus alibi Trunculos niderur nominare suū pedes inter ea q̄ bani sunt succi.

IN XL. CAPVT.

Leuitas
intestino-
rum.

LEnteria.] Celsus ad uerbum interpretatur hāc uocē, leuitatē intestinorū nominans. In hac cibus nō cōtinetur, & quicquid assumptum est, imperfectum protinus redditur.

Cerata ex myrteo.] In græco legitur κερωταῖ δια μυσσίνης pro κερωταῖ σιὰ μυσσινίνης quod est, Cerata ex oleo myrteo. Sic etiam Aetius habet.

IN XLI. CAPVT.

ἀπαρά-
τητος.

Implacabilis desidendi.] græcè erat ἀπαράτητος προθυμία πρὸς ἑκκρίσιν. Celsus ponit frequens desidendi cupiditas: ἀπαράτητος signat ineuitabilis. Melius sonat hic implacabilis, frequens & assidua est. Quidam τεινισμὸν scribendum putant à uerbo τείνω, quod est tendo.

IN XLII. CAPVT.

LAtini tormina.] Celsus lib. 4. ita inquit, Proxima his inter intestinorum mala tormina esse consuerunt, δυσεντερίᾳ Græcis uocantur. Vide Galeni librum sextum de locis affectis, Oribasii librum nonum.

Tenesmi mutatione:] Græce est ἀν μεταπτώσεως τενεσμοῦ, quasi dicas ad uerbum ex decidentia tenesmi, cum uidelicet Tenesmus in dysenteriam degenerat, transit, mutatur.

Corrigitur
codex.
Orosius.

Deinde leuiter subcruenta.] In Græco male habetur οἷα πρὸς γόγον αἵματώδεις pro οἷα πρὸς δλίγον αἵματώδεις. Celsus etiam quodam loco interpretatur. Leuiter subcruenta. Orosius & Gemusæus non annotarunt.

Cochlearum integro tostorum.] Græce est κοχλῶν ὅλων quod sonat cochlearum totarum, quod nostri dicūt, cū toto.

IN XLIII. CAPVT.

Nota.

Colon.] Hoc intestinum apud Latinos scriptores uaria sortitur nomina, nunc intestinum crassum, nunc plenius, nunc laxius appellatur, Paulus dicit, cū pars sit intestini crassi, hoc est, recti. Nam rectum octo fere digitos longum, statim colon uocatur, quod tenuibus est crassius. A sinistro rene ad dextrum super uentriculi fundum fertur, donec sæpenumero & lienem, & iecur attingat. Quod dicit aliquis quod Paulus contra

contra Galeni sententiam à dextra ilium regione peocedere colon pronunciat. Huic respondet Si à tenuibus intestinis numeremus, per dextra ilia prius superuectum colon ad sinistra prodit. Sin à recto incipiamus, à sinistra parte incipit, in dexte riorum obliquum conuertitur.

Ex cruciatur præsertim sensu.] Græce est ἡ δόνησις γίνεται, μάλιστα δὲ κατὰ θέσιν τῆ κώλου τρυπαῖδος συναυδήσεως γινόμενης. quod ad uerū sonat. Color oritur, maxime uero iuxta sitū Coli, cerebali (ut sic dicam) sensu excitato. Galenus hanc doloris speciem lib. 2. de locis affectis exponit his uerbis, οἷα δὲ καὶ ἐμαυτῷ ποτὲ συμβάσαι δόνην σφοδρετάτην, ὥς τρυπάνω δοκῆν διατιτρεῖσθαι κατὰ τὸ βάθος τῆς κοιλίας. Rursus in eodem capite, τὰ μὲν διὰ ταῦτα τῶν ἀλγημάτων ὥς ἐπὶ τρυπάνω φαίνεται γινόμενα.

Dolor coli qualis.

Brassicæ caule probe polito.] Græce erat κραμβῆς καυλῷ καλῶς ἐξεμμένῳ Orosius intelligit per ἐξεμμένῳ, cocto, quod ἐξεσμένῳ potius significasset. Præterea Dioscorides leuiter seruata, si edatur, aluo idoneam: percoctā uero aluū sistere.

Iubebis ut lauent, incalescantq; laconico.] Ad humorem pituitosum concoquendum consulit naturales balneas, & Laconicum. Est autem Laconicū etiam hodie adhuc in usu, testudo, illa thermarū, quæ igne concalfacta vaporem sicci excitat, qui deinde sudorem mouet in corporibus: Columella meminit his uerbis, quotidianam cruditatem laconicis excoquimus, & exusto sudore sitim quærimus Græca sunt πυριῶσαι ἐν διαπύροις τόχοις, quasi dicas desudare intra ignitos parietes. Non opus erat ponere ignitos parietes, cum Laconici uox hoc cōprehēdat, sed ut sciolis quibuldā fiat satis, apposui.

Laconicū.

Cucurbitæ quāmaximè cū flamma.] Sic interpretatus sum σικκῶσαι ὥς μέγιστα διάπυροι, quasi dicas cucurbitæ quāmaximè ignitæ. Celsus cū flamma dicit, quem imitatus sum.

Tāquam in crisi, causā.] Paulo pluribus uerbis reddidi hanc sententiam ὥς περ ἐν κρίσει μεταβάσεως τῆς αἰτίας, hoc est ad uerbum, tanquam Crisi causā mutata. Is autem sensus est, Colicus hic morbus tandem ex intestinis materia tanquam per crisim expulsa in alias partes finitus est.

IN XLIIII. CAPVT,

I Leos.] Morbus hic nomenclaturam ab ipsa parte affecta, ut superius, colicus, accepit. Nā tenue intestinum, uti ieiunum etiam

Ileos.

etiam dicitur. Incipit, si ab imo incipias à cæco, & desinit in ieiunum, in uarios implicatum orbes. Quidam recentiores morbum nocant Voluulum.

Voluulus.

Colica affectione.] Hoc Paulus superius dixit ubi habet: Inter colicas affectiones hæc est grauissima, quæ in Ileū transi- tionem mittatur.

IN XLV. CAPVT.

Colicis in dexteriore potius ilium.] Quia per dextra ilia superuectum, uentriculi fundo incumbit lineam & iecur attingens: deinde ad sinistra prodit, si de superiore ipsius initio, cæco intestino, dici intelligas. Nam infra sinistram magis partem occupat.

Eiusdē lateris ac è.] Hoc signat græce κατὰ δεξιὰ & κατὰ ἄριστε- ρα si Galeno credimus. Hippocr prior his dictionibus usus est.

Hoc inspergi potest.] In codice græco perperam scriptū est κατὰ πλάτον, pro κατὰ πλάτος. Nam de puluere, nō empla- stro mentio est. Aristarchi libenter omiserunt.

Oroscius.

Acroto-
melli.

Phyllis; momēto ex mero & melle.] Hoc est, phylli mo- dico cū mulso Nam ἀκρατό μελι nihil aliud est, quàm οἶνός με- λι. Contrariū est μελικράτον, quod uidelicet ex aqua & melle confit. In græco erat εὐκρατομέλιτος pro ἀκρατομέλιτος.

Iniectione recti syphonis.] Lib. 7. hanc rationem indendi canalis recti in uesicam habes expositā. Vocant καθηκτισμόν ab instrumento κατεκτῆρες. Solent autem quassationes corpo- ris simul adhiberi, ut calculus facilius excidat.

Ex uino & oleo rosaceo, uel ex aqua & oleo.] Græce est εἰς οἶνον ῥοδίνον ἢ ὑδρῶς ῥοδίνου. Quidā de uino rosaceo, & aqua rosa- ceo intelligunt; male nimirū quia ῥοδινὸν per se oleum rosa- ceum significat. Herimolaus barbarus in corollario suo, pace illius dixerim, oxyrhodinū interpretatur, acetum rosaceum, pro aceto & oleo rosaceo, ut Galenus, & alii græci accipiunt.

Hermo-
laus.

Archigenes in epistola.] Idem refert Aetius sermone un- decimo. Ad finem deest particula, in græco habetur enim σι- κίου σπέρμα κακαθαρμένον ἀριθμῶ. λ. cum legendum sit, σικίου ἡμερῶ σπέρματος κακαθαρμένον κόκκους ἀριθμῶ. λ. Paulo post, amyli cochlearia duo. Perperam character, qui heminam si- gnat, ac legendum est. Κοχλ. ut sit cochleare. Iterum: σικίου σπέρματος ἡμερῶ pro σικίου σπέρματος κόκκους ἡμερῶ.

Depraua-
tum exem-
plar græ-
cum,

Nonnihil

Nonnihil ex uena laxant.] Hoc est ut latius exponit Aetius, ex uena caua propter amplitudinem osculorum remittunt. Interim per circuitus hoc mali repetit. Per initia ægri nihil mali sentiunt, eoq; nihil tentandum. Sin autem perseueret, occurrédū, alias grauidima sympt. mata solēt prouenire.

Aut lixiuium.] Simplici uerbo dixit Paulus ἡ φρακτὴν, quod antea quoq; annotaui.

Diabetes.] Multa nomina hic affectio habet, uide Galenū *Diabetes*. de locis affectus lib. 6. Venit à uerbo διαβην, quod signat, pertranseo. Potus enim quàm primū assumptus est, statim trāsit,

Rosato.] Forte legendum in græco pro ξοσάτω ἐδρροσάτω. *Nota.* Nam apud Paulum in septimo nulla est mētio rosati, sed hydrorosati, ubi etiam Rodomelon exponit.

Musculus qui ceruicem.] Musculus hic transuersis constat fibris, uariaq; habet officia. Primum quidem uesicam claudit, licet sine illo claudi possit. Deinde post emissionem urinæ cōtractus undiquaq; id quod in meatu est propellit. Præterea quicquid in exprimente in urinarium meatum incidit, id ne diutius immoretur ibi efficit, sicut cūm urina morda est. *Ex anatome cōstāt*

Resolutionem repræsentat.] Græce est παραλύσις ἐμφασιν ἐργάζεται, quasi dicas, resolutionis emplastrum efficit. ἐμφασις autem est repræsentatio rei cuiusdam, aut adumbratio.

In succum quidem conuersa.] Hoc est in chylum medici dicunt, & ut latinam dictionem per græcam interpreter. Habet autem Paulus χυλοποιήντα, quod est in succum seu chylum redacta beneficio uentriculi. Simile uerbum Gale. lib. 8. *χυλοποιήντα.* de compositione medicamentorum secūdum locos habet, ut antea quoq; annotaui: neυπεχύμωτα quasi dicas exuccata, sed hoc plus signat, chilum scilicet à iecinore attractum ita ut liquidior pars sit distributa, siccior uelut recremētum relicta. Dicimus itaq; Chilū ἐκχύμωτον cum & uenterculus probè concoxerit, & iecur attraxerit, ubi uero ille quidem concoxerit, iecur autem attrahendi uim habeat infirmam, ἀνεχύμωτα & liquida excernuntur.

Bilis insigniter colorata.] Hoc est bilis colore suo abunde exaturata per aluum descendens uel deiectio meræ bilis. Nā Gale. apud Hippocratem interpretatur κατακορέα, τὰ ἀκρατοχολῶν διαχωρήματα.

κατακο-

Quādo iccoris substātia.] Græce est ἡδὴ δὲ καὶ τῆς ὑσίας ρῆς.

αὐτῇ συντηκόμενης τῇ ἥπατος, quod ad uerbum sonat. Id uerò etiam iocinoris substantia cum ea colliquefcente : Cū ea, intelligibile. Nam ubi humor fermè consumptus est, corpus ipsum contabescit cuiuscunq; partis :

Flāmeus ardor] Sic fere ubiq; sum interpretatus dictio-
φλόγῳσις nē φλόγῳσιν. Inflammationē uerò φλεγμονήν, secutus Celsum.

Chamæpyteos radices] Paulus apud Galenū & Alexā-
drum medicū uariat Nam Chamæpyteos drachmæ octo po-
nuntur. Verum Aetius cum Paulo consentit.

Troximū. Adhæc intybum, troximum, & sonchus.] Troximum hoc
est, eris per se esui aptum significat. Sereos autem genera tam
hepatis affectibus cōueniunt, ut etiam cruda comedi possint.

Exemplar
græcum ui-
ciosum. In qbus calor intenditur.] In codice græco habet, τὰ τῶν
τερμῶν, ἢ τὰ τῆς θερμότητος Batiliē. corrector hoc nō castigauit.
Corruda.] Græce est μνάκινθα, quæ latinis Corruda dici-
tur, hoc est asparagus syluestris.

Illud aut in summa præcipiendū] Hoc Galeus lib. 8 de
cōpositione medicamentorū secūdū locos cōmemorat. iecur
& stomachum semper astringētia cum relaxātibus requirere.
Aliàs sæpe stomachicis syncope iocinorosis interius suscitaī.

Copton] Sic dicitur medicamentū quod tunditur. Est aut
malagma lib. 7. ad duriciem stomachi & iocinoris inscriptū.

IN XLVII. CAPVT.

Cottabis-
mus,

Cottabismi.] Cottabismus olim ludus apud Græcos erat,
quo uinū ex alto fundebāt, strepitū faciētes Hic aut pos-
sit accipi pro superfusione in partē aliquā, aut pro ruboris ex-
citatione quo sanguis in exteriora eliciatur, hæc dū meliora
occurrūt, boni conatule

IN XLVIII. CAPVT.

V T corpus albedo, & pituitæ colore.] Græce est, ὡς λευκὸν
καὶ φλεγματῶδες τὸ σῶμα φαίνεται ad uerbū sonāt hec,
ut album & pituitosum corpus appareat. Dicit aut de exter-
no colore apparente. Eoq; albedo & pituitoso colore uerten-
dum erat, quanquam parum refert dicere, album & pituito-
sum apparet, mortuus instar. Ex nono Orbasij sumpta sunt.

Codex græ-
cus uitio-
sus.

Coqui autem possit etiam in aqua.] Perperam in codice,
græco legitur ὕδασι pro ὕδατι. Cæterum πινόμενης de futuro
intelligendum est.

ψαμμο-
μός quid.

Ad hæc in arena cōtecti desudent.] Sic interpretatus sum
ψαμμομόν. Solēt aut hydrotici in arena à sole ex calfacta se-
peliri

peliri capite excepto, ut humiditas meatib⁹ apertis extrahat.

Quia si cum febri aqua subter cutem.] Si duo uno tempore uicia infestent, uehementiori insistendum, altero nō neglecto, quod Paulus per uerbum τὸ κατεπιῶν signat.

Corpus emaciant, colliquantq^{ue}; releganda. Quidam nasutus propter malè impressum, codicem latinum hic me corrigendum censuit, q^{ui} liber habuerit eligenda. Quasi uero nescierim quid sit περιαιρετέον. Gemuszo Luteriæ indicant legendum releganda pro eligenda.

Ad perforationem ueniendum] Græcè uocatur hæc chirurgiæ administratio παρακέντης, hoc est pertusio & pūctio. Nam cos qui ascate laborant, ad peritonæum usq^{ue}; imo in uētre diuidunt, sicut lib 6 de hydropicis comprehensum est.

IN XLIX. CAPVT.

Cum lien melancholicum] Galenus lib 9. de cōpositione medicamentorū secundū locos. Oribasius lib. 9. & Aetius 10 sermone de liene in eandem ferè sententiam tradiderūt.

Centaurij] Male habet codex græcus ταυρίου] pro κενταυρίου, nec tamen hoc castigat Basiliensis.

Ceræ libra, terebinthinæ.] Græcus codex habet κηρίων τερεβινθίνης, pro κήρυ λίτρα. α. τερεβινθίνης λίτρα. α. Oroscius cum Basiliensi hoc neglexit.

Cinis ex officina fabrilii.] Cinis hic est, quem ferrū dum in officinis fabrilibus igitur, ac malleo tunditur, abijcit. Verba græca hæc sunt, καὶ ἡ τέφρα τῶν χαλκείων, ubi Oroscius interpretum censor, pro χαλκείων legendum putat κοχλειῶν. At Gal. lib 9. iam citato, primum aquam in qua ferrum ignitum sæpius extinctum sit, potui lienosis præbet. Paulo post Cataplasma ex cinere fabrilis officinæ obducendum exhibet, hoc pacto inquit, καὶ ἡ τέφρα ἐκ τῶν χαλκείων μετ' ὕδατος.

Acetabulū cum oxymélito.] Lectio codicis græci deprauata est: habet enim ξύβαφον πάντα ἢ ὄξυμέλιτος, ἀναγγαλλίδος, pro ὄξυβαφον μετὰ ὄξυμέλιτος, ἢ ἀναγγαλλίδος.

IN L. CAPVT.

Si enim febricitante ægro.] Græca sonant, εἰ μὲν γὰρ ἐπὶ πυρεκτικῇ νόσῳ ἀσθενέως γεγόνω δ' ἵκτερος ἀποπάνυσι τὸν πυρετὸν, hoc est ad uerbū. Si. n post febrilē morbū subito ortus arguatus febrim finierit. Vide nonū Oribasij, & decimū Aetii.

τὸ κατὰ
πῶγον qd
urget.
περιαιρε-
τέον.
Calūnia.
παρακέν-
τησις.

τέφρα
καλκείων.
Oroscij
error.

Excremen-
ta alba,

Si absq; febris alba deijciuntur.] Alba quia bilis in meatibus obstructa ad intestina non potuit descendere, quæ excrementa tingeret.

Χρυσάτ-
τικόν γλυ-
κόν.

Seminis aut atriplicis scrupuli octo cum Chrysattico, aut alio passo.] In græco exemplari habetur, μετὰ χρυσάττικον ἄλλου γλυκέως Aetius meminit passi Chrysattici. Alexander item sæpius citat, dicitur esse coloris aurei. Scribit Dioscorides atriplicis semen cum mulsâ Istericis conuenire.

IN LI. CAPVT.

ἐξόμφα-
λον.

Causam umbelici prominentis.] Hoc vitium uno uocabulo Paulus uocat lib: 7. ἐξόμφαλον, quod uidelicet aut rupto in ea parte peritonæo, prolapsio; aut omento, aut intestino, interim ocioso humore umbilicum subeunte: interim carne subnata, alias sanguine obuenæ, aut arteriæ rupturam concreto alias spiritu indiderim collecto, generatur. Celsus etiam caput facit de umbilico prominente.

ἐρεγμός

Fabæ frescæ corticum.] In græco est ἐρεγμός λεπύρων. Significat autem ἐρεγμός fabam frescam seu fractam. Dicitur autem etiam de aliis leguminibus confractis, nomine ipsorum appposito. Quâquam hic possit simpliciter de faba dici καταχρηστικῶς, ne sit fabæ corticum, tu utrum malis sequere.

IN LII. CAPVT.

ἐπισκοί,

A Sellorum domesticorum qui tacti conduplicant se in orbem Sic interpretatus sum ex Largo ὀρίσκων κοτοικιδίων τῶν σφαιρουμένων. Ipse autem addit in pilæ rotundissimæ similem. Cæterum uariâ habent nomina, πολύποδες enim græcis κοβαρίδες Dioscoridi, κύαμοι Galeno appellâtur. Nascuntur sub aquariis uasis ut ait Archigenas; imo etiam omnibus locis humidioribus.

ἄσβετος,
κονία.
κονία ἄσ-
βέτου.

Calcis uiuæ partibus duabus.] In græco est ἄσβετου κονίως. Nam ἄσβετος κονία. In extinctam calcē significat. Si autem κονία ἄσφέτου ponatur, pro Lixiuio calcis accipiendum est.

IN LIII. CAPVT.

Nota.

Qua frigida perfulso.] Græce est προκατατλήσας ὕδατι ψυχρῶ. ante hoc προανατρίψας habetur, uidetur legēdum προαναβλίψας, ut scilicet prius intro reprimatur. Nā quid confert prius intestinum confricare, quod προανατρίβειν signat, nolui tamen immutare, quod non haberem quem sequeretur. Medicamento tam spisso.] Sic uerti ἀμολύντω χρῶ. Signat autem

Ἀμολύν-
τω.

autem ἀμόλυντον non nominans à uerbo μόλυνω Coquuntur
medicamenta nunc, ut liquida permaneant, nunc ut dura sint.
Liquida immirrentis digitos inquinant. dura ac spissa non
item. Est itaq; ἀμόλυντος spissitudo qua digiti, aut manus nō
inquinantur, quanquam Oroscius uerterit, postquam ex co-
ctura recementa iam separata fuerint.

Erratum
Oroscij.

IN LIIII. CAPVT.

Tenuissimæ parti.] Sic fere ubiq; παμπάλυν sum interpre-
tatus: aliquando pollinem, quod Oroscius reprehendit,
mihi uero placet, cū alios ēt doctissimos ita uertisse uideam.

Error Oro
scij.

Aphthæ ulcere pressos ἀφθῶντας in græcō habetur, quid
sit ἀφθῆ alibi exposuimus.

ἀφθῶν-
τες.

IN LVII. CAPVT.

Priapismus.] Galenus ad uerbum lib. 10. hæc habet: Vbi
male ī codice græcō ἐνέματων legitur pro ἐμμοτων, quod
miror correctorem Basiliensem non aduertisse.

Nymphæam igitur.] Vulgo nenupharim appellāt insigni
refrigeratoria ui præditā. Duplex est eius species: de qua alias.

IN LVIII. CAPVT.

De particulis inefficacibus.] Hoc loco particulas intelli-
go, eas corporis partes, quæ generationi dicatæ sunt. Bar-
bari caput faciunt de frigidis & maleficiatis.

Particulæ.

Priuatim stellio cōcrematus.] Hoc ex Oribasio sumptum
est. Aetius sermone. 1. mentionē facit, aliorumq; cōplurium.

Satyriace.] Hoc est medicamentum, quod penem erigat,
à satyris dictum, qui naturalibus arctis depinguntur.

Satyri.

IN LIX. CAPVT.

Si in etiam altè descenderint.] In græcō est εἰ δὲ καὶ βάθος
αὐτοῖς τι συνῆν, hoc est: Sin autem profunditas etiam que-
dam ipsis adfuerit.

Iuuat resina fricta.] Hoc est, sicca & retortida. Duplex, re-
sinæ species est, sicca & liquida. Sicca præparatur, ut Dioscori
des memoriæ prodidit. Liquida utribus conditur, quanquam
idem autor ex iisdem arboribus alias esse siccas, alias haberi
liquidas autumnat. Sicca græcis φρυκτὴ nominatur, liquida
ἢ ἐκ τῶν κεραμύων ὑγρὰ, hoc est si ad uerbum exponas, tetorri-
de, & ex utribus, seu dolijs liquida.

Resina.

Puluis inspergitur parti uino prius.] Hoc est, ista in puluē
reim redacta. Textus græcus deinde sequens deprauatus est,

φρυκτὴ.

habet enim προαπονίπτων ἀπίω, ἢ προαπονίπτων ὄψω, ut ego cōuertī. Nec Oroscius nec Basiliēsis calligator animaduertit.

Triginta numero.] Viciosus est codex græcus, ut qui habeat < ᾱ hoc est drachmam unam pro λ quod signat triginta, facili nimirū lapsu. Galenus & Oribasius unde Paulus sum sit, lectionem hanc confirmant.

Oris uenarum quæ quod,] Ita simplicem dictionē græcā αἱμορροῖδες sum interpretatus. Sunt autem uenulæ quædam recti intestini, ore hiantes, eo quod statō tempore sanguinē crassum seculentumq; excernunt, hæmorrhoides appellatæ: cum autem aperto non sint mihiq; excernūt, sed tumidæ apparent, sanguine in eis suppresso, τυφλαί græcis, Cæcæ, quasi foramen nullum habentes, latinis uocantur. Differunt autem situ & origine, si Galeno in Anatomicis fidem accommodamus, aliæ siquidem in recto intestino, aliæ in ano, aliæ in circulari musculo alium constringente qui σφιγκτήρ appellatur, consistunt. Atq; hoc est quod Paulus dicit, quædam superius delitescunt, non apparentes, ob loci longinquitatem.

Quantum ad originem attinet, aliæ uidentur ex ramis uenæ portæ, qui omento, lieni, uentriculo communes sunt, propagari: aliæ ex cauæ uenæ diuicatu in crura factō, ubi grandis arteria cauam uenam conscendit. Hæ itaq; uel ex porta, uel ex caua ortæ nunc iusto largius profluūt, nunc supprimuntur, quando remedia adhibere conuenit. Sin autem mediocriter fluant corpus multis morbis liberant.

Infeliciter contabescere.] Sic reddidi τὸν τῶς ἀποσίτες γίνεσθαι. Abusus est Paulus uerbo ἀποσίτες pro ἀσίτους, hoc est: ἀτρέφους γίνεσθαι, qđ signat, cibū nō sentire, contabescere.

Quare cum plures sint hæmorrhoides.] Ex Hippocrate sumptum est, apho. lib 6. ubi habet, αἱμορροῖδας ἰσθέντι χρονίας, ἢν μὴ μία διαφυλαχθῇ κίνδυνος σφραγίσθαι ἐπιγινέσθαι ἢ φθίσιν. Miror cur Aetius à Galeni sententia, aliorumq; fere omnium græcorum discesserit, nullam esse relinquendā cēsens.

Quædam uero superius.] Hoc est, quædam in recto intestino habentur: quæ superiorem locum occupant, quam quæ in ano, & circulari musculo apparent.

Cæcæ autem.] Hoc est cum apertæ uenæ, dolorem mouent, copia humoris melancholici grauatæ.

Cretæ sutoriæ, aluminis rotūdi singulorū.] In græco codice deest

Hæmorrhoidum
differe-
ntia.

τυφλῆ.

Situs hæ-
morrhoi-
dum.

ἀποσί-
τες.

ce deest ἀνά, & τρογγύλης per se signat alumen rotundū, sicut σχιγὰ scissile. Aliqui tamē pro μελαιτηρία, legunt τυπηρία.

Recremēti plumbi rus syriaci singulorum drachmæ.] In vulgaris codicibus græcis habetur uncia octo. Verū Galenus & Oribasius habēt drach octo, quod nō annotauit Oroscius.

IN LX. CAPVT.

Circa statum menstruale tempus.] Græci uocāt certum, præfinitumq; tempus προθεσμίαν, uel προθεσμίαν τακτὴν προθεσμία. & προμερίαν ut Budæus etiam annotauit.

Detrahetur autem sanguinis.] Hodie sumus timidiorez quā ut libram integram una uice detrahamus, tantū abest, ut libras duas & dimidiam auferamus.

Est autē pressus.] Descriptio pessarii. In græco codice autē superfluum est ἦται, uel in hunc modum legi debet: πισσὸς δ' ἐστὶν ἔριον διεξασμένον ἦται καὶ σφαιρωθέν. Aliqui legēdum putant ἦται καὶ, hoc est, uel aliquid.

Amus, sion.] Malè in exemplari græco impresso σίων habetur, pro σίον aut σίσον. utraq; uim semina prouocandi mentes obtinēt. Paulo post κερκίδες pro κεδρίδες substitutum est.

IN LXII. CAPVT.

OB legitimum partū.] Hoc est, absolutum, perfectumq;. Nam postea dicit, uel ob abortum, illegitimū scilicet partum profluuiā accidere. Verum quæ ex naturali partu sunt, sua sponte plurimum cessant. Erat in græco ἐπὶ τελείας ἀποτέξεσιν, quod Oroscius noster uertendum censuit. In fine partus, quā eruditè, uel mediocriter literatus indicare poterit.

Vel cōbustæ ipsius cinis.] Lege in cod. græco pro κεννμένων, κεννέων αὐτὴν ἢ σποδία, qđ castigatores omiserunt. Paulo post κηκίδα βράχην ἦται, fac κηκίδος βραχὴ. Quod et annotauit Oros. ex suo exemplari.

IN LXIII. CAPVT.

VNctio ex melle.] Sic Gale. libello de prænoscendo præcipit in uxore Boethi, Romanorū cōsulit. Ita fere sonāt uerba ipsius: ἐνόησα τὸν σκοπὸν τῆς διαίτης ποιῆσαι, διὰ τε πέναντος ἐλαχίστου καὶ τρίτης ὅλης τοῦ σώματος, ἐτίτε χρίσεως ὑποσκόδαζομένης, & διὰ πίττης καὶ ῥητίνης, ἀλλὰ διὰ μέλιτος μόνου μέχρι πλήρους μὲν ἐκθεέντος, hoc est ut rudiores intelligāt: Cōsideraui scopū intētionēq; uictus istituere ex portione paucissima, ex totius corporis frictione, & ppea unctione ita pparata, nō ex pice, & resina, sed ex melle solo diurno incocto.

Corrigitur
codex Oro-
scius.

Quercus liber.] In græco codice habetur δρυὸς τὰ ἐπὶ τῷ φλοιῷ τῆ πρέπνυ τὸ ὑμενώδες. Galenus ita legit, δρυὸς τοῦ ἐν τῷ φλοιῷ τῆ πρέμνουτὶ ὑμενώδες. Dioscorides, τὸ μεταξὺ τῆ φλοιῷ καὶ τῆ πρέμνου ὑμενώδες. In Paulo igitur legendum censeo: δρυὸς τὸ ὑπὸ τῷ φλοιῷ τῆ πρέμνυ ὑμενώδες. Quod Oroscius neglexit, & castigator Basilienfis.

IN LXIII. CAPVT.

DE inflammatione uteri.] In ipso titulo græcum exēplar deprauatum est. Habet enim παρεγκλίσσεως pro παρεγκλίσεως, quod etiam Aristarchi omiserunt.

Tendo me-
dius inter
neruum &
ligamen-
tum.

Dolor capitis, tendinis.] Hic nimirum intelligit tēdinem in utraq; capitis parte situm, corpus tenue, ac fibrosum, quod excrescentiam uermicularem ad particulas natibus cerebri, utrinq; adjacentes, illigat, ne errabunda uagetur, uel nervos in sincipite intelligunt.

πίλημα.
Erior
Oroscij.

Per hapsum.] Sic reddidi πίλημα contra Oroscii opinio- nem. At Celsus libro septimo ita inquit: Tum multo is oleo perungendus, inducendusq; hapsus lanæ mollis, tepido oleo repletus, &c. Quid sibi uelit uelamē Oroscij, nemo facile intellexerit. Ex lexico suo ita exponendum censuit.

IN LXV. CAPVT.

Oroscius.

Ræterea uero inordinatæ.] Oroscius græcum codicem deprauatū dicit, legendūq; putat πυρετοὶ δὲ ἀτακτοὶ μετὰ φθίσις ἐν ταῖς ἐπισημασίαις γίνονται, hoc est: Febres autem inordinatæ cum horrore in accessionibus sunt, &c. At ἐπισημασίαι, per se febrilium accessiones significant: nisi forte inflam- mationum accessiones, aut in pure generādo intentiones natu- ræ intelligere uelimus. Tunc enim, ut ait Hippocrates, do- lores ac febres accidunt magis quàm in iam confecto. Vtram tu malis, sequere lectionem. Certe omnia antiqua exempla- ria quæ mihi uidere contigit, impressi codicis uerba habent.

ἐπισημα-
σία.

Aut candidum oleum.] In græco est λευκασμένον ἔλαιον hoc est, dealbatum oleum. Quomodo oleum fiat candidum, ex Dioscoride discis.

IN LXVII. CAPVT.

εἰδεχθεῖς.

Urpem humorū colluuiē.] Græce est εἰδεχθεῖς, hoc est, turpem aspectu, qualis in Elephantiorū facie aliisq; par- tibus uideri solet. Vsus est eo uocabulo lib. 4. in hac snia. Ha- bet. n. εἰδεχθεῖς τρεῖς δ' ἑπὶ μόνον τὸ πρόσηπον. Hoc est: Faciem autem

autem solam aspectu quodāmodo terrā horticā & deformē.

Amurca.] Hoc sedimentum in æneo uase ad mellis spissitudinem decoqui solet. Interim torrei in duriciem, seu puluerem. Ac postea etiam aliis liquidis commisceri.

IN LXVIII. CAPVT.

Elleborismus.] Paulus lib. 7. aliquot rationes tradit ueratri exhibendi. Tu inde colligito.

Metasyncritidem.] Superius exposui, quid sibi uclit *πετασυγκριτικόν*, quod alii male recorporatum interpretatur, nisi forte intelligas noxium humo re euocando restauraticium.

IN LXIX. CAPVT.

Sanguinis uero eruptionem.] Cum mola scilicet in utero affligit, ita curabimus, ut sanguinis profluuium, quod in immoderata purgatione ex abortu potissimum accidit. Item sicut muliebrem fluxum, de quo supra quoque est comprehensum Basilienensis corrector dictionem unam expunxit superfluū esse ratus. Nam legit. *τὰς δὲ αἱμορροαγίας ὥσπερ καὶ τὸν ῥῆν*. Ego ex ipso sensu & exemplari ueteri legendum censeo: *τὰς δὲ αἱμορροαγίας, ὥσπερ τὰς αἱμορροαγίας καὶ τὸν ῥῆν*. Primum *αἱμορροαγίας* refertur ad id quod Paulus ante in eodem capite dixit: *τίσι δὲ καὶ αἷμα φέρεται*, hoc est quibusdam uero etiam sanguis effertur. Secundum *αἱμορροαγίας* ad caput de immoderata purgatione ubi habet: *συνεχῶς δὲ καὶ ἐπὶ ἀμβλώσειν ἰσχυρῶς αἱμορροαγῶσιν*.

IN LXXII. CAPVT.

Ve interaneum id.] In græco codice est *οἱ κατέχουσιν τὸ σπλάγχχνον*, quod est, quæ continent uiscus. Appellat uterum, uiscus. Ego dixi interna eum, nam cor iecur, cerebrum pulmo, lien proprie uiscera appellantur.

Quidam uero & totam uulūā.] Paulus negat totam uulūam posse procidere. Ac nostris temporibus in una & altera totam procidere extra sinum uidimus, ex cornibus tantum & quibusdam adhuc ligamētis suspensam, cuius rei etiam hodie testimonium adferre possumus.

Vaporibus & suffimentis uaporum.] Verba græca ita habent, *ὑπατμισμοῦ καὶ θυμιάμασι*, quasi dicas subuaporationibus & suffimentis.

IN LXXV. CAPVT.

In uulūæ ostio.] Rimæ, aut fissa uocantur latinis, quæ apud græcos *ραγάδες*, etiam nonnulli *αλίδας* ita nominant. Cel-

σπλάγχ-
νον.

Interaneū.

Vulua pro-
cidit.

ὑπατμισ-
μοῦ.

θυμιάμα

ῥάγας.

lus libro

ius libro sexto rhagadia appellat.

Subliuida & feculenta.] Codex græcus impressus aliiq; nonnulli scripti manu habent: *ποτέλιον καὶ τραγγάδι*, pro *υποτέλιον καὶ τραγγάδι*, ita etiam legēdum putat Orosius. Gemusæus autem non aduertit.

μύδιον.
Volfella.

Volfella præhēsas.] Græce sonat *μυδία διακρατήσαντας*, Est autem *μύδιον*, ferramētū quo aliquidprehendimus, quod Celsus Volfellam nominat: Neq; quicquam, inquiens, cōmodius est quā uolfella prehēdere, sub eaq; quod uolumus excidere. Græcus quidā autor anonymus ait: ait τὸς δὲ κεχασμένους ταφυλὰς ἀμέτρως ἐκτέμνομεν μυδία λαβόμενοι, hoc est: Vuas aut immodice relaxatas uolfella phēsas excindim⁹.

IN LXXVII. CAPVT.

σφαίρωμα.
μα.

Gibba natium regione.] Græce legitur δὲ πῶτος αὐτοῖς ἀπὸ τῶν κατὰ σφαίρωμα καὶ τὸν βυβῶνα τόπων. Ad uerbum sonat: Dolor autem ipsis ex locis iuxta sphæroma, & bubonem, &c. Quæ iam pars sit σφαίρωμα, audi. Autor quidam græcus anonymus ita scriptum reliquit: λέγει δὲ ἡ ὄσφους εἰς τὸ ἱερὸν ὅτι·ν. πᾶρ ὁκάτερα δὲ τέτου τὰ ἰσχύια ἐντὶ, ἐφ' οἷς οἱ γλῆτραι διὰ τὸ ὅτι εἶναι ὑποκειμένα μέγιστα ἐνθεν ὑπεστρώθην αὐτοῖς σώματα σαρκώδη, τὰ κυρτώματα ἐκτὸς περιφερῆναι, σφαίρωματὰ πρῶταγορεύεται. Hoc est ad uerbū: Desinūt autem lumbi in os sacrum. Vtraq; huius parte coxæ sunt super quas nates eo quod ossa subiecta sint maxima. Hinc carnosæ corpora ipsis substrata sunt, quorum gibba, inde quod rotūda sint, σφαίρωματὰ, quasi orbiculata appellantur.

In quibusdā & uomitus à radiculis.] Ita ferè semper Celsus intermittatur, ἐμετος ἀπὸ ξαφανίδων intelligit autem raphabum. Vide septimum librū, ubi de uomēdi modis præcipit.

Orosius.

Lixiuio.] Sic græcis κοιλία, aut κοιλία σακτὴν uertimus. Male Orosius hic κοιλίαν πρωτοσάκτην lixiuium uertit cinerē, qui primus destillauerit, cum πρωτοσάκτη sit lixiuiū quod cinere & calce adiecta sit, apud Paulum in septimo.

IN LXXVIII. CAPVT.

Non sola particularū.] Vide Galenū lib. 1. o. de cōpo. medicamētorū ἐν τοῖς τοῖς Οριβασίον nonū, & duodecimū Aetij.

Et cum absunt.] Deest in græco codice particula καί, ut sit καὶ χωρὶς. Vult itaq; Paul ut lauet & cū defluxiones adsunt, & cū nō adsunt, Orosius & Basiliensis corrector omiserunt.

Statim

Statim igitur cum quis morbum primum experiri ceperit, sanguinis missio erit tentanda. Nam quas iam fluxio frequenter infestavit, ij plus.] Pauli sententia est, ut quāprimum quis fluxione cœperit infestari, mittendū sanguinem curet. Vbi autem iam sæpe eadē fuerit conflictatus, præcipue in frigidioribus natura, & imbecillibus Nescio quid Orosio in mētem uenerit, legenti ὡς οἶγε φθίσαιτες ἤδη πολλάκις ῥέμματι δύναι, βλάπτονται, &c. Cum & ratio, & uera sententia in hunc modum habeat ὡς οἶγε φθίσαιτες ἤδη πολλάκις ῥέμματι δύναι, βλάπτονται, &c. Nō sum ignarus Aetium ferē cū superiori sententia conuenire, ubi habet: Quare necessaria maxime est sanguinis, ac reliquorum humorum in fluxionibus sanguineis, detactio, præcipue in ijs qui sanguine redundant, ac reliquis humorum recrementis. In his enim antequā dolores oboriantur, uenam secare oportet, bis in anno, &c. At Paulus de iis mentionem facit, qui iam ex sanguineo temperamento, ad pituitosam inclinant temporis processu, naturaq; frigidiores, ac imbecilli sunt, quæ duo sanguinis missione recusant.

Orosius.

Anxietatem, & cibi fastidium.] ἀσώδης καὶ ἀνορέκτες, hoc est, anxios & inappetentes. ἄσπιν quid sit, antea sum interpretatus. Aliqui nauseabundos hic exponunt.

Nec miraculum est si materies.] Hoc est humor pituitosus per se frigidus, ubi accensus, inflammatusq; fuerit temporis spacio, ut uiridia ligna, æstuat, incandescitq;, & si bilem habuerit admistam, tanto facilius accenditur. Eoq; dicit, ut bilis admistionem omittam.

Bulbi per se: uel cum polentæ polline ad ruborem usque suffricti.] Orosius legit ἔως συμμίζεως, hoc est, ad cōmistiōnem usq; idq; ex suo antiquo exemplari cui plus credit, quā rationi & ueritati. Nō enim ad commistiōnem usq; sunt infricandi bulbi, sed ἔως ἀμύξεως, quod est ad ruborem usq; in cute excitatum, unde tumor relictus discutitur.

Orosius

IN LXXIX. CAPVT.

Lei lentiscini.] Deest in codice impresso τὸ αὐταγες, qđ Orosius præ nimia diligentia præterit:

Minii.] Sic uertit μίλτον, Celsum imitatus qui μίλτον σπορικὸν reddit minium Synopicum. Manardus reprehendit Barbarum, quod μίλτον exposuerit minium, & non potius rubricam.

Calcis

Calcis uiuidæ.] Hoc est, calcis non extinctæ, Verba duo græca idem significant. ἀσβεστος, & ζώσκη. Sed primum calcem uiuam per se positum signat, dū dictione ζώσκη, calcē tantum,

Oroscius.
μοτοί.
Emmoton.

Emmoton.] Hoc est, medicamentum, quod linamentis flatim conceptis excipitur. Nam μοτοί linamenta græcis appellantur, quibus oræ uulnerum obturari solent.

IN LXXX. CAPVT.

CLauis] Celsus inquit: Clauus autem nonnunquā quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, præcipue tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non alias tamen ingredienti mouet.

Syringiacus puluis.] Hoc est puluis qui fistularum callis exterendis conuenit. Dixit græce Paulus συριγγιακὸν ξηρὸν quasi syringiacum aridum.

IN LXXXI. CAPVT.

IN græco codice habetur τυμμάτων, quasi dicas spissamentorum. Oroscius τυμμεως legendum ex ueteri exemplari putat Mihi autem uidetur δέρον, quod est, lupinorum, ut superius etiam habetur. Nam de coctione metallorum, præsertim stymmeos in hac re nihil apud bonos autores habetur.

Ne manus inquinent] Hoc est, tam scissa duraq; fiant, ut digitos iniectos non inquinent, ea enim est emplastrorum crassities. Græci eam ἀμόλυτον appellant, ut superius annotaui. Hic disiuncto uerbo dixit Paulus, μὴ μόλυνεῖσθαι. Atq; hæc contra opinionem Oroscii, qui in hoc ipso uerbo reprehendendum me censuit.

FINIS LIBRI TERTII


COMMENTARIORVM.





COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER QVARTVS.



CAPVT I.



LEPHANTIA, Morbus hic Græca tantum habet nomina, uocaturq; Elephantia
ἐλεφας, ἐλεφαντίασις, ἐλεφαντία, A quibusdam λεοντίασις, αὐτοσατυρίασις. primam ab elephāto, aliam à leone, & satyris nomē claturam accepit. Est autem is nimirum, qui uulgo dicitur lepra Græcorū enim lepra cutis tñ asperitudo est. Iā barbari ele-

phasim uocant pedum tumorem quendam, qui febris superuenire solet, ne te fallat interim nominum diuersitas.

Extrema decidūt.] Hoc est digiti pedū manuūq; auricularū summa, pili, nasus, sed hæc posterius. Istā specie efficit atrabilis ex flaua supra modū naturæ adusta, quæ ideo perniciofa esse uidetur Galeno. qđ uehemēter crudat, & terrā fermēte.

Neq; tamē eminētia tuberosa.] Sic reddidi μῆτε μὴν ὀχθεῖς
ὀχθεῖς. Sunt. n. ὀχθεῖς tumores uerrucosi, tuberosiq; in elephāticis apparētes. Vnde ὀχθῶδες ἐλκῆς ulcere dicūtur p̄tumidis labris. ὀχθαῖ

Sola capitis adustione.] Vide lib. 6. ubi habes expositum, quomodo ferramento quinq; excitant crustas in elephāticis. Est autem eap. 2.

Nunc saltu, nunc magis alteribus.] Miror hic Oroscium nihil uel ex antiquo suo exemplari, uel ingenioso cerebro attulisse, cū & codex Græcus ip̄pressus sit uiciosus, & multi hoc in loco

Oroscius,

loco impegerint. Primum enim habetur in Greco, τὰ μὲν ἀφαλλόμενος, τὰ δὲ πλέον ἀλκῆσι cum legendū sic τὰ μὲν ἀφαλλόμενος, τὰ δὲ πλέον ἀλτῆσι. quod etiam antea in meis annotationibus monuerā. Quia igitur Paulus ualidæ exerceri uult elephanticos, præcipit illis saltū, alteres & follis usum. Sunt autem alteres massæ quædam graues, uel ex lapidibus, uel metallis, quales hodie in librandis rebus adhibentur. Galenus lib. 2. de sanitate tuenda inquit πολὺ δὲ δὴ μάλλον εἶναι βάρους ταῖς χερσὶν ἀκραις περιλαβὼν ἐκατέρω κατὰ μόνας οἰαπερ οἱ κατὰ παλάμην εἶναι ἀλτῆρες, ἅττερός μασ εἶχει προσένας, ἢ ἀνατένας αὐτάς, hoc est: Multo autem magis fiet si quodā pondere summis manibus prehensio utraq; seorsum (qualia sunt quæ in palæstra alteres dicuntur) protensis, aut iursum elatis ipsis in eodem consistat habitu. Item eodē in libro exercitii modū præscribit in hunc modū ἐνισι μὲν καταθέντες ἀλτῆρας ἐν τῷ πρόσθεν διεσῶτας ἀλλήλων ἀργύρον, εἴτα ἐν μέσῳ ἴσάντες αὐτῶν αἰσθύνται προκίποντες τῇ μὲν δεξιᾷ χερσὶ, τὸν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς, τῇ δὲ ἀριστερᾷ τῶν ἐν τοῖς δεξιῶς, καὶ αὐτοὶ ἐκατέρωθεν τὴν οἰκίαν κατατίθενται χώραν. Ex his satis liquet,

Halteres.

Alteres.

quid alteres apud Martiālē, & alios ueteres scriptores fuerint. At litera una addita ἀλκῆρες, dicti, nō sunt massæ quædā, sed adminicula, quibus in saltu innitimur: quales sunt cuspides, hastæ, arūdines: Galenus horū quoq; mentionē facit libro iam citato, in hanc sniam: καὶ μὲν δὴ καὶ διὰ τῶν χειρῶν ἐνεστὶν οὐδὲν γυμνάσιον ὁμιλῶσιν γυμνάσασθαι χωρὶς τῆς κατέχεν ἀλκῆρας, &c. Hæc exercitia supernis partibus ualēt, lūbis & obliquis spinæ regionibus. Basilienſis castigatō reliq; locū deprauatū.

[Insper melissæ herbæ.] Quæ herba ita uocetur nōdum apud idoneos authores comperi nec castigatores locum corrigunt. Aetius eam docet Milesiam herbam Sermone 13.

[Conferunt etiam si bibantur.] Quia meatus uiscerum ui quadam peculiari adaperiunt, & aluum etiam mouent comprimendo ea quæ intestinis inhærent.

ἐφιδρω-
τήρια.

Eandem habet efficaciam] Interpretatus sum ἐφιδρωτήρια, quæ desudationes mouent. Sudor autem Celſo authore duobus modis elicitur aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est & harenæ calidæ, & Laconici, & Clibani, & quarundā naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus uapor, ædificio includitur, sicut super Baias in Murtetis habemus.

IN II. CAPVT.

VTerq; affectus.] Non de lepra uulgarī hic agit, sed de extraneo cutis affectu, ut antea monni. Vide Oribasii lib. 7.

In qua corpus consumitur.] Græce est μετὰ ἀποτίξεως σφύματος. Est aut̃ ἀπότηξις qua semper aliquid à corpore abscedit, eliquatioq; . Sic in externis, lib. 2. de internis usurpat̃. Nā p̃sora & lepra melancholici cutis tantū affectus sunt. Nam si ἀποτίξις. in uenis & carne proueniant, canceri uocabulum fortiuntur.

Stercotis argenti.] Vno uerbo græce dictum ἐλκυσματος, quanquam etiam σκωρία ἀργυρίου & ἰγκαιμα apud Dioscori dem appelletur. ἐλκυσμα.

Lotariorum rubrorum.] Græce est λωτάρια ἔρυθρα, forte legendum λωτάριον ἔρυθρον. Hermolaus barbarus Lotarium rubens quasi diminutiuum loti interpretatur, nisi quis non de siuestri potius dictum accipiat, alii de Aegyptica intelligunt. Citatur apud Paulū lib. 7. Pastillus dia Lotarion ad pu- dendorum, sedisq; uitia Præterit Oroscius.

IN III. CAPVT.

PLeriq; hoc solo impetigines.] Has Galenus lib. 5. de com- positione medicamentorum secundum locos nominat μετὰ γράας, uoce nimirum ex latina & græca dictione compo- sita, quod contra rationē grāmatica fieri uidetur. Plinius etiā lib. 16. huius meminit, aitq; sub Claudii Tiberii Cæsaris princi- patu potissimū hāc menti impetiginē inualuisse quidā hanc morbū quē hodie Gallicū, aut Hispanicū uocār, esse opinant̃.

Oroscius.

IN V. CAPVT.

LEuce, cutis.] Leuce uutiliginis species est albida, & altius descendens: in eaq; albi pili sunt, & lanugini, similes.

Leuce.

Duę uero, alię restant, alphas & melas appellatę Celso. Pau- lo autem alphas albus & niger. In prima color albus est, ferē subasper, & non continuus: ut quędam quasi guttę disperse esse uideantur: Interdum etiam latius, & cum quibūdā inter- missionibus serpit. Altera colore ab hac differt, quia niger est, & umbre similis. Leuce quem occupauit, non facile dimittit.

Acu per summa leucem pungito.] Celsus lib. 5. eadē. fere habet: Vtrum autem, inq̃uiens, horum aliquod sanabile sit, an nō sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis de- bet, aut acu pūgi, si sanguis exit, quod fere fit in duobus prio- ribus, remedio locus est: si humor albidus, sanari non pot̃ est.

Experi-
mentum.

IN

Stigmata. **S**tigmata curabis.] Stigmata in uetere medicina dicta sunt non puucta, sed maculis punctorū quantitate & forma decolorata hominis cutis. Porro latinis etiā in usu est ea dictio. Plinius enim & Largus aliquoties usurpant.

Quod matulæ adhærescit.] Hoc est, qđ in urina subsidet, hoc nāq; matulæ solet adhærescere Diosc. oculorū cicatrices expurgari commemorat.

IN VIII. CAPVT.

Exanthemata.

Exanthemata.] Pustulæ sunt exiguo Celso, quales ex urti ca, uel sudore sunt. Interim pituitæ eruptiones, ita Plinio appellantur, de quibus hic agitur. Græci ēτ ἐξανθήματα, quasi di cas efflorescentias nominant, à uerbo ἐξανθίσθαι.

Cuticula.

In superiore pellicula.] Græce est ἐπιδερμίδα, quā Latine possis interpretari cuticulā. Nā summa pars, & ueluti ipsa cutis efflorescentia existit.

IN IX. CAPVT.

Splenio illitas.] Hoc est, panniculo lienis modo oblongo. Plinius, superimponi oportet splenium è melle decocto.

Sallorum esus.] Male in codice Græco est προσφορὰν, tu fac προσφορὰν, eiusmodi minutias neglexerunt aristarchi interpretum.

IN X. CAPVT.

Vt humoris colluies habeat emissarium.] Græce est κατὰ ὑπόρρησιν, quasi dicas, ex confluxu. Quidā Græcus aut tor habet κατὰ ὑπόχυσιν in eodem significato.

Calidis eruptionibus.] Sic uerti ἐκβράσματα feruētibus papulis, περιζέματα. Gliscentibus seu manantibus capitis ulceribus, ἀχῶρας. Atq; hac autoritate ueterum.

IN XI. CAPVT.

Ambusta.] Latini πυρικαυτὰ ambusta, uel cōbusta, uel exusta, citra ignis uocabulum additum exponunt, Proprie uero signat usta igne, eoq; Paulus primum πυρικαυτὰ dixit. Cōbustionem uero ex aqua calente, κατακαύματα ἀφ' ὕδατος. Quauquam & aliæ materiæ sæpe adurant.

Codex castigatur.

Oui albumē.] Male in cod. nro legit ὠν ὄλον, pro ὠν ὀλυνκῶν. Ita ēτ Auicēna habet, & Dioscorides. Annotauit id Oros.

Ordei farina.] Simpliciter in Græco codice est κριθαῖς, qđ est ordeis. At significantius ex Auicenna & Serapione ordeis farina positum est.

Illitumq; lintheolo.] Male Græcè hebetur ἐμπάστων pro ἐμπλάστων. Id qđ neglexit Orosius, & Basilienis castigator.

IN

IN XII. CAPVT.

Ouum integrum.] Græca sonant ὠὸν ὑλόκληρον χωρὶς τῶν ὀρύβων, hoc est: Ouum integrū sine eruis. Quid sibi uelit, eruis, nō uideo, cū nulla sit ante mentio eruorū facta. Puto igitur legendum, χωρὶς τῶν ἐρέγμων, hoc est, sine putaminibus. Quāuis ēt eruū cælis cōueniat. Hūc locū præteriit Oroscius. Oroscius.

IN XVII. CAPVT.

MAli punici corticibus uino incoctis, rhu & polēta.] Galenus eodem ferē lib. 2. ad Glauconē habet. Vnde lectiōnem Pauli corrigendā puto, ut legatur ἔτε καὶ ἀλφίτων, pro κηρετε καὶ ἀλφίτων. Nam cera hic nihil proficit, sed sumac, ut barbarorum more loquar, astringendi ui præditum. Oroscius hunc locū sua spōte præteriit, & Basiliensis castigatō omisit. Castigatur codex.

IN XVIII. CAPVT:

CAtaplasmate ex ficis siccatis.] Vide librū Galeni iam citatum. Voco autē ficus siccatas ἰσχάδας: quas etiam Caricas nominare licet. Galenus autē habet. Nō autē oportet ipsas caricas assumere, sed aquā, in qua illæ decoctæ itabuerint. ἰσχάδες.

Si uoles magis intēdere.] Hoc est, si uehemētius uoles siccare. Nam Galenus pro ἐπιτένειν habet σφοδρότερον ξηραίνει.

Galenus autē memoriæ.] Lib. 14. Methodi medendi meminit, unde etiam Paulus hæc quasi mutuatus est. Eadem ferē tradit etiam lib. 2. ad Glauconem, & commentario de Tymoribus præter naturam ubi ad uerbum ista habetur.

Qui humorum ex loco in locum decubitu.] Græca lectio nonnihil est uiciata, habet enim τοῖς ἀπὸ σκῆμματος μάλιτα χροῖσασιν ἀποσημασιν, pro τοῖς ἐξ ἀποσημματος μάλιτα χροῖσασιν ἀποσημασιν. Nam una dictio est ἀπόσημμα. Quam Galenus in hunc modū exponit: ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ὅταν χυμοὶ τινες ἐνοχλεῖντες ἐτέρω μορίῳ, καταλιπόντες ἐκείνο, εἰς ἕτερον μετακῶσιν. Atq; hic alter modus est generationis abscessuum. Sit itaq; ἐξ ἀποσημματος quod τὸ πῶς ἀποσημματος, ut ait Galenus. Differunt igitur inter se ἀπόσημα, & ἀπόσημμα, ut apud idoneos autores licet condiscere. Non aduerterunt nostri aristarchi. Locus castigatur.

Porro abscessuū generationē.] Græcus codex uiciatus nōnihil ē, ubi habet τῆς τῶν ἀποσημάτων γενέσεως, pro τῆς δὲ τῶν ἀποσημάτων γενέσεως, dictio δὲ omīssa snīam poterat cōfunde re. Oros. & castigatōr Basiliē. quātūuis oculati nō annotarūt. Codex deprauatus.

IN XIX. CAPVT.

CUm inflammatio neq[ue],] Inuenies penè eadem in secūdo
μερόται. ad Glauconem libro. Verti autem *μερόται* membrum
 emoritur, quod alii barbarè exponunt, mortificatur.

IN XX. CAPVT.

CUm bilis flaua nulli mixta humori.] Hoc est, cū sincera
 bilis, nullū aliū humorē uel pituitā, uel bilē atrā, uel san-
 guinem coniunctum, habens Oribasius lib. 14. similia habet.

Codex ui-
ciatus. Porri succi cyathi dimidium.] Viciatus est codex græcus
 impressus. Nam pro *βυ.ζ.* legendum est *βυ. ήμισι.* quod ualeat
 Cyathi dimidiū. Paulo post, myrtei unciz sex, in græco erat
 Ro. 1. S. pro S. hoc est sedecim, pro sex positum. Statim in ea-
 dem linea, Vino diluta, græcus codex habet *οἶνω ήμισι.* pro
οἶνω δις. Nō multo post, recremēti plūbi uncia una S. græce
 erat *σκαρίας μολίβδ' εββάφων* < S. pro *σκαρίας μολίβδ'*
 Ro. 1. S. q̄ loca nec Oroscius, nec Basiliēsis corrector aduertit.

Oroscius.
Basiliēsis. Circa tedam.] Hoc est circa lignum ad tedam aptatū, cui
 lana cum alia quædam pinguedine circumuoluitur, ad flam-
 mam alendā, cuiusmodi hodie etiam lucernarum loco utunt̃.

Thuris, aluminis scissi.] Hic quoq; diligentiam Basiliensis
 Correctoris desidero, qui lectionē græcā & cōfusā & mutilā
 reliquerit. Nā habet *λίβανου σχισης* < ᾱ quod ad uerbū so-
 nat, thuris scissilis drachma nullo sensu, cū legendū sit *λίβανου*
σχισης, ριζα. < ᾱ. qđ signat thuris, aluminis scissilis, singul.
 drach distinctione post thuris additā, deinde post *σχισης ανω.*

IN XXI. ET XXII. CAPVT.

Erysipelas.] Multi inter latinos scriptores interpretātur
 erysipelas sacrū ignē. Celsus aut̃ hūc ab illo separat, eoq;
 malui græca uti dictione q̄ expositione esse obscurus. Vide Ga-
 lenū secundo ad Glauconē: Aetiū lib. 14. & Oribasī septimū.

Abscessorij tumores.] Hoc est q̄ abscessum representāt. sic
 uerti *ἀποστηματώδεις ἔγκαι* quasi dicas apostematici tumores.

Phyma & Phygerlon.] Tubercula sunt tumida. Celsus græ-
 cis nominibus quoq; appellat Bubo à loco nempe inguine,
 cui solet magna ex parte accidere appellationē accepit, quan-
 quam etiam alas, & ceruicem interim infestet.

IN XXIII. CAPVT.

ORibasius] Lib. 7. huius tuberculi mentionem. Pauli au-
 tem lectio nonnihil est uiciata habet. enim, *ἐπιμερόται δὲ*
αὐτῶς

αὐτῷ ἀνω κάτω pro ἀνωτάτω. Paulo post, τὸ ὑπὸ κάτω pro ὑποκάτω ut sit una dictio. Id quod Aristarchi nostri omiserunt.

IN XXV. CAPVT.

Carbunculus.] Sic uerti græcā dictionem ἀνθρακίς, id est, ad uerbum, Carbonēs Celsus autem, quem libeter in dictionibus latinis imitor, Carbunculum nominat.

Codex impressus.

Quod ulcus est crustaceum.] Habetur in græco ἡ περὶ εἰς τὴν ἐσχαρώδη ἔλκη, quod est, siquidem sunt crustacea ulcera. Ego autem legendum puto pro ἡ περὶ, ὅπερ ut referatur ad ἀνθρακίς. Sua sponte præterierunt hoc, Oroscius, & Gemusæus.

Depascaturq;.] Sic exposui, μετὰ νομῆς quod est cum depastione, Sensus est, ita carni subiectæ affixa est, ut eam quoq; depascatur. Volui itaq; uersionis meæ rationem reddere, ne quis seuenior censor nos à uerbis ipsis discessisse clamet.

Circumscribuntur.] Ad uerbum exposui περιγράφονται. Signat autem hoc loco circumscribi, tolli, aboleri. Nam qui carbunculi carnem obsidentur, facile tolluntur, qui partes solidas, pertinacius hærent.

περιγράφεται.

Vel & ipsum similiter dilutū.] In Græco codice pro εἰ tu fac ἢ, quod etsi exiguū sensum tñ poterat cōfundere. Neglexerūt Censores interpretum.

IN XXI. CAPVT.

Cancer in qualibet.] Hoc caput quasi ad uerbū habet Aetius lib. 14. Oribasius septimo. Galenus secūdo ad Glauconē. Habet autē lectionē deprauatā in exēplari græco, οἷον ἐστὶ τὸ ἐπίθυμον πλῆθος. Γο. δ. S. quæ sonāt ad uerbū, quale est epithymū pōdere unciarū quatuor. At nemo nō medicinæ peritus intelligit nunquā epithymū dari tāto pōdere. Legendum itaq; uenit in hūc modū, οἷον ἐστὶ τὸ ἐπίθυμον πλῆθος Γ. δ. S. id est, quale est epithymū pondere drāchmarū quatuor & S. Nā Dioscorides, aliiq; eiusmodi ferè pōdus admittūt. Miror Oroscium tam grauem interpretū Censorem & Gemusæū, aliqui in medicinis exhibendis peritum hæc non aduertisse.

Oroscius.

Codex emendatur.

Gemusæus.

IN XVII. CAPVT.

Oedema laxusquidā.] Oīa ex Galeno ad Glauconē, 7. Oribasij 14. Aetii trāscripta sunt. dixi autē indolēs tumor, hoc est doloris expers tumor. Vide ēt Galenum lib. 14. Methodi.

Affectus qui hominē premit.] Lectio Galeni libro iam citato corrupta est, habet enim τῆ κατέχοντος πλῆθος, quod Linacer exponit multitudinis, quæ hoīem premit, cū legendum

Galen. codex emendatur.

fit τὸ κατέχοντος πάθος, hoc est affectus, qui hominē premit.

Ellychnion.

Tenuerrimum ellychnion.] Ellychnion est quod ex papyro sparta, canabe, aut itupa tortum in lucernis uritur, dixi tenuerrimum, hoc est mollissimum, græci ἀταλκτάτον.

IN XXX. CAPVT.

διαπή-
σις.

Per subsultum.] Græce subsultus dicitur, διαπήσις Gale- nus lib. 5. Methodi quomodo fiat, exponit in hunc modū. Diapedesis ex tunica quidem ipsa rarefacta, sanguine uero tenuato: interim etiam ex graciliū uasorū adaptatū nascit̃, &c. quando aut̃ hoc fit, sanguis ueluti subsiliendo ex uasis prodit.

IN XXXI. CAPVT.

ξηγμα.

Ruptio.] Vnitatis solutio pro particularum natura, nomē claturā sortitur. In esse græcis κατάγμα quasi fractura dicitur, in carnosis musculorū partibus ex distēione perueniēs, ξηγμα hoc est rupturā, de qua hic fit mentio. Cum autē filamenta similiter tensa rumpuntur, uulsum. In carne uulnus.

IN XXXII. CAPVT.

Oroscius,
Nota le-
ctionem,

Exactos quidē scirrhus.] Vide secundū ad Glauconē. & quartūdecimū Methodi: Vnde hæc omnia fere sunt trāslata, quāquā Oribasius antea & Aetius ea quoq; trāscripserint.

A balneo autem in totum.] Oroscius simpliciter vertit à Lauacris uerò continuis abstineant, quod mihi non placet. Nam uidetur Paulus præcipere ut in totum à lauacris abstineant scirrhus laborantes, aut si id non fiat, saltem à frequentibus, alioqui dictio συχνῶ ex superfluo fuisset adiecta. Ego itaq; lego ἢ γὰρ duabus dictionibus, non ἢ γοιν ut habetur in exemplaribus Aetius abstinendū præcipit à balneis medicamentosis quæ atrametum sutorium, alumen, aut sulphur resipiant.

IN XXXIII. CAPVT.

Codex e-
mendatur,

Nasturcii.] Male in codice græco καρδαμῶν pro καρδίου μου habetur, item σκληράς pro σκληρείας. In fine ἀμμοῖν καὶ θυμάματος. < β. Vbi Gemusæus ex codice Ruelli legit à quo hic non dissentio.

IN XXXVII. CAPVT.

Oroscius,

ἄχνη.

Vercus folia applicata ulceribus.] Vide Oribasii librum septimum, ex quo Oroscius græcam lectionem calligādā putat, legēdumq; ἄχνην ἀλέγειν pro ἀράχην ut sit pol- len farinæ, nō aranei telū, quanquā hoc ēt recētibus uulneribus cōglutinandis cōducatur. Sed malo cū Oribasio legi ἄχνην.

Anagallis,

Anagallis.] Rursus ex Oribasio, ponendum anagallis, pro ἀνάπαλιν ποιεί. Expunge periodum.] Exemplaria Ruellii, & Lascaris ueterem lectionem retinent. Corrigitur lectio.

IN XLV. CAPVT.

MYrrha.] Galenus tertio methodi fufius hæc exponit. Aetius pro myrrha uidetur, legere, myrtus, non omnino male, nam ulceribus conglutinandis, si Dioscoridi credimus, effica- Nota.
 xax est, præterea astringit, & siccat citra rosionem quod proposito cōducit, facilis erat lapsus σμήνα ex σμυξίνη, aut μυρτα.

Ostreorum.] Aetius habet, ostreorum crematorum, item in fine habetur singulorum uncia octo nimirum pro drachmæ octo. Nam antiquum lascari exemplar non Po. quod est uncia, sed < habet. Orosius & Gemusæus noluerunt hoc annotare Rursus in sequenti emplastro, cadmiæ drachmæ sex. In græco male habetur Po. pro < mox sequitur, æris combusti, singulorū drachma, ubi Codex Po. hoc est unciam habet. Deprauata lectio.

IN XLVIII. CAPVT.

SI inferius spectet.] Galenus secūdo ad Glauconē hæc ferre ad uerbū habet, unde ē textus codicis Pauli impressi corrigendus est, legēdumός, καταξρόπῃ δὲ ὄντος αὐτῇ ubi habet ἀναξρόπῃ δὲ ὄντος αὐτῇ, cōtrario nimirū sensu, Galenus autē dicit κατὰ τοὺς δ' ὄντις αὐτῇ. Idem namq; est κατὰξρόπον, & κατὰντες. Omisit Orosius & Basiliensis corrector. Corrigitur græcus textus.

Etenim in cubito.] Sic interpretatus sum ἐν πῆχει, quæ uox græcis significat eā brachii partē, quæ ad manū rēdit interius ulnā quidā recētiore nomināt ἀγκών flexura ipsa recte di. Veteres sanguinē ex cubito detrahi p̄cipiētes, hāc intellexerūt. πῆχυς.
ἀγκών.

De finibus diruptus.] In græco codice est περὶ ξακωδῆς κόλπων. Signat autē ξακωδῆς idem quod ῥωγάλας, καὶ διεξῥωγας, hoc est fractus & ruptus Venit autē à ξάκος, quæ uox significat pannū & uestē laceratam. Sicut ῥάκων apud Aristophanē uestem uileni, detritam, & pertusam Hic itaq; ξακωδῆς abscessui accommodatur in quo cutis pus congestum integēs, erosā extenuari deterij; instar pellium detritarum cōtingit. ξάκος.
ξακωδῆς.

Vt neq; admodum sit durum.] Mirum est quā Orosius hic memor sui non sit. Antea me reprehenderat, quod dictionē græcā ἀμόλυντον ueterini, manus non inquinans. Hoc autē loco nō uidet à Paulo emplastrū liquidū intelligi, cū dicit μητιστακλήραυ, μήτε ἀμόλυντον. Galenus ad Glauconē eadē habet. Orosius.

AT scopus crustā generantiū.] Hoc est, eo cōsiliū in crustā generātibz dirigit, ut calefaciāt simul & astringā t. Calx aut calefacit tantū eoz; non ita cōmode adhibetur. Hæc sunt ex Rufo, petita. **IN LIIII. CAPVT.**

Neruis uulneratis.] Paulus hæc fere ex Galeni tercio secū dum genera mutuatus est, mutato tantum docendi ordine. Aetius lib. 14. Oribasius septimo habet eadem. Cæterum uocat in neruis uulneratos, *νδρστρώτους* in tēdonibus, *τενον- τοτρώτες*. Curatio autem communis est.

*νδρστρώ-
τος.*

Specillo subunctorio.] Sic reddidi *ὑπαλέπτρω* nimirum à uerbo *ὑπαλείφο* quod subiungo significat, deriuato.

Maiores conuulsionis metus.] Male in codice græco habet, *δ μὲν κίνδυνος τῆ σκεπαθῆναι, ὁ δὲ μὲν κίνδυνος τῆ σπαθῆναι.* Orosius & Gemulæus non aduerterunt.

IN LV. CAPVT.

Ancylas.] Celsus & Scribonius eius discipulus, Contra- ctionem, ligationemq; articulorum interpretantur græcorum dictiones *ἀγκύλας*, & *ἀγκυλώσεις*.

ἀγκύλαι.

IN LVI. CAPVT.

*νεῦρα συν-
δετικά.*

Nam colligantes nerui.] Hoc loco intelligit per *συνδετικά* καὶ *νεῦρα*, ipsa ligamenta, quæ ossa colligāt : uocat autem neruos quod eos imitētur. Nā alibi tres species enumerant, alios qui sensum motumq; præbent, alios qui motui tm̄ seruiunt, ut tendines, alios qui ossa cōpagem ligant, uinciuntq;.

IN LVII. CAPVT.

Corrigitur
codex im-
pressus.

Tres sunt uniuersæ.] Aetius lib 9. eundē fere docendi ordinem seruat Celsus duorum generū meminit, Latorum quos etiam peiores dicit, & teretum, Græci addunt etiā ascarides. Habetur in Græco codice *ἀσκαρων* pro *ἀσκειον*, hoc est extre morū perfrictione potius quàm articulorū, antea notauerā.

ζομήσεις

Cochleari.] Sic exposui *ζωμήσεις*, qd̄ Grāmatiti Græci dicūt instrū esse, quo spuma ab ollis tollit̄. Quia igitur nullum cōmodius uasculū ad hanc rē inueni, cochleari interpretatus sum.

IN LVIII. CAPVT.

Recentio-
rum opi-
nio


Carnem fassam.] Recentiores medici carnē suillā pingue, fassamq; uolunt subiici. Aetius pinguedine adempta subdi præcipit. Tu uide quos imitari malis, utrobiq; bona est ratio.

Finis libri quarti Commentariorum:



COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER QVINTVS.



CAPVT I.



DE uirulentis bestiis.] Hoc libro in multis Dioscoridē Paulus imitatur quanquam Galenus etiam librū de Antidotis conscripserit post eū Orbasius, Aetiusq;.

IN II. CAPVT.

HOmo adhibēdus est qui uulnus exugat Celsus lib. 5. idem præcipit. Si cucurbitula inquiens nō est,

quod tñ uix incidere pōt, tū quodlibet simile uas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui uulnus exugat. Græce erat. ἐκ μύτης μὴ κεχρηθῆαι, hoc ē exultione uti.

ἐκ μύτης
μῆς.

Galenus memoriæ prodit.] De uipera multis in locis meministum in commentario simplicium medicamentorum, tū ubi antidota, confectiōemq; Theriacæ comprehendit.

Aut paliurū.] Codex græcus deprauatus particulam n̄ desiderat Legi debet, n̄ παλιῦρον, quod etiam Orbasius lib. 8 habet, præterit Castigator Basiliensis.

Codex ca-
stigator.
Castigator
Basiliensis
ἐκ μύτης
γία.

Desudat ones.] Græce erat ὑδρωθῆναι hoc ē, quæ sudores mouēt, ut laconicū, aliq; id genus modi, ut. suenenū ab inter-
nis foras inuocent.

IN III. CAPVT.

HYDROPHOBIA.] Celsus hoc morbi genus miserrimum, Aquæ timorem appellat. Largus aquæ hoc est, liquoris metum interpretatur ὑδροφοβία.

Aquæ ti-
mor.
ὑδροφο-
βία.

ἀπορία. Sudore & anxietate.] Verti ἀπορίαν anxietatem. Est autē proprie ἀπορία consilii, aut propositi inopia, incertitudo, ex qua quis nescit, quid potissimum acturus sit. Ruellius uertit ἀπορίαν languorem.

περισσεύειν. Carnis præcisio.] Græce erat τὸ μὲν περισσεύειν, quasi dicas circa carnem sectio, uel circūscriptio. nam interim carnem amputare scalpello conuenit.

IN IIII. CAPVT.

Celsus. **L**ata manu morsum ferito.] Hac locutione Celsus etiam utitur. Si manus, inquit, uulneri imponitur, superq; id duobus digitis uerberatur.

πεπρωμένα δ' ὕματα. Ad feruidus autem iam morsus.] Græca sonant πρὸς δὲ ἡδὴ πεπρωμένα τῶν δημάτων, hoc est ad morsus quos inflā-matio iam feruida inuasit.

IN V. CAPVT.

Lac ficulneum. **E**T lac ficulneū.] Hoc est, liquor ficulneus sic lac papaneris lac laseris aliorumq; cōsimiliū pro liquore, aut lachryma.

IN VI. CAPVT.

Dioscorides & Paulus uariant hic. **S**ed leniter rubidus.] Græce habet ἁλλὰ μετρίως μὲν ὑπέρυθρος, quod est, sed mediocriter quidem subrubens. Dioscorides impressus habet pro ὑπέρυθρος, ὑπέρυγρος, hoc est humidus, atq; ita uertit Ruellius. Marcellus autem ὑπέρυθρος, quā-quā supra Paulus dixerat. ἐνερδὺς uide utra placeat lectio.

Et uiridiū cupressi foliorū.] Mutilus est codex græcus. Nā desiderat dictio φύλλων legēdumq; uenit χλωρῶν κυπαρίσσου φυλλων ἢ σφυρίων. Id Oruscius nō aduertit nec Gemusæus,

IN VII. CAPVT.

Particula. **P**articula intenditur.] Hic intelligo particulā penem ipsum. Sic etiam apud græcos τὸ πορίον accipitur. Dioscorides δὲ ποτρίχιν huius loco habet, quod est pilorū erectionē.

IN IX. CAPVT.

Confer auctores. **A**ttolliturq;.] Pauli Codex Græcus habet ἐπαίρεται, hoc est attollitur, Dioscorides unde hæc transcripsit, περισσέπεται hoc est computrescit, legit. Item Paulus δύσινδῃ ponit pro δύσιατον, hoc est δύσφαρον.

IN XII. CAPVT.

ιομή. **A**lbū ulcus apparet.] hoc est ulcus depascens, quod ιομή græcis appellatur.

Frigidi madoris.] hoc est corpus frigido sudore perfunditur, mador

tur, maior initium sudoris est. ὁ τῆς græce dicitur.

ῥοτῆς.

IN XIII. CAPVT.

DE amphibena.] Hoc animal biceps est, autore Galeno, & utraq; parte ingreditur, unde nomen illi est inditum.

IN XV. CAPVT.

DRyinus.] Iude Galenū de Theriaca dictus est à δρῦς, quod Dryinus. in quercuum radicibus uiuat.

Torrones.] Græca dictio est τερρόφι qui proprie tormina sunt circa umbilicum, omneq; id spaciū quod in anteriore parte ab ore stomachi ad umbilici partes descendit hominem torquens.

IN XVI. CAPVT.

Qui hæmorrhoiæctum.] Hæmorrhus & hæmorrhōis suis ipsorum nominibus similem hominibus perniciem adferunt quippe percussi ab eis, sanguine per os, nares, totoq; corpore effuso intereunt.

Hæmorrhus.

Redduntur corpora.] Græcus codex habet ἀραιώματα, hoc est raritatis. Dioscorides quē Paulus sequit̃, σωματά ἐοίκ; sic uertendum duxi, quod Orosius & castigator Basiliensis præterierint.

Et si cicatrix toto corpore.] Sic quoq; legit Aetius, quāquā Marcellus Virgilius aliter legēdum Dioscoride sentiat.

Quem, euomentes.] Pauli codex impressus ἐξαιμαρῆντες pro ἐξεμεῖντες habet. Dioscoridem securus sum unde Paulus hæc transcripsit: licet sententia non multum uariet. Orosius non dignatus est annotare.

Orosius.

Aduersus feram præsidia.] Græca sonant πρὸς τὸ θηρίον. Orosius dum nimis exacte loqui studet, in aliis corrigendis, maxime fallitur. Paulū superius damnauit quendam quod θηρίον bestiam uertisset, semper eam dictionē pro uipera accipi affirmans. Cuius hic contrarium uides.

θηρίον.

Orosius.

IN XVII. CAPVT.

Natricis morsu uulnus factum.] Natrix primum in terra uiuit, & Cherfydios appellatur, deinde in aqua, unde hydros dicitur. Similis est pusillæ aspide, præterquam qd ceruicē latam non habeat ut aspides.

Natrix.
Hydros.

IN XVIII. CAPVT.

Nasturcium.] Dioscorides legit καρδάμωμον hoc est cardamomum nō καρδωμὸν quod est nasturcium, sequere utrāque malis lectionem.

Dioscorides & Paulus uariant.

Orosius.

Reginam Cleopatram.] Vide Galeni commentarium de Theriaca, ubi historiā ampliter comprehendit, speciesq; aspidum enumerat. Orosius putat in fine capituli aliqua ex Dioscoride apponēda, at ego breuitatis cā omīssa existimo.

IN XXIII. CAPVT.

Drachmis duabus.] In Aldino exemplari erat Cyatho uno. Basilienſis corrector fecit cyathis duobus. Aetius integram lectionem ita habet. Drachmis duabus ex cyatho uno aceti: Sequēti die drachmis quatuor ex cyathis duobus Tertia die drach. octo ex tribus cyathis. hoc prateriit Orosius. Lege igitur in græco <.β. μετ' ὄξους βυ. α. τῇ δὲ ἐξῆς <.δ. μετ' ὄξους βυ β. τῇ δὲ τρίτῃ <.η. μετ' ὄξους βυ γ.

IN XXVIII. CAPVT.

Historia
Mithrida-
tis.

Rex Mithridates.] Galenus ea commemorat lib. de Theriaca ad Piſonem, unde Paulus transcripsit.

IN XXXII. CAPVT.

Nota.

Ficus bridæ, item.] Transposita & peruersa uidetur lectio in Pauli codice impresso Nam Dioscorides unde omnia hæc sumpsit, aliter habet. Fac itaque in hunc modum συκὰ ξηρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν σὺν οἴνῳ παρακμάζοντος δὲ τῆ κατ' ὀξύτητα κινδύνου ὠφελεῖνται θυβαϊκὰς βαλάνους ἐθίζοντες ἢ λελεασμένας σὺν οἶνο μέλιτι ἢ γάλακτι πινόντες, ἢ καὶ ἀπίων ἀπαν τὸ γένος ἐθίζοντες καὶ γάλα γυναικεῖον πινόντες, Ita quoq; nos reddimus. Pauli scriptura ad uerbū hēt ut sequet συκὰ ξηρὰ λαμβάνοντες, καὶ τὸ ὀφέψημα αὐτῶν σὺν οἴνῳ ἢ γάλακτι πινόντες, ἢ οἶνο μέλιτι, καὶ ἀπίων μᾶλ' γένος ἐθίζοντες, καὶ γάλα γυναικὸς λαμβάνοντες παρακμάζοντος δὲ τῆ κατ' ὀξύτητα κινδύνου. ὠφελοῦνται θυβαϊκὰς βαλάνους ἐθίζοντες λελεασμένας σὺν οἴνῳ hoc est iuuantur, si ficus aridas sumant, earumq; decoctum cum uino aut lacte bibant, aut mulso; ac pirorum omne genus comedant, & lac muliebri assument, ubi periculum lenius fit & declinat, confert, si glandes thebaicas detritas cum uino edant.

IN XXXIII. CAPVT.

Mens impeditur.] Græca habent λαλιᾶς ἐμπόδις, hoc est loquelæ impedimētū. At Dioscorides unde hæc sumpta sunt διὰ νῆρας ἐμπόδις, id est mentio seu intellectus impedimentū habet. Ita quoq; Aetius lib. 13. scribit. Quibus authoribus

authoribus mutādam lectionem putauī, saluo aliorū iudicio.
 Et resolutione urget.] Hic quoq; uicium exemplaris gręci est habet enim καὶ ἐκλύσεις pro ἐκλύσεις, nec hoc annotauit Oroscius.

IN XXXV. CAPVT.

Piscibus uirosis.] Corrige lectionem gręcam muta; ex, ὁμοία ἰχθυος, βρομάδης. In ὁμοία ἰχθυοῖ βρομάδῃσι. Paulo post, ὑδρεῦσι δὲ δυσώδῃ αἵματι μεμιγμένα. Mutata est lectio, quę sic instaurari debet. ὑδρεῦσι δὲ δυσώδε, καὶ ἐμετῦσι χολῶδῃ ἐνίοτε δὲ αἵματι μεμιγμένα. ut nos uertimus. Oroscius & castigator Basiliensis hęc duo loca deprauata reliquerunt. Nō multo post πενθεδάνκ male habetur, pro κινδάνκ.

Lectio gręca emendatur.

Oroscius. Castigat. Basiliensis.

IN XLII. CAPVT.

Cvm oleo & passō.] Variat lectio Dioscoridis à Paulo impresso. habet σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκῇ, hoc est cū oleo & passō, ubi Paulus σὺν οἴνῳ καὶ γλυκῇ, quod est cum uino & passō. Aetius tantum ex uino dulci habet, sequere quęcunq; ualet.

Instauratur Pauli lectio ex Dioscorides.

IN XLVI. CAPVT.

PResertim in exurgendo.] Hoc est cū ē lectulo leuare se conantur, ut ait Largus. Gręca sonant, ἐν τῷ ἐξανίστασθαι.
 Opobalsami drachma cum uino.] Dioscorides habet cū melle aut lacte. In primo libro etiam opobalsamum ualere contra aconitum tradit, uide an malis cum Dioscoride lege-
 re. Ego exemplar sum secutus.

Nota.

IN XLVIII. CAPVT.

Totum corpus prurire facit.] Gręce est κινεσμός καθ' ὅλον τὸ σῶμα. Dioscorides etiam in hunc modum habet. Largus autem cuius mentionem Galenus subinde facit, pro corpus, habet os in hunc modum. Ephemerum potum protinus quidem os prurire facit, uelut scilla tactum postea etiam adurit, quasi pipere manducato. Hęc te, lector, latere nolui.

Largus.

Nota.

IN LIII. CAPVT.

Pharicum dictum.] Multi scriptores dubitant, simplex ne sit an compositum. Largus ex compluribus componi affirmat.

Nardum syluestrem.] In codice Pauli Gręco deerat ἀγρία. Tu ex Dioscoride restituito Basiliensis castigator omisit.

IN

Castigatur
textus græ-
cus.

VT uinum dulce cum rosaceo.] Deprauat^{us} est Codex græcus impressus, habet enim γλυκὺν οἶον pro γλυκὺν οἶον. Omisit Gemusæus.

IN LV. CAPVT.

A Trametum sutorium.] Hic quoq; uiciatus est codex græcus, habet enim χάλκῳ ἀνός hoc est, flos æris pro χάλκαον, ut sit atramentum sutorium. Ex Dioscoride castigatum: Basiliensis castigator hoc etiam non aduertit. Largus habet æris flos, sed male opinor.

IN LVI. CAPVT.

Impressū
exemplar
græcū cor-
rigitur.

Dentes tincti.] Græcus codex impressus habet ὀδοντες βεβρυμένοι hoc est dentes erosi. Dioscorides ὡς ὀδοντες βεβαμμένοι quod est Dentes tincti. At Aetius legit gingiuæ corrolæ. Secutus sum Dioscoridem. Præterit Gemusæus.

IN LVII. CAPVT.

Marcel-
lus.

LAc potum quod subito ac confarctum sit intus congelatum.] Sic interpretatus sum γάλα ἐπιτυαθὲν ἀδρῶν. Nā si prius coagulatum est quā fuerit assumptum, non opus habet, ut rursus congeletur: Longe dissentio à Marcello cui ἐπιτυαθὲν uertendum censet, cui coagulum sit admixtum, cū Paulus coagulum superbibi cū aceto præcipiat. Sed ἐπιτυαθὲν intelligo intus, hoc est in corpore congelatum. Ibi enim aliquando coit in grumos, & densatur, ut respirationem impediatur. Vbi igitur lac assumptum repente, ac cumulatum, in corpore coierit, remedia adserenda sunt.

κονία πι-
λοποικῇ.

E cinete lixiua.] Turpiter hic Ruellius Marcellus, aliiq; interpretes lapsi sunt, qui κονίαν πιλοποικῇν uerterint, nunc lutum excolatū, nunc lixiui genus aliquod. Nihil enim aliud est quā à cinere lixiuium, quo & pilotarii, & alii artifices utuntur. Sicut apud Galenum ὕδωρ πιλοποικτικόν, quod Largus in eodem medicamēto dixerat, è cinere lixiuium, ut alias annotauimus.

IN LXII. CAPVT.


Castigatur
codex græ-
cus.

HOrmini semine. Male habetur in codice Græco θερμίνου ἀγγείου pro θμίνε ἀγγίε. neglexit Gemusæus.



COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN.

LIBER SEXTVS.



V M humor oculis.] Liber hic sextus curationem tradit, quæ ferramentis & manu administratur. Certe difficilis existit, tum quod nemo hæc eo ordine tractarit, tum quod ij unde transcripsit, non extant. Curabo tamen pro mea fide, ut nihil quod lectorem remorari possit, indiscussum relinquas:

Ferramentis nuclei modo rotundis.]

καυτηρας πυρρνοειδεις. Græce dicuntur πυρρνες, extrema speculorum siue acuta, siue caua, siue rotunda. Hoc autem loco, rotunda ut ustio commodius administretur, aliqui nuclearia uocant instrumenta Celsus tenuibus, retusisq; ferramentis ait lib. 7. de oculorum humoribus reprimendis sermonem faciens. At in elephantiasi.] Paulus hoc lib. 4. iam docuerat, nempe multos qui ne in totum insanabiles fierent, ex capitis ustione seruatos.

Sextus liber omnium difficillimus.

πυρρνες.

Tenuia, retusaq; ferramenta. Ustio capitis.

IN III. CAPVT.

HYdrocephalon.] Celsus lib. 4. Inuenitur genus quod longum potest esse, ubi humor cutem inflat eamq; intumescit, & prementi digito cedit υδροκεφαλον Græci appellant.

Hydrocephalon.

In ociosam inutilemq; mutato substantiam.] Oroscius omnia grammaticorum Lexica introspexit ut me in dictione Græca ἀργον, tanquam male eam interpretatum reprehenderet, ac tandem Budæum nostrum in commentariis in Græcā linguam consulens, ἀργον, inuenit significare, contrarium ei quod elabora-

Oroscius, οἰργος.

elabora-

Crudum.

elaboratum, confectum, concoctumq; est, eoq; exponendum hic censuit ἀγνῶν, crudam, non attendēs, quo modo in re medica crudum dicatur. Nam sanguis nunquam dicitur, post absolutam sanguificationis terminum crudus fieri, sed mordax, acris, crudum uero aut semicoctum succum, sanguinem mutari, aut sanguinem minus elaboratum, ac crudū adhuc in perfectum degenerari. Gal. enim lib. de sanitate tuenda quarto cōcoctionem ponit crudorum, uel etiam semicoctorum humorum eductionem acrium. At sanguis non consistit citra concoctionis terminum. Et si adhuc in uenis etiā illis capitis semicoctus ac crudus existeret, tamen non diceretur extra uasa elapsus, in crudam mutari substantiam, sed putridam potius ac peregrinam. Qui enim extra instrumenta sua elapsus est, nō potest non corrumpi. Crudus autem fieri, non potest. Quare Orosius hunc laborem castigandi, non alio quā calumniæ studio sumplisse uidetur, ipse maxime corripiendus.

κεκυρτω-
μένος.

Orosius.

Puluino sublimi.] εἰς ὕψος κεκυρτωμένος, hoc est, in sublimē eleuatus, quemadmodum puluini in superficiē tument, gibbero extante.

Et quia paucis particulis subiectus] Orosius coniungit hic sequentia cum prioribus. Græca sic habent δι' ὀλίγου σώματος ὑποπέπτων κατὰ τὴν ἐπέραιον τῶν δακτύλων. At clausula hæc posterior κατὰ τὴν ἐπέραιον segreganda est à priori, connectendāq; sequentibus, in hunc modum, κατὰ τὴν ἐπέραιον τῶν δακτύλων ἑαδὲως ὑπέραιον.

Lineis in-
cidere.

Daabus utemur lineis.] Hoc uest duas diuisiones molierum. Celsus ubiq; loquitur eodem modo, ut lib. 7. Reperti in Græcia sunt qui nouem lineis cutem capitis inciderent. Itē Reperti sunt qui à capite recte eas lineas ad tempora diducere. Græce est δι' ἑπτά κεκρήμεθα διαίρεσις.

IN V. CAPVT.

Aut etiam acutus.] Fluxiones in oculos nunc longæ, nunc breues eueniunt, pro humorum in illos decumbentium ratione particula & in Græco codice male pro & posita est, nec Orosio, nec Gemusæo aduertente.

Aut etiam ceruix deligata sit.] Ut scilicet magis conspiciatur. Nam Celsus lib. 7. de eadem re tractans, frequens curatio est, uenas in temporibus adurere: quæ fere quidem in eiusmodi malo

di malo tument, sed tamen ut inflentur, magisq; se ostendāt, ceruix ante modice deliganda est.

Membranam detrahemus.] Codex Græcus uiciatus est, ut qui ὡφ' εἶν habeat pro ὡμένα. omisit Oroscius, aliiq; castigatores. In fine capitis ἀφελωτικαῖς uertit crustam inducentibus, cum dicendum esset, cicatricem inducentibus.

IN VI. CAPVT.

Hypospatismo.] Anonymus quidam Græcus inquit, hypospatismus itaq; tribus sit super frontē diuisionibus post latiore specillo quod spatululam uocant, per corpora quæ interiacent, transmissio.

ὑποσπα-
τίσμος quæ
si spatæ
transmis-
sis.

Exilem spatam.] Hoc est gladiola modo latam Græco uocat Paulus ὑποσπαδιστῆρα. Paulo post σπάδιον, quasi dicas spatulam. Hac autem dictione usus sum non quidem latina, sed medicis cognita.

ὑποσπά-
διον.
πτήγμα.

Panniculumq; implicitum.] Græci πτήγμα & πτυγμάτιον appellant. Galenus in commentariis de Chirurgia.

IN VII. CAPVT.

Periscyphismus.] Citatus supra Græcus author, memoriæ prodit periscyphismus est, cum transuersis lineis coronæ modo frons secatur.

Penicillis.] Sic reddidi σφινίσκος, quæ linamenta dicuntur cunei modo intorta. Vnde quidam reddunt cuneolos ex linamentis.

σφῆνισ-
κος.

IN VIII. CAPVT.

De futura.] Titulus capitis habet περὶ ἀναρῆαφῆς quæ dictio deriuata est à ῥάφῃ & ἀνα. Sicut inferius caput facie de κατὰ ῥῆαφῆς hoc est de futura [inferioris palpebræ à κάτω & ῥάφῃ.

ἀναρῆα-
φή.
κατὰ ῥῆα-
φή.

Græci appellant διττιχίασιν. Celsus eleganter lib 7. hanc dictionem interpretatur, Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit. Quo authore ego quoq; uerti, cum naturali pilorū ordini, alii præter naturam pili succrescūt, nihil tamen ex Pauli snia commutauī. Græce sonāt in huius modū ἡ κολουμένη διττιχίασις ἐστὶ μὲν ἐκ φύσεως παρὰ φύσιν τρύχων, αἷς τὸν κατὰ φύσιν ἀντὶχόντῃ βλέφαρον προσγινομένη τρύχων.

Interim in phalango si.] Phalangosis est cū pilorum subnascantium duplex, triplex uel acies uel in superiore, uel in inferiore palpebra prouenit.

φαλέγγω-
σις.

Cuspide

πυρῆν.
σμίλης.

Cuspide specilli.] Græce est πυρῆν σμίλης. At intelligendum uenit apud Græcos πυρῆνα nunc pro cuspide accipi, nūc pro extremo quidem capi, sed cauo, unde aliquid infundi pōt. Itē rotūdo, nucleoq; specilli. Hic igitur specilli cuspide palpebra in rugas, plicasq; aut sinum coacta quod κολπώσαντες λέγεται, inuertitur. Dixi autem in rugas coacta, pro inuoluta aut cuspidentī.

κροκινῶ
διὰ γρόφου.

Croceno diarthodon.] Sic appellat collyrion apud Paurum 7. lib. quod ex rosīs inscribit, adiecto croco in Græco codice κροκινῶ habetur pro κροκινῶ. Neglexit Oroscius.

Et ueluti lacte infus.] Græce est ὡς γάλακτι ἐγχύτω. Oroscius uoluit instillato dici, quasi uero non etiam infundi dicatur in oculum medicamēta. Cels. Quicquid inspergitur, a uero specillo infundi debet.

IN IX. CAPVT.

Oroscius.
Vrina im-
puberis.

Vrina pueri impubis.] Oroscius diligens aliorū iudex. ἀφ' ὅρου uult à me exponi, uenerent non experti. At ego Plinium secutus dixi impubis. Ante pubertatem enim uenerem exercere nequeunt pueri. Hermolaus alijs; docti uiri eo quo ego modo sunt interpretati. Simili calumnia in sequente capite utitur, reprehendens ἱκανὸν uerti amplam notandā magnam, sufficientem, dicendum autem putans, idoneam contra Grammaticorum suorū quibus adheret pertinaciter, opinionem. Item in Aldino exemplari habebatur, ἔστι γὰρ, ubi ipse ὅν relatiue legendū censet, at ego ex Ruellii exemplari & sensu sine ὅ in hunc modum corrigendum codicem dico ἐστὶ γὰρ αὐτὴν τὴν ἑλπίν, &c. In 11. cap. pro διευχίαν, facito διευχίαν.

Oroscius.

Oroscius.
castigatur.

IN XII. CAPVT.

DE ectropio.] Inferioris palpebrę uicium est, quod parum sursum attollitur, sed pendet & hiat neq; potest cum superiore committi, ut ait Celsus.

Ectropiū.

Ectropion oboritur.] Vide librum septimum Aetii. Inuertuntur palpebrę nonnunquam exulceratione precedente & carne ipsarum adaucta: nonnunquam ex duriore cicatrice.

Auersum specillum. Ita exposui autoribus Celsō & Scribonio, ut etiā antea annotauerim. At Cræci τῶν κυανθίσκων τῆς σμίλης uidentur sepe cōfundere. Nunc pro cauo, & ad fundendum apto specilli extremo, nunc pro acuto & in cuspide abeunte accipitur, ut hoc in loco. Celsus etiam lib. 5. Quicquid, inquit,

Celsus.

inquit, inspergitur, auerso specillo infundi debet. Item libro septimo, nam quod paruulum est, super inguem in aluum uel digito, uel auerso specillo repellendum est. Iterum uulnus digitis, uel aduerso specillo diducendū est, ut torquentibus exitus detur: ijsque effusis tū diutius pura urina descendat. Scribonius compositione 227. Ac quarto die auriscalpio auerso, quam partem *κλαδισκόν* græci uocant sensim tentare, mouere abalienatū oportet, quo celerius excidant hæmorrhoides.

IN XIII. CAPVT.

A Nabrochismum græce dictū.] Nulla est apud latinos dictio, quæ anabrochismum significat. Deriuaturq; à *βροχη*, & *ἀνα*, quasi illā; ationem dicas. pili autem ansulis ex filo factis comprehensū euelluntur, ut non sit quod Oroscius dament, pilorum euulsionē à me dictā, quæ per filū administratur.

Auriscalpio.] Græce est. *μύλωτις*, quod deductū est à *μήλη* *μήλωτις*. hoc est specillum, & *ἄσπις*, auris proprie enim auribus destitutum est. Dicitur etiam *μυλάτρός* *μυλάτρεϊς*.

Specillum quod utroque extremo in cuspidem.] alein co dice Græco habetur *διαπύρινον* pro *διπύρινον*. Quod instrumentum est duplici cuspidē præditum. Nam *πυρήνα* extremum, ac summam cuspidem, seu nucleum, seu capitulum exponunt. Oroscius reliquit codicem deprauatum, sicut etiam Basiliensis Castigator.

IN XIII. CAPVT.

P Alpebræ cuti præter naturam.] Codex deprauatus græcus τῷ βλεφάρων δέσματι κατὰ φύσιν habet, pro *παρὰ φύσιν*. Notauit Oroscius.

Collectionem quandam.] Ita exposui, *συναγωγὴν τινὰ πῆς ὑδατίδος*, hoc est congregantes aliquo modo hydatidem intra digitor.

IN XVIII. CAPVT.

P Terigion.] Celsus libro septimo ita scriptum reliquit. Vnguis uero quod *πτήρυγιον* græce uocant, est membranula neruosa oriens ab angulo, quæ nonnunquam ad pupilam quoque perueniet, eique officit &c. Hunc ego imitatus, dixit unguem oculorum.

Hamulo modice inflexo.] Græce est, *ἀγκυρῶ μικροκαμπύλῳ*. Celsus eleganter dixit hamulum paulum mucrone intus recuruato, alibi, hamulos intus recuruato.

IN XIX. CAPVT

Staphyloma est.] Celsus nomen staphylomatis probe exponit libro septimo. In ipso autem, inquit, oculo, nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue luxatis, & similis figura acino sit, unde id staphyloma græci uocant. Itaque κέρας recte exponitur eleuatio. Nam alius quidam græcus dixit μεταωρίσμος.

IN XX. CAPVT.

De purulentis Galeni uerba] Græce purulēti ὑόπουοι dicuntur, cum scilicet totum oculi orbem, aut eius dimidiū pus occupat. Historiam apud Galenum habes in Methodi medicatoriz libro quartodecimo.

Nisi quis admodum diligenter.] In codice impresso græce habetur, εἰ μὴ παύ τις ἀκριβῶς. Deprauata nimirum pro εἰ μὴ παύ τις ἀκριβῶς. Orosius & Gemusæus ceu exiguum præterierunt.

IN XXI. CAPVT.

Suffusio.] Latini interpretantur ὑπόχυματα, suffusionem. Barbari Cataractam. Alibi Celsus enim ὑπόχυσιν nominat.

Lanam oui luteo cum rosaceo.] Hunc locum Græce ita habemus ἔριον λαυκῶν ὡς σὺν ῥοδίῳ δ' αὐτῇ, quem Orosius male & imprudenter uertit, Imponemus oui luteum rosaceo exceptum, deligatumque.

IN XXII. CAPVT.

Et si ad malas, subluuies.] Hoc est si ad genus humoris impetus deciderit. Paulus dixit, καὶ εἰ πρὸς μῆλον ὑποπίπτει ἡ ὑποφορά.

Ab uisione lenticula melle adiecto.] In Aldino exemplari habebatur omphacomeli, cuius descriptionem habes septimo Pauli inter potiones dulces. At hic nihil proficit. Sed phacomeli, legendum, quod est lenticula melle addito, ut superius τηλόμελι fœnugræcum melle adiecto, item malicorio ex σιδωτῶ reddidimus, à σίδια deriuatum.

IN XXIII. CAPVT

Hic affectus à prima.] Celsus septimo penè eadem habet. Solet inquit tamen tumere, uel à prima natali die protinus, uel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, eoque audiendi usu carcat;

careat, &c. Græci uocant πόρος ἀγέρτης. In titulo male per ἀγέρτης.
tota ἀγέρτης impressum est.

Postea accidit.] Hoc est, post natalem diem accidit hoc uitium, si præcesserit exulceratio.

IN XXIII. CAPVT.

A Vriculario specillo.] Sic exposui μηλωτίδα, quod aliquando etiā pro simplici specillo accipitur, ut in sequentibus interpretor.

Violenta capitis concussione, aure super circulum.] Celsus libro sexto ex Hippocrate inquit, Tabula quoque collocatur media in hærens capitibus ut. inque pendentibus superq; ea homo deligatur in latus uersus, cuius auris eo modo laborat: Sic ut extra tabulā emineat. Tunc malleo caput tabulæ qđ a pedib⁹ est, ferit, atq; ita cōcussa aure, id qđ inest, excidit.

Iam uero Calamo, græce] est διακαλαμίδος. Sic enim aqua potest elici, exugendo. καλάμις;

IN XXV. CAPVT.

P Olypus.] De hoc lib. 3. comprehensum est, uocat autem hic molliores, dictione græce ψαφαρωτέρας, quan dicas teneriores fragilioresq;.

Spatula.] Celsus etiam hac dictione utitur lib. 7. de Poly-po. Ergo, inquit, hunc ferramento acuto in modum spathefacto, resolvere ab osse oportet. Spatula.

Manubriolo ipsius.] Græce est τῷ, καὶ θισκῷ αὐτῷ, quod superius exposui auersam specilli partem. Celsus autem uidetur manubriolum capere pro aduersa specilli parte, ut libro 7. de Chalzio. Dein scapelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt, &c. quanquam etiam dicat eodem libro, Aduerso scalpello subsecare magna cum moderatione. καὶ θισκός;

Duplici cuspidē præditi] Male rursus in codice græco διαπυρίων impressum est, pro δι' πυρίων, nec hoc emendauit Oroscius Gemusæus. Oroscius.

IN XXXVII. CAPVT.

A Ntheron puluerem.] Libro septimo Pauli compositio- nem Antheri habes comprehensam. Dicitur autem ἀν-θηρόν. quod rosarum flores inter alia recipiat. Puluis Antheros.

IN XXX. CAPVT.

T Onfillæ.] Latinos in hoc uitio peculiariter significando uerborum inopia laborare testatur. Si quidem per consillas & partē corporis, & morbū exponere cogimur. Græci autē παρισθία.

distinctum partem παρίσθμια, affectū ἀντίστας appellant, & deuotioni spirationiq; negotium,] Græce est δυσχεραίαν τε παρέχοντα τῇ τε καταπόσει, καὶ τῷ πνεύματι, quod est ad uerbū, difficile usum deuotionis, & spiritui exhibētes.

Quantum licet] Hoc est quoad possumus, ὅφ' ἔσον δύναμει. Apic lib. 3. Trahuntur ad exteriora quantum est possibile.

IN XXXI. CAPVT.

Gurgulio.] Eadem fere Galenus libro sexto de compesitione medicamentorū fm locos habet, Carnosa (inquiens) ut nos uertimus quædā particula in summa oris parte suspensa apparet, si quis toto ore plurimum aperto linguā deprimat hæc inquam caruncula duobus nominibus à ueteribus græcis nominatur Gargareon, & Cion hoc est Gorgulio & Columna. His posterius medici prope omnes non ita, sed cronida quod est columellam ipsam nominant. Nam eorum qui staphylen, hoc est uuam uocitant, satius est nō meminisse. Non enim particulam, sed unum aliquem ipsius affectum, Staphylen hoc est uuam appellamus, &c.

Garga-
rean.
Cion.
Gurgulio.
Columella

Vua.

Tenues aut oblongæ.] Celsus partē ipsam contra græcorū opinionē, uuam appellat lib. 7. uua inquiens, si cum inflāmatiōne descēdit, &c. Paulo post quasi uerba Pauli recenset in hunc modū. Si uerò inflāmatiō quidē nulla est, nihilominus autem ea ultra modum à pituita deducta est, & est tenuis, acuta alba, præcidi debet. Ιτέῳ; si ima, lucida, & crassa, summa tenuis est.

IN XXXII. CAPVT.

Quomodo aspera arteria] Caput est περὶ λαρυγγομίας. Superius annotaui quid ὁ λάρυγξ apud græcos medicos sit, quid ὁ φάρυγξ & ἡ φάρυγξ. Hic dico τὸν λάρυγγα & φάρυγγα pro aspera arteria usurpari & inter se confundi, si cur etiam βρόγχον Gale. eodem modo utitur lib. 2. de placitis Hippocratis & Platonis magis autem ὁ λάρυγξ pro summa parte arteriæ, ὁ φάρυγξ pro tota ipsa ponitur. Verba Gale ni sunt. τὸ μέν γὰρ τῆς τραχείας ἀστηρίας ἥπερ δὴ καὶ φάρυγξ προσαγορεύομεν, &c. Paulo superius. πληττομένη γὰρ ὑπὸ τῶν κατὰ τῶν λαρυγγα χόνδρων, οἷον ὑπὸ πλῆκτρων τινῶν ἢ ἐκφυσις αὐτῆς φωνὴ γίνεται, &c. Iam eodem in loco ἡ φάρυγξ, nisi uicium sit codicis, pro ἡ φάρυγξ usurpatur, in hanc sententiam. οἷδ' ἔστι ἄλλοι ἔχουσι λέγειν, ἢ δ' ἔστι πλῆσιον εἶναι ἢ κρεῖττα τῆς φάρυγγος διὰ τὸ ἐξ ἐκείνης ἀρχεῖσθαι τὴν φωνήν, &c.

Larynx.
Pharynx.

IN

IN XXXIIII. CAPVT.

ANo proximos.] Codices nostri deprauati erāt, δ'ακτυλου habentes, pro δακτυλῆς ubi non parum debet Oroscius exemplari suo. Paulo post fac διάτρεσιν ex διάτρεσιν.

Implicitum aliquod in longitudinem.] Sic interpretatur λημισκόν. Celsus lib. 7. cap. 28. Intus inquiring, & implicitum in longitudinem linamentū (λημισκόν græci uocant) in aceto tinctum demittere. In codice græco est διασυστον distinctum, quasi duæ dictiones sint, iniprestum, quod legēdū est διασυστὸν τόν, quod pertrahi possit & implicari.

λημισκόν

Oroscius.
μοτοφυ-
λάκων

Fomentum & medicamen.] In exemplari græco habetur τὴν αὐτὴν ἐμβροχὴν μοτοφυλάκῳ φάρμακον, pro quo legēdū cenſeo τὴν αὐτὴν ἐμβροχὴν, καὶ μοτοφυλάκῳ φάρμακον. Nā antea uino & oleo, aut aqua & oleo aspergi uolebat, inde me dicamē in lintheolis illicitū accommodari. Capitur autem eo dem fere sensu, quo ἔμμοτον. primum non annotauit Oroscius, nec Gemusæus.

IN XXV. CAPVT.

IN Ceruice.] Superstitiosi quidam doctores, pro in ceruice, censent dicendum, in collo, quod ἐν τραχήλῳ græce dicitur. At Celsus fere ubiq; ceruicem pro collo, ut libro quinto de strumis agens in hunc modum, nascuntur maxime ceruice, sed etiam in alis, & inguinibus, & in lateribus.

τραχήλος

Arteriæ quas Carotidas appellant.] Hæ arteriæ in dextra sinistraque circa guttur sursum procedentes ultra aures feruntur, quæ nomen inde sortitæ sunt, quod ntesæ, aut alterationem quandam expertæ Caron inducunt, quemadmodū musculi καρσιδῆς apud Hippocratem de articulis.

Cartides.

Musculi.
καρσιδῆς
Nerui re-
currentes.

Nerui recurrentes.] Hi sunt nerui sextæ cōiugationis cerebri, qui iuxta carotidas arterias deorsum feruntur, communi utrinque uelamento, & in Anatome plenius condiscēs.

IN XXXVII. CAPVT.

ARteria aperte.] Galenus libello de tumoribus præter naturam hūc in modum habet. ἀρτηρίας δ' ἀνατομωθείσας, τὸ πάθος αἰνυρισμα καλεῖται. γίνεται δὲ καὶ τῷ ἴσθμῳ αὐτῆς, ἐπειδὴν εἰς ἑλὴν μὲν ἀφίκεται τὸ προσκείμενον αὐτῇ, διὲς καὶ δὲ μὲν τῆς ἀρτηρίας ἑλκος, μήτε σιμφυέσις, μήτε σιφυλάσις, μήτε σαρκί φραχθείσις, διαγινώσκειται δὲ ταῦτα οὕτως παθῆναι τῷ σφιγμῶ τῶν ἐργασαζομένων ἀρτηριῶν, ἄλλα καὶ θλιβῶν

μένων ἀφανίζεται πᾶς ὄγκος παλυνδρομῆσιν εἰς τὰς ἀρτηρίας
 πῆς ἐργαζομένης αὐτὸν ἐσίας. Ex quo sententia, addendum in
 Paulo superius est ἔλκος, legendumque μένι δε πῆς ἀρτηρίας
 ἔλκος, non μένι δε τὸ πῆς ἀρτηρίας, &c. Hæc non annotauit
 Orosius, uel Gemulus.

Tumor omnis euanescit.] Codex græcus habet πῶς δ ὄν-
 κος pro πᾶς ὄγκος. nec hoc aduerterunt Aristarchi nostri.

IN XXXVIII. CAPVT.

βρογχολί-
 λη

Gutturosi.

συτροφή.

GRandis in ceruice & rotundus.] Celsus lib. 7. inquit, Ac
 in ceruice inter cutē, & asperā arteriam tumor increfcit,
 βρογχολίλην. græci uocāt, &c. Qui hoc uitio laborāt gutturo-
 si apud latinos nomināntur. IN XXXIX. CAPVT.

GAnglion.] Verti ganglion est nerui in modum concretio
 quod græce est συτροφή νδρῶ. Nā indurātur nerui, contor-
 quenturq; ac in nodosam affectionē coeūt. συτρίφειναι signat
 inspissari, coire, indurescere. IN XL. CAPVT.

Copia uero ipsius] Vide Galeni commentarium de ple-
 nitudine: ubi copiam utramque susulime exponit.

Ordo ue-
 narum in
 mittendo
 sanguine.

At in capitis morbis.] Galenus libro de anatomicis tracta-
 tionibus quarto in eandem fere sententiā habet. In his qui in
 fra iugulum afficiuntur, siquidē sanguinē detrahē oportet,
 principium locum præsidii ratione uena possidet: quæ cubiti
 flexū accedit & quæ ad cubitū ipsum defertur. Tertiū com-
 munis, quartum quæ ab humeraria ad flexū cubiti pergit, po-
 stemū humeraria ipsa. In illis autē quos supra iugulum mor-
 bus infestat, contra, humeraria primum, quæ inde ad cubiti fle-
 xum porrigitur secundum, tertium communis, quartum quæ
 ab interiori parte flexum adit, quintum, quæ cubitum ipsum,

IN XLI. CAPVT.

Leuis cu-
 curbitula.

Leuis itaq; Cucurbitula.] Dicitur leuis cucurbitula, quæ
 sine scarificatu, & flamma imponitur. uide Galenū in li-
 bello de hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, scarificatu.

Alii cucurbitulis usi sunt uitreis.] Celsus duo genera cu-
 curbitularū ponit æneū, & corneū quanquā ex aliis quoque
 materiæ generibus fieri doceat. ac si cætera defecerunt calcu-
 lus quoque pultarius oris cōpressioris ei rei cōmode aptatur.

Genera cu-
 curbitula-
 rum.

IN XLII. CAPVT.

Hippocrates.] Libro de Articulis de ala mentionem fa-
 cit, non autem certe altius ferrum adigi præcipit, quod
 nerui,

nerui, uenz, & arteriæ subſiat, quæ calorem iſtum ex ferramento tolerare nequeunt. IN XLIIII. CAPVT.

Conuenit igitur.] Græcus codex plane peregrinâ habet lectio nē, quid enim ſibi uult ariſtolochiæ mentionē facere, uti ferramento cruſtę excitandę ſunt. Habet autē in hunc modum. *ὅτι ἐν τῇς μακρᾷς ἀριſτολοχίας τὴν ρίζαν ἀλαίῳ ὀδύσαντας ἐντίθεναι αὐτῇς πεπυρακτωμένας τὰς ἐσχάρας.* hoc eſt conuenit igitur longe ariſtolochiæ radicis oleo imbuta imponere iſtis cruſtas ignitas. Mihi autem legendū uiderur *ὅτι ἐν αὐτοῖς καυτηρίοις πεπυρακτομένοις τὰς ἐσχάρας ἐνχιθέναι*, ut nos uertim⁹. Neglexerūt locū Oroſci⁹ & Baſiliēſis caſtigatōr.

IN XLV. CAPVT.

Galenus ſolam adminiſtrationem.] Libro quartodecimo Methodi hæc ad uerbum inuenies.

IN XLVII. CAPVT.

Vomica laborat. Græce eſt *ἀφυστάμενον* quaſi dicas, abſcedens. Celfus de uſtione iecoris agens, dicit ſi uerō iecur uomica laborat, eadem faciēda ſunt, quæ in cæteris interioriſus ſuppurationib⁹. quidā etiā contra id ſcalpello aperiunt, iſſam uomicā adurunt. IN L. CAPVT.

Vomica in
pectore.
Aſcites.

Quo ueluti in utrem aqua colligitur.] Hoc eſt, ſi aſcites hydrops eſt. Nam *ᾰσκος* utrem ſignat. Auicenna adminiſtrationem ex Paulo ſumpſit.

Aſcites.

Imum abdomen aduſq; tenuem.] Sic redidi *ὕπογάστριον*, quod ad uerbū ſonat imū uentrē. Sed abdomen imum ex Celſo ſumpſi, nam exterior uētris pars eſt, abdomen. forte *ἐπιγαστριον* legendū eſt, ut in ſequentib⁹, *χαλκῆν καλαμίſκον διατέ τῆς τῆ ἐπιγαστρίας, καὶ τῆς τῆ περιτομίδος διατείσειν καθόλου*.
IN LII. CRPV T.

Quomodo peritonæi.] Hoc caput ex ſexto medendi Methodi libro ſumptum eſt, uerum in codice græco, mirum quam mutū & deprauatum. Oroſcius aut, & Baſilienſis caſtigatōr non aduerterunt, in erratis interpretū occupati.

Quare etiam remedium.] Lege in codice græco *ὥτε καὶ ἡ ἰατρικὴ ἐν τῷ θέρμῃναι*.

Mox expreſſa calefacere.] fac *ἐκθερμῇναι τὰ τῶ το ἔντερον*.

Quæ græci Syringotoma.] muta in *τὰ καλέμενα ὀρθῶς ſυριγγότομα*. Figura autem laboranti. Adde in græco diſiunctionem hoc pacto *ἐπιτέλειν δὲ σχῆμα τῷ κάμνοντι*.

Cum in superioribus deorsum.] Deest in græco, πρὸς δὲ τοῖς ἀνω, κατὰ ῥέπον.

Quoad totum exacte persuatur.] Deest aliquid. Legendum. enim ἄχρι περὶ ἂν ὅλον ἀκριβῶς βραβῆ.

In per reliquum abdomen.] Fac ex διαπείρην τὸ ἕτερον ἐπιγάστριον hoc, διαπείρην τὸ ἕτερον ἐπιγάστριον.

Deinde ab hoc rursus.] Hic multa desiderantur plane necessaria quæ superioribus adiciantur, ne quis cōpendii causa ab ipso Paulo prætermissa censeat. Sicigitur ex Geleno instaurari debet. ἔτ' αὐθις ἀπὸ τούτου πάλιν ἀρχαίους συρῆσθαι τὴν αὐτῷ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίῳ. κάπαιτα διεκβάλλειν διὰ τῆ πλησίον δέρματος. ἐκείθεν δ' αὖ πάλιν εἰσω διείρην, συρῆσθαι αὐτὸ τῷ ἀντικειμένῳ περιτοναίῳ διεκβάλλοντας τε διὰ γὰρ πλησίον δέρματος, ἔτα, &c.

Pari modo si proxime oras.] Legendum est ἔτω δὲ καὶ τὸ μὲν ἐχυντάτω.

Id autem fiet in eum modum.] Fac ἔσαι δὲ τῷτο κατὰ τὸν δὲ τὸν τρόπον. Quid enim sibi uult ἔτω δὲ τῷτο κάτω κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον Vbi hic tua diligentia Oroscie?

IN LIX. CAPVT.

καθέτην

Sympto igitur Cathetiro.] hoc instrumentum à demittendo dictum est. nam per id aliquis liquor in uescicam demittitur à κατὰ & ἵκημι. Est autem rectus syphe, ut ait Gal.

IN LX. CAPVT.

Igaminibus sex processuū.] Hoc est sex appendiculorum ἑξασκελεῖς enim ad uerbum sonat, sex crurum. à geometris petita dictio est, qui figuras quasdā ἑξασκελεῖς nominant.

ἐπικόπος

Super lapidem qui excidendis subiicitur.] Græce est κάπαιτα διέλωμεν κάτω τὸν λίθον κατ' ἐπικόπου αὐτοῦ τῷ λίθου hoc est deinde diuidemus infra calculū super ipsum lapidē qui incidendis subiicitur. At uitiū exemplaris esse puto, ponendumq; pro τὸν λίθον, quod est calculū, τὸν καυλὸν hoc est colem. uerū Aetius & alii ueteres, sectio nē in cole non infra ad futurā, uerū supra fieri præcipiūt sed κάτω. Sunt qui intelligāt super lapidē ipsum qui inciditur. IN LXI. CAPVT.

Nota.

ἑξασκε-
λεῖς

Dartos.
Erythroides.

Unica erythroides.] Duæ sunt testiculorum tunicae, dartos, & erythroides. Hic autem male habetur in Græco ἑλγροειδῆς pro ἐρυθροειδῆς. Paulo post inuenies ἐρυθρόν pro ἐρυθροειδῆ positum. Gæmuseus locū iā citatū reliquit uitiatū.

IN LXII. CAPVT.

HVmoris ociosi in particulis scrotum impli.] In græco est ἀργὸν ὑγρὸν συλλεγόμενον περὶ τὸ μέρος τῶν τῶν ἔσχειον διὰ πλεόντων σωμαμάτων, quod ad uerbum sonat. Oroscius humor collectus circa partem corporum scrotum implicantiū, Mihi uisa est superior translatio manifestius. hoc te meminisse ueluti. Cæterum commune ramicum nomen est, Hernia ut ait Celsus: unde Herniosi appellantur.

IN LXIII. CAPVT.

Hernia.

RAcosin.] Ita appellant græci ῥάκος quod uile detritumq; linamētum, ut superius annotatum est. Cum itaq; laxior cutis scroti & ueluti lacera pender, rhacosia uocant.

Rhacosia:

Quod incidendis subiicitur.] Græce est κατ' ἐπικόπου σα- νιδίς, quasi dicas super asserem, super quem aliquid inciditur. Superius de calculosis dixerat, κατ' ἐπικόπου τῆ λίθου. Nōnulli calculum ipsum qui inciditur, exponunt, uerum in sequētib; dictio ἐπικόπος inotescet magis.

ἐπικόπου.

IN LXXII. CAPVT.

Pessarium aliquo cicatricem inducente unctum.] πρισκόν reddidi pessarium, nam illud nihil aliud est quā penicillum, pudendi uirilis figuram repræsentans. Superius autem habetur, spiculo quod græci δίοπτραν appellant, à perspicendo, Nam hoc instrumento triplici crure prædito, naturalibus dilatatis, latentes in utero morbi cōspiciuntur modum uero aptandi instrumenti uocant δίοπτρις μόν.

πρισκόν κός.

δίοπτρα,

IN LXXIII. CAPVT.

Speculi tridente.] Sic exposui τῇ τῆς δίοτρας λωτῇ. Cum enim speculum tria habeat crura, aut columellas, aut dentes, inuicem iunctos, sed qui diduci possint, non plane abhorere uisum est à sensu, si tridentem speculi dicerem. Nā quid sibi λωτῆς apud græcos aliud uelit, nescire me fateor. Bernardus felicianus, qui mihi in Pauli sexto uertendo successit, græcam dictionem reliquit, Loton inquitens speculi.

λωτῆς

Lotos,

IN LXXIII. CAPVT.

Contractum.] Male in græco codice est συνημένων pro συνημένῳ Paulo post λελεπτυσμένῳ, pro λελεπτικῷ μένῳ, rursus, postea indicem digitum unctum, λελεπισμένον habetur pro λελεπασμένον quæ omnia Oroscius neglexit.

Hydrocephalon sit, hoc est aquam in capite.] Hoc est ferè quod

Hydrocephalon.

quod Celsus dicit, solet etiam euenire ut infans humore distendatur, ex eoq; profluat fœdi odoris sanies.

IN LXXV. CAPVT.

MAnu siquidem sinistra calida, inunctaq;.] Græce est, τὴν γὰρ χεῖρα τὴν ἀριστερὰν θερμὴν καὶ λελεπισμένην. fac λελεπισμένην ἀ λιπαίνω. Et hoc reliquerunt aristarchi.

IN LXXVII. CAPVT.

SI oblique, specillo duplici cuspide.] male in codice Græco habetur, διαπυρρὴν pro διπυρρὴν.

Caulis modo porrecton.] Græce est ἀποκαυλιθεῖς, hoc notat caulium modo transuersim fractum.

IN LXXVIII. CAPVT.

Fistulæ.

ANi fistulæ latentes.] Fistulæ an alia tortuosæ, alia multiplices, alia transuersæ, alia simplices habentur.

Vel specillo per fistulam.] Rursus male in græco διαπυρρὴν pro διπυρρὴν habetur.

διαφορῆς

διόπτριον

Instrumento quod ad sedem.] Vocatur hoc διατολὴς διόπτριον quasi dicas distendens speculum, uerum propriè dicitur διόπτριον de utero. Potest autem accommodari etiam sedi, cum latentes in ea morbi sint.

IN LXXXIII. CAPVT.

DE extremarum partium præcisione.] Sic uocatur græcis ἀκροτερισμός. Celsus lib. 7. de Gangræna inquit, Gāgræna inquit, inter ungues, alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta uincuntur, membrum præcidi oportere, alio loco mihi dictum est.

ἀκροτη-
ρισμός.

Ex causa exterius adueniente.] Græce est ἐκ προκαταρκτικῆς αἰτίας, quasi dicas præincipiente aut primaria causa, ut προγυμένως de intentiore causa dicitur.

IN LXXXV. CAPVT.

Pollicibus.] In græco est τῆς πρὸς μεγάλῃς δάκτυλῃς, hoc est ad uerbum in manus digitis magnis. Quia uero pollex quasi maximus oïum est, uerbi pollicibus, Celsū imitat^r.

IN LXXXVI. CAPVT.

VT sanie excreta, secta hæc.] Codex græcus tantum habet, ἵνα ἐκκριθέντος, ubi addendum est ἰχώρος, legēdnmῃ; ἵνα ἐκκριθέντος. ἰχώρος quod Orosius & Basilienſis corrector nō annotariunt.

At in rectū superne deorsum.] Hic quoq; mutila est lectio exemplaris

exemplaris græci. Habet enim εἰ δὲ κατ' ἐνθὺ πρῆσαις τομὴν
ἐκ τῶν ἀνωθεν εἰς τὸ καλὲ μενον ὑπερσάρκιμα γίνεται τῆς, &c ubi
legendum est, εἰ δὲ κατ' ἐνθὺ πρῆσαις τομὴν ἐκ τῶν ἀνωθεν εἰς
τὸ κάτω, τὸ καλὲ μενον ὑπερσάρκιμα γίνεται, τῆς, &c. Idud quo
que Aristarchi nostri neglexerunt.

IN LXXXVIII. CAPVT.

Telis extrahendis.] Telum uocatur, quicquid manu iaci
mitiue in aliquem potest, unde quod græcos βέλος à βάλ βέλος
λω, quod est iaceo dictum est.

Hastilia.] Sic exposui ἄτρακτα Galenns in exegeſi Hippo
cratis inquit ἄτρακτον ἔ' μόνον τὸν εἰς ἱερουργὸν χρῆσιμον, ἀλ-
λὰ καὶ τὸ ξύλον βέλος, hoc est attracto non modo ad sacrifi-
cium utilē, sed ēē sagittæ lignum significat. Alibi appellat τὸ
ἐπίθεμα, nempe id quod imponitur Ego ut obtēperarē Oro-
scio hostile di'is, quā interpretatio mea satis erat manifesta.

Belulcum.] Celsus lib 7. hoc ferramētum, ad Authorem
Dioctem refert. Est autem lamina uel ferrea; uel ænea etiam
ab altero capite, duos utrinq; deorsum conuersos uncus ha-
ber, ab altero duplicata lateribus, leuiterq; extrema in eā par-
tem inclinata quæ perforata est.

Succus ex uentriculo.] Hoc est Chylus, quæ uox licet græ-
ca sit, medicis tamen non est incognita. Est autem proprie
Chylus, succus ex alimento in uentriculo prima concoctione
factus, nec proprie succus latine dicitur, quia uero aliam di-
ctionem non habemus, ea utendum fuit.

Lamina quæ membranam custodiat.] uocatur græcis in-
de μνηυγδόφυλαξ. Celsus ut alias annotaui lib. 8. exponit in
hunc modum. Lamina ænea est, firma, paulum resima, ab ex-
teriore parte leuis quæ demissa est, ut exterior pars eius cere-
bro proprior sit, subinde ei subiicitur, quod scalp̄o discuten-
dū est, &c. Sequenti capite rursus ait, subiicienda lumina est, quæ
custodē eius mēbranæ esse proposui, & super eā quicquid spi-
nosum est, & intus eminet excidendū est, forte non male ἐπι-
κόπος dici potest.

IN XC. CAPVT.

VSque ad laminam secundam.] Græce erat ἄχρι τῆς δι-
πλῆος. Recentiores, ijq; barbari dicunt ad caluariz tabu-
laturam, alii usq; ad duplicationem.

Mirum in modū Galeno cōmendatur.] Vide librum sex-
tum Galeni Methodi medēdi, ubi de fracturis caluariz agit.

Chœnicion.

Χοινίκιον
Modiolus.

Choënicion.] Celsus interpretatur modiolū qđ ita describit lib. 8 cap 3. Modiolus ferramentum cōcauū, teres, est imis oris ferratū per quod mediū clauus ipse quoq; interiore orbe cinctus demittitur. IN XCII. CAPVT.

Celsus.

TEnui & forbili cibo.] Celsus lib. 8. in quo Hippocratē magna ex parte sequitur, habet. Deinde die tertio humidū cibū, quod Paulus dixit λέπταις, καὶ βοφματῶδες τροφαῖς.

Fracturarū
differētiæ

Maxilla intra tres potissimū septimanas.] Huic snia Celsus astipulatur. ferē uero intra quartum decimū & unū & uigesimalium diem sanescunt, maxilla, malæ, iugulum, pectus, latus, os scapularū, costæ, spina coxarū, os tali, calx, manus planta.

Quod si fractura per transuersum.] Fracturarum differentiarū quinque sunt, prima quæ sit schidacedon, altera cauledon. Tertia raphanidon, quarta sycyedon, postremo alphitedon, prima assulatim quasi per rectitudinem, secunda per trāuersum, tertia in raphani modum per fissuras, quarta cucumeris modo, quinta in minutissimas partes ut farina efficitur.

IN XCII. CAPVT.

Lamina quæ à tuendis.] Græce erat *μυνηγοφύλακος* ἢ ἐτέρεα ἐκκόπewς. Adhibetur ēt lamina quā in cerebri membranis usurpamus, aliis quibusdam excidendis: ut corium, uel asser, uel massa plumbea æneaq;. Puto autem legendum ἐπικόπου pro ἐκκόπewς. Nam superius ἐκκόπewς facta iam erat mentio Præterea subiungitur, dictioni *μυνηγοφύλακος*. In sequenti capite Græce habetur *πρωτυπῆται* pro *προστυπῆται*, quæ omnia Orosius & Corrector Basiliensis neglexerunt.

IN XCIX. CAPVT.

Manubrii ligonis.] in Græco codice male habetur *οἶον τυλόν*, pro *οἶον τελεῶς* qđ Orosius & Gemusæus præterierunt. Exponit autem Galenus, rationem administrationis huic commētario secundo in librum Hippocratis de fracturis.

κῶλα
Artus.
Membra.

In medio membro.] Græca sonant, ἐν μέσῳ τῶ κῶλῳ frequentius uertunt τὰ κῶλα artus. Celsus autem lib. 8. uidetur etiam in articulis enumerādis, dictione, membri, uel primum in hac sententia Si bteuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt. Item donec id membrū cōfirmetur, de humeris, brachiis, cruribus, feminibus, digitisq; cōfractis uerba faciens.

IN CVII. CAPVT.

Adpramus uero ossa uecte.] Hoc est in locum suum com-
mode

mode restituiumus, Cæterum *μοχλίσκον* quod à *μοχλός* descēdit, uestem reddidimus uide Hippo. lib. de fracturis, ubi habet. *μοχλίσκος*.
σισήρια *χοή* *πρίεσθαι* ἐς τῶτον τὸν τροπὸν ὅνπερ ἔχουσιν οἱ *μοχλοὶ* οἷς δὲ λάτῃται τρέονται, τὸ μέντοι πλατύτερον, τὸ δὲ τίσις. *κότερον*, &c.

Membris coniugalibus.] Dicuntur membra coniugalia, cum duo inuicem iungantur, ut in cubito duo ossa, in tibia itē duo. Rursus *αἰμα*, quæ sola sunt, nulli consimili iuncta, ut brachium, femur, aliāq; id genus. Apud Galenum in anatomicis *φλέψ* *ἀγγος*, de uena, quæ ex paribus thoracem intercurrentibus, sola absq; pari relinquitur, mentionem faciens.

Vt in litera *χ*.] Græce est *κατὰ τὸν χρισμένον*, male pro *χρισμόν*, ut in sequentibus etiam habetur. Est autem *χρισμός*, imitatio literæ *χ*.

Linamento illitum.] Idem *μοτοφύλαξ* & *ἐμαμοτόν* apud græcos est, prius quā in lintheolo seruatum significat: alterū in lintheolo illitum.

IN CXI CAPVT.

Differentias.] Celsus ita scriptum reliquit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modo quæ iūcta sunt inter se dehiscunt: ut cū latum scapularū os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito & in crure, tibia à sura.

Interdū saltu, calcis os à talo. Modo articuli suis sedibus exci-

dūt, &c. primū *παράρθεμα* dicere poteris: alteru *ἐξάρθεμα*.
 Vsq; ad superficiem.] In græco legitur *μεχρὶ τῆς ὀσφύος* male nimirum pro *μεχρὶ τῆς ὀσφύος*. neglexerunt locū Oroscius, & Gemellus.

IN CXII. CAPVT.

DE maxilla,] apud Græcos *γένυς* cum uoce *κάτω* significat maxillam, cum uoce *ἄνω*, malas. quanquam barbari maxillam inferiorem & superiorem appellent. Græci etiam dictione *γνάθος* in eodem significato utuntur.

Σχᾶται.] Galeum commentario secūdo in librum Hippocratis, de articulis exponit quid sibi uelit *σχᾶται*. in hunc modum ὥστε τὸ *σχᾶσθαι* *μυῶν* καὶ *ὀστέων* ἐστὶ πάθος ἀνέν *ἀρθρήματος*. ὁποῖον δὲ τι τὸ πάθος τῆς ἐπὶ *ὀπίλων* μὲν καὶ τῶ *φᾶναι* *παράλλαγαι*. hoc est, quare *σχᾶσθαι* musculorū & neruorum affectus est citra articulum. Qualis autem affectus hic sit, constat quidem ex eo quod dicit, pueruersiones.

Maxillam

Maxillam cōmittūt.] Hippocrates legit συμβάλλουσι τὰς κατὼ γνάθος. codex impressus Pauli dictionē κατὼ nō habet. Tu lectionē corrigitō secundū Hippocratem, ex quo hæc ad uerbum sumpsit Omisit Oroscius, & Castigator Basiliensis.

Sin autem utraq; maxilla.] Græca sonant, ἢν δὲ ἀμφότεραι αἱ γνάθοι. Hoc est si maxilla utraq; parte luxata fuerit nō ut recentiores interpretantur, maxilla inferior, & superior, quæ nialæ rectius dicendæ sunt. Galenus orationem Hippocratis, unde hæc sunt transcripta, in eum modum interpretatur, ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει δόξιν γνάθους ὀνομάζειν οὐ τὴν γένιν ὅλως, ἀλλ' ἐκάτερον τῶν μερῶν, καθ' ἃ πλάτυνεται αὐτὴ δόξιν δὲ καὶ τὰ κατὼ πέρατα καθ' ἃ γυμνοὶ καὶ ἄσκαρκεν τὸ ὅτι ἐν ὀνομάζειν γένιας, &c. Quæ ita exponere possis. In hac oratione uidetur γνάθους non absolute maxillam appellare, sed utrāq; partem, in quibus ipsa dilatescit, uidetur etiam imā extrema i quibus os nudum & ex carne est, maxillas nominare.

Secundū horum directam aciem.] Pauli codex græcus habet κατὰ τάξιν, forte καθ' ἔξιν & ut Gal. dicat καθ' ἐνθυμωπορίαν, ut scilicet dentes primores in maxilla, primoribus in malis, Canini caninis, molares molaribus respondeant. Hippocratis uerba hæc sunt, τὸ δὲ ἀτραβὲς μάλιστ' ἂν γνοίης τοῖσι περὶ τοῖσι τῶν ὀδόντων τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κατὼ καθ' ἔξιν. Nō annotauit Oroscius, nec Gemusæus correxit.

Nam musculi hi dum alterantur, & præter naturam intenduntur, carum inducunt.] Græca ita sonant. καθ' ἔξιν οἱ μῦες οὗτοι καὶ ἐντενύμενοι παρὰ φύσιν. Galenus locum exponens commentario supra citato inquit, utrunq; & alteratio. & musculorum tensio carum potest efficere. Nami tensio hæc fit, filamentis quæ prius erant laxa, nunc omnibus secundum rectam lineam extensis Alteratio, dum calefacti, aut refrigerati, aut humectati, præter modum fuerint, aut inflammatione, aut erysipelas fuerint experti.

Hicigitur decimo die potissimum moriuntur.] Mutilus est codex Græcus Pauli. habet enim οὗτοι ἐν καὶ θνήσκουσι καὶ μάλιστα. pro quo legendum est, οὗτοι ἐν θνήσκουσι δεκατὰ οἱ μάλιστα, ut habet Hippo. lib. de articulis. Gal. ibidem exponit dictionem μάλιστα pro ἐπὶ τὸ πολὺ, quod est plurimum, magna ex parte, & ut nos diximus. potissimum. Oroscius & Gemusæus locum præterierunt.

Interpreta
tano H. p.
pocr.

Oroscius,
καθ' ἔξιν.
καθ' ἑκάστης
οἱ μῦες
Quomodo
caros.

IN CXIIII. CAPVT.

Processus ancoræ similis.] Est hic processus interiore in parte exiguus, acutusq; anchoræ modo, qui etiam ab aliis *κράκεδνς* dicitur, quod extrema ipsius pars, ita corniculæ rostrum exterius inclinatur.

Musculi bicipitis.] Vide Galenum de usu particularū, & de Anatomicis tractationibus. Est aut ex colli musculis anterioribus, qui in duplici capite ligamēta fortia obtinet, unū ex processu anchorali, alterū ex elata superficie scapularū cervicis.

Ipsūq; humeri fastigium.] Quidam anatomici scapularum cū iugulo cōpactionem Græce nomināt *ἀκρόμιον* quasi dicas summum humerum, alii tertium os esse prædicāt, quod in ipsis tantum hominibus deprehenditur, ubi igitur in Græco codice habetur *ἀκρόμιον*, ego reddidi summum humerū, aut humeri fastigium.

Lignum quod Græci hyperon.] Lignum est pistilli modo factum, unde etiam nomen habet, frequens apud Hippocratem de articulis. Hyperon.

Atq; hoc in scalæ gradu.] Celsus lib. 8. de humero luxato Paulo consentit, sic (inquiens) brachium deligatum super scalæ gallinariæ gradū transcurrit, ita alte, ut consistere homo ipse non possit. Hippocrates hanc restitutionem per scalæ gradum separat ab ea quæ fit per hyperium, estq; apud illum, quintus restituendi modus, quanquam in sexto modo, scalæ etiam faciat mentionem. Scala gal-
linaria.

Ambe.] Ad uerbum transcripsit ex Hippocrate, & Celsus Hippocratem lib. 8. quasi expressit in hunc modum. At si uastius corpus, neruiue robustiores sunt, necessaria est spathula lianea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos perueniat. In qua summa capitulū est rotundum & leniter cauum, ut recipere particulam aliquā ex capite humeri possit. Ambe.
Celsus imi-
tatur Hip-
pocr.

Panniculo circumdatū.] Celsus idem aliis uerbis exponit. Eoq; spatha fascia inuoluta, quo neruis tactu lædat, ad alam à brachio dirigitur.

IN CXV. CAPVT.

Sani cubiti inspectio.] Methodus hæc est quam Hippo. lib. de medicina exponit, quamq; Galenus similitudinis, & dissimilitudinis. Optime enim affecta pars cognoscitur, si cū sana conferatur. Codex autem Græcus male habet *πρόσθις* pro *πρόσθις*. Methodus
similitudi-
nis, & dis-
similitudi-
nis.

πάσης. Quid enim sibi uult, ἢ τῷ ὑγιαίνοντος ἀγκῶνος ἐλέγ-
χει πάσης, hoc est sani cubiti affectus arguit, quomodo id quod
sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia
πάσης quod est disciplina, ego dixi inspectio. Aristarchi no-
stri non aduerterunt.

IN SEQVENS.

Appellauī Brachiale eam uincturam, qua brachium cū ex-
trema manu committitur. Celsus palmam nominare ui-
detur in octauo. Græci dicunt καρπὸν.

IN CVIII. CAPVT.

VErtebræ spinæ.] Hoc caput Paulus magna parte ex Hip-
pocrate transcripsit. Auicēna autem quasi ad uerbum ex
Paulo transtulit. In hoc discrepamus, ubi ego sculpturā uerti,
ille foueam habet, ubi ego asserem, ille tabulam.

IN CVIII. CAPVT.

INtenso autem affecto Crure.] Mutilus est codex Græcus
impressus uel Basileæ, uel Venetiis id quod etiam ex Auicēna
manifeste constat. Habet autem codex in hunc modū:
ἐντεταμένου τῷ πεπονθότος ὑπὸ τῶν χειρῶν ὥς δύο δακτύλους.
nimirum pro ἐντεταμένῳ δὲ τῷ πεπονθότος σκελὲς πλεον τῷ
ἐτέρῳ ὥς δύο δακτύλους, quod miror Oroscium ex suo casti-
gato exemplari non aduertisse.

Comprehendens qua crassissimum.] Hic etiam male in
Græco legitur κατὰ τὸ βραχύτατον, pro τὰ τὴν πᾶσχυτατον.
Id etiam omiserunt Oroscius & Gemusæus. Ex superioribus
lectio poterat corrigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent
oculati.


FINIS LIBRI SEXTI

COMMENTARIORVM.





COMMENTARIORVM IN PAVLVM AEGIN. LIBER SEPTIMVS.



LIBER hic septimus Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride partim etiam ex Oribasio, transcriptus est, ordines Galenus præcipue, uires & descriptionem Dioscorides, cõpositionem medicamentorum Oribasius tradidit, quanquam hic quoq; à Galeno & aliis misturarũ ratione ac-

ceperit. In codice Græco habetur ἐκνεκρῶν hoc est ad uerbũ emortuũ reddit, nos diximus sensũ aufert. Oroscius maledicit legendũ ὀνεκρῶν. cū potius quadraret ἐνὸνερῶν, qđ est eneruat. Oroscius.

IN II. CAPVT.

Moderatum sane medicamentũ.] Galenus ẽm genera inquit, medicamentũ affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Cæterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci τάξεις καὶ ἀποστάσεις nominat. Galenus etiam ἀριθμῶς hoc est numeros appellat, nos ordines, interualla, abscessus, & gradus appellamus.

τάξεις.
ἀποστά-
σεις

Ut iam sensu priuent.] Græce est, ὡς ἡδὴ νεκρῶν, quasi dicas, ut iam mortificent, hoc enim frigida uehementer, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuque priuentur. In summa nihil aliud est ἐκνεκρῶν quàm uita & sensu priuare.

ἐκνεκρῶν.

Poterat Oroscius ex hoc loco, superiorem lectionem satis caligatam deprehendere, uerum calumniandi animus eò illũ prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

PAULI AEGIN.

Hh IN

Lignum
aloes.

A Gallochum.] Aerius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilaleon nominauit. Hunc secuti recentiores quidam non dubitarunt Lignum aloes, appellare. In sumatra nuper à Lusitanis inuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem gentes hæ uruntur. Nam si in manu lignum hoc retineatur. optimum spirat odorem.

πλάστος

Flaccidum est superfl.] Gale. πλάστος interpretatur περιττον ὑγρότητα. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus, flaccescit, resoluiturque. Hæc dixi, ut intelligas, Lector, uersionis mea rationem.

Polytri-
chum.
Callitri-
chum.
Tricho-
manes.

Anchuzæ quatuor.] Ex Galeno transcriptum: quâquâ & Dioscorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dioscoride dissentiant, quod onochelon uiperarum moribus conuenire dicant, forma cataplasmatum adhibitam, ad alligatum, & comestam his uerbis, καταπλασσομένη τε περιπτομένη, καὶ ἐδοιμένη. Dioscorides de foliis ἐσθιόμενα. καὶ πινόμενα, καὶ περιπτόμενα.

Adianthum.] Adianthū & Polytrichon idē sunt, Callitrichum, & Trichomanes etiam idem. Duæ igitur species tantū sunt nō quatuor, ut officinæ putant. Vna herba est adianthos in duas partes separata, una proprie adianthū dicitur, de qua Dioscorides priuatim in uno capite tractat, foliis magis albis coriandro similibus & longioribus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes, foliis filicis tenuibus, nigrioribus primo, & breuioribus hæc proprie uocatur Callitrichon. Pharmacopolæ in duobus communi uocabulo capilli ueneris utuntur.

Capilli Ve-
neris.

Athera] Ex Dioscoride sumptum, uerū clausula hæc apud illum non adest, ἀπὸ σίτου quod est è frumento. nec apud Galenum, nec Oribasium inuenitur.

Aegilops] Auene secundū genus. Primū βρόμος dicitur.

Quid loco
acatie ue-
re summi
possit.

Acatia.] Veterum acatiam non habemus. utimur autem quadam ex fractu pruni syluestris facta. uerum recte aliquis utetur loco acatiæ ueteris, rhu obsoniorum, quod sumach uocant officinæ, ut quidam eruditus annotauit.

Brancha
urina.

Acanthus.] Si Dioscoridis acanthū, & nostrā Branchā urfī nā cōferas, idē plane esse intelliges. Verg. dixit, mollis acantib; Acinos] Ex Dioscoride tantū hoc transcriptū est, ubi φόγιον

ἄν interpretatus sum panum, & ἑρυσπέλατα sacros ignes. **Acorus ue-**
Acoron.] Acorus ueterum, Galanga nostra est: noster au- **terum.**
 tem acorus species glandioli.

Amaracus.] Paulus & Galenus duo capita de amaraco & **Amaracus**
 & sampsucho faciunt: easdemq; uires utriq; attribuunt. ac si **Sampsu-**
 autores conferas idē plane sunt. Amaracus aut magis apud cy- **chus.**
 prum celebratus, sampsuchus in tota Græcia præterea amara-
 cus paulo erit odorator, quam hodie apud Gallos maioranā
 gentile dicunt quæq; magis humi serpit. Sampsuchus erectior
 minusq; odoratus. Dioscorides etiā diuersa fecit capita de un-
 gueto amaracino & sampsuchino, qđ alterū ex nobiliori ma-
 iorana in Cypro & cyzicenis, alterum per totā græciā fieret.
 Galeni aut Amaracus est, quā hodie Matricariā nominamus.

Amaranthus.] Nota herba est apud Gallos, uocāt eā passe- **Matrica-**
 uelutum, quod coloris gratia sericum coccineum uincat. an- **ria.**
 notauit Ruellius. **Amaran-**

Ambrosia.] Frequēs reperit in gallia inter exiles & madi- **Ambro-**
 das segetes qua mēssores se coronāt Vinosa herba rusticis dī, **sia.**
 alijs uinosa ruta, qđ folio rutā, & odore uinū imitef. Quā of-
 ficinæ ambrosiā noīant, polemoniū antiquorū ē, nō ambrosia.

Ampeloprasum.] Exulcerat. Græcus codex habet κακὸν. **Polemo-**
 at ego legendū ex Gal. cenſeo ἐλακόν, quod castigatōr Basilien- **nium.**
 sis dissimulat me annotasse priorem Oroscius neglexit.

Anemonæ omnes.] Hoc est oēs satiuæ species. Duo. n. ge- **Oroscius.**
 nera tm̄ habentur. Satiuū, & syluestre. Satiuū nos papauer ru- **Duo ge-**
 brū appellamus, eoq; utimur in triticis nascente. ueteres aut **nera.**
 nunquā papaueris noīe uocarūt. Germani clapperrosen, gal- **Anemone.**
 li passe fleur. Ipsa nomenclatura à uēto sumpta est, qđ eo flā-
 te, flos ipsius aperiat. Erratica nūcupat gallis coquerelles, pri-
 mo uere crescit flore purpureo, mulierculæ hac noua tingūt.

Lac in mammas suggerūt.] Ex Gal hæc omnia sunt tran- **ὄνασπῶσι**
 scripta. Verum in illo ὄνασπῶσι quasi dicas, sursum in mam-
 mas adducunt. In Paulo autem & Dioscoride κατασπῶσι.

Aparine.] Addendum in codice græco particula, τι, nam
 sententia imperfecta est, si tantū legas ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές.
 fac igitur ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές. Hoc Oroscius & Castiga-
 tor Basiliensis annotasse debuerunt, uel exemplari adiecisse.

Aristolochia.] Duab. tm̄ specieb. in officinis utimur, Lōga
 & Rotūda. Sarmētaea negligit, unguētis alioquin utilissima.

Lappa.
Maior.
Minor.

Arction profopitis.] Herba est, quam officinæ uocant Lappam maiorem, Alterum arction uirbasco simile, Lappam minorem appellant.

Arnabo.

Armeniacum.] Hoc est lapis armenius apud Diosc. lib. 5, Arnabo.] Idem est, quod Serapio uocat Zurumbet, Cassiæ fistule, & cubebis uiribus respondens.

Arthemisia.

Arthemisia.] Duplex, monoclones, & polyclones, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distinctæ. Nam & hæc plures habet ramos.

Baccara.

Afarum.] Vulgus Baccharam appellat. Germani Hasel uurtz. Galli, Racabaran.

Oroscius.

Fuligo.] In græco est κατάρματα. Sic etiâ habet Dioscorides. Nescio cur Oroscius τραυματα legendû censeat, cû ipse quoq; fracturæ ossium ad cicatricē uenire dicantur. siquidē raro sine ulcere carnis, fractura accidat, nec κατάρματα solū de capitis fracturis dicitur, ut putat Oroscius, sed omnium mēbrorum quod intellexisset Oroscius si Hippocratis librum de fracturis legisset.

Mumia.

Aspalthus.] Vero aspaltho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Munia loco ipsius uti. Nā in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturq; postea. Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, aliisque id genus conduntur.

Aphodelus.] Pharmacopolæ, aphrodilorum uocant.

Atriplex.] In græco codice uidetur addendum ταχέως. Nam διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται, quod est, quare etiam per uentrem transit, imperfecta est sententia, & communis cū alijs omnibus. Nam per uentrem uniuersa quidē transeunt, alia uero cito, quæ ταχύπορα, alia tarde, quæ βραδύπορα dicuntur. Legendum igitur cum Galeno διὸ καὶ κατὰ γαστέρα διεξέρχεται ταχέως. non aduerterunt nostri Aristarchi.

Vugula ta
ballina.
Borago.
Buglossum.

Bechion.] Officinæ uocant ungulam caballinam.

Buglossum.] Dioscorides & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem uocamus. Ei uero quam buglossam appellant officinæ, respondet ueterum Cirsion dictū. Itaque buglossum duplex erit, alterū minus, diciturq; nostra vulgaris borago, alterū mai⁹, qđ Cirsio apud ueteres dici monuimus.

Sabina.] Duplex est, altera Cupressi similis, altera tarmatici Germani feuerbaum, Galli saunier appellant.

Corallina.

Muscus marinus: Officinæ Corallinam uocant. In græcia ad uermes

ad uermes puerorū quasi præsantanxo remedio utuntur. Imo etiam purgare dicunt, etiam uim astringentē ueteres ei ascripserunt.

Minium.

Lemnium miniū] Celsus miniū uertit *μίλτον*. Manardus corrigit Barbarū, quod minium dixerit, non rubricam, ipse cul pandus. Ceterū officinæ uocant Terram Sigillatam, quā multis annis ficticiam, imo etiam hodie uendunt, rubricā quandā ex terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. ueram nunc Venetiis ex Lemno allatam habes: quæ ibi in collæ quodam fuluo colore nascitur. olim Dianæ sigillo eam imprimebant, unde etiam sphragis dicitur. nunc Turcico insignita est.

Terra armenia.] Hactenus globulos quosdā in medio impressos ex Germania ailatos pro bolo armeno officinæ uendi derūt, uerus autē bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis literis, si supremā & inferiorem partē auferas. nam cū in Turciā imprimunt, adiiciunt fabulū albū, ut melius signū recipiat.

Seneſta anguis.] Hoc est exuiū, quod uerno tempore deponūt. Nuclei acinorū uic.] Græcus codex deprauatus est, qui habet *χυχρα* hoc est frigidū, pro *χυφρα* quod est acerbū. Dioscorides dixit *χυπτικα* hoc est astringētes. Orosius omisit. Gemusæus inuitus cōcedit ita legendū, dissimulās me id antea annotasse.

Gingidiū.] Paulus siccare dicit ordine tertio: Galenus, *κατὰ τὴν δούτερον ἀπόσσειν*, hoc est secundo ordine uel abscessu.

Nota.

Pollen farinaceus.] Tritici intelligendū est.

Teda.] Teda proprie dicta, à græcis *δάς* & *δάδιον* uocatur sui generis arbor in Illyricō est, redundantior humore quā reliquæ parcior liquidiorq; quā picea, flammis & lumini sacrorum quoq; grata. Improperie tedus appellamus, tum piceæ faciæ partes imas tum alia quoq; ligna, quæ flamma olei uel picis illicitu concepta faculæ modo lucet.

Teda.

Daucos.] Vero dauco caremus, qui in Creta nascitur. Noster daucus in officinis est species pastinacæ syluestris. Cum autem easdem uires habeant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictamnus.] Hanc non habemus. In Creta tantum nascitur, unde facile haberi potest, quam officinæ pro Dictamno uendunt, non est, nec etiam pseudo dictamnus.

Dictamnus.

Dracunculus.] Duplex est, maior, & minor. maior Serpentaria in officinis appellatur.

Quercus. Quod sub glandis corio. Dioscorides etiam habet. Tunica glandis putamini subiecta.

Oroscius. Ehenus.] Paulus habet græce ἐπιφατῆντα nullo sensu pro ἐπισκοτῆντα. Sic etiam Dioscorides Oroscius non aduertit, nec Basiliensis castigat.

Veratrū.] Olim ueratrū album in usu frequentissimum erat, nunc nigrū, idque solum forte quod illud molestius euacuet. At ueratrū album si recte correctum exhibeatur, citra molestiā purgat, maxime atra bile laborātes, & lue hispanica.

**Hermoda-
ctylus.**

Hermodactylus.] Alius hic est ab eo quē officinæ hermodactylū appellant. Hermodactylus serapiones duo cōprehendit, ephemerū, & colchicū. Illud nō lethale, hoc perniciosum. Sed in Italia colchicū min⁹ noxiū est, officinarūq; hermodactylus, colchicū existit. Soluit ad sanguinē usq; Ephemerocarem.

Eupatorium.] Eupatoriū antiquorū est nostra agrimonia, quid autem nostrum Eupatoriū sit adhuc me nescire fateor.

Spelta.

Zea.] In Germania inferiori, & Italia speltam appellant.

Zithus.] Potus est ea ordeo aqua resoluto, uocant ubiq; cereuisiant quanquā ea ex aliis etiā frugibus fieri soleat.

Isatis.] Glastrum latini uocant. Galli Guadam.

Caucamum.] Serapionis lacca est, non autem ea quam officinæ uendunt. Tria enim nomine laccæ ueneunt, unum uerum caucamum, alterum grana quædam arte facta. Tercium unde color carmesinus confit.

Oroscius.

Cadmia.] Manifestus error in græco. Legendum enim βοτρυτῆς λεπτομερετέρα πλακίτις δὲ παχυμερετέρα. Oroscius omisit Gemusæus dissimulat me annotasse.

**Calamin-
thæ.**

Calamintha.] Nepita Romanis uocatur. Tres sunt sp̄. Prima foliis ocymī, altera odorē pulegii habet. Tertia foliis mentastri. Officinæ secundā uocant herbā cattorum. Tertiā calamenthū, quæ cæteris est ignauior. Quidā secundā sp̄m pprie Nepitā à Romanis nōiari dicūt. Gal. aut libello de paratu facilibus inq̄t, Calaminthā absolute Nepitā Romanas appellari.

Caros.] Officinæ Carui appellant.

Carpesum.]

Mytopolæ Cubebas nominant.

Cubebæ.

Nux.] In græco deesse aliquid ex dictione καὶν intelligo. Nam Galenus ita habet, κάρυα τὸ δένδρον ἔχει μέντι καὶ τοῖς βλαστῶσι τυπτικὸν καὶ τοῖς φύλλοις. Tu igitur hinc restitue. Castigatores neglexerunt.

Cassia.] De Cassia odorata hic intellige Cassia fistula antiquis eadem erat quæ odorata. Officinarum Cinnamomū, seu

feu canellæ uilioris frustra, Cassia illa antiquorū uidetur. Nūc autem uulgas cassiā fistulā accipit pro siliqua illa humore nigro intus plena, ueterib. incognita. qua purgamus hodie bilē.

Cerasia.] Acida inquit conueniunt phlegmaticis & excrementosis stomachis. Male in codice græco legitur φλεγματώδεσι καὶ φλεγματικῶς. Mutanda autem ex Galeno φλεγματώδεσι καὶ περιττωματικῶς. Quod Cēsores nři nō annotarūt.

Ceratonia.] Pauli codex græcus habet, ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ ψυκτικῆς hoc est siccantis facultatis est & refrigerantis. Galenus pro ψυκτικῆς, legit τυπτικῆς. hunc nos sumus imitati non admonuerunt castigatores,

Galla.] Duo gallarū genera tantū in usu mediocrem sunt: unū solidū, alterū perforatū. aliorū compluriū nullus est usus.

Cinnamomum.] Hoc caremus. Nam quod nos Cinnamomum, aut canellam uocamus cassia potius fistula antiquo rum existit Nam cinamomum fistula aut canella non est, sed arbutum. uide Galenum de Antidotis.

Hedera.] Quod officinæ gummi hederæ, appellant, non est lachryma hederæ, sed alterius cuiusdam arboris quam igno ramus. potest autem haberi lachryma uera hederæ.

Gummi
Hederæ.

Cichoreum.] Paulus uocat cichoreum, syluaticam serem, seu, intybum. Græci tamē alij cichorei uocabulo tam domesticam, quā agrestem appellant Domestica duplex est. una latioribus folijs, lactucæ similibus quam uulgas corrupto uocabulo Endiuia quasi intybum nuncupant. Altera strictioribus folijs. Officinæ has duas scariolā quoq; nominant. Iam syluatica etiā duplex habetur, ac proprio nomine cichoreum seu picris ab amaritudine dicitur. Quanquam græci alij cichorei nomine, tam domesticā quā agrestem sennā accipiāt. At quā hodie uulgas herbariorū Endiuia ostendit in aruis sponte nascentē, folio lactucæ pusillo, aculeato, caule spinulis horrido, cādicāte, cui succus inest lacteus, syluestris lactuca existit.

Intybi spe
cies.

Clematis.] Bis habetur in codice græco κληματίτις pro κλημάτις. non emendarunt censores.

Orosius.

Cnicus.] Officinæ Cartamum appellant.

Gummi.] Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuū.] Protofacton. multi etiā celebres uiri trāstulerūt cinerē qui primus destillauerit, uerū ideo non est dictum lixiuium protofactū, sed quod primariū sit lixiuiū, & principale.

Lixiuum
protofacton.

H h 4 Costus.]

Costus.] Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria haberi.

Hordeum.] Polenta græcis ἄλφιτα dicitur. Est autem proprie ordeum torrefactum. Pisana uerò ordeum decorticatū.

Sigillum
Mariz.

Cyclaminus] Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut Rapum terræ latinis à rotunditate dicitur. Altera Sigillum Mariz, officinis appellatur.

Lichen.] Hæc est herba, quam officinæ hepaticam nominant, iocinorum fibris similis.

Leucoion.] Per se signat uiolam albam quam gariophylla ram albam uulgo nominat. Refertur ramen nomen hoc leucoion, etiam ad omnes alias uiolas, præsertim ad eas quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue purpureæ, siue luteæ fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

Fuligo.] Fuliginē pini, coni, & piceæ acriorem esse prodit. Mirum in modū uariant interpretes in his uocibus reddendis misereq; se torquent. Gaza πεύκην transfert pinum, πέτιν, piceam. Κώνον, Conum. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πεύκην exponat tedam. Conū autem nucē pineam interpretatur, ut accipit Dioscorides, aliq; ueteres græci. Galenus autem Canon arborē appellat, fructum eius, hoc est nucē. κόκκαλον, & σφόβιλον. Atq; hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides.] In græco est μέροφος, lege μόροφος. Dioscorides uocat μόροχθον, alij etiam μόλαχθον.

Lycium.] Officinæ uerum Lycium non habent.

Atramentum Indicum.] Dioscorides uocat lapidem Indicum, præterea astringentis esse naturæ tradit. unde codex Pauli græcus entendari debet legendūq; τῶν στυφόντων pro τῶν ψυχόντων, quod Orosius non annotauit. Gemusæus dissimulat me id ostendisse, textumq; relinquit deprauatum.

Melantheria.] Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea calceamentorum tingi scribit.

Melanthium.] Nigella est. Quam officinæ ostendunt, uera non est. Nam semē est sublauum, cū nigrū esse debeat, acutū, boni odoris. Galli melle noyre. Germani ratten appellār.

Myxa.] Officinæ Sebestem nominant.

Oenanthe.] Duplex, una solui foliis herba, quæ uitis nō est, sed ob fructū racemosum uitis appellat. Altera labrusca quæ à uite domestica nihil differat, nisi q̃a syluestre habitum referat,

πεύκης
πύτις
κῶνος

referat, nec colitur, uocant Oenanthe, labruscæ flores, quam & herba sit eiusdem nominis.

Opos.] Codex Pauli Græcus ὀπιον habet, Galenus ὀπος. ὀπος.
Superius de lachryma papaueris quæ opium dicitur, actum est. Hic de laserpitii liquore: qui partim belzuinum partim assa fetida dicitur officinis.

Eruum.] Dubitatur, an officinarum eruum uerum sit nam intus flauescit, cum album esse debeat.

Orminum.] Vulgus in Gallia uocant: Toute bonne, aut Balsamitie.

Oryza,] Vulgus Rizam appellat, prima adempta litera. Rizum.

Petroselinū.] Verū petroselinū nō habemus, forte nostrū est apiū hortense, qđ Dioscorides cōdimētis accōmodatū dicit.

Peuce] Vbiq; interpretes græcorum πεύκην pinum, interrim pinastrum reddunt.

Pistacea.] Officinæ, phistica nominant, aut phystico rum grana. codex græcus male habet λεπτῶν, pro λεπῶν. Nō emēdarunt censores nostri. Phytica. Orosius.

Pityides.] Dioscorides pini, piceæq; fructus nominat. Gale nus piceæ tātū, illosq; abuti dictione ait qui utriusq; arboris fructū ita appellāt. Sunt aut̄ intetni nucum pinearum nuclei.

Poligonatū.] Officinæ Sigillum Mariæ, nel Salomonis di cunt, item genicularem & fraxinellam. Sigillum. Mariæ.

Pompholyx] Officinæ Tutiam nominant. codex Græcus σαρκώδες hoc est carnosus ulceribus, pro καρκινώδες habet. Tutia.

Non aduerterunt Aristarchi nostri.

Propolis.] Vnguentarii Ceram uirgineam nuncupant.

Resinæ.] Dici non potest, quā interpretes Græcorū tum antiqui, tum recentiores in arborum quæ resinas fundunt, no menclaturis euarient. E pinu dixi, quā Græci πεύκην uocāt, hanc Marcellus Thedam exponit, quā ratione, ignoro. Gaza, Hermolaus pinū aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus uer sit. Resina ē Strobilo, ut hæc etiam sit arbor. Nam Plinius de pinu & pinastro agens, Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiæ, quas strobilas uocant, pleriq; arbitrantur, &c.

Eadem igitur arbor est strobilus, quæ Conos superius dicta est, pineas nuces ferēs. Ruellius interpretatus est. Resinā Stro bilinam quæ ex nucibus pineis fiat, secutus Pliniū, qui 16. lib. inquit, pinus fert minimū Resinæ, interdum ex nucibus ipsis.

Itaq;

Itaq; cōfundunt hæc nomina πεύκη, κώνον, τρύβιλον addit ē
 πύτιν, pro pinu, aut pinastro, aut picea, cū inter se ēt uiribus
 respōdeār, eoq; minus periculi est in expositionū diuersitate.

Rhus.] Officinæ sumach appellant.

Sagapenum.] Seplasiarij Serapinum uocant.

Sandaracha uera. Sandaracha.] Officinæ ueram sandaracham non habent,
 aut saltē ignorāt, uernicē team uocantes. uera aut est, quæ in
 argēti fodinis cū auro & argēto inueniūt, flāmeo colore ruffe-
 scit, ita ut cinnabarim quasi referat, odore sulphuris uirus. Id
 qđ in auripigmēto rubrū est, uera est sandaracha, licetq; auri-
 pigmēto loco sandarachæ uti, cū idē quasi sint, simulq; alte-
 rum alteri iunctū ex fodinis colligātur. Hoc solū differunt, qđ
 auripigmentum nondū à natura perfectū sit: sandaracha au-
 tem per concoctionem naturæ, debitum colorem acceperit.

Seseli.] Tria sunt genera seselios, Massiliēse, Aetiopicū, &
 peloponnesiacū. Massiliensis descriptio cōuenit cū nostro, si-
 leri mōtano, ut uocant uulgares, at quod officinæ ostendunt,
 Aethiopici semen uidetur, facillimum est, uerum comparare.

Sylphium.] Laserpitium herba est, Liqueor Laser uocatur.
 Affertur partim ex aphrica, armenia, & india, suauissimo odo-
 re, præsertim cyrenaicū, unde etiam liqueor Cyrenaicus apud
 autores uocatur, atq; hic officinis dicitur, assa odorata, seu bel-
 zuinū partim ex Media & Syria uiroso odore, qđ liqueorū Me-
 dicū, & Syriacū nuncupant, officinæ uero, assam fœtidam.

Assa odorata.
Assa fœ-
nida. Sifymbrium.] In Gallia officinæ mentam aquaticam ap-
 pellant. In Italia Menta florentina uel menta gētilis aut no-
 bilis Nā magis odoratū est. Nisi colatē, in neperā degenerat.

Scammionium.] Officinæ raro uerum habent.

Scolopendrium.] Seplasiarum Ceter ac existit.

Scordion.] In fine sententiæ legitur in græco codice ἐπι-
 πλαττόμενον, pro ἐπιπαττόμενον croco enim illini, sed insper-
 gi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Orosius.
Mirra. Myrrha.] Quam officinæ uendunt myrrham, est deterri-
 ma species myrrhæ Optima subuirdis esse debet: cōfracta, cā-
 dida unguiu modo. Legit in codice Græco male ἐπιπλατομέ-
 νη, pro ἐπιπαττομένη. Nec hoc annotarunt censores nostri.

Orosius. Solanum.] Vulgus Solatrum nominat.

Aluminis species. Alumen.] alūmen scissile officinæ uocant alūmē plumę,
 nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, ueluti pluma
 esse

esse uideantur. Alumen rotundum raro in officinis inuenitur nonnunquam tamen inter singulorū lapides conspicitur, quibus uisus plumbūq; mistis, uitrum paternū & laucium parant. Alumen liquidum, uocat se plapsia, rochæ alumen, cū foditur, liquidum est, postea durefcit: & si igni admoueaturs rursus liquefcit. Quod placitū & latercularium à Galeno & Paulo nūcupatur, forte est officinarum alumē scaiolæ, ex Gipsi fodinis, pellucens tanquā subtilissima ipsius portio. Sunt adhuc alia aluminis Genera in officinis, sed fictitia, Zuccarinum, quod ex alumine liquido aqua rosacea, & albumine oui conficitur. Mulieres huc fucum parant. Item alumen catinum ex herba quadam cali uulgo dicta, quæ autem sit adhuc ignoro.

Styrax.] Officinæ storax dicunt. Sed quam illæ uocant, sty racem liquidam uocant, myrrha est stacte. Calamitis autem storax, uerus styrax est de qua ueteres tractant. **Stactæ.**

Simphitum,] Variant sententiæ recentiorū in huius herbæ cognitione. Adiectum est in codice Græco γλισχρόν τὶ καὶ κινισμίδες. Galenus habet γλισχρόν τὶ καὶ δακνῶδες, quod est uiscosum quippiam & mordax. **Nota.**

Scheni anthos.] Officinæ squinanthos corrupto uocabulo appellant, uerti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad differentiam quadrati seu angulosi. Sæpe autem alterum tantum adijcio, uel odorati, uel rotundi.

Calx.] Perperam in codice græco erat, συντείνει pro θερμαίνει hoc est calefacit. Oroscius nō aduertit. Gemulæus dissimulat ne id ante eum annotasse. **Oroscius.**

Tragus frumentaceus.] Ita dicitur, ut ab herba distingatur. Nam herba quædam etiam Tragos dicitur.

Altercū.] Deerat in codice græco τῶν ψυχράτων. Instaurau ex Galeno. Oroscius libenter, omisit, & si necessario addatur, Gemulæus fugit se in exemplari antiquo inuenisse, sed textum tamen impressum, mutilum edidit.

Aes.] In sicciore corporibus conuenire dicit ad cicatricem duendam, Sin autem eluatur, in teneris ultima clausula, deerat in codice Græco, necessario addenda, pp̄ superiorē sniam, nempe in sicciore corporibus, hoc est duris. Legēdum itaq; uenit, εἰ δὲ πλυθέν τῷ ἀπλύτου ἐπὶ τῶν ἀπαλασσομένων χροσμιμῶν τερον. Ad uerbū fere ex Galeno. Nō obseruarūt cēsores nostri.

Chamædrys] Quasi dicas humilis quærcus, unde etiam uulgus,

Iua mu-
scata.

vulgus, quærculam minorem appellat.

Chamæpitys.] Hoc est humilis pinus aut picea, officinæ Iuam muscatam uocant hanc antiquorum chamæpityn.

Chrysocolla.] Officinæ uocant Borax.

Ocymum.] Vulgo Basilicum dicitur.

IN IIII. CAPVT.

AD affectum induratum.] Recte dixit *μοχλεῖσθαι* quasi uerte quadam agitare. Male autem in codice græco *ἐσκιζέσθαι* pro *ἐσκληρωμέναι*. neglexerunt castigatores.

Sed etiam à neruis & neruosis partibus.] Oroscius diligens ut ipse sibi uideatur, castigator, legit in codice græco *ἀπὸ πλὺ-
ξῶν*, quod est à costis aut latere ut idē uertit, pro *ἀπὸ νδρῶν*. Aetius & Oribasius nobiscum sentiunt.

Elaterium.] Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimū uidetur Dioscoridi, nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci *πρασίζον* nominant.

Lathyrides.] Species Tithymali est. Capit hic Paulus Lathyrides pro ipsis granis fruticis, cum alioquin lathyris ipse frutex uocetur. Dioscorides & Aetius *σπερμάτια* hoc est grana Lathyridis septem aut octo propinant.

Polypodium.] In Græco codice est *ἐπιπλαθεῖσα* pro *ἐπιπαθεῖσα*. Nnn emendarunt Aristarchi nostri.

IN V. CAPVT.

COlocynthidis medullæ.] Hæc sunt Catapotia, quæ officinæ uocant Cochias. Deprauata autem est scriptura in codice Græco, habet enim *ἀλόης με.ω.* hoc est, aloes pars una. Gale. unde Paulus transcripsit, lib. i. de compositione medicamentorum secundum locos, *ἀλόης* habet *με.ω.* hoc est partes duæ. Castigatores omiserunt.

Purgatio ex malis cotoneis.] Nimis magnū uidetur pondus pipæris, nempe uncie sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes.] Habetur in compositione oliuarii colybadum, scissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint. Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris infectas in eodem liquore aliquot diebus cōficito & utere. Catapotia ex lapide armenico.] Scammoniæ pondus erat nimis grande, uncie sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur s. hoc est uncie sex pro *Γο. S.* quid est semuncia facilis

ilis lapsus, cum quasi eadem literę utriusq; facit.

Vbi uenter inanitus.] In Gręco lege post κένωσιν, εος. Nō fuit uersa in γατέρος, ὁ βόλους dictio, ut putat Castigator Basiliēsis. Orosci⁹ hūc & superiorē locū prę studio omisit.

Puls.] In titulo est Gręce ὠχθηδικαῖς tu fac οἰσθηδικαῖς, quasi œdematosis.

IN VII. CAPVT.

Rictione & medicaminum potu.] non purgantiū, sed obtundentium uim medicaminis pręsumpti, intelligito.

IN VIII. CAPVT.

Mellis quod sufficit.] Post τὸ ἀρκῆν. In codice Gręco, adde, ἄλλως. Hoc est aliter, omiserunt censores nostri.

Hiera Archigenis.] In Gręco cod. pro πολλῆς quidam φύλῃ legunt.

IN X. CAPVT.

Pręcipuē induratis.] Melius in codice Gręco legitur τῶν ἐσκληρωμένον pro τῶν ἀσκιζόμενων, quod est scyrrho obductis. Nam scyrthus nūquam potest emolliiri aut discuti, aut medicamentis intro sumptis amoueri.

Apii radice.] Apios herba est, cuius radice alia pars sursum, alia infra purgat, ne putes hic apium, quod gręci σέλινον dicunt, intelligi.

Purgatio paulatim respondeat.] In Gręco est κατὰ λόγον, fac tu κατ' ὀλίγον. neglexerunt castigatores.

IN XI. CAPVT.

Hedychroi.] Paulus ad uerbum quasi ex commētario Galeni ad Pamphilianum transcripsit: sed exemplaria mirū in modum uariant;

Carpobalsami.] Huc usq; conueniūt scripturę; Galenus in citato libello Carpopālsamum non habet; uerum primo de Antidotis, opobalsamum addit: non Carpopalsamum. Prę terea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis aliis simplicibus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita pergit, Iunci odorati floris drachmę duodecim, secūdū alios, uigintiquatuor. Cinamomi drachmę duodecim, amomi: Cassię, rhapōtici singulorū drachmę quindecim, nardi indicę, solij singul. drachmę sedecim, myrrhę, croci, singul. drachmę duodecim, uino falerno excipito in opobalsamū manus intingēs. Alia habet in cōmentario de Antidotis, sed uariat magis.

Pastilli

πάσης. Quid enim sibi uult, ἡ τῷ ὑγιαίνοντος ἀγκῶνος ἐλέγ-
χει πάσης, hoc est sani cubiti affectus arguit, quomodo id quod
sanum est, simul affectum est? Melius igitur mea sententia
πάσης quod est disciplina, ego dixi inspectio. Aristarchi no-
stri non aduerterunt.

IN SEQVENS.

Appellavi Brachiale eam uincturam, qua brachium cū ex-
trema manu committitur. Celsus palmam nominare ui-
detur in octauo. Græci dicunt καρπὸν.

IN CVIII. CAPVT.

Vertebræ spinæ.] Hoc caput Paulus magna parte ex Hip-
pocrate transcripsit. Auicēna autem quasi ad uerbum ex
Paulo transtulit. In hoc discrepamus, ubi ego sculpturā uerti,
ille foueam habet, ubi ego asserem, ille tabulam.

IN CVIII. CAPVT.

Intenso autem affecto Crure.] Mutilus est codex Græcus
impressus uel Basileæ, uel Venetiis id quod etiam ex Auicēna
manifeste constat. Habet autem codex in hunc modū:
ἐντεταμένου τῆ πεπονθότος ὑπὸ τῶν ἰεργῶν ὡς δύο δακτύλους.
nimirum pro ἐντεταμένῳ δὲ τῆ πεπονθότος σκελεῖς πλεον τῆ
ἐτέρῃ ὡς δύο δακτύλους. quod miror Orosium ex suo casti-
gato exemplari non aduertisse.

Comprehendens qua crassissimum.] Hic etiam male in
Græco legitur κατὰ τὸ βράχυτατον, pro τὰ τῇ πύσχυτατον.
Id etiam omiserunt Orosius & Gemusæus. Ex superioribus
lectio poterat corrigi, nisi in aliorum erratis nimium fuissent
oculati.

FINIS LIBRI SEXTI

COMMENTARIORVM.






COMMENTARIORVM

IN PAVLVM AEGIN.

LIBER SEPTIMVS.



LIBER hic septimus Pauli de simplici & composita medicina, partim ex Galeno, partim ex Dioscoride partim etiam ex Oribasio, transcriptus est, ordines Galenus præcipue, uires & descriptionem Dioscorides, cõpositionem medicamentorum Oribasius tradidit, quanquam hic quoq; à Galeno & aliis misturarũ rationẽ ac-

ceperit. In codice Græco habetur ἐκνεκρῶν hoc est ad uerbũ emortuũ reddit, nos diximus sensũ aufert. Oroscius maledicit legendũ ὀνυχοῦν. cū potius quadraret ἐκὸνυχοῦν, qđ est eneruat.

Oroscius.

IN II. CAPVT.

MOderatum sane medicamentũ.] Galenus ãm genera inquit, medicamentũ affectioni cui adhibetur, potentia respondere oportet. Cæterum hic ordines quatuor enumerat, quos Græci τὰς ἐξ καὶ ἀποκρίσεις nominat. Galenus etiam ἀριθμὸς hoc est numeros appellat, nos ordines, interualla, abscissus, & gradus appellamus.

ταξίς.
ἀποκρί-
σεις

Ut iam sensu priuent.] Græce est, ὥς ἡδὴ νεκρῶν, quasi dicas, ut iam mortificent, hoc enim frigida uehemẽter, in membris efficiunt, ut emoriantur, sensuq; priuentur. In summa nihil aliud est ἐκνεκρῶν quàm uita & sensu priuare.

ἐκνεκρῶν.

Poterat Oroscius ex hoc loco, superiorem lectionem satis castigatam deprehendere, uerum calumniandi animus eò illũ prouexit, ut bene dicta etiam deteriora faciat.

PAULI AEGIN.

H h IN

Lignum
aloes,

A Gallochum.] Aetius lignum hoc describens, à similitudine quadam coloris Aloes, Xilalcon nominauit. Hunc secuti recentiores quidam non dubitarunt Lignum aloes, appellare. In sumatra nuper à Lusitanis inuenta, magna copia esse fertur. Ad odorem optimū spirat odorem.

πλάσος

Flaccidum est superfl.] Gale. πλάσος interpretatur περίττω υγρότητα. Cum itaq; humiditate ea stomachus est irriguus, flacceseit, resoluaturque. Hæc dixi, ut intelligas, Lector, uersionis mea rationem.

Polytri-
chum.
Callitri-
chum.
Tricho-
manes.

Anchuiæ quatuor.] Ex Galeno transcripsit: quāquā & Dioscorides fere omnia habeat. Verum Galenus & Paulus in hoc à Dioscoride dissentiunt, quod onochelon uiperarum moribus conuenire dicant, forma cataplasmatidis adhibitam, ad alligatum, & comestam his uerbis, κατατλασσομένη τε περιττωμένη, καὶ εἰδιόμενη. Dioscorides de foliis εἰδιόμενα, καὶ πυνόμενα, καὶ περιττωμένα.

Adiantum.] Adiantū & Polytrichon idē sunt, Callitrichum, & Trichomanes etiam idem. Duæ igitur species tantū sunt nō quatuor, ut officinæ putant. Vna herba est adianthos in duas partes separata, una proprie adiantū dicitur, de qua Dioscorides priuatim in uno capite tractat, foliis magis albis coriandro similibus & longioribus. Altera pars sequenti capite explicatur, diciturq; Trichomanes, foliis filicis tenuibus, nigris prioribus primo, & breuioribus hæc proprie uocatur Callitrichon. Pharmacopolæ in duobus communi uocabulo capilli ueneris utuntur.

Capilli Ve-
neris.

Athera] Ex Dioscoride sumptum, uerū clausula hæc apud illum non adest, ἀπὸ σίτου quod est è frumento. nec apud Galenum, nec Oribasium inuenitur.

Aegilops] Auene secundū genus. Primū βρόμος dicitur.

Quid loco
acatie ue-
re sumit
possit.

Acacia.] Veterum acatiam non habemus. utimur autem quadam ex fractu pruni syluestris facta. uerum recte aliquis utetur loco acatiæ ueteris, hu obsoniorum, quod sumach uocant officinæ, ut quidam eruditus annotauit.

Brancha
ursina.

Acanthus.] Si Dioscoridis acanthū, & nostrā Branchā ursi nā cōferas, idē plane esse intelliges. Verg. dixit, mollis acantibus.

Acinos] Ex Dioscoride tantū hoc transcriptū est, ubi φύγιον

λαον interpretatus sum panum, & ἑρυσυπέλατα sacros ignes. **Acorus** ueterum. **Acoron**] Acorus ueterum, Galanga nostra est: noster autem acorus species glandioli.

Amaracus.] Paulus & Galenus duo capita de amaraco & sampsucho faciunt: easdemq; uires utriq; attribuunt. ac si autores conferas idē plane sunt. Amaracus aut magis apud cyprum celebratus, sampsuchus in tota Græcia præterea amarus paulo erit odoratior, quam hodie apud Gallos maioranā gentile dicunt quæq; magis humi serpit. Sampsuchus erectior minusq; odoratus. Dioscorides etiā diuersa fecit capita de unguento amaracino & sampsuchino, qđ alterū ex nobiliori maiorana in Cypro & cyzicenis, alterum per totā græciā fieret. Galeni aut Amaracus est, quā hodie Matricariā nominamus.

Amaranthus.] Nota herba est apud Gallos, uocāt eā passe- uelutum, quod coloris gratia sericum coccineum uincat, annotauit Ruellius.

Ambrosia.] Frequēs reperit in gallia inter exiles & madi- das segetes qua messores se coronāt Vinosa herba rusticis dī, alijs uinosa ruta, qđ folio rutā, & odore uinū imiteē. Quā of- ficinæ ambrosiā noīant, polemoniū antiquorū ē, nō ambrosia.

Ampeloprasum.] Exulcerat. Græcus codex habet κακῶν, at ego legendū ex Gal. censeo ἐλαῖν, quod castigator Basiliensis dissimulat me annotasse priorem Oroscius neglexit.

Anemonæ omnes.] Hoc est oēs satiuæ species. Duo n. ge- nera tñ habentur. Satiuū, & syluestre. Satiuū nos papauer ru- brū appellamus, eoq; utimur in triticis nascente. ueteres aut nunquā papaueris noīe uocarūt. Germani clapperrosen, gal- li passe fleur. Ipsa nomenclatura à uēto sumpta est, qđ eo flā- te, flos ipsius aperiat. Erratica nūcupat gallis coquerelles, pri- mo uere crescit flore purpureo, mulierculæ hac noua tingūt.

Lacin mammas suggerūt.] Ex Gal hæc omnia sunt tran- scripta. Verum in illo ἀνασπῶσι quasi dicas, sursum in mam- mas adducunt. In Paulo autem & Dioscoride κατασπῶσι.

Aparine.] Addendum in codice græco particula, τι, nam sententia imperfecta est, si tantū legas ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές. facigitur ἔχει δὲ καὶ τι λεπτομερές. Hoc Oroscius & Castiga- tor Basiliensis annotasse debuerunt, uel exemplari adiecisse.

Aristolochia] Duab. tñ specieb. in officinis utimur, Lōga & Rotūda, Sarmētacea negligit, unguētis alioquin utilissima.

Lappa,
Maior.
Minor.

Arction profopitis.] *Herba est, quam officinæ uocant Lappam maiorem, Alterum arction uirbasco simile, Lappam minorem appellant.*

Arnabo.

Armeniacum.] *Hoc est lapis armenius apud Diosc. lib. 5. Arnabo.] Idem est, quod Serapio uocat Zurumbet, Cassiæ fistulæ, & cubebis uiribus respondens.*

Arthemisia.

Arthemisia.] *Duplex, monoclones, & polyclones, matricaria species illius est, per unum & plures ramos distinctæ. Nam & hæc plures habet ramos.*

Baccara.

Afarum.] *Vulgus Baccharam appellat. Germani Hasel uurtz. Galli, Racabaran.*

Oroscius.

Fuligo.] *In græco est κατέγματα. Sic etiâ habet Dioscorides. Nescio cur Oroscius τραύματα legendû censeat, cû ipse quoq; fracturæ ossium ad cicatricē uenire dicantur. siquidē raro sine ulcere carnis, fractura accidat, nec κατέγματα solū de capitis fracturis dicitur, ut putat Oroscius, sed omniū mēbro- rum quod intellexisset Oroscius si Hippocratis librum de fracturis legisset.*

Mumia.

Aspalthus.] *Vero aspaltho in officinis caremus. Possumus autem ipsa Munia loco ipsius uti. Nā in Syria pauperes mortui bitumine implentur, uendunturq; postea. Diuites autem myrrha, aloë, croco, balsamo, aliisque id genus conduntur.*

Asphodelus.] *Pharmacopolæ, aphrodilorum uocant.*

Vugula ta-
ballina.
Borago.
Buglos-
sum.

Atriplex.] *In græco codice uidetur addendum ταχέως. Nam διὸ καὶ κατὰ γὰρ τὰ διεξέρχεται, quod est, quare etiā per uentrem transit, imperfecta est sententia, & communis cū alijs omnibus. Nam per uentrem uniuersa quidē transeunt; alia uero cito, quæ ταχύπορα, alia tarde, quæ βραδύπορα dicuntur. Legendum igitur cum Galeno διὸ καὶ κατὰ γὰρ τὰ διεξέρχεται ταχέως. non aduerterunt nostri Aristarchi.*

Bechion.] *Officinæ uocant ungulam caballinam.*

Buglossum.] *Dioscorides & antiquorum Buglossum est, quam hodie boraginem uocamus. Ei uero quam buglossam appellant officinæ, respondet ueterum Cirrhion dictū. Itaque buglossum duplex erit, alterū minus, diciturq; nostra uulgaris borago, alterū mai⁹, qđ Cirrhio apud ueteres dici monuimus.*

Sabina.] *Duplex est, altera Cupressi similis, altera tartarici Germani seuerbaum, Galli sauinier appellant.*

Corallina.

Muscus marinus: Officinæ Corallinam uocant. In græcia ad uermes

ad uermes puerorū quasi præsentanxo remedio utuntur. Imo etiā purgare dicūt, etiā uim astringentē ueteres ei ascripserūt.

Lemnium miniū.] Celsus miniū uertit *μίλτον*. Manardus corrigat Barbarū, quod minium dixerit, non rubricam, ipse cul pandus. Cæterū officinæ uocant Tertam Sigillatam, quā multis annis fictitiam, imo etiam hodie uendunt, rubricā quandā ex terra sigillata & bolo armeno mixtam exhibentes. ueram nunc Venetiis ex Lemno allatam habes: quæ ibi in collæ quodam fuluo colore nascitur. olim Dianæ sigillo eam imprimebant, unde etiam sphragis dicitur. nunc Turcico insignita est.

Minium.

Terra armenia.] Hactenus globulos quosdā in medio impressos ex Germania ailatos pro bolo armeno officinæ uendiderūt, uerus aut bolus armenus est, terra illa sigillata turcicis literis, si supremā & inferiorē partē auferas. nam cū in Turciā imprimunt, adiiciunt sabulū albū, ut melius signū recipiat.

Senecta anguis.] Hoc est exuuiū, quod uerno tēpore deponūt. Nuclei acinorū uue.] Græcus codex deprauatus est, qui habet *ψυχρά* hoc est frigidū, pro *αριφρά* quod est acerbū. Dioscorides dixit *απιτικά* hoc est astringētes. Orosius omisit. Gemusæus inuitus cōcedit ita legendū, dissimulās me id antea annotasse.

Gingidiū.] Paulus siccare dicit ordinē tertio: Galenus, *κατὰ τὴν δὲ δεύτεραν ἀπόστασιν*, hoc est secundo ordinē uel abscessu.

Nota.

Pollen farinaceus.] Triticici intelligendū est.

Teda.] Teda proprie dicta, à græcis *τάς* & *τάδιον* uocatur sui generis arbor in Illyricō est, redundantior humore quā reliquæ patetior liquidiorq; quā picea, flammis & lumini sa crorum quoq; grata. Improprie tedus appellamus, tum piceæ satiuæ partes imas tum alia quoq; ligna, quæ flamma olei uel picis illitu concepra facultate modo lucent.

Teda.

Daucos.] Vero dauco catemus, qui in Creta nascitur, Noster daucus in officinis est species pastinacæ syluestris. Cum autem easdem uires halteant, nil refert hoc loco dauci uti.

Dictamnus.

Dictamnus.] Hanc non habemus. In Creta tantum nascitur, unde facile haberi potest, quā officinæ pro Dictamno uendunt, non est, nec etiam pseudo dictamnus.

Dracunculus.] Duplex est, maior, & minor. maior Serpentaria in officinis appellatur.

Quercus. Quod s. b glandis corio. Dioscorides etiam habet. Tunica glandis putamini subiecta.

Orosius. Ehenus.] Paulus habet græce ἐπιχαῦντα nullo sensu pro ἐπισκοῦντα. Sic etiam Dioscorides Orosius non aduertit nec Basiliensis castigat.

Veratrū.] Olim ueratrū album in usu frequentissimum erat, nunc nigrū, idque solum forte quod illud molestius euacuet. At ueratrū album si recte correctum exhibeatur, citra molestiā purgat, maxime atra bile laborātes, & lue hispanica.

**Hermoda-
ctylus.]** Alius hic est ab eo quē officinæ hermodactylū appellant. Hermodactylus serapiones duo cōprehendit, ephemerū, & colchicū. Illud nō lethale, hoc perniciosum. Sed in Italia colchicū min⁹ noxiū est, officinarūq; hermodactylus, colchicū existit. Soluit ad sanguinē usq; Ephemerocarem.

Eupatorium.] Eupatoriū antiquorū est nostra agrimonia, quid autem nostrum Eupatoriū sit adhuc me nescire fateor.

Spelta.] Zea.] In Germania inferiori, & Italia speltam appellant. Zithus.] Potus est ea ordeo aqua resoluta, uocant ubiq; cereuisiant quanquā ea ex aliis etiā frugibus fieri soleat.

Isatis.] Glastum latini uocant. Galli Guadum.

Caucamum.] Serapionis lacca est, non autem ea quam officinæ uendunt. Tria enim nomine laccae ueneunt, unum uerum caucamum, alterum grana quædam arte facta. Tertium unde color carmesinus confit.

Orosius.] Cadmia.] Manifestus error in græco. Legendum enim βοτρυτῆς λεπτομερετέρα πλακίτις διὰ παχυμερετέρα. Orosius omisit Gemulæus dissimulat me annotasse.

Calamintha.] Nepita Romanis uocatur. Tres sunt spēs. Prima foliis ocymī, altera odorē pulegii habet. Tertia foliis mentastri. Officinæ secundā uocant herbā cattorum. Tertiā calamenthū, quæ cæteris est ignauior. Quidā secundā spēm, pprie Nepitā à Romanis notari dicūt. Gal. aut libello de paratu facilibus inqt, Calaminthā absolute Nepitā Romanas appellari.

Caros.] Officinæ Carui appellant.

Carpesium.] Myropolæ Cubebas nominant.

Cubebæ.] Nux.] In græco deesse aliquid ex dictione καὶν intelligo. Nam Galenus ita habet, καὶνα τὸ δένδρον ἔχει μέντι καὶν τοῖς βλαστῶσι τυπτικόν, καὶν τοῖς φύλλοις. Tu igitur hinc restitue. Castigatores neglexerunt.

Cassia.] De Cassia odorata hic intellige Cassia fistula antiquis eadem erat quæ odorata. Officinarum Cinnamomū, seu

feu canellæ uilioris frustra, Cassia illa antiquorū uidetur. Nūc autem uulgas cassiā fistulā accipit pro siliqua illa humore nigro intus plena, ueterib. incognita. qua purgamus hodie bilē.

Cerasia.] Acida inquit conueniunt phlegmaticis & excrementosis stomachis. Male in codice græco legitur φλεγματώδεις καὶ φλεγματικαῖς. Mutanda autem ex Galeno φλεγματώδεις καὶ περιττωματικαῖς. Quod Cēsores nři nō annotarūt.

Ceratoniz.] Pauli codex græcus habet, ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ ψυκτικῆς hoc est siccantis facultatis est & refrigerantis. Galenus pro ψυκτικῆς, legit τυπτικῆς. hunc nos sumus imitati non admonuerunt castigatores,

Galla.] Duo gallarū genera tantū in usu mediocrem sunt: unū solidū, alterū perforatū. aliorū compluriū nullus est usus.

Cinnamomum.] Hoc caremus. Nam quod nos Cinnamomum, aut canellam uocamus cassia potius fistula antiquorum existit Nam cinamomum fistula aut canella non est, sed arbutum. uide Galenum de Antidotis.

Hedera.] Quod officinæ gummi hederæ, appellant, non est lachryma hederæ, sed alterius cuiusdam arboris quam igno- ramus. potest autem haberi lachryma uera hederæ.

Gummi
Hederæ.

Cichoreum.] Paulus uocat cichoreū, syluaticam serem, seu, intybum. Græci tamē alii cichorei uocabulo tam domesticam, quā agrestem appellant Domestica duplex est. una latioribus folijs, lactucæ similibus quam uulgas corrupto uocabulo Endiuia quasi intybum nuncupant. Altera strictioribus folijs. Officinæ has duas scariolā quoq; nominant. Iam syluatica etiā duplex habetur, ac proprio nomine cichoreum seu picris ab amaritudine dicitur. Quanquam græci alij cichorei nomīne, tam domesticā quā agrestem serim accipiāt. At quā hodie uulgas herbariorū Endiuia ostendit in aruis sponte nascentē, folio lactucæ pusillo, aculeato, caule spinulis horrido, cādicāte, cui succus inest lacteus, syluestris lactuca existit.

Intybi spe-
cies.

Clematis.] Bis habetur in codice græco κληματίτις pro κληματίς. non emendarunt censores.

Orosius.

Cnicus.] Officinæ Cartamum appellant.

Gummi.] Arabicum intellige, absolute dictum.

Lixiuū.] Protofacton. multi etiā celebres uiri trāstulerūt cinerē qui primus destillauerit, uerū ideo non est dictum lixiuū protofactū, sed quod primariū sit lixiuū, & principale.

Lixiuū
protofacton.

Costus.] Vero costo caremus. Potest autem ex Arabia, aut Syria haberi.

Hordeum.] Polenta græcis ἀλφιτα dicitur. Est autem proprie ordeum torrefactum. Ptisana uero ordeum decorticatū.

Sigillum
Maris.

Cyclaminus] Duplex, prima species panis porcinus officinis, aut Rapum terræ latinis à rotunditate dicitur. Altera Sigillum Maris, officinis appellatur.

Lichen.] Hæc est herba, quam officinæ hepaticam nominant, iocinorum fibris similis.

Leucoion.] Per se signat uiolam albam quam gariophylla tam albam uulgo nominat. Refertur tamen nomen hoc leucoion, etiam ad omnes alias uiolas, præsertim ad eas quæ primo uere nascuntur, siue albæ, siue purpureæ, siue luteæ fuerint. Apud Columellam, habetur. Leucoia candida.

Fuligo.] Fuliginē pini, coni, & piceæ acriorem esse prodit. Mirum in modū uariant interpretes in his uocibus reddendis miserēq; se torquent. Gaza πεύκιν transfert pinum, πέτιν, piceam. Κωνον, Conum. Hunc fere secutus est Marcellus, nisi quod πεύκιν exponat tedam. Conū autem nucē pineam interpretatur, ut accipit Dioscorides, aliq; ueteres græci. Galenus autem Canon arborē appellat, fructum eius, hoc est nucē. κόκκαλον, & τρέβιλον. Atq; hoc pacto apud Paulum accipi debet.

Lapides.] In græco est μέροφος, lege μόροφος. Dioscorides uocat μόροθον, alij etiam μόλαθον.

Lycium.] Officinæ uerum Lycium non habent.

Atramentum Indicum.] Dioscorides uocat lapidem Indicum, præterea astringentis esse naturæ tradit. unde codex Pauli græcus entendari debet legendūq; τῶν στυφεινῶν pro τῶν ψυχρόντων, quod Orosius non annotauit. Gemusæus dissimulat me id ostendisse, textumq; relinquit deprauatum.

Melantharia.] Verti, creta sutoria, ex Scribonio qui ea caligulas calceamentorum tingi scribit.

Melanthium.] Nigella est. Quam officinæ ostendunt, uera non est. Nam semē est sublauium, cū nigrū esse debeat, acutū, boni odoris. Galli melle noyre. Germani ratten appellār.

Myxa.] Officinæ Scbestem nominant.

Oenanthe.] Duplex, una solui foliis herba, quæ uitiiis nō est, sed ob fructū racemosum uitis appellat. Altera labrusca quæ à uite domestica nihil differat, nisi quæ syluestre habitum referat,

πεύκιν
πέτιν
κωνον

referat, nec colitur, uocant Oenanthe, labruscæ flores, quam & herba sit eiusdem nominis.

Opos.] Codex Pauli Græcus ὀπιον habet, Galenus ὀπος. ὀπος. Superius de lachryma papaueris quæ opium dicitur, actum est. Hic de laserpitii liquore: qui partim belzuinum partim assa fetida dicitur officinis.

Eruum.] Dubitatur, an officinarum eruum uerum sit nam intus flauescit, cum album esse debeat.

Orminum.] Vulgus in Gallia uocant: Toute bonne, aut Balsamitie.

Oryza,] Vulgus Rizam appellat, prima adempta litera. Rizum.

Petroselinū.] Verū petroselinū nō habemus, forte nostrū est apiū hortense, qđ Dioscorides cōdimētis accommodatū dicit.

Peuce] Vbiq; interpretes græcorum πεύκω pinum, interim pinastrum reddunt.

Pistacea.] Officinæ, phistica nominant, aut phystico rum grana. codex græcus male habet λεπτῶν, pro λεπῶν. Nō emē darunt censores nostri. Phytica, Orosius.

Pityides.] Dioscorides pini, piceæq; fructus nominat. Galenus piceæ tātū, illosq; abuti dictione ait qui utriusq; arboris fructū ita appellāt. Sunt aut interni nucum pinearum nuclei.

Poligonatū.] Officinæ Sigillum Maris, nel Salomonis dicunt, item genicularem & fraxinellam. Sigillum, Mariæ.

Pompholyx] Officinæ Tutiam nominant. codex Græcus σαρκώδεις hoc est carnosus ulceribus, pro καρκινώδεις habet. Tutia, Non aduerterunt Aristarchi nostri.

Propolis.] Vnguentarii Ceram uirgineam nuncupant.

Resinæ.] Dici non potest, quā interpretes Græcorū tum antiqui, tum recentiores in arborum quæ resinas fundunt, nomenclaturis euariant. E pinu dixi, quam Græci πεύκω uocāt, hanc Marcellus Thedam exponit, qua ratione, ignoro Gaza, Hermolaus pinū aut pinastrum. Strobilena. Hermolaus uerit Resinā ē Strobilo, ut hæc etiam sit arbor. Nam Plinius de pinu & pinastro agens, Easdem arbores alio nomine esse per oram Italiæ, quas strobilas uocant, pleriq; arbitrantur, &c. Nota, Eadem igitur arbor est strobilus, quæ Conos superius dicta est, pineas nuces ferēs. Ruellius ininterpretatus est. Resinā Strobilinam quæ ex nucibus pineis fiat, secutus Pliniū, qui 16. lib. inquit, pinus fert minimū Resinæ, interdum ex nucibus ipsis. Itaq;

Itaq; cōfundunt hæc nomina *πέυκιν, κώνιν, τρόβιον* addit ē *πύτιν*, pro pinu, aut pinastro, aut picea, cū inter se ēt uiribus respōdeāt, eoq; minus periculi est in expositionū diuersitate.

Rhus.] Officinæ sumach appellant.

Sagapenum.] Seplasiarij Serapinum uocant.

Sandaracha uera.

Sandaracha.] Officinæ ueram sandaracham non habent, aut saltē ignorāt, uernicē team uocantes. uera aut est, quæ in argēti fodinis cū auro & argēto inueniē, flāmeo colore ruffescit, ita ut cinnabarim quasi referat, odore sulphuris uirus: Id qđ in auripigmēto rubrū est, uera est sandaracha, licetq; auripigmēto loco sandarachæ uti, cū idē quasi sint, simulq; alterum alteri iunctū ex fodinis colligātur. Hoc solū differunt, qđ auripigmentum nondū à natura perfectū sit: sandaracha autem per concoctionem naturæ, debitū colorem acceperit.

Seseli.] Tria sunt genera seselios, Massiliēse, Aetiopicū, & peloponnesiacū. Massiliensis descriptio cōuenit cū nostro, siliari mōrano, ut uocant uulgares, at quod officinæ ostendunt, Aethiopici semen uidetur, facillimum est, uerum comparare.

Assa odorata.
Assa foetida.

Sylphium.] Laserpitium herba est, Liqueor Laser uocatur. Affertur partim ex aphrica, armenia, & india, suauissimo odore, præsertim cyrenaicū, unde etiam liqueor Cyrenaicus apud autores uocatur, atq; hic officinis dicitur, assa odorata, seu belzuinū partim ex Media & Syria uiroso odore, qđ liqueorū Medieū, & Syriacū nuncupant, officinæ uero, assam foetidam.

Ceterat.

Sisymbrium.] In Gallia officinæ mentam aquaticam appellant. In Italia Menta florentina uel menta gētilis aut nobilis Nā magis odoratū est. Nisi colatē, in nepetā degenerat.

Scammonium.] Officinæ raro uerum habent.

Scolopendrium.] Seplasiarum Ceterac existit.

Oroscius.
Mirrha.

Scordion.] In fine sententiæ legitur in græco codice *ἐπιπλάττομενον*, pro *ἐπιπαττόμενον* croco enim illini, sed inspergi sicca debent. Castigatores præterierunt.

Oroscius.

Myrrha.] Quam officinæ uendunt myrrham, est deterriora species myrrhæ Optima subuirdis esse debet: cōfracta, cā dida unguiu modo. Legit in codice Græco male *ἐπιπλάτομέιν*, pro *ἐπιπαττόμεν*. Nec hoc annotarunt censores nostri.

Aluminis species.

Solanum.] Vulgus Solatrum nominat.

Alumen.] alūmen scissile officinæ uocant alumē plumę, nimirum quod si frangitur, capillamenta ipsius, uelut pluma esse

esse uideantur. Alumen rotundum raro in officinis inuenitur nonnunquam tamen inter singulorū lapides conspicitur, quibus uisus plumboq; mistis, uitrum paternū & laucium parant. Alumen liquidum, uocat seplapsia, rochæ alumen, cū foditur, liquidum est, postea durefcit: & si igni admoueatut rursus liquefcit. Quod placitū & latercularium à Galeno & Paulo nūcupatur, forte est officinarum alumē scziolæ, ex Gipsi fodinis, pellucens tanquā subtilissima ipsius portio. Sunt adhuc alia aluminis Genera in officinis, sed fictitia, Zuccarinum, quod ex alumine liquido aqua rosacea, & albumine oui conficitur. Mulieres hiuc fucum parant Item alumen catinum ex herba quadam cali uulgo dicta, quæ autem sit adhuc ignoro.

Styrax.] Officinæ storax dicunt. Sed quam illæ uocant, sty racem liquidam uocant, myrrha est stacte. Calamitis autem storax, uerus styrax est de qua ueteres tractant. Styrax,
Stactæ.

Simphitum,] Variant sententiæ recentiorū in huius herbæ cognitione. Adiectum est in codice Græco γλισχρόν τι καὶ κινησ μωδες. Galenus habet γλισχρόν τι καὶ δ' αὖν ὠδες, quod est uiscosum quippiam & moidax. Nota,

Scheni anthos.] Officinæ squinanthos corrupto uocabulo appellant, uerti ego odorati ad differentiam palustris, & rotundi, ad differentiam quadrati seu angulosi. Sæpe autem alterum tantum adijcio, uel odorati, uel rotundi.

Calx.] Perperam in codice græco erat, συντείνει pro θερμαίνει hoc est calefacit. Oroscius nō aduertit. Gemufæus dissimulat ne id ante eum annotasse. Oroscius.

Tragus frumentaceus.] Ita dicitur, ut ab herba distingatur. Nam herba quædam etiam Tragos dicitur.

Altercū.] Deerat in codice græco τῶν ψυχράτων. Instaurauit ex Galeno. Oroscius libenter, omisit, & si necessario addatur, Gemufæus fingit se in exemplari antiquo inuenisse, sed textum tamen impressum, mutilum edidit.

Aes.] In siccioribus corporibus conuenire dicit ad cicatricem ducendam, Sin autem eluatur, in teneris ultima clausula, deerat in codice Græco, necessario addenda, pp superiorē sniam, nempe in siccioribus, hoc est duris. Legēdum itaq; uenit, εἰ δὲ πλυθείη τῇ ἀπλύτου ἐπὶ τῶν ἀπαλασαρκῶν χροσσιμώτερον. Ad uerbū fere ex Galeno. Nō obseruauit cēsores nostri.

Chamædrys] Quasi dicas humilis quærcus, unde etiam uulgus,

Iua mu-
scata.

vulgus, querculam minorem appellat.

Chamæpitys.] Hoc est humilis pinus aut picea, officinæ Iuam muscatam uocant hanc antiquorum chamæpityn.

Chrysocolla.] Officinæ uocant Borax.

Ocymum.] Vulgo Basilicum dicitur.

IN IIII. CAPVT.

AD affectum induratum.] Recte dixit *μοχλεῖσθαι* quasi uete quadam agitare. Male autem in codice græco *ἐσκληρωμένον* pro *ἐσκληρωμένον*, neglexerunt castigatores.

Sed etiam à neruis & neruosis partibus.] Orosius diligens ut ipse sibi uideatur, castigator, legit in codice græco *ἀπὸ πλινθίων*, quod est à costis aut latere ut idē uertit, pro *ἀπὸ νερῶν*. Aetius & Oribasius nobiscum sentiunt.

Elaterium.] Paulus aliter quàm Dioscorides Elaterium commendat porraceum. Nam candidum colore optimū uidetur Dioscoridi, nisi porraceum aliter intelligi debeat, quod Græci *πρασίζον* nominant.

Lathyrides.] Species Tithymali est. Capit hic Paulus Lathyrides pro ipsis granis fruticis, cum alioquin lathyris ipse frutex uocetur. Dioscorides & Aetius *σπερμάτια* hoc est grana Lathyridis septem aut octo propinant.

Polypodium.] In Græco codice est *ἐπιπλαθεῖσα* pro *ἐπιπαθεῖσα*. Nō emendarunt Aristarchi nostri.

IN V. CAPVT.

COlocynthidis medullæ.] Hæc sunt Catapotia, quæ officinæ uocant Cochias. Deprauata autem est scriptura in codice Græco, habet enim *ἀλόης με. α.* hoc est, aloes pars una. Gale, unde Paulus transcripsit, lib. 1. de compositione medicamentorum secundum locos, *ἀλόης* habet *με. ω.* hoc est partes duæ. Castigatores omiserunt.

Purgatio ex maliscotoneis.] Nimis magnū uidetur pondus piperis, nempe unciæ sex forte drachmæ sex.

Oliuæ purgantes.] Habetur in compositione oliuarii colymbadum, scissarum, hoc est, ut melius perfundi liquore possint. Aetius libro tertio, inquit, oliuas sigillatim tribus scissuris infectas in eodem liquore aliquot diebus cōficcito & utere. Catapotia ex lapide armenico.] Scammonie pondus erat nimis grande, unciæ sex, mendumq; in codice Græco esse puto, nam legitur s. hoc est unciæ sex pro *το. S.* quid est semuncia facilis

eilis lapsus, cum quasi eadem literę utriusq; facies sit.

Vbi uenter inanitus.] In Gręco lege post κένωσιν, γαστέ-
ρος. Nō fuit uersa in γαστέρος, ὀβόλους dictio, ut putat Castiga-
tor Baglięsis. Orosci⁹ hūc & superiorē locū prę studio omisit.

Puls.] In titulo est Gręce ὠδιδιμαῖς tu fac οἰδιδιμαῖς, quasi
œdematosis.

IN VII. CAPVT.

Frictione & medicaminum potu.] non purgantiū, sed ob-
tundentium uim medicaminis pręsumpti, intelligito.

IN VIII. CAPVT.

Mellis quod sufficit.] Post τὸ ἀρκεῖν. In codice Gręco, ad-
de, ἄλλως. Hoc est aliter, omiserunt censores nostri.

Hiera Archigenis.] In Gręco cod. pro πάλιν quidam φύλα-
ον legunt.

IN X. CAPVT.

Recipue induratis.] Melius in codice Gręco legitur τῶν
ἐσκληρωμένων pro τῶν ἀσκιζόμενων, quod est scyrrho ob-
ductis. Nam scyrthus nūquam potest emolliiri aut discuti, aut
medicamentis intro sumptis amoueri.

Apii radicis.] Apios herba est, cuius radicis alia pars sur-
sum, alia infra purgat, ne putes hic apium, quod gręci σέλινον
dicunt, intelligi.

Purgatio paulatim respondeat.] In Gręco est κατὰ λόγον,
fac tu κατ' ὀλίγον, neglexerunt castigatores.

IN XI. CAPVT.

Hedychroi.] Paulus ad uerbum quasi ex commētario Ga-
leni ad Pamphilianum transcripsit: sed exemplaria mirū
in modum uariant;

Carpobalsamī.] Huc usq; conueniūt scripturę; Galenus
in citato libello Carpobalsamum non habet; uerum primo
de Antidotis, opobalsamum addit: non Carpobalsamum. Prę-
terea in ponderibus dissentiunt, & in nonnullis aliis simplici-
bus medicamentis. Galeni itaq; ad Pamphilianum codex ita
pergit, lunci odorati floris drachmę duodecim, secūdū alios,
uigintiquatuor. Cinamomi drachmę duodecim, amomi: Ca-
sie, rhapōtici singulorū drachmę quindecim, nardi indicę, fo-
lij singul. drachmę sede cim, myrrhę, croci, singul. drachmę
duodecim, uino falerno excipito in opobalsamū manus intin-
gēs. Alia habet in cōmentario de Antidotis, sed uariat magis.

Pastilli

Pastilli scillini.] Carnis ipsius partes duæ, hoc est, ut Gale-
nus ait drachmæ centum uiginti, erui farinæ drach. sexaginta.

Pastillorum Hedychroi.] Deest in Græco ἀγρίσκων. An-
tea uerteram magmatis hedychoi, secundum Galenū de An-
tidotis, quod Oroscius reprehendit sine causa.

Nota. Rosarum siccarum drachmæ duodecim.] Textus Græcus
habet. <.ι. hoc est drachmæ quindecim. Oroscius castigās
locum, ait legendum <.ιι. quod est drachmæ undecim. Ego
<.ιβ. hoc est drachmæ duodecim, scribendum esse iudico Ga-
leni exemplaribus tum de Antidotis, tum ad Pamphilianum,
tum uersibus Andromachi consentientibus.

Napi seminit.] Galenus adiicit γογγύλιδος ἀγρίας, quod
Oroscius. est Rapi syluestris, præterijt Oroscius.

Dictamni.] Post dictamni habetur in Græco αἰθους, quod
expungi debet. Oroscius ex Galeno.

Masticæ Chizæ.] Pauli codex Chizæ non habet. Ex Gale-
no addendum.

Cassiz nigræ.] Galenus Cassiz fistulæ nigræ.

Nardi Indicæ.] Paulus καρδωσάχυνος hoc est spicæ nardi,
Sed Galenus ubiq; nardi indicæ habet, quanquam Aetios spi-
cæ nardi etiam legat. Post nardi Indicæ, deest pondus in Græ-
co < S hoc est drachmæ sex.

Carpobalsami.] In Codice Græco tantum erat βαλσα-
μον. Ex Galeno intaurandam καρποβαλσάμον.

Phu pōtici.] male legebat i Græco φε, ἀπὸ πρ πρ ποντικῆ.

Centaurii.] Omnes Theriacæ descriptiones apud Galenū
habent κενταυρίον quod est centaurii tenuis.

Liquore hypocythidos.] Perperam in Græco ἐπυον ὑπο-
κυθίδος pro ὀπον ὑποκυθίδος.

In nephriticis cū mulso.] Male Græcus codex habet ἐπὶ
νεφρικῶν μετ' ὀνομέλitos pro ἐπὶ νεφριτικῶν μετ' ὀνομέλitos,
ex Galeno castigatum. Basiliensis castigator omisit.

Sumuntur uiperæ.] Ex libello Galeni de Theriaca ad Pā-
philianū ad uerbū sunt trāscripta nisi quod deest in illo, apii.

Ruræ satiuæ feminis libra.] Paulus habet. β. hoc est sexta
rii duo, male nimirū pro λιβ, ut habet Gale. omisit. Oroscius.

Malabathri foliorū.] Codex Pauli habet singulorū uncia;
Galenus uncis quatuor. Ita ēt Aetius. Neglexit Oroscius.

Thymi summitatū.] Hic quoq; castigandus codex. Legen-
dumq;

dumq; Γο.θ. pro Γο.β. secundum Galenum & Aetium.

Piperis nigri, scæniculi singulorum libris.] Male in codice Græco Pauli λ.κ. habet pro λ.β. sed facilis error erat, ponere ω, pro κ. primum signat β secundum, litteram ητα, quam Latini in e uertunt, ualet autem in numero, octo.

Tordyli montani.] Deest in codice Pauli, ex Galeno plane restituendum. Neglexerunt Orosius, & Gemusæus, tanquam non addenda compendio.

Philonis antidotum.] In Græco est εοσκνάμκ κ. ubi legendum εοσκνάμου < κ. quod præterierunt Aristarchi nostri.

Esdra.] in fine compositionis quidam legunt σέρεως hoc est iutybi pro σισέλεως.

Medicamentum Cyphoides.] Textus Græcus & mutilus, & deprauatus est. Legendum enim καλαμου < β. S. βδελλίς < β. S. κασσίας < α. κινάωνου τριώβολον, ιάρθρου στάχυος < γ. σχοίνος άνθους < β. S. Orosius & castigator Basilienfis reliquerunt textum deprauatum.

Compositio atactos, Piperis albi & nigri.] Deest in codice Græco πίπερεως. Orosius omisit.

IN XII. CAPVT.

Terra samia cū cremore ptisanæ.] In Græco est διαχυλῆ πτίσανης, forte μετὰ χυλῆ. Notauit etiam Orosius, Gemusæus autem omisit.

Herbæ pulicaris succo.] In fine capitis puto Græcū codicē esse deprauatū, quā proximē aut licuit, ad ueritatē cōuerti.

IN XVI. CAPVT.

Quidam uino, aut succo.] Codex Græcus hic rursus deprauatus est. Habet enim εἰμὴ οἶνω ἢ χύλω τινὶ λικύντε καὶ τριβέν, &c. pro εἰ μὲν οἶνω καὶ τριβέν δὲ αὐτὰ. Neglexit castigator Basilienfis.

Lectio Græca deprauata.

IN XVII. CAPVT.

Oesypo.] In principio Capitis Græcus codex habet, εσσωπῶρ ρ αἰσυνῶρ hoc est Oesypo. Aristarchi nři præterierūt.

Lixiuū ē ficu cui calx.] Græci hoc lixiuium uocant κοιλαν προτόφακτον Orosius, aliiq; multi uertunt, lixiuium quod primum distillauerit, Paulus autem lib. 7. ipse interpretatur, lixiuium cui calx sit admista.

Orosius,

Emplastrum ex dictamno.] Textus Græcus deprauatus corrigi debet ex Galeno de compo. medicamentorū secundum

dum genera in hunc modū λεπιδος < S. χαλκῆ κεκαυμένου
< .η. αλοῆς. < .η. χαλβάνης. < .ιβ. ut nos uertimus.

Aristolochiæ rotundæ & longæ drachmæ quatuor.] In em-
plastro dia cinnabareos codex Græcus habet post pōdus præ-
scriptum Ϟο, S quod est semuncia. Sed quatuor drachmæ ua-
lent semuncia, puto superfluum Neglexerunt Castigatores.

Olei ueteris.] In fine Emplastri ex lapidis asij flore. Græ-
cus codex superflue habet ὄξους δρυμνιάτου. Nam superius
mētionē aceti fecerat Paulus. Oroscius & Gemus. omiserunt:

IN XVIII. CAPVT.


Sertulæ cāpanæ.] In malagmate polyarchio, Deest μελλί-
της. Instauratum ex Galeno. Neglexerūt hoc correctores.

Pentamyron. In medicamento quædam sunt superflua, &
nomen ipsum Græcum indicat, quinq; tantum significans, &
Oribasius consentit. Ita autem sonant ea quæ adijciuntur, fo-
lia tum, phylli unciz tres, ammoniaci uncia: Cassiæ unciz sex,
Ladani, &c. aut in fine addendum, ladant unciz sex.

Seui Taurini.] In medicamento diaspermation deest co-
dici græco λ. ι. Vt sit seui Taurini libra. Sic etiam habet Ale-
xander medicus, omisit Oroscius & castigator Basiliensis.

Copton.] Sic dicitur medicamentum, quod nō coquitur,
uerum tunditur, & succis aut liquidus affusus, ad figuram ma-
lagmatis redigitur.

FINIS LIBRI VLTIMI COMMENTARIORVM.




R E G I S T R V M.

* * * * * a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z,

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z,

A a B b C c D d E e F f G g H h.

Omnes sunt quaterniones,



Et dicitur in hoc tractatu
de sancto spiritu. et dicitur
in hoc tractatu.

Ex hereditate bo. me. Francisci
Antonij Archiepi Acheronein' &
Materanen'.

